

第3部

身体状況調査の結果

◆第13表◆ 身長・体重の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

年齢(歳)	男						女					
	身長(cm)		体重(kg)		標準偏差		身長(cm)		体重(kg)		標準偏差	
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
1	43	80.2	4.2	43	10.9	1.3	48	78.6	4.7	48	10.4	1.4
2	55	88.6	4.6	55	12.9	1.5	39	88.8	4.8	39	12.5	1.6
3	53	96.4	7.0	53	14.8	2.2	53	95.3	3.6	53	14.3	1.8
4	47	104.2	5.9	47	16.8	2.4	41	102.9	5.1	41	16.5	2.7
5	43	110.8	5.1	43	19.5	3.3	37	110.8	4.9	37	19.5	4.0
6	62	115.5	5.1	62	20.8	3.1	51	116.4	6.1	51	21.4	4.5
7	52	123.1	5.9	52	25.5	6.2	58	120.9	5.3	58	23.0	3.3
8	39	126.8	4.3	39	26.8	3.8	50	126.2	4.2	50	25.2	3.9
9	52	132.9	5.8	52	29.9	4.7	44	133.4	6.5	44	30.1	6.2
10	60	139.8	6.0	60	34.9	7.2	48	139.0	6.4	48	33.4	6.5
11	53	143.7	8.0	53	37.9	6.9	48	144.3	6.8	48	36.5	7.4
12	42	151.3	9.5	42	45.8	9.7	51	152.0	5.3	51	43.3	6.7
13	43	159.3	8.1	43	50.9	11.3	46	155.2	4.4	46	46.3	7.2
14	40	162.1	7.8	40	52.9	10.1	37	156.9	5.5	37	51.1	9.2
15	38	167.7	5.1	38	58.4	12.0	48	157.1	4.4	48	50.4	7.8
16	43	170.3	6.5	43	59.2	8.4	46	158.0	4.5	46	51.6	9.8
17	36	170.9	5.2	36	65.2	15.9	50	157.7	4.4	50	51.9	6.5
18	42	171.1	6.0	42	61.9	9.5	53	157.5	5.4	53	53.7	11.6
19	30	172.0	5.3	29	65.6	10.4	38	157.7	4.9	37	51.9	7.0
20	43	169.2	5.2	43	61.7	8.9	38	157.2	5.0	38	49.6	5.9
21	40	169.8	5.5	40	62.2	9.5	50	158.1	5.0	49	51.3	8.0
22	35	172.3	4.6	35	63.3	10.1	43	159.8	5.9	42	53.1	5.9
23	27	170.7	5.8	27	64.4	9.7	39	157.2	5.7	37	50.3	9.6
24	35	171.2	5.3	35	63.4	7.9	47	159.5	5.7	44	52.2	9.7
25	37	172.5	6.3	37	68.9	11.6	35	157.8	6.6	33	51.2	6.6
26~29	169	171.2	6.6	169	65.8	10.4	200	158.1	4.9	188	52.5	8.0
30~39	511	170.8	6.2	507	69.4	11.8	640	157.7	5.4	619	53.4	9.5
40~49	504	170.2	5.8	503	69.4	9.9	625	156.2	5.1	625	55.2	8.8
50~59	642	166.2	6.0	640	65.9	9.9	830	153.7	5.6	829	54.3	8.6
60~69	666	163.5	5.9	665	63.3	9.3	823	150.5	5.2	822	53.3	8.3
70歳以上	660	159.7	6.4	661	57.6	9.3	892	146.2	6.5	891	49.6	8.7
(再掲)												
20歳以上	3,369	166.2	7.4	3,362	64.7	10.8	4,262	153.0	7.1	4,217	52.8	8.9
20~29	386	171.0	6.0	386	64.7	10.2	452	158.2	5.3	431	51.8	7.9
60~64	334	164.2	5.9	334	64.4	9.4	399	151.4	5.3	398	52.9	8.1
65~69	332	162.8	5.9	331	62.2	9.0	424	149.7	5.1	424	53.7	8.5
70~74	303	160.9	6.4	303	59.9	9.2	368	147.8	5.9	368	52.0	8.4
75~79	188	160.1	5.9	188	57.7	8.8	267	146.3	6.0	267	49.6	8.8
80歳以上	169	157.0	6.0	170	53.2	8.3	257	143.6	6.9	256	46.0	7.9

注) 体重は妊婦除外

◆第14表◆ BMIの平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

年 齢（歳）	男			女		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	3,549	23.24	3.30	4,450	22.53	3.60
15～19歳	188	21.24	3.40	233	20.90	3.25
20～29	386	22.10	3.09	431	20.73	3.11
30～39	507	23.76	3.72	619	21.44	3.55
40～49	503	23.95	3.10	625	22.61	3.49
50～59	640	23.81	3.05	829	22.96	3.42
60～69	665	23.65	2.97	822	23.56	3.53
70歳以上	660	22.55	3.22	891	23.17	3.62
（再掲）						
20歳以上	3,361	23.35	3.25	4,217	22.62	3.60
20～69歳	2,701	23.55	3.23	3,326	22.47	3.58
40～69	1,808	23.79	3.03	2,276	23.08	3.50
65～69	331	23.43	2.91	424	23.97	3.58
70～74	303	23.14	3.22	368	23.77	3.43
75～79	188	22.47	2.94	267	23.19	3.94
80～84	105	21.44	3.09	161	22.56	3.35
80歳以上	169	21.57	3.29	256	22.27	3.35
85歳以上	64	21.78	3.62	95	21.79	3.31

注) 妊婦除外

◆第15表◆ BMIの分布（15歳以上）

	全 国	男	女
	人数（割合%）	人数（割合%）	人数（割合%）
総数（有効回答数）	7,999（100.0）	3,549（100.0）	4,450（100.0）
15未満	14（0.2）	7（0.2）	7（0.2）
15～16未満	27（0.3）	8（0.2）	19（0.4）
16～17未満	116（1.5）	41（1.2）	75（1.7）
17～18未満	281（3.5）	85（2.4）	196（4.4）
18～19未満	517（6.5）	161（4.5）	356（8.0）
19～20未満	723（9.0）	260（7.3）	463（10.4）
20～21未満	902（11.3）	339（9.6）	563（12.7）
21～22未満	934（11.7）	395（11.1）	539（12.1）
22～23未満	949（11.9）	452（12.7）	497（11.2）
23～24未満	886（11.1）	435（12.3）	451（10.1）
24～25未満	740（9.3）	407（11.5）	333（7.5）
25～26未満	559（7.0）	305（8.6）	254（5.7）
26～27未満	449（5.6）	240（6.8）	209（4.7）
27～28未満	312（3.9）	158（4.5）	154（3.5）
28～29未満	203（2.5）	100（2.8）	103（2.3）
29～30未満	133（1.7）	63（1.8）	70（1.6）
30～31未満	67（0.8）	31（0.9）	36（0.8）
31～32未満	59（0.7）	20（0.6）	39（0.9）
32～33未満	54（0.7）	14（0.4）	40（0.9）
33～34未満	24（0.3）	9（0.3）	15（0.3）
34～35未満	14（0.2）	3（0.1）	11（0.2）
35以上	36（0.5）	16（0.5）	20（0.4）

注) 妊婦除外

◆第16表◆ BMI の状況 (性・年齢階級別)

(%)

		総数 (実数)	やせ	普通	肥満
男	総 数	100.0 (3,361)	5.3	66.9	27.8
	20 ~ 29 歳	100.0 (386)	8.0	77.2	14.8
	30 ~ 39	100.0 (507)	5.1	62.1	32.7
	40 ~ 49	100.0 (503)	1.6	64.0	34.4
	50 ~ 59	100.0 (640)	2.8	66.3	30.9
	60 ~ 69	100.0 (665)	3.2	66.2	30.7
	70 歳 以上	100.0 (660)	11.2	67.9	20.9
	(再掲)				
	20~69歳	100.0 (2,701)	3.9	66.6	29.5
	40~69	100.0 (1,808)	2.6	65.6	31.8
	65~69	100.0 (331)	4.8	67.7	27.5
	70~74	100.0 (303)	6.3	67.7	26.1
	75~79	100.0 (188)	11.2	69.7	19.1
	80~84	100.0 (105)	20.0	67.6	12.4
	85 歳 以上	100.0 (64)	20.3	64.1	15.6
女	総 数	100.0 (4,217)	10.1	67.8	22.2
	20 ~ 29 歳	100.0 (431)	23.4	68.4	8.1
	30 ~ 39	100.0 (619)	14.7	72.7	12.6
	40 ~ 49	100.0 (625)	7.2	73.0	19.8
	50 ~ 59	100.0 (829)	6.6	69.6	23.8
	60 ~ 69	100.0 (822)	6.4	63.3	30.3
	70 歳 以上	100.0 (891)	8.9	62.9	28.3
	(再掲)				
	20~69歳	100.0 (3,326)	10.4	69.1	20.5
	40~69	100.0 (2,276)	6.7	68.2	25.0
	65~69	100.0 (424)	4.5	60.1	35.4
	70~74	100.0 (368)	5.4	61.7	32.9
	75~79	100.0 (267)	9.4	62.5	28.1
	80~84	100.0 (161)	12.4	64.6	23.0
	85 歳 以上	100.0 (95)	14.7	65.3	20.0

注) 妊婦除外。BMIによる肥満の判定は p.18 参照

◆第17表◆ 日比式肥満区分〔児童・生徒〕(性・年齢階級別)

(%)

		総 数	6～8歳	9～11歳	12～14歳
全 国	総 数	876 (100.0)	312 (100.0)	305 (100.0)	259 (100.0)
	-30%未満	4 (0.5)	1 (0.3)	2 (0.7)	1 (0.4)
	-30%以上～-20%未満	17 (1.9)	4 (1.3)	8 (2.6)	5 (1.9)
	-20%以上～-10%未満	109 (12.4)	25 (8.0)	41 (13.4)	43 (16.6)
	-10%以上～ 0%未満	321 (36.6)	121 (38.8)	101 (33.1)	99 (38.2)
	0%以上～+10%未満	228 (26.0)	97 (31.1)	76 (24.9)	55 (21.2)
	+10%以上～+20%未満	102 (11.6)	34 (10.9)	41 (13.4)	27 (10.4)
	+20%以上～+30%未満	56 (6.4)	19 (6.1)	23 (7.5)	14 (5.4)
	+30%以上～+40%未満	16 (1.8)	5 (1.6)	4 (1.3)	7 (2.7)
	+40%以上	23 (2.6)	6 (1.9)	9 (3.0)	8 (3.1)
男	総 数	443 (100.0)	153 (100.0)	165 (100.0)	125 (100.0)
	-30%未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	-30%以上～-20%未満	10 (2.3)	3 (2.0)	5 (3.0)	2 (1.6)
	-20%以上～-10%未満	57 (12.9)	15 (9.8)	19 (11.5)	23 (18.4)
	-10%以上～ 0%未満	149 (33.6)	56 (36.6)	49 (29.7)	44 (35.2)
	0%以上～+10%未満	122 (27.5)	49 (32.0)	44 (26.7)	29 (23.2)
	+10%以上～+20%未満	56 (12.6)	16 (10.5)	29 (17.6)	11 (8.8)
	+20%以上～+30%未満	26 (5.9)	7 (4.6)	13 (7.9)	6 (4.8)
	+30%以上～+40%未満	8 (1.8)	3 (2.0)	2 (1.2)	3 (2.4)
	+40%以上	15 (3.4)	4 (2.6)	4 (2.4)	7 (5.6)
女	総 数	433 (100.0)	159 (100.0)	140 (100.0)	134 (100.0)
	-30%未満	4 (0.9)	1 (0.6)	2 (1.4)	1 (0.7)
	-30%以上～-20%未満	7 (1.6)	1 (0.6)	3 (2.1)	3 (2.2)
	-20%以上～-10%未満	52 (12.0)	10 (6.3)	22 (15.7)	20 (14.9)
	-10%以上～ 0%未満	172 (39.7)	65 (40.9)	52 (37.1)	55 (41.0)
	0%以上～+10%未満	106 (24.5)	48 (30.2)	32 (22.9)	26 (19.4)
	+10%以上～+20%未満	46 (10.6)	18 (11.3)	12 (8.6)	16 (11.9)
	+20%以上～+30%未満	30 (6.9)	12 (7.5)	10 (7.1)	8 (6.0)
	+30%以上～+40%未満	8 (1.8)	2 (1.3)	2 (1.4)	4 (3.0)
	+40%以上	8 (1.8)	2 (1.3)	5 (3.6)	1 (0.7)

注) 日比式による区分は p.18 参照

◆第18表◆ 腹囲の区分（性・年齢階級別）

	総数(実数)	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上
全	100.0 (6,681)	100.0 (300)	100.0 (576)	100.0 (926)	100.0 (940)	100.0 (1,250)	100.0 (1,347)	100.0 (1,342)	100.0 (6,381)
国	70.6 (4,717)	94.0 (282)	90.3 (520)	80.2 (743)	72.8 (684)	68.9 (861)	59.6 (803)	61.4 (824)	69.5 (4,435)
	29.4 (1,964)	6.0 (18)	9.7 (56)	19.8 (183)	27.2 (256)	31.1 (389)	40.4 (544)	38.6 (518)	30.5 (1,946)
男	100.0 (2,861)	100.0 (134)	100.0 (262)	100.0 (386)	100.0 (392)	100.0 (515)	100.0 (589)	100.0 (583)	100.0 (2,727)
	55.4 (1,585)	90.3 (121)	83.2 (218)	61.9 (239)	52.6 (206)	45.4 (234)	45.7 (269)	51.1 (298)	53.7 (1,464)
	44.6 (1,276)	9.7 (13)	16.8 (44)	38.1 (147)	47.4 (186)	54.6 (281)	54.3 (320)	48.9 (285)	46.3 (1,263)
女	100.0 (3,820)	100.0 (166)	100.0 (314)	100.0 (540)	100.0 (548)	100.0 (735)	100.0 (758)	100.0 (759)	100.0 (3,654)
	82.0 (3,132)	97.0 (161)	96.2 (302)	93.3 (504)	87.2 (478)	85.3 (627)	70.4 (534)	69.3 (526)	81.3 (2,971)
	18.0 (688)	3.0 (5)	3.8 (12)	6.7 (36)	12.8 (70)	14.7 (108)	29.6 (224)	30.7 (233)	18.7 (683)

注) 妊婦除外

◆第19表◆ BMI・腹囲の区分（性・年齢階級別）

	総数(実数)	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上
全	100.0 (6,681)	100.0 (300)	100.0 (576)	100.0 (926)	100.0 (940)	100.0 (1,250)	100.0 (1,347)	100.0 (1,342)	100.0 (6,381)
国	64.3 (4,299)	90.0 (270)	85.2 (491)	73.9 (684)	65.7 (618)	60.6 (757)	53.6 (722)	56.4 (757)	63.1 (4,029)
	10.9 (727)	0.3 (1)	3.0 (17)	4.2 (39)	7.4 (70)	11.9 (149)	16.1 (217)	17.4 (234)	11.4 (726)
	6.3 (418)	4.0 (12)	5.0 (29)	6.4 (59)	7.0 (66)	8.3 (104)	6.0 (81)	5.0 (67)	6.4 (406)
	18.5 (1,237)	5.7 (17)	6.8 (39)	15.6 (144)	19.8 (186)	19.2 (240)	24.3 (327)	21.2 (284)	19.1 (1,220)
男	100.0 (2,861)	100.0 (134)	100.0 (262)	100.0 (386)	100.0 (392)	100.0 (515)	100.0 (589)	100.0 (583)	100.0 (2,727)
	52.4 (1,500)	86.6 (116)	79.4 (208)	56.5 (218)	49.0 (192)	42.7 (220)	43.1 (254)	50.1 (292)	50.8 (1,384)
	19.7 (565)	0.7 (1)	6.5 (17)	9.1 (35)	15.3 (60)	25.8 (133)	26.5 (156)	28.0 (163)	20.7 (564)
	3.0 (85)	3.7 (5)	3.8 (10)	5.4 (21)	3.6 (14)	2.7 (14)	2.5 (15)	1.0 (6)	2.9 (80)
	24.9 (711)	9.0 (12)	10.3 (27)	29.0 (112)	32.1 (126)	28.7 (148)	27.8 (164)	20.9 (122)	25.6 (699)
女	100.0 (3,820)	100.0 (166)	100.0 (314)	100.0 (540)	100.0 (548)	100.0 (735)	100.0 (758)	100.0 (759)	100.0 (3,654)
	73.3 (2,799)	92.8 (154)	90.1 (283)	86.3 (466)	77.7 (426)	73.1 (537)	61.7 (468)	61.3 (465)	72.4 (2,645)
	4.2 (162)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.7 (4)	1.8 (10)	2.2 (16)	8.0 (61)	9.4 (71)	4.4 (162)
	8.7 (333)	4.2 (7)	6.1 (19)	7.0 (38)	9.5 (52)	12.2 (90)	8.7 (66)	8.0 (61)	8.9 (326)
	13.8 (526)	3.0 (5)	3.8 (12)	5.9 (32)	10.9 (60)	12.5 (92)	21.5 (163)	21.3 (162)	14.3 (521)

注) 妊婦除外

◆第20表の1◆ 服薬有の者の割合（全国，年齢階級別）

（％）

	総数 (実数)	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
血圧を下げる薬	19.9 (1,191)	0.0 (0)	1.1 (9)	4.1 (35)	13.7 (164)	29.2 (376)	46.5 (607)
脈の乱れを治す薬	3.8 (227)	0.0 (0)	0.6 (5)	0.7 (6)	2.1 (25)	4.6 (59)	10.1 (132)
インスリン注射 又は 血糖を下げる薬	4.1 (244)	0.0 (0)	0.6 (5)	1.5 (13)	3.8 (45)	6.0 (77)	8.0 (104)
コレステロールを 下げる薬	9.2 (549)	0.4 (2)	1.1 (9)	1.8 (15)	7.4 (89)	15.2 (196)	18.2 (238)

注) 妊婦除外

◆第20表の2◆ 服薬有の者の割合（男，年齢階級別）

（％）

	総数 (実数)	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
血圧を下げる薬	19.9 (494)	0.0 (0)	1.5 (5)	4.4 (15)	13.6 (64)	30.9 (171)	42.8 (239)
脈の乱れを治す薬	5.1 (127)	0.0 (0)	0.6 (2)	0.6 (2)	2.6 (12)	5.8 (32)	14.2 (79)
インスリン注射 又は 血糖を下げる薬	5.2 (129)	0.0 (0)	0.3 (1)	2.1 (7)	4.7 (22)	8.2 (45)	9.7 (54)
コレステロールを 下げる薬	6.9 (172)	0.4 (1)	0.9 (3)	1.8 (6)	5.3 (25)	10.5 (58)	14.2 (79)

◆第20表の3◆ 服薬有の者の割合（女，年齢階級別）

（％）

	総数 (実数)	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
血圧を下げる薬	19.8 (697)	0.0 (0)	0.8 (4)	3.9 (20)	13.8 (100)	27.9 (205)	49.2 (368)
脈の乱れを治す薬	2.8 (100)	0.0 (0)	0.6 (3)	0.8 (4)	1.8 (13)	3.7 (27)	7.1 (53)
インスリン注射 又は 血糖を下げる薬	3.3 (115)	0.0 (0)	0.8 (4)	1.2 (6)	3.2 (23)	4.4 (32)	6.7 (50)
コレステロールを 下げる薬	10.7 (377)	0.4 (1)	1.2 (6)	1.7 (9)	8.8 (64)	18.8 (138)	21.3 (159)

注) 妊婦除外

◆第21表の1◆ 血圧の状況（性・年齢階級別）

（%）

		総数（実数）	至適血圧	正常血圧	正常高値血圧	軽症高血圧	中等症高血圧	重症高血圧
総数	総数	100.0 (5,806)	29.3	17.2	18.0	24.1	8.9	2.4
	15～19歳	100.0 (194)	78.4	13.9	5.2	2.6	0.0	0.0
	20～29	100.0 (433)	66.3	20.1	9.2	3.7	0.2	0.5
	30～39	100.0 (767)	60.4	20.6	9.0	8.1	1.3	0.7
	40～49	100.0 (773)	37.5	23.0	18.6	15.1	4.3	1.4
	50～59	100.0 (1,118)	21.0	19.4	23.1	25.0	9.1	2.3
	60～69	100.0 (1,260)	13.3	14.1	20.2	34.9	13.7	3.8
	70歳以上	100.0 (1,261)	8.6	12.4	21.4	38.2	15.6	3.7
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	100.0 (1,209) 100.0 (704)	11.2 7.7	11.7 12.8	21.7 20.5	38.0 38.2	13.6 16.8	3.7 4.1
男	総数	100.0 (2,322)	20.6	17.9	20.9	27.3	10.4	2.9
	15～19歳	100.0 (91)	72.5	16.5	7.7	3.3	0.0	0.0
	20～29	100.0 (170)	45.3	28.2	16.5	8.8	0.0	1.2
	30～39	100.0 (277)	37.2	31.4	14.1	14.8	1.4	1.1
	40～49	100.0 (281)	24.2	23.8	20.6	23.1	5.3	2.8
	50～59	100.0 (424)	14.4	15.6	27.1	27.4	12.0	3.5
	60～69	100.0 (535)	10.7	12.0	22.1	37.6	14.2	3.6
	70歳以上	100.0 (544)	8.5	12.5	22.1	35.5	17.6	3.9
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	100.0 (527) 100.0 (290)	9.1 8.3	10.1 13.1	21.8 21.7	41.2 33.8	14.6 18.3	3.2 4.8
女	総数	100.0 (3,484)	35.2	16.8	16.1	22.0	7.9	2.0
	15～19歳	100.0 (103)	83.5	11.7	2.9	1.9	0.0	0.0
	20～29	100.0 (263)	79.8	14.8	4.6	0.4	0.4	0.0
	30～39	100.0 (490)	73.5	14.5	6.1	4.3	1.2	0.4
	40～49	100.0 (492)	45.1	22.6	17.5	10.6	3.7	0.6
	50～59	100.0 (694)	25.1	21.8	20.6	23.6	7.3	1.6
	60～69	100.0 (725)	15.2	15.7	18.8	33.0	13.4	4.0
	70歳以上	100.0 (717)	8.8	12.3	20.9	40.3	14.1	3.6
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	100.0 (682) 100.0 (414)	12.8 7.2	13.0 12.6	21.6 19.6	35.6 41.3	12.9 15.7	4.1 3.6

注) 2回測定の平均値

◆第21表の2◆ 血圧の状況（性・年齢階級別）

（％）

		総数（実数）	至適血圧	正常血圧	正常高値血圧	軽症高血圧	中等症高血圧	重症高血圧
総数	総数	100.0 (5,779)	29.1	17.2	18.1	24.3	8.9	2.4
	15～19歳	100.0 (193)	78.8	13.5	5.2	2.6	0.0	0.0
	20～29	100.0 (421)	66.0	20.0	9.5	3.8	0.2	0.5
	30～39	100.0 (753)	59.9	20.7	9.2	8.2	1.3	0.7
	40～49	100.0 (773)	37.5	23.0	18.6	15.1	4.3	1.4
	50～59	100.0 (1,118)	21.0	19.4	23.1	25.0	9.1	2.3
	60～69	100.0 (1,260)	13.3	14.1	20.2	34.9	13.7	3.8
	70歳以上	100.0 (1,261)	8.6	12.4	21.4	38.2	15.6	3.7
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	100.0 (1,209) 100.0 (704)	11.2 7.7	11.7 12.8	21.7 20.5	38.0 38.2	13.6 16.8	3.7 4.1
男	総数	100.0 (2,322)	20.6	17.9	20.9	27.3	10.4	2.9
	15～19歳	100.0 (91)	72.5	16.5	7.7	3.3	0.0	0.0
	20～29	100.0 (170)	45.3	28.2	16.5	8.8	0.0	1.2
	30～39	100.0 (277)	37.2	31.4	14.1	14.8	1.4	1.1
	40～49	100.0 (281)	24.2	23.8	20.6	23.1	5.3	2.8
	50～59	100.0 (424)	14.4	15.6	27.1	27.4	12.0	3.5
	60～69	100.0 (535)	10.7	12.0	22.1	37.6	14.2	3.6
	70歳以上	100.0 (544)	8.5	12.5	22.1	35.5	17.6	3.9
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	100.0 (527) 100.0 (290)	9.1 8.3	10.1 13.1	21.8 21.7	41.2 33.8	14.6 18.3	3.2 4.8
女	総数	100.0 (3,457)	34.8	16.8	16.2	22.2	7.9	2.1
	15～19歳	100.0 (102)	84.3	10.8	2.9	2.0	0.0	0.0
	20～29	100.0 (251)	80.1	14.3	4.8	0.4	0.4	0.0
	30～39	100.0 (476)	73.1	14.5	6.3	4.4	1.3	0.4
	40～49	100.0 (492)	45.1	22.6	17.5	10.6	3.7	0.6
	50～59	100.0 (694)	25.1	21.8	20.6	23.6	7.3	1.6
	60～69	100.0 (725)	15.2	15.7	18.8	33.0	13.4	4.0
	70歳以上	100.0 (717)	8.8	12.3	20.9	40.3	14.1	3.6
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	100.0 (682) 100.0 (414)	12.8 7.2	13.0 12.6	21.6 19.6	35.6 41.3	12.9 15.7	4.1 3.6

注) 妊婦除外。2回測定の平均値

◆第21表の3◆ 血圧の状況（性・年齢階級別）

（%）

		総数（実数）	至適血圧	正常血圧	正常高値血圧	軽症高血圧	中等症高血圧	重症高血圧
総数	総数	100.0 (4,650)	35.2	19.4	18.1	19.7	5.8	1.8
	15～19歳	100.0 (193)	78.8	13.5	5.2	2.6	0.0	0.0
	20～29	100.0 (421)	66.0	20.0	9.5	3.8	0.2	0.5
	30～39	100.0 (745)	60.5	20.8	8.9	7.8	1.3	0.7
	40～49	100.0 (742)	38.9	23.5	18.5	14.2	3.5	1.5
	50～59	100.0 (967)	23.7	20.8	23.6	22.8	7.1	2.1
	60～69	100.0 (895)	16.8	17.1	21.5	32.0	9.9	2.8
	70歳以上	100.0 (687)	12.5	16.0	24.5	32.6	11.2	3.2
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	100.0 (774) 100.0 (350)	14.3 12.0	14.2 17.4	24.3 22.9	34.4 32.3	10.1 11.7	2.7 3.7
男	総数	100.0 (1,853)	25.0	21.2	21.8	22.8	6.8	2.4
	15～19歳	100.0 (91)	72.5	16.5	7.7	3.3	0.0	0.0
	20～29	100.0 (170)	45.3	28.2	16.5	8.8	0.0	1.2
	30～39	100.0 (273)	37.7	31.9	14.3	13.6	1.5	1.1
	40～49	100.0 (269)	25.3	23.8	21.6	21.9	4.5	3.0
	50～59	100.0 (364)	16.5	17.0	28.0	25.3	9.9	3.3
	60～69	100.0 (373)	14.2	16.1	23.9	34.0	9.1	2.7
	70歳以上	100.0 (313)	11.8	18.2	25.9	28.4	12.8	2.9
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	100.0 (339) 100.0 (153)	11.2 13.7	14.5 19.6	24.5 26.1	37.5 24.8	10.0 12.4	2.4 3.3
女	総数	100.0 (2,797)	41.9	18.2	15.6	17.6	5.2	1.5
	15～19歳	100.0 (102)	84.3	10.8	2.9	2.0	0.0	0.0
	20～29	100.0 (251)	80.1	14.3	4.8	0.4	0.4	0.0
	30～39	100.0 (472)	73.7	14.4	5.7	4.4	1.3	0.4
	40～49	100.0 (473)	46.7	23.3	16.7	9.7	3.0	0.6
	50～59	100.0 (603)	28.0	23.1	20.9	21.2	5.5	1.3
	60～69	100.0 (522)	18.6	17.8	19.7	30.5	10.5	2.9
	70歳以上	100.0 (374)	13.1	14.2	23.3	36.1	9.9	3.5
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	100.0 (435) 100.0 (197)	16.8 10.7	14.0 15.7	24.1 20.3	32.0 38.1	10.1 11.2	3.0 4.1

注) 妊婦・降圧薬服用者除外。2回測定の平均値

◆第22表の1◆ 拡張期（最低）・収縮期（最高）血圧の分布（性・年齢階級別）

(人)

		血圧区分	総数 (%)	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	
男	拡張期（最低）血圧	総数	2,320 (100)	91 (100)	170 (100)	277 (100)	281 (100)	424 (100)	535 (100)	542 (100)	
		39mmHg未満	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)
		40～49	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)
		50～59	65 (2.8)	24 (26.4)	10 (5.9)	5 (1.8)	3 (1.1)	2 (0.5)	5 (0.9)	16 (3.0)	16 (3.0)
		60～69	298 (12.8)	38 (41.8)	45 (26.5)	45 (16.2)	23 (8.2)	21 (5.0)	44 (8.2)	82 (15.1)	82 (15.1)
		70～79	724 (31.2)	20 (22.0)	69 (40.6)	117 (42.2)	88 (31.3)	105 (24.8)	150 (28.0)	175 (32.3)	175 (32.3)
		80～89	736 (31.7)	7 (7.7)	36 (21.2)	70 (25.3)	90 (32.0)	163 (38.4)	196 (36.6)	174 (32.1)	174 (32.1)
		90～99	365 (15.7)	2 (2.2)	6 (3.5)	33 (11.9)	59 (21.0)	89 (21.0)	107 (20.0)	69 (12.7)	69 (12.7)
		100～109	95 (4.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (1.4)	10 (3.6)	35 (8.3)	24 (4.5)	22 (4.1)	22 (4.1)
		110～119	27 (1.2)	0 (0.0)	2 (1.2)	2 (0.7)	6 (2.1)	8 (1.9)	7 (1.3)	2 (0.4)	2 (0.4)
	120～129	3 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	130～139	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	140mmHg以上	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	平均値 mmHg	80.8	65.9	73.9	78.3	83.2	85.3	83.5	79.3	79.3	
	標準偏差	11.9	9.4	10.6	10.7	12.3	11.0	10.7	11.2	11.2	
	収縮期（最高）血圧	総数	2,322 (100)	91 (100)	170 (100)	277 (100)	281 (100)	424 (100)	535 (100)	544 (100)	
		89mmHg未満	3 (0.1)	1 (1.1)	1 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		90～99	33 (1.4)	9 (9.9)	6 (3.5)	5 (1.8)	4 (1.4)	2 (0.5)	5 (0.9)	2 (0.4)	2 (0.4)
		100～109	136 (5.9)	23 (25.3)	25 (14.7)	29 (10.5)	18 (6.4)	21 (5.0)	8 (1.5)	12 (2.2)	12 (2.2)
110～119		361 (15.5)	33 (36.3)	55 (32.4)	83 (30.0)	60 (21.4)	50 (11.8)	47 (8.8)	33 (6.1)	33 (6.1)	
120～129		487 (21.0)	16 (17.6)	44 (25.9)	97 (35.0)	82 (29.2)	90 (21.2)	84 (15.7)	74 (13.6)	74 (13.6)	
130～139		478 (20.6)	7 (7.7)	24 (14.1)	34 (12.3)	65 (23.1)	106 (25.0)	112 (20.9)	130 (23.9)	130 (23.9)	
140～149		330 (14.2)	1 (1.1)	12 (7.1)	18 (6.5)	20 (7.1)	68 (16.0)	113 (21.1)	98 (18.0)	98 (18.0)	
150～159		239 (10.3)	1 (1.1)	2 (1.2)	7 (2.5)	18 (6.4)	39 (9.2)	82 (15.3)	90 (16.5)	90 (16.5)	
160～169		148 (6.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	7 (2.5)	27 (6.4)	50 (9.3)	63 (11.6)	63 (11.6)	
170～179	60 (2.6)	0 (0.0)	1 (0.6)	1 (0.4)	3 (1.1)	12 (2.8)	21 (3.9)	22 (4.0)	22 (4.0)		
180mmHg以上	47 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.7)	3 (1.1)	9 (2.1)	13 (2.4)	20 (3.7)	20 (3.7)		
平均値 mmHg	134.2	113.2	120.2	122.7	128.2	135.9	141.1	143.0	143.0		
標準偏差	19.5	12.5	13.5	13.4	17.5	18.5	18.5	18.6	18.6		
女	拡張期（最低）血圧	総数	3,484 (100)	103 (100)	263 (100)	490 (100)	492 (100)	694 (100)	725 (100)	717 (100)	
		39mmHg未満	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		40～49	23 (0.7)	6 (5.8)	5 (1.9)	6 (1.2)	1 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.3)	2 (0.3)	2 (0.3)
		50～59	205 (5.9)	31 (30.1)	42 (16.0)	54 (11.0)	18 (3.7)	11 (1.6)	14 (1.9)	35 (4.9)	35 (4.9)
		60～69	728 (20.9)	39 (37.9)	112 (42.6)	174 (35.5)	106 (21.5)	84 (12.1)	86 (11.9)	127 (17.7)	127 (17.7)
		70～79	1,154 (33.1)	21 (20.4)	83 (31.6)	179 (36.5)	194 (39.4)	230 (33.1)	218 (30.1)	229 (31.9)	229 (31.9)
		80～89	898 (25.8)	5 (4.9)	19 (7.2)	59 (12.0)	123 (25.0)	230 (33.1)	242 (33.4)	220 (30.7)	220 (30.7)
		90～99	373 (10.7)	1 (1.0)	0 (0.0)	11 (2.2)	36 (7.3)	112 (16.1)	132 (18.2)	81 (11.3)	81 (11.3)
		100～109	80 (2.3)	0 (0.0)	1 (0.4)	5 (1.0)	13 (2.6)	21 (3.0)	22 (3.0)	18 (2.5)	18 (2.5)
		110～119	17 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	1 (0.2)	3 (0.4)	9 (1.2)	2 (0.3)	2 (0.3)
	120～129	4 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	3 (0.4)	3 (0.4)	
	130～139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	140mmHg以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	平均値 mmHg	76.5	63.4	67.0	70.4	76.2	80.2	81.1	78.1	78.1	
	標準偏差	11.8	9.6	9.0	10.5	10.6	10.7	10.9	11.5	11.5	
	収縮期（最高）血圧	総数	3,484 (100)	103 (100)	263 (100)	490 (100)	492 (100)	694 (100)	725 (100)	717 (100)	
		89mmHg未満	24 (0.7)	5 (4.9)	5 (1.9)	8 (1.6)	1 (0.2)	1 (0.1)	3 (0.4)	1 (0.1)	1 (0.1)
		90～99	185 (5.3)	24 (23.3)	44 (16.7)	65 (13.3)	21 (4.3)	16 (2.3)	9 (1.2)	6 (0.8)	6 (0.8)
		100～109	487 (14.0)	37 (35.9)	91 (34.6)	162 (33.1)	86 (17.5)	57 (8.2)	34 (4.7)	20 (2.8)	20 (2.8)
110～119		609 (17.5)	24 (23.3)	79 (30.0)	140 (28.6)	130 (26.4)	123 (17.7)	71 (9.8)	42 (5.9)	42 (5.9)	
120～129		595 (17.1)	9 (8.7)	34 (12.9)	68 (13.9)	113 (23.0)	160 (23.1)	122 (16.8)	89 (12.4)	89 (12.4)	
130～139		560 (16.1)	2 (1.9)	9 (3.4)	26 (5.3)	79 (16.1)	135 (19.5)	154 (21.2)	155 (21.6)	155 (21.6)	
140～149		430 (12.3)	2 (1.9)	1 (0.4)	13 (2.7)	34 (6.9)	95 (13.7)	135 (18.6)	150 (20.9)	150 (20.9)	
150～159		289 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (1.0)	14 (2.8)	54 (7.8)	81 (11.2)	135 (18.8)	135 (18.8)	
160～169		164 (4.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	8 (1.6)	31 (4.5)	59 (8.1)	64 (8.9)	64 (8.9)	
170～179	84 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	4 (0.8)	13 (1.9)	34 (4.7)	32 (4.5)	32 (4.5)		
180mmHg以上	57 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	9 (1.3)	23 (3.2)	23 (3.2)	23 (3.2)		
平均値 mmHg	128.7	106.5	108.8	112.0	122.2	130.8	138.8	142.6	142.6		
標準偏差	21.3	12.5	10.8	13.6	16.0	18.5	20.1	18.9	18.9		

注) 2回測定値の平均値

◆第22表の2◆ 拡張期（最低）・収縮期（最高）血圧の分布（性・年齢階級別）

(人)

	血圧区分	総数 (%)	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	
男	拡張期（最低）血圧	総数	2,320 (100)	91 (100)	170 (100)	277 (100)	281 (100)	424 (100)	535 (100)	542 (100)
		39mmHg未満	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)
		40～49	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)
		50～59	65 (2.8)	24 (26.4)	10 (5.9)	5 (1.8)	3 (1.1)	2 (0.5)	5 (0.9)	16 (3.0)
		60～69	298 (12.8)	38 (41.8)	45 (26.5)	45 (16.2)	23 (8.2)	21 (5.0)	44 (8.2)	82 (15.1)
		70～79	724 (31.2)	20 (22.0)	69 (40.6)	117 (42.2)	88 (31.3)	105 (24.8)	150 (28.0)	175 (32.3)
		80～89	736 (31.7)	7 (7.7)	36 (21.2)	70 (25.3)	90 (32.0)	163 (38.4)	196 (36.6)	174 (32.1)
		90～99	365 (15.7)	2 (2.2)	6 (3.5)	33 (11.9)	59 (21.0)	89 (21.0)	107 (20.0)	69 (12.7)
		100～109	95 (4.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (1.4)	10 (3.6)	35 (8.3)	24 (4.5)	22 (4.1)
		110～119	27 (1.2)	0 (0.0)	2 (1.2)	2 (0.7)	6 (2.1)	8 (1.9)	7 (1.3)	2 (0.4)
		120～129	3 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	2 (0.4)	0 (0.0)
		130～139	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		140mmHg以上	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		平均値 mmHg	80.8	65.9	73.9	78.3	83.2	85.3	83.5	79.3
	標準偏差	11.9	9.4	10.6	10.7	12.3	11.0	10.7	11.2	
男	収縮期（最高）血圧	総数	2,322 (100)	91 (100)	170 (100)	277 (100)	281 (100)	424 (100)	535 (100)	544 (100)
		89mmHg未満	3 (0.1)	1 (1.1)	1 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		90～99	33 (1.4)	9 (9.9)	6 (3.5)	5 (1.8)	4 (1.4)	2 (0.5)	5 (0.9)	2 (0.4)
		100～109	136 (5.9)	23 (25.3)	25 (14.7)	29 (10.5)	18 (6.4)	21 (5.0)	8 (1.5)	12 (2.2)
		110～119	361 (15.5)	33 (36.3)	55 (32.4)	83 (30.0)	60 (21.4)	50 (11.8)	47 (8.8)	33 (6.1)
		120～129	487 (21.0)	16 (17.6)	44 (25.9)	97 (35.0)	82 (29.2)	90 (21.2)	84 (15.7)	74 (13.6)
		130～139	478 (20.6)	7 (7.7)	24 (14.1)	34 (12.3)	65 (23.1)	106 (25.0)	112 (20.9)	130 (23.9)
		140～149	330 (14.2)	1 (1.1)	12 (7.1)	18 (6.5)	20 (7.1)	68 (16.0)	113 (21.1)	98 (18.0)
		150～159	239 (10.3)	1 (1.1)	2 (1.2)	7 (2.5)	18 (6.4)	39 (9.2)	82 (15.3)	90 (16.5)
		160～169	148 (6.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	7 (2.5)	27 (6.4)	50 (9.3)	63 (11.6)
		170～179	60 (2.6)	0 (0.0)	1 (0.6)	1 (0.4)	3 (1.1)	12 (2.8)	21 (3.9)	22 (4.0)
		180mmHg以上	47 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.7)	3 (1.1)	9 (2.1)	13 (2.4)	20 (3.7)
		平均値 mmHg	134.2	113.2	120.2	122.7	128.2	135.9	141.1	143.0
		標準偏差	19.5	12.5	13.5	13.4	17.5	18.5	18.5	18.6
女	拡張期（最低）血圧	総数	3,457 (100)	102 (100)	251 (100)	476 (100)	492 (100)	694 (100)	725 (100)	717 (100)
		39mmHg未満	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
		40～49	21 (0.6)	6 (5.9)	4 (1.6)	5 (1.1)	1 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.3)	2 (0.3)
		50～59	199 (5.8)	31 (30.4)	40 (15.9)	50 (10.5)	18 (3.7)	11 (1.6)	14 (1.9)	35 (4.9)
		60～69	718 (20.8)	39 (38.2)	107 (42.6)	169 (35.5)	106 (21.5)	84 (12.1)	86 (11.9)	127 (17.7)
		70～79	1146 (33.2)	20 (19.6)	80 (31.9)	175 (36.8)	194 (39.4)	230 (33.1)	218 (30.1)	229 (31.9)
		80～89	897 (25.9)	5 (4.9)	18 (7.2)	59 (12.4)	123 (25.0)	230 (33.1)	242 (33.4)	220 (30.7)
		90～99	373 (10.8)	1 (1.0)	0 (0.0)	11 (2.3)	36 (7.3)	112 (16.1)	132 (18.2)	81 (11.3)
		100～109	80 (2.3)	0 (0.0)	1 (0.4)	5 (1.1)	13 (2.6)	21 (3.0)	22 (3.0)	18 (2.5)
		110～119	17 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	1 (0.2)	3 (0.4)	9 (1.2)	2 (0.3)
		120～129	4 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	3 (0.4)
		130～139	—	—	—	—	—	—	—	—
		140mmHg以上	—	—	—	—	—	—	—	—
		平均値 mmHg	76.6	63.3	67.0	70.7	76.2	80.2	81.1	78.1
	標準偏差	11.8	9.6	9.0	10.4	10.6	10.7	10.9	11.5	
女	収縮期（最高）血圧	総数	3,457 (100)	102 (100)	251 (100)	476 (100)	492 (100)	694 (100)	725 (100)	717 (100)
		89mmHg未満	24 (0.7)	5 (4.9)	5 (2.0)	8 (1.7)	1 (0.2)	1 (0.1)	3 (0.4)	1 (0.1)
		90～99	176 (5.1)	24 (23.5)	41 (16.3)	59 (12.4)	21 (4.3)	16 (2.3)	9 (1.2)	6 (0.8)
		100～109	483 (14.0)	37 (36.3)	91 (36.3)	158 (33.2)	86 (17.5)	57 (8.2)	34 (4.7)	20 (2.8)
		110～119	601 (17.4)	24 (23.5)	73 (29.1)	138 (29.0)	130 (26.4)	123 (17.7)	71 (9.8)	42 (5.9)
		120～129	589 (17.0)	8 (7.8)	31 (12.4)	66 (13.9)	113 (23.0)	160 (23.1)	122 (16.8)	89 (12.4)
		130～139	560 (16.2)	2 (2.0)	9 (3.6)	26 (5.5)	79 (16.1)	135 (19.5)	154 (21.2)	155 (21.6)
		140～149	430 (12.4)	2 (2.0)	1 (0.4)	13 (2.7)	34 (6.9)	95 (13.7)	135 (18.6)	150 (20.9)
		150～159	289 (8.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (1.1)	14 (2.8)	54 (7.8)	81 (11.2)	135 (18.8)
		160～169	164 (4.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	8 (1.6)	31 (4.5)	59 (8.1)	64 (8.9)
		170～179	84 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	4 (0.8)	13 (1.9)	34 (4.7)	32 (4.5)
		180mmHg以上	57 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	9 (1.3)	23 (3.2)	23 (3.2)
		平均値 mmHg	128.8	106.3	108.8	112.2	122.2	130.8	138.8	142.6
		標準偏差	21.3	12.4	10.7	13.6	16.0	18.5	20.1	18.9

注) 妊婦除外。2回測定値の平均値

◆第22表の3◆ 拡張期（最低）・収縮期（最高）血圧の分布（性・年齢階級別）

(人)

		血圧区分	総数 (%)	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
男	拡張期（最低）血圧	総数	1,853 (100)	91 (100)	170 (100)	273 (100)	269 (100)	364 (100)	373 (100)	313 (100)
		39mmHg未満	1 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		40～49	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)
		50～59	57 (3.1)	24 (26.4)	10 (5.9)	5 (1.8)	3 (1.1)	2 (0.5)	4 (1.1)	9 (2.9)
		60～69	263 (14.2)	38 (41.8)	45 (26.5)	45 (16.5)	23 (8.6)	21 (5.8)	33 (8.8)	58 (18.5)
		70～79	614 (33.1)	20 (22.0)	69 (40.6)	117 (42.9)	86 (32.0)	92 (25.3)	118 (31.6)	112 (35.8)
		80～89	574 (31.0)	7 (7.7)	36 (21.2)	68 (24.9)	88 (32.7)	145 (39.8)	139 (37.3)	91 (29.1)
		90～99	255 (13.8)	2 (2.2)	6 (3.5)	31 (11.4)	53 (19.7)	71 (19.5)	59 (15.8)	33 (10.5)
		100～109	63 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (1.5)	8 (3.0)	26 (7.1)	16 (4.3)	9 (2.9)
		110～119	20 (1.1)	0 (0.0)	2 (1.2)	2 (0.7)	6 (2.2)	6 (1.6)	4 (1.1)	0 (0.0)
	120～129	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	130～139	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	140mmHg以上	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	平均値 mmHg	79.8	65.9	73.9	78.1	82.8	84.5	82.2	77.7	
	標準偏差	11.7	9.4	10.6	10.7	12.3	10.7	10.4	10.5	
	収縮期（最高）血圧	総数	1,853 (100)	91 (100)	170 (100)	273 (100)	269 (100)	364 (100)	373 (100)	313 (100)
		89mmHg未満	3 (0.2)	1 (1.1)	1 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		90～99	33 (1.8)	9 (9.9)	6 (3.5)	5 (1.8)	4 (1.5)	2 (0.5)	5 (1.3)	2 (0.6)
		100～109	133 (7.2)	23 (25.3)	25 (14.7)	29 (10.6)	18 (6.7)	21 (5.8)	7 (1.9)	10 (3.2)
		110～119	350 (18.9)	33 (36.3)	55 (32.4)	83 (30.4)	60 (22.3)	49 (13.5)	44 (11.8)	26 (8.3)
120～129		455 (24.6)	16 (17.6)	44 (25.9)	97 (35.5)	78 (29.0)	84 (23.1)	74 (19.8)	62 (19.8)	
130～139		386 (20.8)	7 (7.7)	24 (14.1)	33 (12.1)	63 (23.4)	92 (25.3)	83 (22.3)	84 (26.8)	
140～149		213 (11.5)	1 (1.1)	12 (7.1)	15 (5.5)	18 (6.7)	50 (13.7)	70 (18.8)	47 (15.0)	
150～159		145 (7.8)	1 (1.1)	2 (1.2)	7 (2.6)	16 (5.9)	30 (8.2)	53 (14.2)	36 (11.5)	
160～169		74 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	6 (2.2)	19 (5.2)	19 (5.1)	29 (9.3)	
170～179	33 (1.8)	0 (0.0)	1 (0.6)	1 (0.4)	2 (0.7)	9 (2.5)	12 (3.2)	8 (2.6)		
180mmHg以上	28 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.7)	3 (1.1)	8 (2.2)	6 (1.6)	9 (2.9)		
平均値 mmHg	130.5	113.2	120.2	122.4	127.5	134.3	137.3	138.5		
標準偏差	18.5	12.5	13.5	13.2	17.3	18.6	17.8	18.5		
女	拡張期（最低）血圧	総数	2,797 (100)	102 (100)	251 (100)	472 (100)	473 (100)	603 (100)	522 (100)	374 (100)
		39mmHg未満	2 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
		40～49	21 (0.8)	6 (5.9)	4 (1.6)	5 (1.1)	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.4)	2 (0.5)
		50～59	182 (6.5)	31 (30.4)	40 (15.9)	50 (10.6)	18 (3.8)	11 (1.8)	13 (2.5)	19 (5.1)
		60～69	632 (22.6)	39 (38.2)	107 (42.6)	169 (35.8)	105 (22.2)	82 (13.6)	68 (13.0)	62 (16.6)
		70～79	971 (34.7)	20 (19.6)	80 (31.9)	175 (37.1)	189 (40.0)	210 (34.8)	168 (32.2)	129 (34.5)
		80～89	677 (24.2)	5 (4.9)	18 (7.2)	55 (11.7)	116 (24.5)	201 (33.3)	170 (32.6)	112 (29.9)
		90～99	244 (8.7)	1 (1.0)	0 (0.0)	11 (2.3)	33 (7.0)	78 (12.9)	80 (15.3)	41 (11.0)
		100～109	51 (1.8)	0 (0.0)	1 (0.4)	5 (1.1)	10 (2.1)	16 (2.7)	14 (2.7)	5 (1.3)
		110～119	13 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	1 (0.2)	2 (0.3)	7 (1.3)	1 (0.3)
	120～129	4 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	3 (0.8)	
	130～139	—	—	—	—	—	—	—	—	
	140mmHg以上	—	—	—	—	—	—	—	—	
	平均値 mmHg	75.5	63.3	67.0	70.5	75.9	79.4	80.1	77.7	
	標準偏差	11.6	9.6	9.0	10.4	10.3	10.7	11.0	11.4	
	収縮期（最高）血圧	総数	2,797 (100)	102 (100)	251 (100)	472 (100)	473 (100)	603 (100)	522 (100)	374 (100)
		89mmHg未満	24 (0.9)	5 (4.9)	5 (2.0)	8 (1.7)	1 (0.2)	1 (0.2)	3 (0.6)	1 (0.3)
		90～99	174 (6.2)	24 (23.5)	41 (16.3)	59 (12.5)	21 (4.4)	15 (2.5)	8 (1.5)	6 (1.6)
		100～109	478 (17.1)	37 (36.3)	91 (36.3)	158 (33.5)	86 (18.2)	57 (9.5)	32 (6.1)	17 (4.5)
		110～119	573 (20.5)	24 (23.5)	73 (29.1)	137 (29.0)	129 (27.3)	119 (19.7)	61 (11.7)	30 (8.0)
120～129		513 (18.3)	8 (7.8)	31 (12.4)	65 (13.8)	112 (23.7)	146 (24.2)	97 (18.6)	54 (14.4)	
130～139		425 (15.2)	2 (2.0)	9 (3.6)	24 (5.1)	72 (15.2)	115 (19.1)	116 (22.2)	87 (23.3)	
140～149		287 (10.3)	2 (2.0)	1 (0.4)	13 (2.8)	28 (5.9)	77 (12.8)	94 (18.0)	72 (19.3)	
150～159		163 (5.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (1.1)	13 (2.7)	37 (6.1)	49 (9.4)	59 (15.8)	
160～169		84 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	6 (1.3)	20 (3.3)	34 (6.5)	22 (5.9)	
170～179	47 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	3 (0.6)	9 (1.5)	18 (3.4)	16 (4.3)		
180mmHg以上	29 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	7 (1.2)	10 (1.9)	10 (2.7)		
平均値 mmHg	124.7	106.3	108.8	112.1	121.4	128.9	135.5	139.0		
標準偏差	19.8	12.4	10.7	13.5	15.6	17.9	19.3	19.2		

注) 血圧降下薬服用者除外。妊婦除外。2回測定値の平均値

◆第23表◆ 血色素量の分布（性・年齢階級別）

（％）

		総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 65～69歳	(再掲) 70～74歳	(再掲) 75～79歳	(再掲) 80～84歳	(再掲) 85歳以上
男	総数 (実数)	100.0 (2,097)	100.0 (160)	100.0 (263)	100.0 (268)	100.0 (402)	100.0 (508)	100.0 (496)	100.0 (260)	100.0 (238)	100.0 (144)	100.0 (77)	100.0 (37)
	10.0g/dl未満	0.7	0.6	0.0	0.0	0.2	0.8	1.6	1.2	1.3	0.7	1.3	8.1
	10.0～10.9	1.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	3.8	0.4	2.1	4.9	7.8	2.7
	11.0～11.9	2.2	0.6	0.4	0.0	0.2	2.0	6.7	1.9	4.2	6.3	6.5	24.3
	12.0～12.9	7.2	0.6	0.8	2.6	3.0	9.1	16.9	11.2	12.6	17.4	27.3	21.6
	13.0～13.9	18.8	11.3	7.2	15.3	19.2	20.5	27.2	20.8	26.5	31.3	26.0	18.9
	14.0～14.9	33.8	27.5	34.2	38.4	37.6	37.8	25.8	37.3	30.3	24.3	18.2	18.9
	15.0～15.9	26.7	46.3	38.0	31.3	28.6	23.2	13.7	20.4	17.6	12.5	7.8	5.4
	16.0～16.9	7.9	11.9	16.3	9.3	9.5	4.3	3.6	4.6	4.6	2.8	3.9	0.0
	17.0～17.9	1.3	1.3	2.3	2.2	1.5	1.2	0.4	1.2	0.4	0.0	1.3	0.0
18.0g/dl以上	0.5	0.0	0.8	0.4	0.2	1.0	0.2	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	
14.0未満(再掲)	29.9	13.1	8.4	18.3	22.6	32.5	56.3	35.4	46.6	60.4	68.8	75.7	
平均値 g/dl	14.5	15.0	15.2	14.8	14.7	14.4	13.6	14.3	14.0	13.6	13.2	12.6	
標準偏差	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.5	1.3	1.5	1.4	1.6	1.7	
女	総数 (実数)	100.0 (3,185)	100.0 (243)	100.0 (461)	100.0 (474)	100.0 (663)	100.0 (686)	100.0 (658)	100.0 (355)	100.0 (283)	100.0 (198)	100.0 (113)	100.0 (64)
	10.0g/dl未満	3.0	2.9	5.0	7.4	1.2	0.4	2.9	0.8	2.1	1.5	3.5	9.4
	10.0～10.9	4.5	4.1	5.9	5.3	3.0	1.9	7.4	1.4	4.9	11.1	7.1	7.8
	11.0～11.9	14.2	12.8	15.4	13.9	10.0	12.2	20.4	15.5	15.5	22.2	23.9	29.7
	12.0～12.9	34.6	31.3	36.0	35.7	34.8	33.7	34.8	34.6	36.7	32.3	36.3	31.3
	13.0～13.9	32.7	37.0	29.7	29.5	37.4	37.0	26.0	34.4	30.0	25.8	25.7	9.4
	14.0～14.9	9.8	11.1	7.4	7.6	12.1	12.7	7.3	11.5	9.2	5.6	3.5	10.9
	15.0～15.9	1.2	0.8	0.7	0.6	1.5	1.9	1.1	1.7	1.4	1.5	0.0	0.0
	16.0～16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17.0～17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.0g/dl以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	
12.0未満(再掲)	21.7	19.8	26.2	26.6	14.2	14.6	30.7	17.7	22.6	34.8	34.5	46.9	
平均値 g/dl	12.7	12.8	12.5	12.4	12.9	13.0	12.5	12.9	12.7	12.4	12.2	12.1	
標準偏差	1.2	1.2	1.3	1.5	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.6	

◆第24表◆ 赤血球数の分布（性・年齢階級別）

（％）

		総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 65～69歳	(再掲) 70～74歳	(再掲) 75～79歳	(再掲) 80～84歳	(再掲) 85歳以上
男	総数 (実数)	100.0 (2,097)	100.0 (160)	100.0 (263)	100.0 (268)	100.0 (402)	100.0 (508)	100.0 (496)	100.0 (260)	100.0 (238)	100.0 (144)	100.0 (77)	100.0 (37)
	400万個/mm ³ 未満	8.4	1.3	0.8	3.0	3.2	9.1	21.2	9.6	12.6	21.5	32.5	51.4
	400～449	26.9	5.6	10.6	19.8	24.4	33.3	41.9	35.0	39.5	43.8	46.8	40.5
	450～499	45.4	45.6	48.3	52.6	56.5	45.9	30.4	45.8	38.2	31.3	16.9	5.4
	500～549	17.2	41.9	36.1	20.5	15.2	10.6	5.6	8.5	8.0	3.5	3.9	2.7
	550～599	2.0	5.0	4.2	3.7	0.7	1.2	0.6	1.2	1.3	0.0	0.0	0.0
	600～649	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	410未満(再掲)	11.8	1.3	1.1	3.7	4.7	12.8	29.8	13.5	20.2	31.3	42.9	59.5
	530以上(再掲)	5.1	17.5	11.0	7.1	3.2	2.4	1.2	1.5	2.1	0.7	0.0	0.0
平均値 万個/mm ³	462.2	496.5	490.6	475.7	467.2	454.5	432.6	452.3	445.2	429.0	417.5	396.2	
標準偏差	45.2	34.8	33.8	38.9	35.5	40.8	47.3	40.5	44.2	44.0	47.3	50.2	
女	総数 (実数)	100.0 (3,185)	100.0 (243)	100.0 (461)	100.0 (474)	100.0 (663)	100.0 (686)	100.0 (658)	100.0 (355)	100.0 (283)	100.0 (198)	100.0 (113)	100.0 (64)
	400万個/mm ³ 未満	22.0	12.8	19.3	18.4	16.3	20.7	36.9	23.9	31.1	36.4	44.2	51.6
	400～449	54.0	56.0	54.2	59.5	54.8	53.1	49.2	51.0	51.2	50.5	46.9	40.6
	450～499	22.5	29.2	24.5	20.0	27.3	24.6	13.2	23.9	17.0	12.1	8.8	7.8
	500～549	1.5	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	0.6	1.1	0.7	1.0	0.0	0.0
	550～599	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	600～649	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	650万個/mm ³ 以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	380未満(再掲)	8.9	4.1	6.5	6.3	4.8	7.0	20.2	7.0	15.5	21.7	23.0	31.3
	480以上(再掲)	5.5	7.4	5.2	5.7	7.4	5.5	3.0	5.4	4.2	3.5	0.0	1.6
平均値 万個/mm ³	425.3	435.8	427.8	426.7	431.4	427.7	409.7	425.3	416.5	408.8	403.2	394.5	
標準偏差	35.8	31.0	33.1	33.5	32.6	34.6	40.2	33.9	39.2	39.5	36.7	46.8	

◆第25表◆ フェリチンの分布（性・年齢階級別）

（％）

		総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 65～69歳	(再掲) 70～74歳	(再掲) 75～79歳	(再掲) 80～84歳	(再掲) 85歳以上
男	総 数 (実 数)	100.0 (2,109)	100.0 (162)	100.0 (263)	100.0 (270)	100.0 (401)	100.0 (513)	100.0 (500)	100.0 (264)	100.0 (240)	100.0 (144)	100.0 (79)	100.0 (37)
	1.1ng/ml未満	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.1～5 未満	0.3	0.0	0.4	0.7	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
	5～10	1.6	0.0	1.1	0.4	1.2	2.1	2.8	1.9	2.5	2.8	3.8	2.7
	10～15	2.0	2.5	0.0	1.1	1.5	2.1	3.6	2.7	3.8	2.8	5.1	2.7
	15～20	1.8	1.2	0.4	1.1	1.5	2.1	2.8	1.5	1.7	4.2	3.8	2.7
	20～25	1.8	0.0	0.8	0.7	1.7	1.6	4.0	2.3	3.8	4.9	5.1	0.0
	25～30	3.1	1.2	0.8	1.5	2.0	3.3	6.4	2.3	5.8	8.3	3.8	8.1
	30～35	2.6	2.5	1.1	1.9	1.2	3.1	4.4	3.0	3.8	2.8	8.9	5.4
	35～40	3.1	3.7	1.1	2.2	3.0	3.1	4.4	2.3	3.8	5.6	1.3	10.8
	40～45	2.9	3.1	2.7	0.7	2.5	4.1	3.2	4.5	4.2	2.1	3.8	0.0
	45～50	3.7	4.9	2.7	2.2	4.2	3.7	4.0	3.0	3.8	4.9	2.5	5.4
	50～60	8.4	9.3	8.4	8.1	8.5	6.8	9.8	7.2	12.9	9.0	1.3	10.8
	60～70	6.3	6.8	9.9	8.5	5.5	5.5	4.6	6.4	5.0	4.2	5.1	2.7
	70～80	7.3	7.4	7.6	8.1	7.2	7.2	6.6	7.2	3.3	8.3	11.4	10.8
	80～90	7.1	12.3	4.9	8.5	6.7	7.4	5.8	7.6	4.6	4.9	7.6	13.5
	90～100	6.5	9.9	7.6	8.5	7.5	5.3	4.4	6.1	4.6	4.9	5.1	0.0
	100～150	18.1	19.1	21.7	19.3	19.0	16.0	16.8	13.6	18.3	15.3	17.7	10.8
	150～200	11.9	9.3	15.2	12.6	13.7	12.7	8.4	15.2	10.4	6.3	8.9	2.7
	200ng/ml以上	11.5	6.2	13.7	13.7	12.7	13.6	7.8	12.9	7.5	9.0	5.1	10.8
	27 未満(再掲)	8.6	4.3	3.4	4.4	7.2	9.2	15.4	9.8	13.8	16.7	19.0	13.5
320 以上(再掲)	3.2	0.6	3.4	4.1	3.5	4.3	2.2	3.0	1.7	3.5	2.5	0.0	
平均値 ng/ml	112.5	97.6	130.6	119.7	117.3	120.6	91.7	116.6	92.3	89.8	97.4	83.8	
標準偏差	118.4	67.4	142.4	93.2	110.0	147.7	97.6	129.9	84.1	85.1	153.3	73.1	
女	総 数 (実 数)	100.0 (3,192)	100.0 (243)	100.0 (463)	100.0 (476)	100.0 (663)	100.0 (690)	100.0 (657)	100.0 (358)	100.0 (283)	100.0 (197)	100.0 (113)	100.0 (64)
	1.1ng/ml未満	0.3	1.2	0.2	0.8	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
	1.1～5 未満	7.0	11.5	15.8	17.6	4.4	0.9	0.8	1.7	0.7	0.5	1.8	0.0
	5～10	8.2	16.5	17.5	13.9	5.0	1.4	5.0	2.0	4.2	6.6	4.4	4.7
	10～15	7.3	11.5	14.9	13.4	3.5	2.5	4.9	2.8	3.5	5.1	4.4	10.9
	15～20	6.6	10.7	11.0	9.9	5.3	2.2	5.8	2.8	3.9	5.1	8.0	12.5
	20～25	7.0	12.8	8.2	9.2	5.1	4.1	7.6	4.2	8.1	7.6	6.2	7.8
	25～30	7.0	8.6	8.4	9.7	5.6	6.2	5.8	5.3	6.0	7.6	3.5	3.1
	30～35	5.8	6.6	4.3	5.3	6.9	5.4	6.4	5.6	5.3	7.1	7.1	7.8
	35～40	6.0	5.8	6.0	3.4	7.5	5.9	6.7	7.0	6.0	6.1	10.6	4.7
	40～45	5.4	2.9	2.6	3.6	7.5	7.0	5.9	6.1	5.7	7.1	6.2	3.1
	45～50	4.4	2.9	2.6	2.3	5.3	5.9	5.5	5.3	4.9	5.6	6.2	6.3
	50～60	7.8	2.5	3.7	3.2	11.0	12.9	7.5	12.3	8.1	9.6	5.3	1.6
	60～70	6.7	3.3	1.7	2.9	9.0	10.1	8.2	8.4	8.8	8.1	10.6	1.6
	70～80	4.7	0.4	0.9	1.5	5.4	8.1	6.8	8.9	7.1	7.6	5.3	6.3
	80～90	3.2	1.2	0.4	0.4	4.8	4.8	4.4	5.6	3.9	4.6	5.3	4.7
	90～100	2.8	0.0	0.4	1.5	3.5	5.1	3.5	5.6	3.9	3.0	0.9	7.8
	100～150	5.8	0.8	0.6	0.8	6.3	10.0	9.7	7.8	14.1	4.6	7.1	10.9
	150～200	2.0	0.4	0.0	0.4	2.1	3.6	3.3	3.6	3.9	2.0	5.3	1.6
	200ng/ml以上	1.7	0.4	0.6	0.2	1.5	3.9	2.0	5.0	1.8	2.0	0.9	4.7
	3.4未満(再掲)	4.2	7.8	8.6	10.5	2.6	0.3	0.8	0.6	0.7	0.5	1.8	0.0
89 以上(再掲)	12.6	2.1	1.7	2.9	13.9	23.0	19.0	22.1	24.0	12.2	14.2	26.6	
平均値 ng/ml	47.9	23.8	24.8	23.6	52.8	71.3	61.0	72.4	67.0	52.9	59.3	62.4	
標準偏差	58.9	23.4	60.8	25.2	43.3	66.1	73.2	74.2	86.6	47.2	72.5	75.0	

◆第26表◆ 総たんぱく質値の分布（性・年齢階級別）

（%）

		総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 65～69歳	(再掲) 70～74歳	(再掲) 75～79歳	(再掲) 80～84歳	(再掲) 85歳以上
男	総 数 (実 数)	100.0 (2,108)	100.0 (162)	100.0 (263)	100.0 (270)	100.0 (401)	100.0 (513)	100.0 (499)	100.0 (264)	100.0 (239)	100.0 (144)	100.0 (79)	100.0 (37)
	6.0 g/dl未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6.0～6.4	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.6	0.4	0.0	0.7	2.5	0.0
	6.5～6.9	7.4	2.5	3.8	5.6	7.2	7.6	12.0	7.6	8.4	13.2	17.7	18.9
	7.0～7.4	32.3	25.9	22.4	33.3	35.9	31.4	37.1	28.4	36.4	38.9	40.5	27.0
	7.5～7.9	40.6	47.5	47.9	39.3	39.7	45.4	31.1	45.5	30.5	33.3	25.3	37.8
	8.0～8.4	16.6	21.0	22.1	18.9	15.0	13.1	16.0	15.2	20.5	11.8	12.7	10.8
	8.5 g/dl以上	2.8	3.1	3.8	2.6	2.2	2.3	3.2	3.0	4.2	2.1	1.3	5.4
	6.5 未満(再掲)	0.2	0	0	0.4	0	0.2	0.6	0.4	0.0	0.7	2.5	0.0
	平均 値 g/dl 標 準 偏 差	7.6 0.5	7.7 0.4	7.7 0.5	7.6 0.4	7.5 0.4	7.6 0.4	7.5 0.5	7.6 0.4	7.6 0.5	7.5 0.5	7.4 0.5	7.5 0.5
女	総 数 (実 数)	100.0 (3,190)	100.0 (243)	100.0 (463)	100.0 (476)	100.0 (662)	100.0 (690)	100.0 (656)	100.0 (358)	100.0 (283)	100.0 (196)	100.0 (113)	100.0 (64)
	6.0 g/dl未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6.0～6.4	0.4	0.0	0.6	0.0	0.3	0.3	0.9	0.3	1.1	0.5	0.0	3.1
	6.5～6.9	5.2	5.8	5.6	4.6	3.8	4.1	7.9	3.6	7.1	7.1	8.8	12.5
	7.0～7.4	29.9	25.9	27.9	32.1	27.5	29.0	34.8	31.8	32.9	29.1	46.9	39.1
	7.5～7.9	43.2	41.6	45.6	45.2	45.2	43.8	38.3	43.3	39.6	43.4	31.0	29.7
	8.0～8.4	17.8	23.0	17.5	16.2	19.5	18.6	14.9	17.9	15.5	16.8	11.5	12.5
	8.5 g/dl以上	3.3	3.7	2.8	1.9	3.6	4.3	3.2	3.1	3.9	3.1	1.8	3.1
	6.5 未満(再掲)	0.4	0	0.6	0	0.5	0.3	0.9	0.3	1.1	0.5	0.0	3.1
	平均 値 g/dl 標 準 偏 差	7.6 0.4	7.6 0.4	7.6 0.4	7.6 0.4	7.7 0.4	7.7 0.4	7.5 0.5	7.6 0.4	7.6 0.5	7.5 0.4	7.5 0.4	7.4 0.5

◆第27表◆ アルブミン値の分布（性・年齢階級別）

（%）

		総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 65～69歳	(再掲) 70～74歳	(再掲) 75～79歳	(再掲) 80～84歳	(再掲) 85歳以上
男	総 数 (実 数)	100.0 (2,108)	100.0 (162)	100.0 (263)	100.0 (270)	100.0 (401)	100.0 (513)	100.0 (499)	100.0 (264)	100.0 (239)	100.0 (144)	100.0 (79)	100.0 (37)
	3.0 g/dl未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.0～3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.2～3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.4～3.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	1.3	1.4	1.3	2.7
	3.6～3.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.4	0.4	0.7	1.3	2.7
	3.8～4.0	1.7	0.0	0.0	0.4	0.2	1.6	5.2	2.7	3.3	5.6	10.1	5.4
	4.0～4.2	5.1	0.0	0.0	1.1	1.5	5.3	14.2	7.2	11.7	17.4	16.5	13.5
	4.2～4.4	12.3	0.0	2.3	7.4	6.7	16.8	24.2	18.9	21.3	24.3	31.6	27.0
	4.4～4.6	23.7	5.6	6.1	16.7	25.4	34.5	30.3	33.7	33.1	29.9	22.8	29.7
	4.6～4.8	23.2	12.3	19.0	26.7	33.7	24.6	17.2	21.2	20.9	15.3	13.9	8.1
	4.8～5.0	20.0	35.2	36.1	30.4	24.2	12.5	5.2	11.0	6.7	4.2	1.3	8.1
	5.0～5.2	10.6	31.5	28.9	15.2	7.0	4.3	1.2	4.9	1.3	0.7	1.3	2.7
	5.2 g/dl以上	2.7	15.4	7.6	2.2	1.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
	3.5 以下(再掲)	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	1.3	1.4	1.3	2.7
平均 値 g/dl	4.60	4.94	4.87	4.72	4.64	4.51	4.36	4.48	4.41	4.33	4.27	4.31	
標 準 偏 差	0.32	0.23	0.23	0.25	0.23	0.25	0.29	0.27	0.28	0.29	0.29	0.33	
女	総 数 (実 数)	100.0 (3,190)	100.0 (243)	100.0 (463)	100.0 (476)	100.0 (662)	100.0 (690)	100.0 (656)	100.0 (358)	100.0 (283)	100.0 (196)	100.0 (113)	100.0 (64)
	3.0 g/dl未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
	3.0～3.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.2～3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	3.4～3.6	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	3.6～3.8	0.6	0.4	0.9	0.0	0.2	0.4	1.4	0.8	0.7	0.5	2.7	4.7
	3.8～4.0	1.3	2.1	1.1	0.2	0.9	0.7	3.0	0.8	0.7	3.6	5.3	7.8
	4.0～4.2	3.9	1.6	0.9	2.1	1.7	4.3	9.8	5.0	9.2	9.2	8.8	15.6
	4.2～4.4	13.7	5.8	5.8	14.1	10.7	16.1	22.6	18.2	20.8	20.4	30.1	23.4
	4.4～4.6	29.2	10.3	28.1	34.9	30.8	29.7	30.6	32.1	31.8	29.6	31.0	28.1
	4.6～4.8	30.9	34.6	37.1	30.5	33.8	29.9	23.6	31.3	25.1	28.6	15.9	15.6
	4.8～5.0	15.1	31.3	19.4	14.3	15.9	14.3	6.9	8.9	9.5	5.6	5.3	1.6
	5.0～5.2	3.9	9.9	4.5	3.4	4.5	3.9	1.1	2.2	0.7	1.0	0.9	3.1
	5.2 g/dl以上	1.1	4.1	1.7	0.4	1.4	0.4	0.5	0.6	0.4	1.0	0.0	0.0
	3.5 以下(再掲)	0.3	0.0	0.4	0.2	0.2	0.1	0.6	0.0	1.1	0.5	0.0	0.0
平均 値 g/dl	4.55	4.70	4.61	4.55	4.59	4.53	4.41	4.50	4.44	4.43	4.35	4.31	
標 準 偏 差	0.27	0.28	0.25	0.23	0.25	0.25	0.28	0.24	0.26	0.28	0.27	0.30	

◆第28表の1◆ ヘモグロビンA_{1c}の分布（全国，年齢階級別）

（％）

		総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 65～69歳	(再掲) 70～74歳	(再掲) 75～79歳	(再掲) 80～84歳	(再掲) 85歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (5,285)	100.0 (404)	100.0 (724)	100.0 (742)	100.0 (1,065)	100.0 (1,196)	100.0 (1,154)	100.0 (617)	100.0 (521)	100.0 (342)	100.0 (190)	100.0 (101)
	3.9%未満	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.0～4.1	0.1	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
	4.2～4.3	0.9	2.5	1.5	1.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.0
	4.4～4.5	2.4	8.7	5.1	3.2	1.4	0.7	0.9	0.3	0.4	1.2	1.1	2.0
	4.6～4.7	7.2	20.5	13.0	10.8	5.7	3.2	2.3	3.1	2.5	1.8	2.1	3.0
	4.8～4.9	13.0	26.5	18.5	15.8	12.1	8.5	8.6	8.3	8.3	10.5	7.4	5.9
	5.0～5.1	19.5	22.5	28.6	23.0	18.2	16.3	15.0	15.7	13.1	13.5	21.1	18.8
	5.2～5.3	19.4	12.6	17.0	19.4	23.6	19.4	19.4	19.9	19.8	17.5	21.1	20.8
	5.4～5.5	14.8	4.2	9.4	13.9	15.8	18.1	18.0	17.2	18.6	15.8	19.5	19.8
	5.6～5.7	7.6	1.2	3.3	4.9	8.1	10.4	10.9	10.7	10.6	10.8	11.6	11.9
	5.8～5.9	4.0	0.0	0.7	2.6	3.9	6.6	5.9	7.5	6.5	6.1	4.7	4.0
	6.0	1.7	0.0	0.3	0.9	2.2	1.7	3.2	1.3	2.7	5.0	1.6	3.0
	6.1	1.1	0.0	0.6	0.5	1.3	0.9	2.0	1.1	2.5	2.0	1.1	1.0
	6.2	0.8	0.0	0.1	0.4	0.6	1.4	1.2	1.9	1.0	1.8	0.5	2.0
	6.3	0.5	0.5	0.0	0.1	0.2	0.8	1.2	0.6	1.5	1.5	0.5	0.0
	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.0	1.5	1.5	0.6	1.1	0.0
	6.5	0.5	0.0	0.1	0.3	0.2	0.7	1.1	0.8	0.8	2.0	0.5	1.0
	6.6	0.5	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.8	0.6	0.8	1.2	0.0	1.0
	6.7	0.4	0.0	0.0	0.4	0.2	0.7	0.5	1.0	0.8	0.6	0.0	0.0
	6.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	0.3	0.6	0.9	0.5	1.0
	6.9	0.4	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	0.7	0.5	0.8	0.9	0.5	0.0
	7.0～7.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.4	1.3	1.1	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0
	7.2～7.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.1	0.6	0.3	0.5	0.4	0.6	0.0	0.0
	7.4～7.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.7	0.8	1.3	0.3	0.0	0.0
	7.6～7.7	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0
	7.8～7.9	0.4	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.6	0.0	2.0
	8.0～8.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	0.3	0.4	0.9	1.6	1.0
8.2～8.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.3	0.6	0.0	0.9	0.5	0.0	
8.4～8.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
8.6～8.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.5	0.0	
8.8～8.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9.0%以上	1.3	0.0	0.4	1.2	1.8	1.9	1.2	2.1	1.7	0.6	1.1	1.0	
6.1%以上(再掲)	9.2	0.7	1.9	4.0	8.3	14.5	15.3	15.4	17.3	17.0	9.5	10.9	
平均値 %	5.37	4.90	5.06	5.21	5.42	5.59	5.58	5.61	5.63	5.58	5.51	5.50	
標準偏差	0.84	0.35	0.56	0.72	0.92	0.94	0.85	0.97	0.89	0.78	0.94	0.73	