

◆第91表の3◆ 喫煙の状況別、栄養素等摂取量（女、年齢階級別）

	総 数												70歳以上						
	20～29歳			30～39歳			40～49歳			50～59歳			60～69歳		70歳以上				
	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	現在喫煙	非喫煙		
調査人数	530	169	3,992	410	129	48	533	104	23	549	98	37	767	52	12	791	44	23	942
エネルギー	1,641	1,801	1,740	1,639	1,736	1,805	1,726	1,758	1,914	1,798	1,664	1,949	1,814	1,638	1,728	1,809	1,455	1,551	1,611
たんぱく質	62.0	67.4	67.1	61.1	63.8	64.9	63.2	65.7	70.3	68.9	66.1	74.4	70.7	63.1	65.9	71.4	55.5	57.3	62.8
うち動物性	33.5	34.8	34.8	34.8	35.2	36.0	33.0	35.9	36.1	37.0	36.4	37.8	36.4	34.4	31.9	35.8	27.0	25.7	31.8
脂質	49.2	55.2	48.7	53.1	61.5	55.7	54.3	53.9	61.8	53.7	50.3	60.4	50.6	44.0	49.5	46.7	37.6	32.1	39.5
うち動物性	24.5	25.9	23.4	27.9	30.7	27.3	26.4	26.6	28.7	26.3	25.1	28.7	23.7	23.1	21.1	22.1	16.2	14.0	19.3
炭水化物	221.6	246.0	251.2	216.7	223.4	226.7	236.6	228.1	251.5	250.0	221.6	262.3	261.5	237.4	249.0	270.4	215.7	244.8	246.1
食塩(ナトリウム×2.54/1,000)	9.9	10.9	11.0	9.7	9.9	9.9	10.0	10.0	11.1	11.1	10.3	11.7	11.5	10.5	11.7	12.1	9.9	11.1	10.8
カリウム	1,968	2,338	2,405	1,786	2,150	2,024	2,063	2,041	2,391	2,294	2,171	2,733	2,577	2,240	2,603	2,757	1,978	2,360	2,393
カルシウム	430	528	539	403	601	466	478	441	486	509	442	586	563	473	617	614	419	531	540
マグネシウム	216	251	254	199	220	215	224	226	252	247	237	287	273	232	292	289	213	250	249
リン	871	963	969	846	929	902	904	921	978	975	913	1,048	1,018	897	1,027	1,050	794	867	923
鉄	7.0	8.6	8.5	6.7	7.5	7.1	7.5	7.4	8.6	9.2	7.6	9.8	8.8	7.1	10.0	9.4	7.0	7.9	8.1
亜鉛	7.1	8.0	7.7	7.3	7.9	7.5	7.3	7.5	8.2	7.9	7.2	8.2	8.0	7.2	7.7	8.1	6.6	7.4	7.2
銅	0.99	1.17	1.18	0.95	1.03	1.03	1.05	1.01	1.13	1.14	1.03	1.29	1.25	1.08	1.41	1.32	1.06	1.17	1.16
ビタミンA	729	1,194	952	702	1,098	800	790	829	1,026	876	671	996	986	949	1,438	1,114	772	1,074	989
ビタミンD	6.9	6.9	8.5	5.6	4.4	7.4	6.2	7.6	5.8	8.7	8.3	6.9	9.1	8.3	13.4	9.6	7.0	6.6	8.8
ビタミンE	10.4	14.8	11.7	6.8	19.0	9.2	10.8	15.8	22.6	11.0	15.2	10.9	11.9	8.6	10.1	12.5	8.6	22.5	12.7
ビタミンK	229	310	288	202	311	223	252	219	240	265	246	373	313	314	399	349	250	347	279
ビタミンB <sub>1</sub>	1.42	2.28	1.54	1.68	0.96	1.17	1.08	1.82	1.50	1.24	1.60	1.76	1.46	1.07	4.94	2.05	1.62	3.93	1.78
ビタミンB <sub>2</sub>	1.87	2.68	2.01	1.87	1.37	3.78	1.45	2.10	1.32	1.48	3.18	4.33	1.52	1.19	1.31	1.58	1.48	4.58	2.62
ナイアシン	13.9	14.3	14.1	13.1	12.6	13.1	13.1	15.1	15.2	14.6	15.4	16.3	15.3	14.9	13.1	15.2	12.3	12.7	12.9
ビタミンB <sub>6</sub>	1.72	4.78	2.03	1.38	1.14	1.39	1.72	2.41	1.31	1.80	2.33	10.64	1.83	1.35	5.35	2.48	1.84	4.87	2.43
ビタミンB <sub>12</sub>	6.4	7.9	7.2	6.6	5.2	6.1	5.4	6.5	6.3	6.6	7.9	6.5	7.7	7.1	14.7	8.5	5.9	5.5	7.3
葉酸	263	360	326	235	304	263	266	274	344	305	290	395	348	314	447	383	307	354	334
パントテン酸	4.64	5.52	5.30	4.52	5.37	5.03	4.99	4.90	5.22	5.26	4.75	5.89	5.56	4.88	6.19	5.73	4.26	4.89	5.04
ビタミンC	108	133	146	78	102	118	115	116	108	124	176	163	154	112	135	182	105	156	153
コレステロール	293	325	301	313	354	318	310	370	367	339	296	344	305	255	311	290	210	233	273
食物繊維	11.8	14.8	15.1	10.6	13.9	12.4	12.9	11.9	14.4	14.1	12.8	17.6	16.3	13.5	16.6	17.7	12.7	15.4	15.0
うち水溶性	2.8	3.5	3.5	2.6	3.2	3.0	3.1	2.9	3.6	3.3	2.9	4.5	3.8	3.0	3.7	4.1	3.0	3.5	3.4
うち不溶性	9.0	11.2	11.6	8.0	10.7	9.3	9.8	9.0	10.8	10.8	9.9	13.1	12.5	10.5	12.9	13.6	9.7	11.8	11.6
脂肪エネルギー比率	26.4	26.8	24.7	28.6	31.2	28.9	27.9	27.2	28.4	26.5	26.2	27.0	24.6	23.4	26.0	22.9	23.3	18.6	21.6
炭水化物エネルギー比率	58.3	58.1	59.8	56.2	54.0	55.7	57.4	57.6	56.7	58.1	57.6	57.4	59.7	61.0	58.7	61.3	61.2	66.5	62.9
動物性たんぱく質比率	51.5	49.8	49.9	54.1	52.6	54.0	50.5	53.5	50.8	52.0	52.4	50.0	49.8	52.5	46.4	48.3	45.5	43.3	48.1

注) 現在喫煙：現在習慣的に喫煙している者  
 過去喫煙：過去習慣的に喫煙していた者  
 非喫煙：喫煙しない者

◆第92表◆ ニコチン依存度の分布（性・年齢階級別）

（％）

ニコチン依存度		総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (3,627)	100.0 ( 449)	100.0 ( 654)	100.0 ( 612)	100.0 ( 780)	100.0 ( 570)	100.0 ( 562)
	0 点	1.7( 63)	0.2( 1)	0.9( 6)	1.0( 6)	1.3( 10)	2.8( 16)	4.3( 24)
	1	1.7( 63)	2.9( 13)	1.8( 12)	1.5( 9)	1.3( 10)	1.9( 11)	1.4( 8)
	2	3.0( 109)	3.3( 15)	3.8( 25)	2.6( 16)	2.6( 20)	3.0( 17)	2.8( 16)
	3	3.7( 133)	4.5( 20)	4.1( 27)	3.9( 24)	3.3( 26)	2.6( 51)	3.7( 21)
	4	5.0( 183)	5.1( 23)	5.0( 33)	4.7( 29)	3.7( 29)	6.0( 34)	6.2( 35)
	5	7.8( 284)	8.5( 38)	7.8( 51)	8.3( 51)	7.6( 59)	5.3( 30)	9.8( 55)
	6	9.5( 345)	12.0( 54)	10.1( 66)	9.5( 58)	8.3( 65)	8.6( 49)	9.4( 53)
	7	12.5( 454)	18.0( 81)	13.9( 91)	8.7( 53)	11.4( 89)	10.2( 58)	14.6( 82)
	8	14.3( 519)	14.9( 67)	14.5( 95)	14.1( 86)	12.4( 97)	18.6( 106)	12.1( 68)
	9	14.1( 513)	11.8( 53)	13.8( 90)	14.1( 86)	14.6( 114)	17.0( 97)	13.0( 73)
	10	13.8( 500)	12.0( 54)	12.5( 82)	15.5( 95)	15.5( 121)	13.0( 74)	13.2( 74)
	11	7.8( 282)	5.3( 24)	8.3( 54)	9.3( 57)	10.5( 82)	6.8( 39)	4.6( 26)
12	4.9( 179)	1.3( 6)	3.4( 22)	6.9( 42)	7.4( 58)	4.2( 24)	4.8( 27)	
男	総 数 (実 数)	100.0 (2,887)	100.0 ( 309)	100.0 ( 470)	100.0 ( 478)	100.0 ( 637)	100.0 ( 502)	100.0 ( 491)
	0 点	2.0( 57)	0.3( 1)	1.1( 5)	0.8( 4)	1.4( 9)	2.8( 14)	4.9( 24)
	1	1.4( 41)	1.9( 6)	1.7( 8)	1.7( 8)	0.9( 6)	1.4( 7)	1.2( 6)
	2	2.5( 73)	1.9( 6)	1.9( 9)	2.5( 12)	2.5( 16)	3.2( 16)	2.9( 14)
	3	2.9( 84)	3.6( 11)	3.0( 14)	3.1( 15)	2.4( 15)	2.8( 14)	3.1( 15)
	4	4.2( 120)	3.6( 11)	4.5( 21)	3.8( 18)	3.1( 20)	5.0( 25)	5.1( 25)
	5	6.8( 197)	7.1( 22)	7.9( 37)	7.1( 34)	6.1( 39)	4.4( 22)	8.8( 43)
	6	9.1( 262)	11.3( 35)	8.9( 42)	8.6( 41)	8.6( 55)	8.0( 40)	10.0( 49)
	7	12.5( 361)	19.7( 61)	13.6( 64)	9.6( 46)	11.0( 70)	9.6( 48)	14.7( 72)
	8	14.6( 421)	16.8( 52)	14.5( 68)	12.6( 60)	12.6( 80)	19.3( 97)	13.0( 64)
	9	14.7( 423)	12.9( 40)	15.3( 72)	14.0( 67)	14.1( 90)	17.7( 89)	13.2( 65)
	10	14.7( 425)	12.9( 40)	14.3( 67)	17.2( 82)	16.5( 105)	13.3( 67)	13.0( 64)
	11	8.9( 256)	6.1( 19)	9.1( 43)	11.1( 53)	12.1( 77)	7.8( 39)	5.1( 25)
12	5.8( 167)	1.6( 5)	4.3( 20)	7.9( 38)	8.6( 55)	4.8( 24)	5.1( 25)	
女	総 数 (実 数)	100.0 ( 740)	100.0 ( 140)	100.0 ( 184)	100.0 ( 134)	100.0 ( 143)	100.0 ( 68)	100.0 ( 71)
	0 点	0.8( 6)	0.0( 0)	0.5( 1)	1.5( 2)	0.7( 1)	2.9( 2)	0.0( 0)
	1	3.0( 22)	5.0( 7)	2.2( 4)	0.7( 1)	2.8( 4)	5.9( 4)	2.8( 2)
	2	4.9( 36)	6.4( 9)	8.7( 16)	3.0( 4)	2.8( 4)	1.5( 1)	2.8( 2)
	3	6.6( 49)	6.4( 9)	7.1( 13)	6.7( 9)	7.7( 11)	1.5( 1)	8.5( 6)
	4	8.5( 63)	8.6( 12)	6.5( 12)	8.2( 11)	6.3( 9)	13.2( 9)	14.1( 10)
	5	11.8( 87)	11.4( 16)	7.6( 14)	12.7( 17)	14.0( 20)	11.8( 8)	16.9( 12)
	6	11.2( 83)	13.6( 19)	13.0( 24)	12.7( 17)	7.0( 10)	13.2( 9)	5.6( 4)
	7	12.6( 93)	14.3( 20)	14.7( 27)	5.2( 7)	13.3( 19)	14.7( 10)	14.1( 10)
	8	13.2( 98)	10.7( 15)	14.7( 27)	19.4( 26)	11.9( 17)	13.2( 9)	5.6( 4)
	9	12.2( 90)	9.3( 13)	9.8( 18)	14.2( 19)	16.8( 24)	11.8( 8)	11.3( 8)
	10	10.1( 75)	10.0( 14)	8.2( 15)	9.7( 13)	11.2( 16)	10.3( 7)	14.1( 10)
	11	3.5( 26)	3.6( 5)	6.0( 11)	3.0( 4)	3.5( 5)	0.0( 0)	1.4( 1)
12	1.6( 12)	0.7( 1)	1.1( 2)	3.0( 4)	2.1( 3)	0.0( 0)	2.8( 2)	

◆第93表◆ 喫煙の状況別、ニコチン依存度の分布（男，年齢階級別）

（％）

	ニコチン 依存度	総数(実数)	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総 数	総数(実数)	100.0(2,846)	100.0( 308)	100.0( 470)	100.0( 469)	100.0( 631)	100.0( 491)	100.0( 477)
	0点	1.9( 54)	0.3( 1)	1.1( 5)	0.9( 4)	1.3( 8)	2.9( 14)	4.6( 22)
	1	1.4( 40)	1.9( 6)	1.7( 8)	1.5( 7)	1.0( 6)	1.4( 7)	1.3( 6)
	2	2.5( 70)	1.9( 6)	1.9( 9)	2.3( 11)	2.4( 15)	3.3( 16)	2.7( 13)
	3	2.8( 81)	3.6( 11)	3.0( 14)	3.2( 15)	2.2( 14)	2.4( 12)	3.1( 15)
	4	4.1( 118)	3.6( 11)	4.5( 21)	3.8( 18)	3.2( 20)	4.9( 24)	5.0( 24)
	5	6.9( 195)	7.1( 22)	7.9( 37)	7.0( 33)	6.2( 39)	4.5( 22)	8.8( 42)
	6	9.1( 259)	11.4( 35)	8.9( 42)	8.7( 41)	8.7( 55)	7.9( 39)	9.9( 47)
	7	12.5( 355)	19.8( 61)	13.6( 64)	9.4( 44)	10.9( 69)	9.6( 47)	14.7( 70)
	8	14.6( 415)	16.6( 51)	14.5( 68)	12.8( 60)	12.5( 79)	19.6( 96)	12.8( 61)
	9	14.7( 418)	13.0( 40)	15.3( 72)	14.1( 66)	14.1( 89)	17.7( 87)	13.4( 64)
	10	14.8( 422)	13.0( 40)	14.3( 67)	17.1( 80)	16.6( 105)	13.6( 67)	13.2( 63)
	11	8.9( 254)	6.2( 19)	9.1( 43)	11.1( 52)	12.2( 77)	7.7( 38)	5.2( 25)
12	5.8( 165)	1.6( 5)	4.3( 20)	8.1( 38)	8.7( 55)	4.5( 22)	5.2( 25)	
現 在 習 慣 的 に 喫 煙 し て い る 者	総数(実数)	100.0(1,966)	100.0( 292)	100.0( 391)	100.0( 362)	100.0( 449)	100.0( 272)	100.0( 200)
	0点	0.2( 3)	0.3( 1)	0.3( 1)	0.0( 0)	0.2( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
	1	0.9( 18)	1.7( 5)	1.8( 7)	0.8( 3)	0.4( 2)	0.0( 0)	0.5( 1)
	2	1.4( 27)	1.7( 5)	1.8( 7)	1.1( 4)	1.1( 5)	1.1( 3)	1.5( 3)
	3	2.3( 45)	3.1( 9)	2.3( 9)	1.4( 5)	2.2( 10)	2.2( 6)	3.0( 6)
	4	3.3( 65)	3.8( 11)	3.6( 14)	3.9( 14)	1.8( 8)	2.2( 6)	6.0( 12)
	5	6.4( 125)	6.8( 20)	7.7( 30)	6.6( 24)	5.3( 24)	3.3( 9)	9.0( 18)
	6	8.7( 172)	11.0( 32)	9.5( 37)	8.3( 30)	7.1( 32)	8.1( 22)	9.5( 19)
	7	12.7( 249)	20.2( 59)	10.7( 42)	8.8( 32)	11.8( 53)	10.3( 28)	17.5( 35)
	8	15.3( 301)	16.4( 48)	15.1( 59)	11.6( 42)	13.6( 61)	22.8( 62)	14.5( 29)
	9	16.0( 315)	13.4( 39)	16.1( 63)	15.5( 56)	14.9( 67)	21.3( 58)	16.0( 32)
	10	17.1( 337)	13.4( 39)	15.3( 60)	20.7( 75)	19.8( 89)	15.4( 42)	16.0( 32)
	11	9.9( 194)	6.5( 19)	10.7( 42)	11.9( 43)	13.1( 59)	8.5( 23)	4.0( 8)
12	5.8( 115)	1.7( 5)	5.1( 20)	9.4( 34)	8.5( 38)	4.8( 13)	2.5( 5)	
過 去 習 慣 的 に 喫 煙 し て い た 者	総数(実数)	100.0( 880)	100.0( 16)	100.0( 79)	100.0( 107)	100.0( 182)	100.0( 219)	100.0( 277)
	0点	5.8( 51)	0.0( 0)	5.1( 4)	3.7( 4)	3.8( 7)	6.4( 14)	7.9( 22)
	1	2.5( 22)	6.3( 1)	1.3( 1)	3.7( 4)	2.2( 4)	3.2( 7)	1.8( 5)
	2	4.9( 43)	6.3( 1)	2.5( 2)	6.5( 7)	5.5( 10)	5.9( 13)	3.6( 10)
	3	4.1( 36)	12.5( 2)	6.3( 5)	9.3( 10)	2.2( 4)	2.7( 6)	3.2( 9)
	4	6.0( 53)	0.0( 0)	8.9( 7)	3.7( 4)	6.6( 12)	8.2( 18)	4.3( 12)
	5	8.0( 70)	12.5( 2)	8.9( 7)	8.4( 9)	8.2( 15)	5.9( 13)	8.7( 24)
	6	9.9( 87)	18.8( 3)	6.3( 5)	10.3( 11)	12.6( 23)	7.8( 17)	10.1( 28)
	7	12.0( 106)	12.5( 2)	27.8( 22)	11.2( 12)	8.8( 16)	8.7( 19)	12.6( 35)
	8	13.0( 114)	18.8( 3)	11.4( 9)	16.8( 18)	9.9( 18)	15.5( 34)	11.6( 32)
	9	11.7( 103)	6.3( 1)	11.4( 9)	9.3( 10)	12.1( 22)	13.2( 29)	11.6( 32)
	10	9.7( 85)	6.3( 1)	8.9( 7)	4.7( 5)	8.8( 16)	11.4( 25)	11.2( 31)
	11	6.8( 60)	0.0( 0)	1.3( 1)	8.4( 9)	9.9( 18)	6.8( 15)	6.1( 17)
12	5.7( 50)	0.0( 0)	0.0( 0)	3.7( 4)	9.3( 17)	4.1( 9)	7.2( 20)	

◆第93表◆ 喫煙の状況別、ニコチン依存度の分布（女，年齢階級別）

（％）

	ニコチン 依存度	総数(実数)	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総 数	総数(実数)	100.0( 733)	100.0( 139)	100.0( 183)	100.0( 133)	100.0( 141)	100.0( 68)	100.0( 69)
	0点	0.8( 6)	0.0( 0)	0.5( 1)	1.5( 2)	0.7( 1)	2.9( 2)	0.0( 0)
	1	2.9( 21)	4.3( 6)	2.2( 4)	0.8( 1)	2.8( 4)	5.9( 4)	2.9( 2)
	2	4.9( 36)	6.5( 9)	8.7( 16)	3.0( 4)	2.8( 4)	1.5( 1)	2.9( 2)
	3	6.7( 49)	6.5( 9)	7.1( 13)	6.8( 9)	7.8( 11)	1.5( 1)	8.7( 6)
	4	8.6( 63)	8.6( 12)	6.6( 12)	8.3( 11)	6.4( 9)	13.2( 9)	14.5( 10)
	5	11.6( 85)	11.5( 16)	7.7( 14)	12.8( 17)	13.5( 19)	11.8( 8)	15.9( 11)
	6	11.2( 82)	13.7( 19)	13.1( 24)	12.0( 16)	7.1( 10)	13.2( 9)	5.8( 4)
	7	12.7( 93)	14.4( 20)	14.8( 27)	5.3( 7)	13.5( 19)	14.7( 10)	14.5( 10)
	8	13.0( 95)	10.8( 15)	14.2( 26)	19.5( 26)	11.3( 16)	13.2( 9)	4.3( 3)
	9	12.3( 90)	9.4( 13)	9.8( 18)	14.3( 19)	17.0( 24)	11.8( 8)	11.6( 8)
	10	10.2( 75)	10.1( 14)	8.2( 15)	9.8( 13)	11.3( 16)	10.3( 7)	14.5( 10)
	11	3.5( 26)	3.6( 5)	6.0( 11)	3.0( 4)	3.5( 5)	0.0( 0)	1.4( 1)
12	1.6( 12)	0.7( 1)	1.1( 2)	3.0( 4)	2.1( 3)	0.0( 0)	2.9( 2)	
現 在 習 慣 的 に 喫 煙 し て い る 者	総数(実数)	100.0( 555)	100.0( 109)	100.0( 134)	100.0( 110)	100.0( 101)	100.0( 56)	100.0( 45)
	0点	0.2( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.8( 1)	0.0( 0)
	1	1.4( 8)	3.7( 4)	0.7( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	3.6( 2)	2.2( 1)
	2	2.9( 16)	4.6( 5)	3.7( 5)	2.7( 3)	1.0( 1)	1.8( 1)	2.2( 1)
	3	5.2( 29)	6.4( 7)	6.0( 8)	6.4( 7)	4.0( 4)	1.8( 1)	4.4( 2)
	4	8.3( 46)	9.2( 10)	6.7( 9)	8.2( 9)	5.9( 6)	8.9( 5)	15.6( 7)
	5	10.5( 58)	9.2( 10)	9.0( 12)	10.0( 11)	13.9( 14)	8.9( 5)	13.3( 6)
	6	11.5( 64)	12.8( 14)	11.9( 16)	11.8( 13)	7.9( 8)	16.1( 9)	8.9( 4)
	7	14.1( 78)	17.4( 19)	14.9( 20)	4.5( 5)	14.9( 15)	17.9( 10)	20.0( 9)
	8	14.6( 81)	11.0( 12)	16.4( 22)	20.0( 22)	13.9( 14)	14.3( 8)	6.7( 3)
	9	13.5( 75)	10.1( 11)	11.9( 16)	17.3( 19)	18.8( 19)	12.5( 7)	6.7( 3)
	10	12.1( 67)	11.0( 12)	9.7( 13)	11.8( 13)	13.9( 14)	12.5( 7)	17.8( 8)
	11	4.0( 22)	3.7( 4)	7.5( 10)	3.6( 4)	4.0( 4)	0.0( 0)	0.0( 0)
12	1.8( 10)	0.9( 1)	1.5( 2)	3.6( 4)	2.0( 2)	0.0( 0)	2.2( 1)	
過 去 習 慣 的 に 喫 煙 し て い た 者	総数(実数)	100.0( 178)	100.0( 30)	100.0( 49)	100.0( 23)	100.0( 40)	100.0( 12)	100.0( 24)
	0点	2.8( 5)	0.0( 0)	2.0( 1)	8.7( 2)	2.5( 1)	8.3( 1)	0.0( 0)
	1	7.3( 13)	6.7( 2)	6.1( 3)	4.3( 1)	10.0( 4)	16.7( 2)	4.2( 1)
	2	11.2( 20)	13.3( 4)	22.4( 11)	4.3( 1)	7.5( 3)	0.0( 0)	4.2( 1)
	3	11.2( 20)	6.7( 2)	10.2( 5)	8.7( 2)	17.5( 7)	0.0( 0)	16.7( 4)
	4	9.6( 17)	6.7( 2)	6.1( 3)	8.7( 2)	7.5( 3)	33.3( 4)	12.5( 3)
	5	15.2( 27)	20.0( 6)	4.1( 2)	26.1( 6)	12.5( 5)	25.0( 3)	20.8( 5)
	6	10.1( 18)	16.7( 5)	16.3( 8)	13.0( 3)	5.0( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)
	7	8.4( 15)	3.3( 1)	14.3( 7)	8.7( 2)	10.0( 4)	0.0( 0)	4.2( 1)
	8	7.9( 14)	10.0( 3)	8.2( 4)	17.4( 4)	5.0( 2)	8.3( 1)	0.0( 0)
	9	8.4( 15)	6.7( 2)	4.1( 2)	0.0( 0)	12.5( 5)	8.3( 1)	20.8( 5)
	10	4.5( 8)	6.7( 2)	4.1( 2)	0.0( 0)	5.0( 2)	0.0( 0)	8.3( 2)
	11	2.2( 4)	3.3( 1)	2.0( 1)	0.0( 0)	2.5( 1)	0.0( 0)	4.2( 1)
12	1.1( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	2.5( 1)	0.0( 0)	4.2( 1)	

◆第94表の1◆ 習慣的喫煙開始年齢別、ニコチン依存度  
 [現在習慣的に喫煙している者] (男, 年齢階級別)

(%)

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	習 慣 的 喫 煙 開 始 年 齢							
			19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	
総 数	総数(実数)	100.0(1,900)	100.0( 833)	100.0(1,018)	100.0( 36)	100.0( 7)	100.0( 5)	100.0( 1)	—	
	0点	0.1( 2)	0.0( 0)	0.2( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	1	0.7( 14)	0.6( 5)	0.8( 8)	2.8( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	2	1.3( 25)	1.0( 8)	1.5( 15)	0.0( 0)	14.3( 1)	20.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	3	2.3( 43)	1.6( 13)	2.8( 29)	2.8( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	4	3.2( 60)	2.4( 20)	3.7( 38)	5.6( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	5	6.4( 121)	5.0( 42)	7.3( 74)	5.6( 2)	42.9( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	6	8.8( 167)	8.0( 67)	9.4( 96)	11.1( 4)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	7	12.7( 241)	12.0( 100)	12.8( 130)	19.4( 7)	28.6( 2)	40.0( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	8	15.2( 288)	14.0( 117)	16.0( 163)	19.4( 7)	14.3( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	9	16.2( 307)	16.2( 135)	16.0( 163)	25.0( 9)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	10	17.3( 329)	18.1( 151)	17.0( 173)	8.3( 3)	0.0( 0)	20.0( 1)	100.0( 1)	0.0( 0)	—
	11	10.1( 191)	12.6( 105)	8.3( 85)	0.0( 0)	0.0( 0)	20.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
12	5.9( 112)	8.4( 70)	4.1( 42)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	
20～29歳	総数(実数)	100.0( 281)	100.0( 170)	100.0( 111)	—	—	—	—	—	
	0点	0.4( 1)	0.0( 0)	0.9( 1)	—	—	—	—	—	—
	1	1.1( 3)	0.6( 1)	1.8( 2)	—	—	—	—	—	—
	2	1.4( 4)	1.2( 2)	1.8( 2)	—	—	—	—	—	—
	3	2.8( 8)	1.8( 3)	4.5( 5)	—	—	—	—	—	—
	4	3.9( 11)	2.9( 5)	5.4( 6)	—	—	—	—	—	—
	5	6.8( 19)	4.1( 7)	10.8( 12)	—	—	—	—	—	—
	6	11.4( 32)	10.0( 17)	13.5( 15)	—	—	—	—	—	—
	7	20.3( 57)	21.2( 36)	18.9( 21)	—	—	—	—	—	—
	8	16.4( 46)	18.2( 31)	13.5( 15)	—	—	—	—	—	—
	9	13.5( 38)	14.7( 25)	11.7( 13)	—	—	—	—	—	—
	10	13.9( 39)	15.9( 27)	10.8( 12)	—	—	—	—	—	—
	11	6.4( 18)	7.1( 12)	5.4( 6)	—	—	—	—	—	—
12	1.8( 5)	2.4( 4)	0.9( 1)	—	—	—	—	—	—	
30～39歳	総数(実数)	100.0( 383)	100.0( 213)	100.0( 167)	100.0( 3)	—	—	—	—	
	0点	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	1.6( 6)	1.4( 3)	1.2( 2)	33.3( 1)	—	—	—	—	—
	2	1.8( 7)	0.9( 2)	3.0( 5)	0.0( 0)	—	—	—	—	—
	3	2.3( 9)	0.5( 1)	4.8( 8)	0.0( 0)	—	—	—	—	—
	4	3.1( 12)	2.8( 6)	3.6( 6)	0.0( 0)	—	—	—	—	—
	5	7.8( 30)	4.7( 10)	12.0( 20)	0.0( 0)	—	—	—	—	—
	6	9.7( 37)	7.5( 16)	12.0( 20)	33.3( 1)	—	—	—	—	—
	7	11.0( 42)	9.4( 20)	13.2( 22)	0.0( 0)	—	—	—	—	—
	8	15.4( 59)	16.0( 34)	14.4( 24)	33.3( 1)	—	—	—	—	—
	9	16.2( 62)	17.4( 37)	15.0( 25)	0.0( 0)	—	—	—	—	—
	10	14.9( 57)	17.8( 38)	11.4( 19)	0.0( 0)	—	—	—	—	—
	11	11.0( 42)	14.6( 31)	6.6( 11)	0.0( 0)	—	—	—	—	—
12	5.2( 20)	7.0( 15)	3.0( 5)	0.0( 0)	—	—	—	—	—	
40～49歳	総数(実数)	100.0( 350)	100.0( 172)	100.0( 172)	100.0( 5)	100.0( 1)	—	—	—	
	0点	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	0.6( 2)	0.0( 0)	1.2( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—	—	—
	2	1.1( 4)	1.2( 2)	0.6( 1)	0.0( 0)	100.0( 1)	—	—	—	—
	3	1.4( 5)	1.7( 3)	1.2( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—	—	—
	4	3.7( 13)	2.3( 4)	5.2( 9)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—	—	—
	5	6.3( 22)	4.7( 8)	7.6( 13)	20.0( 1)	0.0( 0)	—	—	—	—
	6	8.6( 30)	10.5( 18)	7.0( 12)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—	—	—
	7	8.6( 30)	5.2( 9)	11.0( 19)	40.0( 2)	0.0( 0)	—	—	—	—
	8	10.9( 38)	10.5( 18)	11.0( 19)	20.0( 1)	0.0( 0)	—	—	—	—
	9	15.7( 55)	16.9( 29)	14.5( 25)	20.0( 1)	0.0( 0)	—	—	—	—
	10	21.4( 75)	20.9( 36)	22.7( 39)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—	—	—
	11	12.3( 43)	14.0( 24)	11.0( 19)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—	—	—
12	9.4( 33)	12.2( 21)	7.0( 12)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—	—	—	

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	習 慣 的 喫 煙 開 始 年 齢						
			19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
50～59歳	総数(実数)	100.0( 435)	100.0( 172)	100.0( 254)	100.0( 7)	—	100.0( 2)	—	—
	0点	0.2( 1)	0.0( 0)	0.4( 1)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—	—
	1	0.5( 2)	0.6( 1)	0.4( 1)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—	—
	2	1.1( 5)	1.2( 2)	0.8( 2)	0.0( 0)	—	50.0( 1)	—	—
	3	2.3( 10)	1.7( 3)	2.4( 6)	14.3( 1)	—	0.0( 0)	—	—
	4	1.6( 7)	1.2( 2)	1.6( 4)	14.3( 1)	—	0.0( 0)	—	—
	5	5.5( 24)	7.0( 12)	4.7( 12)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—	—
	6	6.7( 29)	4.1( 7)	8.3( 21)	14.3( 1)	—	0.0( 0)	—	—
	7	12.2( 53)	14.0( 24)	10.2( 26)	28.6( 2)	—	50.0( 1)	—	—
	8	13.6( 59)	10.5( 18)	15.7( 40)	14.3( 1)	—	0.0( 0)	—	—
	9	15.2( 66)	15.1( 26)	15.4( 39)	14.3( 1)	—	0.0( 0)	—	—
	10	19.5( 85)	16.3( 28)	22.4( 57)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—	—
	11	13.3( 58)	16.3( 28)	11.8( 30)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—	—
	12	8.3( 36)	12.2( 21)	5.9( 15)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—	—
60～69歳	総数(実数)	100.0( 261)	100.0( 65)	100.0( 183)	100.0( 10)	100.0( 2)	100.0( 1)	—	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	1.1( 3)	0.0( 0)	1.6( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	3	2.3( 6)	1.5( 1)	2.7( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	4	2.3( 6)	0.0( 0)	3.3( 6)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	5	3.4( 9)	0.0( 0)	4.9( 9)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	6	8.0( 21)	7.7( 5)	8.7( 16)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	7	10.3( 27)	9.2( 6)	10.4( 19)	10.0( 1)	50.0( 1)	0.0( 0)	—	—
	8	22.6( 59)	16.9( 11)	24.0( 44)	30.0( 3)	50.0( 1)	0.0( 0)	—	—
	9	20.7( 54)	18.5( 12)	20.8( 38)	40.0( 4)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	10	15.7( 41)	24.6( 16)	12.6( 23)	20.0( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	11	8.4( 22)	10.8( 7)	7.7( 14)	0.0( 0)	0.0( 0)	100.0( 1)	—	—
	12	5.0( 13)	10.8( 7)	3.3( 6)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
70歳以上	総数(実数)	100.0( 190)	100.0( 41)	100.0( 131)	100.0( 11)	100.0( 4)	100.0( 2)	100.0( 1)	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	0.5( 1)	0.0( 0)	0.8( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	2	1.1( 2)	0.0( 0)	1.5( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	3	2.6( 5)	4.9( 2)	2.3( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	4	5.8( 11)	7.3( 3)	5.3( 7)	9.1( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	5	8.9( 17)	12.2( 5)	6.1( 8)	9.1( 1)	75.0( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	6	9.5( 18)	9.8( 4)	9.2( 12)	18.2( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	7	16.8( 32)	12.2( 5)	17.6( 23)	18.2( 2)	25.0( 1)	50.0( 1)	0.0( 0)	—
	8	14.2( 27)	12.2( 5)	16.0( 21)	9.1( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	9	16.8( 32)	14.6( 6)	17.6( 23)	27.3( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	10	16.8( 32)	14.6( 6)	17.6( 23)	9.1( 1)	0.0( 0)	50.0( 1)	100.0( 1)	—
	11	4.2( 8)	7.3( 3)	3.8( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	12	2.6( 5)	4.9( 2)	2.3( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—

◆第94表の1◆ 習慣的喫煙開始年齢別、ニコチン依存度  
 [現在習慣的に喫煙している者] (女, 年齢階級別)

(%)

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	習 慣 的 喫 煙 開 始 年 齢						
			19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総 数	総数(実数)	100.0( 521)	100.0( 140)	100.0( 278)	100.0( 69)	100.0( 22)	100.0( 8)	100.0( 2)	100.0( 2)
	0点	0.2( 1)	0.0( 0)	0.4( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	1	1.3( 7)	0.7( 1)	1.4( 4)	1.4( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	50.0( 1)	0.0( 0)
	2	2.7( 14)	2.9( 4)	2.5( 7)	4.3( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	3	5.2( 27)	2.9( 4)	5.4( 15)	7.2( 5)	9.1( 2)	12.5( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
	4	7.5( 39)	9.3( 13)	5.8( 16)	8.7( 6)	9.1( 2)	25.0( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)
	5	10.6( 55)	7.9( 11)	10.1( 28)	15.9( 11)	13.6( 3)	25.0( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)
	6	11.5( 60)	10.0( 14)	12.6( 35)	5.8( 4)	22.7( 5)	12.5( 1)	0.0( 0)	50.0( 1)
	7	14.8( 77)	16.4( 23)	14.0( 39)	11.6( 8)	13.6( 3)	25.0( 2)	50.0( 1)	50.0( 1)
	8	14.4( 75)	10.7( 15)	17.6( 49)	13.0( 9)	9.1( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	9	13.4( 70)	17.9( 25)	12.2( 34)	15.9( 11)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	10	12.5( 65)	12.9( 18)	11.9( 33)	14.5( 10)	18.2( 4)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	11	4.0( 21)	6.4( 9)	4.3( 12)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
12	1.9( 10)	2.1( 3)	1.8( 5)	1.4( 1)	4.5( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	
20～29歳	総数(実数)	100.0( 103)	100.0( 47)	100.0( 56)	—	—	—	—	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	3.9( 4)	2.1( 1)	5.4( 3)	—	—	—	—	—
	2	3.9( 4)	4.3( 2)	3.6( 2)	—	—	—	—	—
	3	6.8( 7)	6.4( 3)	7.1( 4)	—	—	—	—	—
	4	8.7( 9)	8.5( 4)	8.9( 5)	—	—	—	—	—
	5	7.8( 8)	8.5( 4)	7.1( 4)	—	—	—	—	—
	6	13.6( 14)	8.5( 4)	17.9( 10)	—	—	—	—	—
	7	18.4( 19)	21.3( 10)	16.1( 9)	—	—	—	—	—
	8	10.7( 11)	8.5( 4)	12.5( 7)	—	—	—	—	—
	9	10.7( 11)	12.8( 6)	8.9( 5)	—	—	—	—	—
	10	10.7( 11)	17.0( 8)	5.4( 3)	—	—	—	—	—
	11	3.9( 4)	2.1( 1)	5.4( 3)	—	—	—	—	—
12	1.0( 1)	0.0( 0)	1.8( 1)	—	—	—	—	—	
30～39歳	総数(実数)	100.0( 126)	100.0( 42)	100.0( 81)	100.0( 3)	—	—	—	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	0.8( 1)	0.0( 0)	1.2( 1)	0.0( 0)	—	—	—	—
	2	4.0( 5)	2.4( 1)	4.9( 4)	0.0( 0)	—	—	—	—
	3	5.6( 7)	0.0( 0)	7.4( 6)	33.3( 1)	—	—	—	—
	4	7.1( 9)	11.9( 5)	3.7( 3)	33.3( 1)	—	—	—	—
	5	8.7( 11)	2.4( 1)	12.3( 10)	0.0( 0)	—	—	—	—
	6	11.9( 15)	14.3( 6)	11.1( 9)	0.0( 0)	—	—	—	—
	7	15.1( 19)	19.0( 8)	12.3( 10)	33.3( 1)	—	—	—	—
	8	16.7( 21)	14.3( 6)	18.5( 15)	0.0( 0)	—	—	—	—
	9	11.1( 14)	16.7( 7)	8.6( 7)	0.0( 0)	—	—	—	—
	10	9.5( 12)	4.8( 2)	12.3( 10)	0.0( 0)	—	—	—	—
	11	7.9( 10)	14.3( 6)	4.9( 4)	0.0( 0)	—	—	—	—
12	1.6( 2)	0.0( 0)	2.5( 2)	0.0( 0)	—	—	—	—	
40～49歳	総数(実数)	100.0( 101)	100.0( 31)	100.0( 56)	100.0( 14)	—	—	—	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	2.0( 2)	0.0( 0)	1.8( 1)	7.1( 1)	—	—	—	—
	3	5.9( 6)	3.2( 1)	3.6( 2)	21.4( 3)	—	—	—	—
	4	8.9( 9)	9.7( 3)	7.1( 4)	14.3( 2)	—	—	—	—
	5	10.9( 11)	16.1( 5)	7.1( 4)	14.3( 2)	—	—	—	—
	6	10.9( 11)	3.2( 1)	14.3( 8)	14.3( 2)	—	—	—	—
	7	5.0( 5)	6.5( 2)	5.4( 3)	0.0( 0)	—	—	—	—
	8	18.8( 19)	12.9( 4)	25.0( 14)	7.1( 1)	—	—	—	—
	9	16.8( 17)	22.6( 7)	14.3( 8)	14.3( 2)	—	—	—	—
	10	12.9( 13)	16.1( 5)	12.5( 7)	7.1( 1)	—	—	—	—
	11	4.0( 4)	3.2( 1)	5.4( 3)	0.0( 0)	—	—	—	—
12	4.0( 4)	6.5( 2)	3.6( 2)	0.0( 0)	—	—	—	—	

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	習 慣 的 喫 煙 開 始 年 齢						
			19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
50～59歳	総数(実数)	100.0( 96)	100.0( 16)	100.0( 49)	100.0( 18)	100.0( 11)	100.0( 2)	—	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	1.0( 1)	6.3( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	3	4.2( 4)	0.0( 0)	4.1( 2)	5.6( 1)	0.0( 0)	50.0( 1)	—	—
	4	3.1( 3)	6.3( 1)	4.1( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	5	14.6( 14)	6.3( 1)	12.2( 6)	22.2( 4)	18.2( 2)	50.0( 1)	—	—
	6	8.3( 8)	12.5( 2)	6.1( 3)	0.0( 0)	27.3( 3)	0.0( 0)	—	—
	7	15.6( 15)	6.3( 1)	20.4( 10)	5.6( 1)	27.3( 3)	0.0( 0)	—	—
	8	13.5( 13)	6.3( 1)	14.3( 7)	22.2( 4)	9.1( 1)	0.0( 0)	—	—
	9	19.8( 19)	31.3( 5)	18.4( 9)	27.8( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	10	14.6( 14)	18.8( 3)	16.3( 8)	11.1( 2)	9.1( 1)	0.0( 0)	—	—
	11	3.1( 3)	6.3( 1)	4.1( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	12	2.1( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	5.6( 1)	9.1( 1)	0.0( 0)	—	—
60～69歳	総数(実数)	100.0( 54)	100.0( 2)	100.0( 27)	100.0( 17)	100.0( 2)	100.0( 5)	100.0( 1)	—
	0点	1.9( 1)	0.0( 0)	3.7( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	1	3.7( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	5.9( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	100.0( 1)	—
	2	1.9( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	5.9( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	3	1.9( 1)	0.0( 0)	3.7( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	4	7.4( 4)	0.0( 0)	3.7( 1)	5.9( 1)	0.0( 0)	40.0( 2)	0.0( 0)	—
	5	9.3( 5)	0.0( 0)	11.1( 3)	11.8( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	6	14.8( 8)	50.0( 1)	14.8( 4)	11.8( 2)	0.0( 0)	20.0( 1)	0.0( 0)	—
	7	18.5( 10)	50.0( 1)	11.1( 3)	23.5( 4)	0.0( 0)	40.0( 2)	0.0( 0)	—
	8	14.8( 8)	0.0( 0)	22.2( 6)	5.9( 1)	50.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	9	13.0( 7)	0.0( 0)	18.5( 5)	11.8( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	10	13.0( 7)	0.0( 0)	11.1( 3)	17.6( 3)	50.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	11	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳以上	総数(実数)	100.0( 41)	100.0( 2)	100.0( 9)	100.0( 17)	100.0( 9)	100.0( 1)	100.0( 1)	100.0( 2)
	0点	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	2.4( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	5.9( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	3	4.9( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	22.2( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	4	12.2( 5)	0.0( 0)	11.1( 1)	11.8( 2)	22.2( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	5	14.6( 6)	0.0( 0)	11.1( 1)	17.6( 3)	11.1( 1)	100.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
	6	9.8( 4)	0.0( 0)	11.1( 1)	0.0( 0)	22.2( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	50.0( 1)
	7	22.0( 9)	50.0( 1)	44.4( 4)	11.8( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	100.0( 1)	50.0( 1)
	8	7.3( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	17.6( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	9	4.9( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	11.8( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	10	19.5( 8)	0.0( 0)	22.2( 2)	23.5( 4)	22.2( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	11	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	2.4( 1)	50.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)



◆第94表の2◆ 習慣的喫煙開始年齢別、ニコチン依存度  
 [過去習慣的に喫煙していた者] (男, 年齢階級別)

(%)

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	習 慣 的 喫 煙 開 始 年 齢					
			19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳
総 数	総数(実数)	100.0( 777)	100.0( 293)	100.0( 444)	100.0( 25)	100.0( 8)	100.0( 4)	100.0( 3)
	0点	4.6( 36)	2.7( 8)	5.4( 24)	4.0( 1)	12.5( 1)	25.0( 1)	33.3( 1)
	1	2.1( 16)	1.7( 5)	2.0( 9)	8.0( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	2	3.5( 27)	2.0( 6)	4.1( 18)	12.0( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	3	3.9( 30)	2.7( 8)	4.5( 20)	0.0( 0)	12.5( 1)	25.0( 1)	0.0( 0)
	4	5.9( 46)	4.8( 14)	6.3( 28)	8.0( 2)	0.0( 0)	25.0( 1)	33.3( 1)
	5	7.7( 60)	7.5( 22)	7.0( 31)	16.0( 4)	37.5( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)
	6	9.7( 75)	7.5( 22)	10.8( 48)	20.0( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	7	12.7( 99)	13.0( 38)	13.1( 58)	4.0( 1)	25.0( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)
	8	13.9( 108)	16.7( 49)	12.8( 57)	4.0( 1)	0.0( 0)	25.0( 1)	0.0( 0)
	9	12.0( 93)	11.9( 35)	12.6( 56)	4.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	33.3( 1)
	10	10.4( 81)	13.0( 38)	9.0( 40)	12.0( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	11	7.5( 58)	8.2( 24)	7.2( 32)	4.0( 1)	12.5( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
12	6.2( 48)	8.2( 24)	5.2( 23)	4.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	
20～29歳	総数(実数)	100.0( 11)	100.0( 6)	100.0( 5)	—	—	—	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	9.1( 1)	16.7( 1)	0.0( 0)	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—
	3	9.1( 1)	0.0( 0)	20.0( 1)	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	—
	5	18.2( 2)	16.7( 1)	20.0( 1)	—	—	—	—
	6	9.1( 1)	0.0( 0)	20.0( 1)	—	—	—	—
	7	18.2( 2)	16.7( 1)	20.0( 1)	—	—	—	—
	8	27.3( 3)	33.3( 2)	20.0( 1)	—	—	—	—
	9	9.1( 1)	16.7( 1)	0.0( 0)	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—
	11	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	
30～39歳	総数(実数)	100.0( 67)	100.0( 41)	100.0( 24)	100.0( 2)	—	—	—
	0点	4.5( 3)	4.9( 2)	4.2( 1)	0.0( 0)	—	—	—
	1	1.5( 1)	2.4( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—	—
	2	1.5( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	50.0( 1)	—	—	—
	3	6.0( 4)	7.3( 3)	4.2( 1)	0.0( 0)	—	—	—
	4	9.0( 6)	9.8( 4)	8.3( 2)	0.0( 0)	—	—	—
	5	7.5( 5)	7.3( 3)	8.3( 2)	0.0( 0)	—	—	—
	6	7.5( 5)	2.4( 1)	12.5( 3)	50.0( 1)	—	—	—
	7	26.9( 18)	26.8( 11)	29.2( 7)	0.0( 0)	—	—	—
	8	13.4( 9)	19.5( 8)	4.2( 1)	0.0( 0)	—	—	—
	9	13.4( 9)	9.8( 4)	20.8( 5)	0.0( 0)	—	—	—
	10	7.5( 5)	9.8( 4)	4.2( 1)	0.0( 0)	—	—	—
	11	1.5( 1)	0.0( 0)	4.2( 1)	0.0( 0)	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	
40～49歳	総数(実数)	100.0( 89)	100.0( 45)	100.0( 44)	—	—	—	—
	0点	1.1( 1)	2.2( 1)	0.0( 0)	—	—	—	—
	1	2.2( 2)	2.2( 1)	2.3( 1)	—	—	—	—
	2	5.6( 5)	2.2( 1)	9.1( 4)	—	—	—	—
	3	7.9( 7)	6.7( 3)	9.1( 4)	—	—	—	—
	4	3.4( 3)	2.2( 1)	4.5( 2)	—	—	—	—
	5	10.1( 9)	6.7( 3)	13.6( 6)	—	—	—	—
	6	7.9( 7)	11.1( 5)	4.5( 2)	—	—	—	—
	7	12.4( 11)	15.6( 7)	9.1( 4)	—	—	—	—
	8	19.1( 17)	20.0( 9)	18.2( 8)	—	—	—	—
	9	10.1( 9)	6.7( 3)	13.6( 6)	—	—	—	—
	10	5.6( 5)	8.9( 4)	2.3( 1)	—	—	—	—
	11	10.1( 9)	8.9( 4)	11.4( 5)	—	—	—	—
12	4.5( 4)	6.7( 3)	2.3( 1)	—	—	—	—	

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	習 慣 的 喫 煙 開 始 年 齢					
			19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳
50～59歳	総数(実数)	100.0( 166)	100.0( 80)	100.0( 82)	100.0( 4)	—	—	—
	0点	3.6( 6)	2.5( 2)	4.9( 4)	0.0( 0)	—	—	—
	1	1.8( 3)	0.0( 0)	3.7( 3)	0.0( 0)	—	—	—
	2	3.0( 5)	1.3( 1)	3.7( 3)	25.0( 1)	—	—	—
	3	1.8( 3)	1.3( 1)	2.4( 2)	0.0( 0)	—	—	—
	4	6.6( 11)	5.0( 4)	7.3( 6)	25.0( 1)	—	—	—
	5	8.4( 14)	10.0( 8)	6.1( 5)	25.0( 1)	—	—	—
	6	12.7( 21)	8.8( 7)	17.1( 14)	0.0( 0)	—	—	—
	7	9.0( 15)	10.0( 8)	8.5( 7)	0.0( 0)	—	—	—
	8	10.2( 17)	11.3( 9)	9.8( 8)	0.0( 0)	—	—	—
	9	12.7( 21)	13.8( 11)	12.2( 10)	0.0( 0)	—	—	—
	10	9.6( 16)	11.3( 9)	8.5( 7)	0.0( 0)	—	—	—
	11	10.8( 18)	12.5( 10)	9.8( 8)	0.0( 0)	—	—	—
12	9.6( 16)	12.5( 10)	6.1( 5)	25.0( 1)	—	—	—	
60～69歳	総数(実数)	100.0( 196)	100.0( 59)	100.0( 126)	100.0( 6)	100.0( 2)	—	100.0( 3)
	0点	4.6( 9)	1.7( 1)	4.0( 5)	16.7( 1)	50.0( 1)	—	33.3( 1)
	1	2.6( 5)	1.7( 1)	1.6( 2)	33.3( 2)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	2	5.1( 10)	5.1( 3)	5.6( 7)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	3	3.1( 6)	0.0( 0)	4.8( 6)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	4	7.1( 14)	6.8( 4)	7.1( 9)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	33.3( 1)
	5	6.1( 12)	5.1( 3)	6.3( 8)	0.0( 0)	50.0( 1)	—	0.0( 0)
	6	7.7( 15)	3.4( 2)	8.7( 11)	33.3( 2)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	7	9.7( 19)	10.2( 6)	10.3( 13)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	8	16.3( 32)	23.7( 14)	14.3( 18)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	9	13.3( 26)	15.3( 9)	12.7( 16)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	33.3( 1)
	10	12.2( 24)	15.3( 9)	11.1( 14)	16.7( 1)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	11	7.7( 15)	6.8( 4)	8.7( 11)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
12	4.6( 9)	5.1( 3)	4.8( 6)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	
70歳以上	総数(実数)	100.0( 248)	100.0( 62)	100.0( 163)	100.0( 13)	100.0( 6)	100.0( 4)	—
	0点	6.9( 17)	3.2( 2)	8.6( 14)	0.0( 0)	0.0( 0)	25.0( 1)	—
	1	1.6( 4)	1.6( 1)	1.8( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	2	2.4( 6)	1.6( 1)	2.5( 4)	7.7( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	3	3.6( 9)	1.6( 1)	3.7( 6)	0.0( 0)	16.7( 1)	25.0( 1)	—
	4	4.8( 12)	1.6( 1)	5.5( 9)	7.7( 1)	0.0( 0)	25.0( 1)	—
	5	7.3( 18)	6.5( 4)	5.5( 9)	23.1( 3)	33.3( 2)	0.0( 0)	—
	6	10.5( 26)	11.3( 7)	10.4( 17)	15.4( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	7	13.7( 34)	8.1( 5)	16.0( 26)	7.7( 1)	33.3( 2)	0.0( 0)	—
	8	12.1( 30)	11.3( 7)	12.9( 21)	7.7( 1)	0.0( 0)	25.0( 1)	—
	9	10.9( 27)	11.3( 7)	11.7( 19)	7.7( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	10	12.5( 31)	19.4( 12)	10.4( 17)	15.4( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	11	6.0( 15)	9.7( 6)	4.3( 7)	7.7( 1)	16.7( 1)	0.0( 0)	—
12	7.7( 19)	12.9( 8)	6.7( 11)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	

◆第94表の2◆ 習慣的喫煙開始年齢別、ニコチン依存度  
 [過去習慣的に喫煙していた者] (女, 年齢階級別)

(%)

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	習 慣 的 喫 煙 開 始 年 齢					
			19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳
総 数	総数(実数)	100.0( 161)	100.0( 45)	100.0( 90)	100.0( 13)	100.0( 10)	100.0( 2)	100.0( 1)
	0点	3.1( 5)	2.2( 1)	3.3( 3)	7.7( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	1	6.8( 11)	0.0( 0)	6.7( 6)	38.5( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	2	10.6( 17)	17.8( 8)	7.8( 7)	0.0( 0)	0.0( 0)	50.0( 1)	100.0( 1)
	3	11.2( 18)	4.4( 2)	14.4( 13)	7.7( 1)	20.0( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)
	4	9.9( 16)	6.7( 3)	13.3( 12)	0.0( 0)	10.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
	5	16.1( 26)	8.9( 4)	18.9( 17)	15.4( 2)	20.0( 2)	50.0( 1)	0.0( 0)
	6	10.6( 17)	17.8( 8)	8.9( 8)	7.7( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	7	8.1( 13)	15.6( 7)	5.6( 5)	0.0( 0)	10.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
	8	7.5( 12)	8.9( 4)	6.7( 6)	15.4( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	9	7.5( 12)	4.4( 2)	7.8( 7)	0.0( 0)	30.0( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)
	10	5.0( 8)	8.9( 4)	3.3( 3)	0.0( 0)	10.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
	11	2.5( 4)	2.2( 1)	3.3( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
12	1.2( 2)	2.2( 1)	0.0( 0)	7.7( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	
20～29歳	総数(実数)	100.0( 27)	100.0( 17)	100.0( 10)	—	—	—	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	3.7( 1)	0.0( 0)	10.0( 1)	—	—	—	—
	2	11.1( 3)	11.8( 2)	10.0( 1)	—	—	—	—
	3	3.7( 1)	0.0( 0)	10.0( 1)	—	—	—	—
	4	7.4( 2)	5.9( 1)	10.0( 1)	—	—	—	—
	5	22.2( 6)	11.8( 2)	40.0( 4)	—	—	—	—
	6	18.5( 5)	29.4( 5)	0.0( 0)	—	—	—	—
	7	3.7( 1)	5.9( 1)	0.0( 0)	—	—	—	—
	8	11.1( 3)	17.6( 3)	0.0( 0)	—	—	—	—
	9	7.4( 2)	0.0( 0)	20.0( 2)	—	—	—	—
	10	7.4( 2)	11.8( 2)	0.0( 0)	—	—	—	—
	11	3.7( 1)	5.9( 1)	0.0( 0)	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	
30～39歳	総数(実数)	100.0( 45)	100.0( 18)	100.0( 27)	—	—	—	—
	0点	2.2( 1)	0.0( 0)	3.7( 1)	—	—	—	—
	1	6.7( 3)	0.0( 0)	11.1( 3)	—	—	—	—
	2	22.2( 10)	33.3( 6)	14.8( 4)	—	—	—	—
	3	11.1( 5)	5.6( 1)	14.8( 4)	—	—	—	—
	4	6.7( 3)	0.0( 0)	11.1( 3)	—	—	—	—
	5	4.4( 2)	0.0( 0)	7.4( 2)	—	—	—	—
	6	17.8( 8)	16.7( 3)	18.5( 5)	—	—	—	—
	7	13.3( 6)	27.8( 5)	3.7( 1)	—	—	—	—
	8	6.7( 3)	5.6( 1)	7.4( 2)	—	—	—	—
	9	2.2( 1)	5.6( 1)	0.0( 0)	—	—	—	—
	10	4.4( 2)	5.6( 1)	3.7( 1)	—	—	—	—
	11	2.2( 1)	0.0( 0)	3.7( 1)	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	
40～49歳	総数(実数)	100.0( 18)	100.0( 3)	100.0( 13)	100.0( 2)	—	—	—
	0点	11.1( 2)	33.3( 1)	7.7( 1)	0.0( 0)	—	—	—
	1	5.6( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	50.0( 1)	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—
	3	11.1( 2)	0.0( 0)	15.4( 2)	0.0( 0)	—	—	—
	4	5.6( 1)	0.0( 0)	7.7( 1)	0.0( 0)	—	—	—
	5	27.8( 5)	33.3( 1)	30.8( 4)	0.0( 0)	—	—	—
	6	11.1( 2)	0.0( 0)	15.4( 2)	0.0( 0)	—	—	—
	7	11.1( 2)	33.3( 1)	7.7( 1)	0.0( 0)	—	—	—
	8	16.7( 3)	0.0( 0)	15.4( 2)	50.0( 1)	—	—	—
	9	—	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—
	11	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	習 慣 的 喫 煙 開 始 年 齢					
			19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳
50～59歳	総数(実数)	100.0( 35)	100.0( 6)	100.0( 24)	100.0( 3)	—	100.0( 2)	—
	0点	2.9( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	33.3( 1)	—	0.0( 0)	—
	1	8.6( 3)	0.0( 0)	8.3( 2)	33.3( 1)	—	0.0( 0)	—
	2	8.6( 3)	0.0( 0)	8.3( 2)	0.0( 0)	—	50.0( 1)	—
	3	17.1( 6)	0.0( 0)	25.0( 6)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—
	4	8.6( 3)	33.3( 2)	4.2( 1)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—
	5	14.3( 5)	16.7( 1)	12.5( 3)	0.0( 0)	—	50.0( 1)	—
	6	5.7( 2)	0.0( 0)	4.2( 1)	33.3( 1)	—	0.0( 0)	—
	7	8.6( 3)	0.0( 0)	12.5( 3)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—
	8	5.7( 2)	0.0( 0)	8.3( 2)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—
	9	8.6( 3)	16.7( 1)	8.3( 2)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—
	10	5.7( 2)	16.7( 1)	4.2( 1)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—
	11	2.9( 1)	0.0( 0)	4.2( 1)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—
	12	2.9( 1)	16.7( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	—
60～69歳	総数(実数)	100.0( 12)	—	100.0( 4)	100.0( 4)	100.0( 4)	—	—
	0点	8.3( 1)	—	25.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	—
	1	16.7( 2)	—	0.0( 0)	50.0( 2)	0.0( 0)	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—
	4	33.3( 4)	—	75.0( 3)	0.0( 0)	25.0( 1)	—	—
	5	25.0( 3)	—	0.0( 0)	25.0( 1)	50.0( 2)	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	—
	8	8.3( 1)	—	0.0( 0)	25.0( 1)	0.0( 0)	—	—
	9	8.3( 1)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	25.0( 1)	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—
	11	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—
70歳以上	総数(実数)	100.0( 24)	100.0( 1)	100.0( 12)	100.0( 4)	100.0( 6)	—	100.0( 1)
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	4.2( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	25.0( 1)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	2	4.2( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	100.0( 1)
	3	16.7( 4)	100.0( 1)	0.0( 0)	25.0( 1)	33.3( 2)	—	0.0( 0)
	4	12.5( 3)	0.0( 0)	25.0( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	5	20.8( 5)	0.0( 0)	33.3( 4)	25.0( 1)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	6	—	—	—	—	—	—	—
	7	4.2( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	16.7( 1)	—	0.0( 0)
	8	—	—	—	—	—	—	—
	9	20.8( 5)	0.0( 0)	25.0( 3)	0.0( 0)	33.3( 2)	—	0.0( 0)
	10	8.3( 2)	0.0( 0)	8.3( 1)	0.0( 0)	16.7( 1)	—	0.0( 0)
	11	4.2( 1)	0.0( 0)	8.3( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—	0.0( 0)
	12	4.2( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	25.0( 1)	0.0( 0)	—	0.0( 0)

◆第95表の1◆ 初回喫煙年齢別、ニコチン依存度[現在習慣的に喫煙している者] (男, 年齢階級別)

(%)

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	初 回 喫 煙 年 齢					
			11歳以下	12～14歳	15～17歳	18～19歳	20～29歳	30歳以上
総 数	総数(実数)	100.0(1,959)	100.0( 33)	100.0( 124)	100.0( 412)	100.0( 520)	100.0( 843)	100.0( 27)
	0点	0.2( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.4( 3)	0.0( 0)
	1	0.9( 18)	0.0( 0)	1.6( 2)	0.7( 3)	0.8( 4)	1.1( 9)	0.0( 0)
	2	1.4( 27)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.2( 5)	1.9( 10)	1.3( 11)	3.7( 1)
	3	2.3( 45)	0.0( 0)	0.8( 1)	1.5( 6)	2.5( 13)	2.8( 24)	3.7( 1)
	4	3.3( 65)	3.0( 1)	0.8( 1)	2.7( 11)	3.8( 20)	3.8( 32)	0.0( 0)
	5	6.4( 125)	6.1( 2)	7.3( 9)	5.3( 22)	4.4( 23)	7.9( 67)	7.4( 2)
	6	8.7( 170)	12.1( 4)	5.6( 7)	7.5( 31)	9.2( 48)	9.3( 78)	7.4( 2)
	7	12.6( 247)	21.2( 7)	12.9( 16)	12.1( 50)	12.1( 63)	12.3( 104)	25.9( 7)
	8	15.4( 301)	12.1( 4)	14.5( 18)	14.6( 60)	14.0( 73)	16.6( 140)	22.2( 6)
	9	16.0( 313)	9.1( 3)	16.1( 20)	16.3( 67)	14.8( 77)	16.7( 141)	18.5( 5)
	10	17.2( 337)	6.1( 2)	20.2( 25)	18.2( 75)	17.9( 93)	16.7( 141)	3.7( 1)
	11	9.9( 194)	21.2( 7)	9.7( 12)	12.9( 53)	10.2( 53)	7.9( 67)	7.4( 2)
12	5.8( 114)	9.1( 3)	10.5( 13)	7.0( 29)	8.3( 43)	3.1( 26)	0.0( 0)	
20～29歳	総数(実数)	100.0( 291)	100.0( 7)	100.0( 40)	100.0( 95)	100.0( 53)	100.0( 96)	—
	0点	0.3( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.0( 1)	—
	1	1.7( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.1( 1)	1.9( 1)	3.1( 3)	—
	2	1.7( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.1( 1)	1.9( 1)	3.1( 3)	—
	3	3.1( 9)	0.0( 0)	2.5( 1)	2.1( 2)	3.8( 2)	4.2( 4)	—
	4	3.8( 11)	14.3( 1)	0.0( 0)	2.1( 2)	3.8( 2)	6.3( 6)	—
	5	6.9( 20)	0.0( 0)	7.5( 3)	3.2( 3)	3.8( 2)	12.5( 12)	—
	6	11.0( 32)	14.3( 1)	5.0( 2)	11.6( 11)	13.2( 7)	11.5( 11)	—
	7	19.9( 58)	28.6( 2)	17.5( 7)	20.0( 19)	26.4( 14)	16.7( 16)	—
	8	16.5( 48)	14.3( 1)	22.5( 9)	18.9( 18)	15.1( 8)	12.5( 12)	—
	9	13.4( 39)	14.3( 1)	12.5( 5)	13.7( 13)	15.1( 8)	12.5( 12)	—
	10	13.4( 39)	0.0( 0)	22.5( 9)	16.8( 16)	5.7( 3)	11.5( 11)	—
	11	6.5( 19)	14.3( 1)	5.0( 2)	7.4( 7)	9.4( 5)	4.2( 4)	—
12	1.7( 5)	0.0( 0)	5.0( 2)	2.1( 2)	0.0( 0)	1.0( 1)	—	
30～39歳	総数(実数)	100.0( 391)	100.0( 17)	100.0( 58)	100.0( 101)	100.0( 87)	100.0( 127)	100.0( 1)
	0点	0.3( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.8( 1)	0.0( 0)
	1	1.8( 7)	0.0( 0)	1.7( 1)	2.0( 2)	1.1( 1)	2.4( 3)	0.0( 0)
	2	1.8( 7)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.0( 1)	2.3( 2)	3.1( 4)	0.0( 0)
	3	2.3( 9)	0.0( 0)	0.0( 0)	2.0( 2)	2.3( 2)	3.9( 5)	0.0( 0)
	4	3.6( 14)	0.0( 0)	1.7( 1)	1.0( 1)	10.3( 9)	2.4( 3)	0.0( 0)
	5	7.7( 30)	11.8( 2)	8.6( 5)	4.0( 4)	4.6( 4)	11.8( 15)	0.0( 0)
	6	9.5( 37)	17.6( 3)	8.6( 5)	5.9( 6)	10.3( 9)	10.2( 13)	100.0( 1)
	7	10.7( 42)	17.6( 3)	12.1( 7)	6.9( 7)	12.6( 11)	11.0( 14)	0.0( 0)
	8	15.1( 59)	17.6( 3)	12.1( 7)	15.8( 16)	13.8( 12)	16.5( 21)	0.0( 0)
	9	16.1( 63)	0.0( 0)	17.2( 10)	21.8( 22)	14.9( 13)	14.2( 18)	0.0( 0)
	10	15.3( 60)	5.9( 1)	13.8( 8)	21.8( 22)	16.1( 14)	11.8( 15)	0.0( 0)
	11	10.7( 42)	17.6( 3)	17.2( 10)	14.9( 15)	4.6( 4)	7.9( 10)	0.0( 0)
12	5.1( 20)	11.8( 2)	6.9( 4)	3.0( 3)	6.9( 6)	3.9( 5)	0.0( 0)	
40～49歳	総数(実数)	100.0( 361)	100.0( 5)	100.0( 11)	100.0( 96)	100.0( 119)	100.0( 128)	100.0( 2)
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	0.8( 3)	0.0( 0)	9.1( 1)	0.0( 0)	0.8( 1)	0.8( 1)	0.0( 0)
	2	1.1( 4)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	3.4( 4)	0.0( 0)	0.0( 0)
	3	1.4( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	2.5( 3)	1.6( 2)	0.0( 0)
	4	3.9( 14)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.2( 4)	1.7( 2)	6.3( 8)	0.0( 0)
	5	6.6( 24)	0.0( 0)	0.0( 0)	5.2( 5)	7.6( 9)	7.8( 10)	0.0( 0)
	6	8.3( 30)	0.0( 0)	0.0( 0)	10.4( 10)	10.9( 13)	5.5( 7)	0.0( 0)
	7	8.9( 32)	20.0( 1)	0.0( 0)	6.3( 6)	7.6( 9)	11.7( 15)	50.0( 1)
	8	11.6( 42)	0.0( 0)	9.1( 1)	12.5( 12)	11.8( 14)	10.9( 14)	50.0( 1)
	9	15.5( 56)	20.0( 1)	27.3( 3)	14.6( 14)	15.1( 18)	15.6( 20)	0.0( 0)
	10	20.8( 75)	0.0( 0)	27.3( 3)	19.8( 19)	18.5( 22)	24.2( 31)	0.0( 0)
	11	11.9( 43)	40.0( 2)	0.0( 0)	11.5( 11)	12.6( 15)	11.7( 15)	0.0( 0)
12	9.1( 33)	20.0( 1)	27.3( 3)	15.6( 15)	7.6( 9)	3.9( 5)	0.0( 0)	

第4部 生活習慣調査の結果

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	初 回 喫 煙 年 齢					
			11歳以下	12～14歳	15～17歳	18～19歳	20～29歳	30歳以上
50～59歳	総数(実数)	100.0( 448)	100.0( 3)	100.0( 10)	100.0( 71)	100.0( 164)	100.0( 195)	100.0( 5)
	0点	0.2( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.5( 1)	0.0( 0)
	1	0.4( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.6( 1)	0.5( 1)	0.0( 0)
	2	1.1( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	2.8( 2)	1.8( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)
	3	2.2( 10)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.4( 1)	2.4( 4)	2.1( 4)	20.0( 1)
	4	1.8( 8)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.2( 3)	1.2( 2)	1.5( 3)	0.0( 0)
	5	5.4( 24)	0.0( 0)	10.0( 1)	7.0( 5)	3.7( 6)	6.2( 12)	0.0( 0)
	6	6.9( 31)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.2( 3)	5.5( 9)	9.2( 18)	20.0( 1)
	7	11.8( 53)	33.3( 1)	10.0( 1)	15.5( 11)	11.0( 18)	11.3( 22)	0.0( 0)
	8	13.6( 61)	0.0( 0)	0.0( 0)	8.5( 6)	13.4( 22)	16.4( 32)	20.0( 1)
	9	15.0( 67)	33.3( 1)	10.0( 1)	15.5( 11)	12.2( 20)	16.9( 33)	20.0( 1)
	10	19.9( 89)	0.0( 0)	50.0( 5)	14.1( 10)	22.0( 36)	19.5( 38)	0.0( 0)
	11	13.2( 59)	33.3( 1)	0.0( 0)	18.3( 13)	13.4( 22)	11.3( 22)	20.0( 1)
	12	8.5( 38)	0.0( 0)	20.0( 2)	8.5( 6)	12.8( 21)	4.6( 9)	0.0( 0)
60～69歳	総数(実数)	100.0( 269)	100.0( 1)	100.0( 4)	100.0( 22)	100.0( 62)	100.0( 173)	100.0( 7)
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—
	2	1.1( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.7( 3)	0.0( 0)
	3	2.2( 6)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.6( 1)	2.9( 5)	0.0( 0)
	4	2.2( 6)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.6( 1)	2.9( 5)	0.0( 0)
	5	3.3( 9)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.6( 1)	4.6( 8)	0.0( 0)
	6	7.8( 21)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.5( 1)	8.1( 5)	8.7( 15)	0.0( 0)
	7	10.4( 28)	0.0( 0)	0.0( 0)	18.2( 4)	6.5( 4)	10.4( 18)	28.6( 2)
	8	23.0( 62)	0.0( 0)	25.0( 1)	18.2( 4)	17.7( 11)	24.9( 43)	42.9( 3)
	9	20.8( 56)	0.0( 0)	25.0( 1)	9.1( 2)	22.6( 14)	22.0( 38)	14.3( 1)
	10	15.6( 42)	100.0( 1)	0.0( 0)	27.3( 6)	21.0( 13)	12.7( 22)	0.0( 0)
	11	8.6( 23)	0.0( 0)	0.0( 0)	18.2( 4)	11.3( 7)	6.4( 11)	14.3( 1)
	12	4.8( 13)	0.0( 0)	50.0( 2)	4.5( 1)	8.1( 5)	2.9( 5)	0.0( 0)
70歳以上	総数(実数)	100.0( 199)	—	100.0( 1)	100.0( 27)	100.0( 35)	100.0( 124)	100.0( 12)
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	0.5( 1)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.8( 1)	0.0( 0)
	2	1.5( 3)	—	0.0( 0)	3.7( 1)	0.0( 0)	0.8( 1)	8.3( 1)
	3	3.0( 6)	—	0.0( 0)	3.7( 1)	2.9( 1)	3.2( 4)	0.0( 0)
	4	6.0( 12)	—	0.0( 0)	3.7( 1)	11.4( 4)	5.6( 7)	0.0( 0)
	5	9.0( 18)	—	0.0( 0)	18.5( 5)	2.9( 1)	8.1( 10)	16.7( 2)
	6	9.5( 19)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	14.3( 5)	11.3( 14)	0.0( 0)
	7	17.1( 34)	—	100.0( 1)	11.1( 3)	20.0( 7)	15.3( 19)	33.3( 4)
	8	14.6( 29)	—	0.0( 0)	14.8( 4)	17.1( 6)	14.5( 18)	8.3( 1)
	9	16.1( 32)	—	0.0( 0)	18.5( 5)	11.4( 4)	16.1( 20)	25.0( 3)
	10	16.1( 32)	—	0.0( 0)	7.4( 2)	14.3( 5)	19.4( 24)	8.3( 1)
	11	4.0( 8)	—	0.0( 0)	11.1( 3)	0.0( 0)	4.0( 5)	0.0( 0)
	12	2.5( 5)	—	0.0( 0)	7.4( 2)	5.7( 2)	0.8( 1)	0.0( 0)

◆第95表の1◆ 初回喫煙年齢別、ニコチン依存度[現在習慣的に喫煙している者] (女, 年齢階級別)

(%)

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	初 回 喫 煙 年 齢					
			11歳以下	12～14歳	15～17歳	18～19歳	20～29歳	30歳以上
総 数	総数(実数)	100.0( 550)	100.0( 8)	100.0( 26)	100.0( 84)	100.0( 93)	100.0( 264)	100.0( 75)
	0点	0.2( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.4( 1)	0.0( 0)
	1	1.5( 8)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.2( 1)	1.1( 1)	1.1( 3)	4.0( 3)
	2	2.9( 16)	0.0( 0)	7.7( 2)	3.6( 3)	2.2( 2)	3.0( 8)	1.3( 1)
	3	5.3( 29)	12.5( 1)	0.0( 0)	4.8( 4)	6.5( 6)	5.7( 15)	4.0( 3)
	4	8.4( 46)	12.5( 1)	15.4( 4)	7.1( 6)	6.5( 6)	6.8( 18)	14.7( 11)
	5	10.5( 58)	0.0( 0)	0.0( 0)	7.1( 6)	12.9( 12)	10.6( 28)	16.0( 12)
	6	11.5( 63)	12.5( 1)	7.7( 2)	10.7( 9)	5.4( 5)	14.0( 37)	12.0( 9)
	7	14.2( 78)	12.5( 1)	15.4( 4)	16.7( 14)	10.8( 10)	14.4( 38)	14.7( 11)
	8	14.5( 80)	0.0( 0)	26.9( 7)	11.9( 10)	12.9( 12)	16.3( 43)	10.7( 8)
	9	13.5( 74)	25.0( 2)	15.4( 4)	10.7( 9)	22.6( 21)	11.7( 31)	9.3( 7)
	10	11.8( 65)	12.5( 1)	0.0( 0)	11.9( 10)	14.0( 13)	12.1( 32)	12.0( 9)
	11	4.0( 22)	12.5( 1)	11.5( 3)	9.5( 8)	2.2( 2)	3.0( 8)	0.0( 0)
12	1.8( 10)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.8( 4)	3.2( 3)	0.8( 2)	1.3( 1)	
20～29歳	総数(実数)	100.0( 108)	100.0( 3)	100.0( 7)	100.0( 30)	100.0( 18)	100.0( 50)	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	3.7( 4)	0.0( 0)	0.0( 0)	3.3( 1)	5.6( 1)	4.0( 2)	—
	2	4.6( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	6.7( 2)	5.6( 1)	4.0( 2)	—
	3	6.5( 7)	33.3( 1)	0.0( 0)	3.3( 1)	11.1( 2)	6.0( 3)	—
	4	9.3( 10)	33.3( 1)	28.6( 2)	6.7( 2)	11.1( 2)	6.0( 3)	—
	5	9.3( 10)	0.0( 0)	0.0( 0)	10.0( 3)	16.7( 3)	8.0( 4)	—
	6	13.0( 14)	33.3( 1)	0.0( 0)	6.7( 2)	11.1( 2)	18.0( 9)	—
	7	17.6( 19)	0.0( 0)	0.0( 0)	23.3( 7)	16.7( 3)	18.0( 9)	—
	8	10.2( 11)	0.0( 0)	28.6( 2)	10.0( 3)	0.0( 0)	12.0( 6)	—
	9	10.2( 11)	0.0( 0)	42.9( 3)	6.7( 2)	11.1( 2)	8.0( 4)	—
	10	11.1( 12)	0.0( 0)	0.0( 0)	20.0( 6)	11.1( 2)	8.0( 4)	—
	11	3.7( 4)	0.0( 0)	0.0( 0)	3.3( 1)	0.0( 0)	6.0( 3)	—
12	0.9( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	2.0( 1)	—	
30～39歳	総数(実数)	100.0( 132)	100.0( 1)	100.0( 19)	100.0( 25)	100.0( 19)	100.0( 68)	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	0.8( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	1.5( 1)	—
	2	3.8( 5)	0.0( 0)	10.5( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.4( 3)	—
	3	6.1( 8)	0.0( 0)	0.0( 0)	8.0( 2)	0.0( 0)	8.8( 6)	—
	4	6.8( 9)	0.0( 0)	10.5( 2)	12.0( 3)	5.3( 1)	4.4( 3)	—
	5	9.1( 12)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.0( 1)	10.5( 2)	13.2( 9)	—
	6	11.4( 15)	0.0( 0)	10.5( 2)	8.0( 2)	5.3( 1)	14.7( 10)	—
	7	15.2( 20)	100.0( 1)	21.1( 4)	16.0( 4)	15.8( 3)	11.8( 8)	—
	8	16.7( 22)	0.0( 0)	26.3( 5)	16.0( 4)	21.1( 4)	13.2( 9)	—
	9	12.1( 16)	0.0( 0)	5.3( 1)	12.0( 3)	26.3( 5)	10.3( 7)	—
	10	9.1( 12)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.0( 1)	5.3( 1)	14.7( 10)	—
	11	7.6( 10)	0.0( 0)	15.8( 3)	20.0( 5)	5.3( 1)	1.5( 1)	—
12	1.5( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	5.3( 1)	1.5( 1)	—	
40～49歳	総数(実数)	100.0( 110)	100.0( 2)	—	100.0( 18)	100.0( 32)	100.0( 53)	100.0( 5)
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—
	2	2.7( 3)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	3.1( 1)	3.8( 2)	0.0( 0)
	3	6.4( 7)	0.0( 0)	—	5.6( 1)	6.3( 2)	5.7( 3)	20.0( 1)
	4	8.2( 9)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	9.4( 3)	9.4( 5)	20.0( 1)
	5	10.0( 11)	0.0( 0)	—	11.1( 2)	18.8( 6)	5.7( 3)	0.0( 0)
	6	11.8( 13)	0.0( 0)	—	16.7( 3)	3.1( 1)	15.1( 8)	20.0( 1)
	7	4.5( 5)	0.0( 0)	—	5.6( 1)	3.1( 1)	5.7( 3)	0.0( 0)
	8	20.0( 22)	0.0( 0)	—	16.7( 3)	15.6( 5)	24.5( 13)	20.0( 1)
	9	17.3( 19)	50.0( 1)	—	11.1( 2)	25.0( 8)	13.2( 7)	20.0( 1)
	10	11.8( 13)	50.0( 1)	—	11.1( 2)	9.4( 3)	13.2( 7)	0.0( 0)
	11	3.6( 4)	0.0( 0)	—	5.6( 1)	3.1( 1)	3.8( 2)	0.0( 0)
12	3.6( 4)	0.0( 0)	—	16.7( 3)	3.1( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	

第4部 生活習慣調査の結果

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	初 回 喫 煙 年 齢					
			11歳以下	12～14歳	15～17歳	18～19歳	20～29歳	30歳以上
50～59歳	総数(実数)	100.0( 101)	100.0( 2)	—	100.0( 10)	100.0( 20)	100.0( 50)	100.0( 19)
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—
	2	1.0( 1)	0.0( 0)	—	10.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)
	3	4.0( 4)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	10.0( 2)	2.0( 1)	5.3( 1)
	4	5.9( 6)	0.0( 0)	—	10.0( 1)	0.0( 0)	8.0( 4)	5.3( 1)
	5	13.9( 14)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	5.0( 1)	12.0( 6)	36.8( 7)
	6	7.9( 8)	0.0( 0)	—	10.0( 1)	5.0( 1)	6.0( 3)	15.8( 3)
	7	14.9( 15)	0.0( 0)	—	20.0( 2)	5.0( 1)	20.0( 10)	10.5( 2)
	8	13.9( 14)	0.0( 0)	—	0.0( 0)	15.0( 3)	18.0( 9)	10.5( 2)
	9	18.8( 19)	50.0( 1)	—	20.0( 2)	25.0( 5)	18.0( 9)	10.5( 2)
	10	13.9( 14)	0.0( 0)	—	10.0( 1)	35.0( 7)	12.0( 6)	0.0( 0)
	11	4.0( 4)	50.0( 1)	—	10.0( 1)	0.0( 0)	4.0( 2)	0.0( 0)
	12	2.0( 2)	0.0( 0)	—	10.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	5.3( 1)
60～69歳	総数(実数)	100.0( 56)	—	—	100.0( 1)	100.0( 2)	100.0( 31)	100.0( 22)
	0点	1.8( 1)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	3.2( 1)	0.0( 0)
	1	3.6( 2)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	9.1( 2)
	2	1.8( 1)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	3.2( 1)	0.0( 0)
	3	1.8( 1)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	3.2( 1)	0.0( 0)
	4	8.9( 5)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	3.2( 1)	18.2( 4)
	5	8.9( 5)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	16.1( 5)	0.0( 0)
	6	16.1( 9)	—	—	100.0( 1)	0.0( 0)	19.4( 6)	9.1( 2)
	7	17.9( 10)	—	—	0.0( 0)	50.0( 1)	9.7( 3)	27.3( 6)
	8	14.3( 8)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	19.4( 6)	9.1( 2)
	9	12.5( 7)	—	—	0.0( 0)	50.0( 1)	12.9( 4)	9.1( 2)
	10	12.5( 7)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	9.7( 3)	18.2( 4)
	11	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—
70歳以上	総数(実数)	100.0( 43)	—	—	—	100.0( 2)	100.0( 12)	100.0( 29)
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	2.3( 1)	—	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	3.4( 1)
	2	2.3( 1)	—	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	3.4( 1)
	3	4.7( 2)	—	—	—	0.0( 0)	8.3( 1)	3.4( 1)
	4	16.3( 7)	—	—	—	0.0( 0)	16.7( 2)	17.2( 5)
	5	14.0( 6)	—	—	—	0.0( 0)	8.3( 1)	17.2( 5)
	6	9.3( 4)	—	—	—	0.0( 0)	8.3( 1)	10.3( 3)
	7	20.9( 9)	—	—	—	50.0( 1)	41.7( 5)	10.3( 3)
	8	7.0( 3)	—	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	10.3( 3)
	9	4.7( 2)	—	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	6.9( 2)
	10	16.3( 7)	—	—	—	0.0( 0)	16.7( 2)	17.2( 5)
	11	—	—	—	—	—	—	—
	12	2.3( 1)	—	—	—	50.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)



◆第95表の2◆ 初回喫煙年齢別、ニコチン依存度[過去習慣的に喫煙していた者] (男, 年齢階級別) (%)

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	初 回 喫 煙 年 齢					
			11歳以下	12～14歳	15～17歳	18～19歳	20～29歳	30歳以上
総 数	総数(実数)	100.0( 874)	100.0( 3)	100.0( 32)	100.0( 142)	100.0( 272)	100.0( 409)	100.0( 16)
	0 点	5.5( 48)	0.0( 0)	6.3( 2)	2.1( 3)	6.3( 17)	6.1( 25)	6.3( 1)
	1	2.5( 22)	66.7( 2)	0.0( 0)	2.8( 4)	1.8( 5)	2.2( 9)	12.5( 2)
	2	4.8( 42)	0.0( 0)	9.4( 3)	2.8( 4)	2.9( 8)	5.9( 24)	18.8( 3)
	3	4.1( 36)	33.3( 1)	6.3( 2)	1.4( 2)	4.4( 12)	4.6( 19)	0.0( 0)
	4	6.1( 53)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.9( 7)	6.3( 17)	6.6( 27)	12.5( 2)
	5	8.0( 70)	0.0( 0)	6.3( 2)	11.3( 16)	8.1( 22)	6.8( 28)	12.5( 2)
	6	10.0( 87)	0.0( 0)	12.5( 4)	6.3( 9)	10.3( 28)	11.0( 45)	6.3( 1)
	7	12.0( 105)	0.0( 0)	9.4( 3)	12.0( 17)	12.1( 33)	12.2( 50)	12.5( 2)
	8	13.0( 114)	0.0( 0)	18.8( 6)	16.9( 24)	12.5( 34)	12.0( 49)	6.3( 1)
	9	11.7( 102)	0.0( 0)	0.0( 0)	10.6( 15)	12.1( 33)	13.2( 54)	0.0( 0)
	10	9.7( 85)	0.0( 0)	12.5( 4)	14.8( 21)	9.2( 25)	8.3( 34)	6.3( 1)
	11	6.9( 60)	0.0( 0)	9.4( 3)	4.9( 7)	8.5( 23)	6.4( 26)	6.3( 1)
	12	5.7( 50)	0.0( 0)	9.4( 3)	9.2( 13)	5.5( 15)	4.6( 19)	0.0( 0)
20～29歳	総数(実数)	100.0( 16)	100.0( 1)	100.0( 1)	100.0( 3)	100.0( 6)	100.0( 5)	—
	0 点	—	—	—	—	—	—	—
	1	6.3( 1)	100.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	2	6.3( 1)	0.0( 0)	100.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	3	12.5( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	40.0( 2)	—
	4	—	—	—	—	—	—	—
	5	12.5( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	33.3( 1)	0.0( 0)	20.0( 1)	—
	6	18.8( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	50.0( 3)	0.0( 0)	—
	7	12.5( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	16.7( 1)	20.0( 1)	—
	8	18.8( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	33.3( 1)	33.3( 2)	0.0( 0)	—
	9	6.3( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	33.3( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	10	6.3( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	20.0( 1)	—
	11	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—
30～39歳	総数(実数)	100.0( 78)	100.0( 1)	100.0( 6)	100.0( 26)	100.0( 21)	100.0( 24)	—
	0 点	5.1( 4)	0.0( 0)	16.7( 1)	3.8( 1)	4.8( 1)	4.2( 1)	—
	1	1.3( 1)	100.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	2	2.6( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	3.8( 1)	0.0( 0)	4.2( 1)	—
	3	6.4( 5)	0.0( 0)	16.7( 1)	0.0( 0)	9.5( 2)	8.3( 2)	—
	4	9.0( 7)	0.0( 0)	0.0( 0)	7.7( 2)	14.3( 3)	8.3( 2)	—
	5	9.0( 7)	0.0( 0)	0.0( 0)	7.7( 2)	9.5( 2)	12.5( 3)	—
	6	6.4( 5)	0.0( 0)	0.0( 0)	3.8( 1)	4.8( 1)	12.5( 3)	—
	7	26.9( 21)	0.0( 0)	33.3( 2)	26.9( 7)	23.8( 5)	29.2( 7)	—
	8	11.5( 9)	0.0( 0)	16.7( 1)	15.4( 4)	19.0( 4)	0.0( 0)	—
	9	11.5( 9)	0.0( 0)	0.0( 0)	7.7( 2)	14.3( 3)	16.7( 4)	—
	10	9.0( 7)	0.0( 0)	16.7( 1)	23.1( 6)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	11	1.3( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.2( 1)	—
	12	—	—	—	—	—	—	—
40～49歳	総数(実数)	100.0( 107)	—	100.0( 6)	100.0( 24)	100.0( 39)	100.0( 37)	100.0( 1)
	0 点	3.7( 4)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	5.1( 2)	5.4( 2)	0.0( 0)
	1	3.7( 4)	—	0.0( 0)	8.3( 2)	5.1( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)
	2	6.5( 7)	—	16.7( 1)	4.2( 1)	0.0( 0)	10.8( 4)	100.0( 1)
	3	9.3( 10)	—	0.0( 0)	4.2( 1)	15.4( 6)	8.1( 3)	0.0( 0)
	4	3.7( 4)	—	0.0( 0)	4.2( 1)	2.6( 1)	5.4( 2)	0.0( 0)
	5	8.4( 9)	—	0.0( 0)	8.3( 2)	7.7( 3)	10.8( 4)	0.0( 0)
	6	10.3( 11)	—	0.0( 0)	4.2( 1)	15.4( 6)	10.8( 4)	0.0( 0)
	7	11.2( 12)	—	16.7( 1)	12.5( 3)	12.8( 5)	8.1( 3)	0.0( 0)
	8	16.8( 18)	—	33.3( 2)	20.8( 5)	12.8( 5)	16.2( 6)	0.0( 0)
	9	9.3( 10)	—	0.0( 0)	12.5( 3)	5.1( 2)	13.5( 5)	0.0( 0)
	10	4.7( 5)	—	0.0( 0)	12.5( 3)	2.6( 1)	2.7( 1)	0.0( 0)
	11	8.4( 9)	—	16.7( 1)	4.2( 1)	10.3( 4)	8.1( 3)	0.0( 0)
	12	3.7( 4)	—	16.7( 1)	4.2( 1)	5.1( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)

第4部 生活習慣調査の結果

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	初 回 喫 煙 年 齢					
			11歳以下	12～14歳	15～17歳	18～19歳	20～29歳	30歳以上
50～59歳	総数(実数)	100.0( 180)	—	100.0( 13)	100.0( 32)	100.0( 66)	100.0( 68)	100.0( 1)
	0点	3.3( 6)	—	0.0( 0)	3.1( 1)	4.5( 3)	2.9( 2)	0.0( 0)
	1	2.2( 4)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	5.9( 4)	0.0( 0)
	2	5.0( 9)	—	0.0( 0)	3.1( 1)	1.5( 1)	8.8( 6)	100.0( 1)
	3	2.2( 4)	—	7.7( 1)	0.0( 0)	1.5( 1)	2.9( 2)	0.0( 0)
	4	6.7( 12)	—	0.0( 0)	3.1( 1)	9.1( 6)	7.4( 5)	0.0( 0)
	5	8.3( 15)	—	15.4( 2)	15.6( 5)	9.1( 6)	2.9( 2)	0.0( 0)
	6	12.8( 23)	—	23.1( 3)	12.5( 4)	9.1( 6)	14.7( 10)	0.0( 0)
	7	8.9( 16)	—	0.0( 0)	15.6( 5)	7.6( 5)	8.8( 6)	0.0( 0)
	8	10.0( 18)	—	15.4( 2)	9.4( 3)	10.6( 7)	8.8( 6)	0.0( 0)
	9	12.2( 22)	—	0.0( 0)	12.5( 4)	13.6( 9)	13.2( 9)	0.0( 0)
	10	8.9( 16)	—	15.4( 2)	3.1( 1)	12.1( 8)	7.4( 5)	0.0( 0)
	11	10.0( 18)	—	15.4( 2)	6.3( 2)	15.2( 10)	5.9( 4)	0.0( 0)
12	9.4( 17)	—	7.7( 1)	15.6( 5)	6.1( 4)	10.3( 7)	0.0( 0)	
60～69歳	総数(実数)	100.0( 218)	100.0( 1)	100.0( 4)	100.0( 27)	100.0( 75)	100.0( 107)	100.0( 4)
	0点	6.4( 14)	0.0( 0)	25.0( 1)	0.0( 0)	8.0( 6)	5.6( 6)	25.0( 1)
	1	3.2( 7)	0.0( 0)	0.0( 0)	3.7( 1)	2.7( 2)	1.9( 2)	50.0( 2)
	2	6.0( 13)	0.0( 0)	25.0( 1)	3.7( 1)	5.3( 4)	6.5( 7)	0.0( 0)
	3	2.8( 6)	100.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	2.7( 2)	2.8( 3)	0.0( 0)
	4	8.3( 18)	0.0( 0)	0.0( 0)	11.1( 3)	6.7( 5)	9.3( 10)	0.0( 0)
	5	6.0( 13)	0.0( 0)	0.0( 0)	11.1( 3)	6.7( 5)	3.7( 4)	25.0( 1)
	6	7.8( 17)	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	8.0( 6)	10.3( 11)	0.0( 0)
	7	8.7( 19)	0.0( 0)	0.0( 0)	7.4( 2)	12.0( 9)	7.5( 8)	0.0( 0)
	8	15.6( 34)	0.0( 0)	25.0( 1)	29.6( 8)	13.3( 10)	14.0( 15)	0.0( 0)
	9	12.8( 28)	0.0( 0)	0.0( 0)	7.4( 2)	13.3( 10)	15.0( 16)	0.0( 0)
	10	11.5( 25)	0.0( 0)	25.0( 1)	11.1( 3)	13.3( 10)	10.3( 11)	0.0( 0)
	11	6.9( 15)	0.0( 0)	0.0( 0)	11.1( 3)	4.0( 3)	8.4( 9)	0.0( 0)
12	4.1( 9)	0.0( 0)	0.0( 0)	3.7( 1)	4.0( 3)	4.7( 5)	0.0( 0)	
70歳以上	総数(実数)	100.0( 275)	—	100.0( 2)	100.0( 30)	100.0( 65)	100.0( 168)	100.0( 10)
	0点	7.3( 20)	—	0.0( 0)	3.3( 1)	7.7( 5)	8.3( 14)	0.0( 0)
	1	1.8( 5)	—	0.0( 0)	3.3( 1)	1.5( 1)	1.8( 3)	0.0( 0)
	2	3.6( 10)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	4.6( 3)	3.6( 6)	10.0( 1)
	3	3.3( 9)	—	0.0( 0)	3.3( 1)	1.5( 1)	4.2( 7)	0.0( 0)
	4	4.4( 12)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	3.1( 2)	4.8( 8)	20.0( 2)
	5	8.7( 24)	—	0.0( 0)	10.0( 3)	9.2( 6)	8.3( 14)	10.0( 1)
	6	10.2( 28)	—	50.0( 1)	10.0( 3)	9.2( 6)	10.1( 17)	10.0( 1)
	7	12.7( 35)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	12.3( 8)	14.9( 25)	20.0( 2)
	8	11.6( 32)	—	0.0( 0)	10.0( 3)	9.2( 6)	13.1( 22)	10.0( 1)
	9	11.6( 32)	—	0.0( 0)	10.0( 3)	13.8( 9)	11.9( 20)	0.0( 0)
	10	11.3( 31)	—	0.0( 0)	26.7( 8)	9.2( 6)	9.5( 16)	10.0( 1)
	11	6.2( 17)	—	0.0( 0)	3.3( 1)	9.2( 6)	5.4( 9)	10.0( 1)
12	7.3( 20)	—	50.0( 1)	20.0( 6)	9.2( 6)	4.2( 7)	0.0( 0)	

◆第95表の2◆ 初回喫煙年齢別、ニコチン依存度[過去習慣的に喫煙していた者] (女, 年齢階級別) (%)

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	初 回 喫 煙 年 齢					
			11歳以下	12～14歳	15～17歳	18～19歳	20～29歳	30歳以上
総 数	総数(実数)	100.0( 177)	—	100.0( 3)	100.0( 29)	100.0( 34)	100.0( 88)	100.0( 23)
	0点	2.8( 5)	—	0.0( 0)	3.4( 1)	2.9( 1)	2.3( 2)	4.3( 1)
	1	7.3( 13)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	5.9( 2)	8.0( 7)	17.4( 4)
	2	10.7( 19)	—	0.0( 0)	13.8( 4)	11.8( 4)	10.2( 9)	8.7( 2)
	3	11.3( 20)	—	0.0( 0)	6.9( 2)	5.9( 2)	13.6( 12)	17.4( 4)
	4	9.6( 17)	—	0.0( 0)	6.9( 2)	8.8( 3)	12.5( 11)	4.3( 1)
	5	15.3( 27)	—	0.0( 0)	10.3( 3)	5.9( 2)	20.5( 18)	17.4( 4)
	6	10.2( 18)	—	0.0( 0)	17.2( 5)	17.6( 6)	8.0( 7)	0.0( 0)
	7	8.5( 15)	—	33.3( 1)	10.3( 3)	14.7( 5)	5.7( 5)	4.3( 1)
	8	7.9( 14)	—	0.0( 0)	17.2( 5)	8.8( 3)	5.7( 5)	4.3( 1)
	9	8.5( 15)	—	33.3( 1)	3.4( 1)	8.8( 3)	8.0( 7)	13.0( 3)
	10	4.5( 8)	—	0.0( 0)	10.3( 3)	5.9( 2)	2.3( 2)	4.3( 1)
	11	2.3( 4)	—	—	33.3( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	3.4( 3)
12	1.1( 2)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	2.9( 1)	0.0( 0)	4.3( 1)
20～29歳	総数(実数)	100.0( 29)	—	100.0( 1)	100.0( 11)	100.0( 7)	100.0( 10)	—
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	6.9( 2)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	14.3( 1)	10.0( 1)	—
	2	10.3( 3)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	28.6( 2)	10.0( 1)	—
	3	6.9( 2)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	14.3( 1)	10.0( 1)	—
	4	6.9( 2)	—	0.0( 0)	9.1( 1)	0.0( 0)	10.0( 1)	—
	5	20.7( 6)	—	0.0( 0)	18.2( 2)	0.0( 0)	40.0( 4)	—
	6	17.2( 5)	—	0.0( 0)	27.3( 3)	28.6( 2)	0.0( 0)	—
	7	3.4( 1)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	14.3( 1)	0.0( 0)	—
	8	10.3( 3)	—	0.0( 0)	27.3( 3)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	9	6.9( 2)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	20.0( 2)	—
	10	6.9( 2)	—	0.0( 0)	18.2( 2)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	11	3.4( 1)	—	—	100.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
12	—	—	—	—	—	—	—	
30～39歳	総数(実数)	100.0( 49)	—	100.0( 2)	100.0( 13)	100.0( 12)	100.0( 22)	—
	0点	2.0( 1)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.5( 1)	—
	1	6.1( 3)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	13.6( 3)	—
	2	22.4( 11)	—	0.0( 0)	30.8( 4)	16.7( 2)	22.7( 5)	—
	3	10.2( 5)	—	0.0( 0)	15.4( 2)	0.0( 0)	13.6( 3)	—
	4	6.1( 3)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	16.7( 2)	4.5( 1)	—
	5	4.1( 2)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	9.1( 2)	—
	6	16.3( 8)	—	0.0( 0)	15.4( 2)	33.3( 4)	9.1( 2)	—
	7	14.3( 7)	—	50.0( 1)	23.1( 3)	16.7( 2)	4.5( 1)	—
	8	8.2( 4)	—	0.0( 0)	7.7( 1)	8.3( 1)	9.1( 2)	—
	9	4.1( 2)	—	50.0( 1)	7.7( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)	—
	10	4.1( 2)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	8.3( 1)	4.5( 1)	—
	11	2.0( 1)	—	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	4.5( 1)	—
12	—	—	—	—	—	—	—	
40～49歳	総数(実数)	100.0( 23)	—	—	100.0( 3)	100.0( 4)	100.0( 15)	100.0( 1)
	0点	8.7( 2)	—	—	33.3( 1)	25.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
	1	4.3( 1)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	100.0( 1)
	2	4.3( 1)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	6.7( 1)	0.0( 0)
	3	8.7( 2)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	13.3( 2)	0.0( 0)
	4	8.7( 2)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	13.3( 2)	0.0( 0)
	5	26.1( 6)	—	—	33.3( 1)	25.0( 1)	26.7( 4)	0.0( 0)
	6	13.0( 3)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	20.0( 3)	0.0( 0)
	7	8.7( 2)	—	—	0.0( 0)	25.0( 1)	6.7( 1)	0.0( 0)
	8	17.4( 4)	—	—	33.3( 1)	25.0( 1)	13.3( 2)	0.0( 0)
	9	—	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—
	11	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	

第4部 生活習慣調査の結果

年 齢	ニコチン 依存度	総数(実数)	初 回 喫 煙 年 齢					
			11歳以下	12～14歳	15～17歳	18～19歳	20～29歳	30歳以上
50～59歳	総数(実数)	100.0( 40)	—	—	100.0( 2)	100.0( 9)	100.0( 24)	100.0( 5)
	0点	2.5( 1)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	0.0( 0)	20.0( 1)
	1	10.0( 4)	—	—	0.0( 0)	11.1( 1)	12.5( 3)	0.0( 0)
	2	7.5( 3)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	8.3( 2)	20.0( 1)
	3	17.5( 7)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	25.0( 6)	20.0( 1)
	4	7.5( 3)	—	—	50.0( 1)	11.1( 1)	4.2( 1)	0.0( 0)
	5	12.5( 5)	—	—	0.0( 0)	11.1( 1)	12.5( 3)	20.0( 1)
	6	5.0( 2)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	8.3( 2)	0.0( 0)
	7	10.0( 4)	—	—	0.0( 0)	11.1( 1)	12.5( 3)	0.0( 0)
	8	5.0( 2)	—	—	0.0( 0)	11.1( 1)	4.2( 1)	0.0( 0)
	9	12.5( 5)	—	—	0.0( 0)	22.2( 2)	8.3( 2)	20.0( 1)
	10	5.0( 2)	—	—	50.0( 1)	11.1( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
	11	2.5( 1)	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	4.2( 1)	0.0( 0)
	12	2.5( 1)	—	—	0.0( 0)	11.1( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
60～69歳	総数(実数)	100.0( 12)	—	—	—	100.0( 1)	100.0( 5)	100.0( 6)
	0点	8.3( 1)	—	—	—	0.0( 0)	20.0( 1)	0.0( 0)
	1	16.7( 2)	—	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	33.3( 2)
	2	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—
	4	33.3( 4)	—	—	—	0.0( 0)	60.0( 3)	16.7( 1)
	5	25.0( 3)	—	—	—	0.0( 0)	20.0( 1)	33.3( 2)
	6	—	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	—
	8	8.3( 1)	—	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	16.7( 1)
	9	8.3( 1)	—	—	—	100.0( 1)	0.0( 0)	0.0( 0)
	10	—	—	—	—	—	—	—
	11	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—
70歳以上	総数(実数)	100.0( 24)	—	—	—	100.0( 1)	100.0( 12)	100.0( 11)
	0点	—	—	—	—	—	—	—
	1	4.2( 1)	—	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	9.1( 1)
	2	4.2( 1)	—	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	9.1( 1)
	3	16.7( 4)	—	—	—	100.0( 1)	0.0( 0)	27.3( 3)
	4	12.5( 3)	—	—	—	0.0( 0)	25.0( 3)	0.0( 0)
	5	20.8( 5)	—	—	—	0.0( 0)	33.3( 4)	9.1( 1)
	6	—	—	—	—	—	—	—
	7	4.2( 1)	—	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	9.1( 1)
	8	—	—	—	—	—	—	—
	9	20.8( 5)	—	—	—	0.0( 0)	25.0( 3)	18.2( 2)
	10	8.3( 2)	—	—	—	0.0( 0)	8.3( 1)	9.1( 1)
	11	4.2( 1)	—	—	—	0.0( 0)	8.3( 1)	0.0( 0)
	12	4.2( 1)	—	—	—	0.0( 0)	0.0( 0)	9.1( 1)

◆第96表の1◆ 喫煙の状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [現在習慣的に喫煙している者] (全国, 年齢階級別)

(%)

	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総数 (実数)	100.0 ( 282)	100.0 ( 32)	100.0 ( 51)	100.0 ( 59)	100.0 ( 67)	100.0 ( 44)	100.0 ( 29)
0.9未満	1.1	0.0	0.0	0.0	1.5	4.5	0.0
1.4～	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.0～2.1	0.7	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.0～4.9	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.0～8.9	0.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
9.0～9.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
10～19.9	1.1	0.0	0.0	1.7	1.5	2.3	0.0
20～29.9	0.7	0.0	0.0	1.7	1.5	0.0	0.0
30～39.9	2.8	6.3	2.0	1.7	3.0	2.3	3.4
40～49.9	1.8	3.1	3.9	1.7	0.0	0.0	3.4
50～99.9	9.6	6.3	5.9	6.8	9.0	11.4	24.1
100～149	11.3	0.0	13.7	20.3	10.4	9.1	6.9
150～199	14.5	18.8	11.8	6.8	9.0	27.3	24.1
200～249	16.3	9.4	13.7	15.3	23.9	11.4	20.7
250～299	12.4	25.0	17.6	13.6	7.5	9.1	3.4
300～349	9.6	9.4	5.9	10.2	13.4	11.4	3.4
350～399	5.3	6.3	5.9	6.8	3.0	6.8	3.4
400～449	2.8	3.1	3.9	1.7	6.0	0.0	0.0
450～599	2.8	3.1	2.0	6.8	3.0	0.0	0.0
500以上	5.7	3.1	9.8	5.1	6.0	4.5	3.4
平均値	228.9	225.1	250.9	246.2	239.8	206.6	168.2
標準偏差	145.8	136.9	163.2	154.6	144.7	131.7	114.9

◆第96表の2◆ 喫煙の状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [現在習慣的に喫煙している者] (男, 年齢階級別)

(%)

	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総数 (実数)	100.0 ( 201)	100.0 ( 17)	100.0 ( 35)	100.0 ( 40)	100.0 ( 50)	100.0 ( 34)	100.0 ( 25)
0.9未満	1.5	0.0	0.0	0.0	2.0	5.9	0.0
1.4～	0.5	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
4.0～4.9	0.5	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
8.0～8.9	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
10～19.9	1.0	0.0	0.0	2.5	2.0	0.0	0.0
30～39.9	3.0	5.9	0.0	2.5	4.0	2.9	4.0
40～49.9	1.5	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	4.0
50～99.9	7.5	0.0	2.9	2.5	6.0	11.8	24.0
100～149	9.0	0.0	14.3	12.5	8.0	5.9	8.0
150～199	17.4	29.4	11.4	10.0	8.0	32.4	28.0
200～249	18.4	11.8	14.3	20.0	26.0	8.8	24.0
250～299	9.0	17.6	14.3	7.5	6.0	11.8	0.0
300～349	10.4	11.8	5.7	15.0	12.0	11.8	4.0
350～399	5.5	11.8	5.7	7.5	4.0	5.9	0.0
400～449	3.5	5.9	2.9	2.5	8.0	0.0	0.0
450～599	4.0	5.9	2.9	10.0	4.0	0.0	0.0
500以上	7.0	0.0	14.3	7.5	8.0	2.9	4.0
平均値	244.2	258.1	267.3	286.1	258.8	199.9	166.2
標準偏差	151.3	113.1	181.7	161.6	155.1	116.6	108.6

◆第96表の3◆ 喫煙の状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [現在習慣的に喫煙している者] (女, 年齢階級別)

(%)

	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総数 (実数)	100.0 ( 81)	100.0 ( 15)	100.0 ( 16)	100.0 ( 19)	100.0 ( 17)	100.0 ( 10)	100.0 ( 4)
2.0～2.1	2.5	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.0～9.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
10～19.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
20～29.9	2.5	0.0	0.0	5.3	5.9	0.0	0.0
30～39.9	2.5	6.7	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
40～49.9	2.5	6.7	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0
50～99.9	14.8	13.3	12.5	15.8	17.6	10.0	25.0
100～149	17.3	0.0	12.5	36.8	17.6	20.0	0.0
150～199	7.4	6.7	12.5	0.0	11.8	10.0	0.0
200～249	11.1	6.7	12.5	5.3	17.6	20.0	0.0
250～299	21.0	33.3	25.0	26.3	11.8	0.0	25.0
300～349	7.4	6.7	6.3	0.0	17.6	10.0	0.0
350～399	4.9	0.0	6.3	5.3	0.0	10.0	25.0
400～449	1.2	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
500以上	2.5	6.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
平均値	191.1	187.7	215.1	162.2	183.9	229.1	181.0
標準偏差	124.2	155.2	109.3	97.2	90.4	179.7	169.0

◆第97表の1◆ 喫煙の状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (全国, 年齢階級別)  
 (%)

	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総数 (実数)	100.0 ( 891)	100.0 ( 54)	100.0 ( 115)	100.0 ( 116)	100.0 ( 175)	100.0 ( 219)	100.0 ( 212)
0.9未満	67.6	55.6	60.0	55.2	58.9	74.4	81.6
1.0～	5.2	1.9	4.3	12.1	5.1	3.7	4.2
1.1～	3.3	9.3	4.3	7.8	1.7	0.9	2.4
1.2～	2.2	1.9	3.5	1.7	2.9	2.3	1.4
1.3～	2.0	3.7	1.7	5.2	0.6	0.9	2.4
1.4～	2.5	9.3	6.1	0.0	1.7	1.4	1.9
1.5～	1.3	3.7	3.5	1.7	1.7	0.5	0.0
1.6～	2.4	0.0	4.3	0.9	2.9	3.2	1.4
1.7～	1.2	1.9	0.0	4.3	2.9	0.0	0.0
1.8～	2.0	0.0	4.3	0.9	4.0	0.9	1.4
1.9～	0.8	0.0	0.9	0.9	1.7	0.5	0.5
2.0～2.1	1.2	3.7	0.9	0.9	1.1	1.8	0.5
2.2～2.3	0.9	0.0	0.9	1.7	2.3	0.5	0.0
2.4～2.5	0.9	0.0	0.0	1.7	2.3	0.5	0.5
2.6～2.7	0.7	0.0	0.9	0.0	0.6	1.4	0.5
2.8～2.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
3.0～3.4	0.8	1.9	0.9	0.9	1.7	0.0	0.5
3.5～3.9	0.8	0.0	0.0	0.9	1.7	1.4	0.0
4.0～4.9	0.7	1.9	0.0	0.9	0.6	1.4	0.0
5.0～5.9	0.2	1.9	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
6.0～6.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
7.0～7.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5
9.0～9.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
10～19.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
20～29.9	0.4	0.0	2.6	0.0	0.6	0.0	0.0
30～39.9	0.3	0.0	0.0	1.7	0.6	0.0	0.0
50～99.9	0.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0
100～149	0.4	0.0	0.9	0.0	0.6	0.9	0.0
150～199	0.4	1.9	0.0	0.9	0.0	0.5	0.5
200～249	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
250～299	0.2	1.9	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
450～599	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
平均値	4.3	8.7	2.5	2.9	7.2	5.4	1.5
標準偏差	26.9	40.7	11.4	15.8	42.3	27.8	11.7

◆第97表の2◆ 喫煙の状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (男, 年齢階級別)  
 (%)

	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総数 (実数)	100.0 ( 255)	100.0 ( 14)	100.0 ( 27)	100.0 ( 25)	100.0 ( 32)	100.0 ( 81)	100.0 ( 76)
0.9未満	66.3	35.7	37.0	52.0	50.0	75.3	84.2
1.0～	4.3	7.1	7.4	12.0	3.1	2.5	2.6
1.1～	4.7	21.4	7.4	12.0	6.3	1.2	1.3
1.2～	1.6	0.0	0.0	0.0	3.1	2.5	1.3
1.3～	1.2	7.1	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
1.4～	4.3	14.3	14.8	0.0	3.1	2.5	2.6
1.5～	1.2	0.0	3.7	4.0	3.1	0.0	0.0
1.6～	2.4	0.0	11.1	0.0	0.0	2.5	1.3
1.7～	0.8	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0
1.8～	2.4	0.0	11.1	0.0	0.0	2.5	1.3
1.9～	1.2	0.0	3.7	0.0	0.0	1.2	1.3
2.2～2.3	0.8	0.0	0.0	4.0	3.1	0.0	0.0
2.4～2.5	0.8	0.0	0.0	4.0	0.0	1.2	0.0
2.6～2.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3
3.0～3.4	1.2	7.1	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0
3.5～3.9	0.4	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0
4.0～4.9	0.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.0～5.9	0.4	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0
6.0～6.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
7.0～7.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
9.0～9.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
10～19.9	0.4	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0
30～39.9	0.8	0.0	0.0	4.0	3.1	0.0	0.0
50～99.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
100～149	0.8	0.0	3.7	0.0	0.0	1.2	0.0
150～199	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3
200～249	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
450～599	0.4	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0
平均値	6.4	1.3	5.4	2.3	16.9	8.0	3.0
標準偏差	36.6	1.1	22.3	7.2	80.4	33.9	19.6



◆第97表の3◆ 喫煙の状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (女, 年齢階級別)  
 (%)

	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総数 (実数)	100.0 ( 636)	100.0 ( 40)	100.0 ( 88)	100.0 ( 91)	100.0 ( 143)	100.0 ( 138)	100.0 ( 136)
0.9未満	68.1	62.5	67.0	56.0	60.8	73.9	80.1
1.0～	5.5	0.0	3.4	12.1	5.6	4.3	5.1
1.1～	2.7	5.0	3.4	6.6	0.7	0.7	2.9
1.2～	2.5	2.5	4.5	2.2	2.8	2.2	1.5
1.3～	2.4	2.5	2.3	4.4	0.7	1.4	3.7
1.4～	1.7	7.5	3.4	0.0	1.4	0.7	1.5
1.5～	1.4	5.0	3.4	1.1	1.4	0.7	0.0
1.6～	2.4	0.0	2.3	1.1	3.5	3.6	1.5
1.7～	1.4	2.5	0.0	5.5	2.1	0.0	0.0
1.8～	1.9	0.0	2.3	1.1	4.9	0.0	1.5
1.9～	0.6	0.0	0.0	1.1	2.1	0.0	0.0
2.0～2.1	1.7	5.0	1.1	1.1	1.4	2.9	0.7
2.2～2.3	0.9	0.0	1.1	1.1	2.1	0.7	0.0
2.4～2.5	0.9	0.0	0.0	1.1	2.8	0.0	0.7
2.6～2.7	0.6	0.0	1.1	0.0	0.7	1.4	0.0
2.8～2.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
3.0～3.4	0.6	0.0	1.1	1.1	0.7	0.0	0.7
3.5～3.9	0.9	0.0	0.0	1.1	1.4	2.2	0.0
4.0～4.9	0.8	0.0	0.0	1.1	0.7	2.2	0.0
5.0～5.9	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.0～7.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
20～29.9	0.6	0.0	3.4	0.0	0.7	0.0	0.0
30～39.9	0.2	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
50～99.9	0.5	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	0.0
100～149	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0
150～199	0.3	2.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
200～249	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
250～299	0.3	2.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
平均値	3.5	11.2	1.6	3.1	5.0	3.9	0.7
標準偏差	21.8	47.2	4.2	17.5	27.5	23.5	0.4

◆第98表の1◆ 家庭又は職場での受動喫煙状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (性別)

(%)

	男				女			
	総数	家庭又は職場での受動喫煙			総数	家庭又は職場での受動喫煙		
		ほぼ毎日	時々あった	全くない		ほぼ毎日	時々あった	全くない
総数 (実数)	100.0 ( 251)	100.0 ( 66)	100.0 ( 69)	100.0 ( 116)	100.0 ( 631)	100.0 ( 206)	100.0 ( 143)	100.0 ( 282)
0.9～	65.7	39.4	66.7	80.2	67.8	40.3	76.9	83.3
1.0～	4.4	4.5	5.8	3.4	5.5	6.3	6.3	4.6
1.1～	4.8	7.6	7.2	1.7	2.7	2.9	4.2	1.8
1.2～	1.6	3.0	1.4	0.9	2.5	5.8	1.4	0.7
1.3～	1.2	4.5	0.0	0.0	2.4	3.9	1.4	1.8
1.4～	4.4	6.1	2.9	4.3	1.7	4.4	0.7	0.4
1.5～	1.2	0.0	4.3	0.0	1.4	3.4	1.4	0.0
1.6～	2.4	6.1	1.4	0.9	2.4	4.9	2.1	0.7
1.7～	0.8	0.0	1.4	0.9	1.4	1.9	0.0	1.8
1.8～	2.4	3.0	4.3	0.9	1.9	3.9	0.7	1.1
1.9～	1.2	4.5	0.0	0.0	0.6	1.9	0.0	0.0
2.0～2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.9	0.7	0.7
2.2～2.3	0.8	3.0	0.0	0.0	1.0	1.5	1.4	0.4
2.4～2.5	0.8	3.0	0.0	0.0	1.0	2.4	0.0	0.4
2.6～2.7	0.8	1.5	0.0	0.9	0.6	1.9	0.0	0.0
2.8～2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0
3.0～3.4	1.2	3.0	0.0	0.9	0.6	1.9	0.0	0.0
3.5～3.9	0.4	1.5	0.0	0.0	1.0	1.5	1.4	0.4
4.0～4.9	0.4	0.0	0.0	0.9	0.8	1.9	0.0	0.4
5.0～5.9	0.4	1.5	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0
6.0～6.9	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.0～7.9	0.4	0.0	0.0	0.9	0.2	0.5	0.0	0.0
9.0～9.9	0.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
10～19.9	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.7
30～39.9	0.8	1.5	1.4	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0
50～99.9	0.4	0.0	1.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.7
100～149	0.8	0.0	0.0	1.7	0.3	0.5	0.0	0.4
150～199	0.8	1.5	0.0	0.9	0.3	1.0	0.0	0.0
200～249	0.4	0.0	1.4	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0
250～299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.0
450～599	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	6.5	11.2	5.6	4.4	3.5	6.7	2.6	1.7
標準偏差	36.9	58.8	28.7	22.4	21.9	31.8	21.9	9.3

注) 20歳以上

◆第98表の2◆ 家庭での受動喫煙状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (性別)

(%)

	男				女			
	総 数	家庭での受動喫煙			総 数	家庭での受動喫煙		
		ほぼ毎日	時々あった	全くない		ほぼ毎日	時々あった	全くない
総 数 (実 数)	100.0 ( 248)	100.0 ( 24)	100.0 ( 32)	100.0 ( 192)	100.0 ( 629)	100.0 ( 182)	100.0 ( 91)	100.0 ( 356)
0.9未満	65.7	50.0	65.6	67.7	67.9	37.4	73.6	82.0
1.0～	4.4	0.0	3.1	5.2	5.6	6.6	5.5	5.1
1.1～	4.8	8.3	3.1	4.7	2.5	3.3	4.4	1.7
1.2～	1.6	4.2	0.0	1.6	2.5	5.5	2.2	1.1
1.3～	1.2	8.3	0.0	0.5	2.4	4.4	2.2	1.4
1.4～	4.4	8.3	6.3	3.6	1.7	4.9	0.0	0.6
1.5～	1.2	0.0	0.0	1.6	1.4	3.8	2.2	0.0
1.6～	2.4	0.0	12.5	1.0	2.4	5.5	2.2	0.8
1.7～	0.8	0.0	3.1	0.5	1.4	2.2	0.0	1.4
1.8～	2.4	0.0	3.1	2.6	1.9	3.8	0.0	1.4
1.9～	1.2	0.0	0.0	1.6	0.6	2.2	0.0	0.0
2.0～2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.7	2.2	1.1
2.2～2.3	0.8	0.0	0.0	1.0	1.0	1.1	1.1	0.8
2.4～2.5	0.8	0.0	0.0	1.0	1.0	2.7	0.0	0.3
2.6～2.7	0.8	4.2	0.0	0.5	0.6	2.2	0.0	0.0
2.8～2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	0.0
3.0～3.4	1.2	4.2	0.0	1.0	0.6	2.2	0.0	0.0
3.5～3.9	0.4	0.0	3.1	0.0	1.0	1.6	2.2	0.3
4.0～4.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.8	1.6	0.0	0.6
5.0～5.9	0.4	4.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0
6.0～6.9	0.4	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.0～7.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.2	0.5	0.0	0.0
9.0～9.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
10～19.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20～29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.6
30～39.9	0.4	4.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0
50～99.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.6
100～149	0.8	0.0	0.0	1.0	0.3	0.5	0.0	0.3
150～199	0.8	0.0	0.0	1.0	0.3	1.1	0.0	0.0
200～249	0.4	0.0	0.0	0.5	0.2	0.5	0.0	0.0
250～299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.1	0.0
450～599	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	6.4	2.9	0.9	7.8	3.5	7.4	3.7	1.5
標準偏差	37.1	7.5	0.7	42.0	22.0	33.8	27.4	8.3

注) 20歳以上

◆第98表の3◆ 職場での受動喫煙状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (性別)

(%)

	男				女			
	総数	職場での受動喫煙			総数	職場での受動喫煙		
		ほぼ毎日	時々あった	全くない		ほぼ毎日	時々あった	全くない
総数 (実数)	100.0 (249)	100.0 (52)	100.0 (56)	100.0 (141)	100.0 (615)	100.0 (60)	100.0 (98)	100.0 (457)
0.9未満	65.5	32.7	57.1	80.9	67.8	43.3	61.2	72.4
1.0～	4.4	5.8	5.4	3.5	5.5	6.7	8.2	4.8
1.1～	4.8	7.7	10.7	1.4	2.6	0.0	6.1	2.2
1.2～	1.6	1.9	1.8	1.4	2.6	10.0	1.0	2.0
1.3～	1.2	5.8	0.0	0.0	2.4	1.7	2.0	2.6
1.4～	4.4	7.7	1.8	4.3	1.8	5.0	3.1	1.1
1.5～	1.2	0.0	5.4	0.0	1.3	5.0	3.1	0.4
1.6～	2.4	7.7	1.8	0.7	2.4	3.3	2.0	2.4
1.7～	0.8	0.0	1.8	0.7	1.5	1.7	0.0	1.8
1.8～	2.4	3.8	5.4	0.7	2.0	3.3	3.1	1.5
1.9～	1.2	5.8	0.0	0.0	0.7	1.7	2.0	0.2
2.0～2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.0	1.0	1.5
2.2～2.3	0.8	3.8	0.0	0.0	0.8	3.3	1.0	0.4
2.4～2.5	0.8	3.8	0.0	0.0	1.0	1.7	1.0	0.9
2.6～2.7	0.8	1.9	0.0	0.7	0.7	1.7	0.0	0.7
2.8～2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
3.0～3.4	1.2	1.9	1.8	0.7	0.7	0.0	1.0	0.7
3.5～3.9	0.4	1.9	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.1
4.0～4.9	0.4	0.0	0.0	0.7	0.8	3.3	0.0	0.7
5.0～5.9	0.4	1.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
6.0～6.9	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
7.0～7.9	0.4	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	1.0	0.0
9.0～9.9	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
10～19.9	0.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	0.0	0.4
30～39.9	0.8	0.0	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
50～99.9	0.4	0.0	1.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7
100～149	0.8	0.0	0.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.4
150～199	0.8	1.9	0.0	0.7	0.3	0.0	1.0	0.2
200～249	0.4	0.0	1.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
250～299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	1.0	0.0
450～599	0.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	6.6	13.2	7.5	3.8	3.5	6.4	5.3	2.8
標準偏差	37.0	66.0	32.0	20.4	22.2	37.7	31.0	16.5

注) 20歳以上

◆第98表の4◆ 学校での受動喫煙状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (性別)

(%)

	男				女			
	総 数	学校での受動喫煙			総 数	学校での受動喫煙		
		ほぼ毎日	時々あった	全くない		ほぼ毎日	時々あった	全くない
総 数 (実 数)	100.0 ( 244)	100.0 ( 2)	100.0 ( 6)	100.0 ( 236)	100.0 ( 613)	100.0 ( 2)	100.0 ( 7)	100.0 ( 604)
0.9未満	64.8	0.0	66.7	65.3	67.7	50.0	42.9	68.0
1.0～	4.5	0.0	0.0	4.7	5.5	0.0	0.0	5.6
1.1～	4.9	50.0	16.7	4.2	2.6	0.0	28.6	2.3
1.2～	1.6	0.0	0.0	1.7	2.6	0.0	0.0	2.6
1.3～	1.2	0.0	0.0	1.3	2.4	0.0	0.0	2.5
1.4～	4.5	0.0	0.0	4.7	1.8	0.0	0.0	1.8
1.5～	1.2	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.3
1.6～	2.5	0.0	0.0	2.5	2.4	0.0	14.3	2.3
1.7～	0.8	0.0	0.0	0.8	1.5	50.0	0.0	1.3
1.8～	2.5	0.0	0.0	2.5	2.0	0.0	0.0	2.0
1.9～	1.2	0.0	0.0	1.3	0.7	0.0	0.0	0.7
2.0～2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8
2.2～2.3	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	14.3	0.7
2.4～2.5	0.8	0.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	1.0
2.6～2.7	0.8	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	0.0	0.7
2.8～2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
3.0～3.4	1.2	50.0	0.0	0.8	0.7	0.0	0.0	0.7
3.5～3.9	0.4	0.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	1.0
4.0～4.9	0.4	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.8
5.0～5.9	0.4	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2
6.0～6.9	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
7.0～7.9	0.4	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2
9.0～9.9	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
10～19.9	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20～29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
30～39.9	0.8	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.2
50～99.9	0.4	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.5
100～149	0.8	0.0	16.7	0.4	0.3	0.0	0.0	0.3
150～199	0.8	0.0	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.3
200～249	0.4	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2
250～299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3
450～599	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	6.7	2.2	20.0	6.4	3.6	1.1	1.1	3.6
標準偏差	37.4	1.6	47.5	37.3	22.2	0.8	0.6	22.4

注) 20歳以上

◆第98表の5◆ 飲食店での受動喫煙状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (性別)

(%)

	男				女			
	総数	飲食店での受動喫煙			総数	飲食店での受動喫煙		
		ほぼ毎日	時々あった	全くない		ほぼ毎日	時々あった	全くない
総数 (実数)	100.0 (247)	100.0 (8)	100.0 (123)	100.0 (116)	100.0 (619)	100.0 (5)	100.0 (248)	100.0 (366)
0.9未満	65.6	12.5	61.0	74.1	67.9	0.0	64.5	71.0
1.0～	4.5	25.0	4.9	2.6	5.5	0.0	5.6	5.5
1.1～	4.9	12.5	4.1	5.2	2.6	0.0	3.2	2.2
1.2～	1.2	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	2.8	2.5
1.3～	1.2	0.0	1.6	0.9	2.4	20.0	3.2	1.6
1.4～	4.5	12.5	4.1	4.3	1.8	20.0	1.6	1.6
1.5～	1.2	0.0	1.6	0.9	1.5	0.0	2.4	0.8
1.6～	2.4	0.0	4.1	0.9	2.4	20.0	2.4	2.2
1.7～	0.8	0.0	0.8	0.9	1.5	0.0	1.6	1.4
1.8～	2.4	0.0	3.3	1.7	1.9	0.0	2.0	1.9
1.9～	1.2	0.0	1.6	0.9	0.6	0.0	1.2	0.3
2.0～2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	20.0	1.2	1.9
2.2～2.3	0.8	12.5	0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.8
2.4～2.5	0.8	0.0	0.8	0.9	1.0	20.0	2.0	0.0
2.6～2.7	0.8	0.0	1.6	0.0	0.6	0.0	0.8	0.5
2.8～2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
3.0～3.4	1.2	12.5	0.8	0.9	0.6	0.0	0.4	0.8
3.5～3.9	0.4	0.0	0.8	0.0	1.0	0.0	0.8	1.1
4.0～4.9	0.4	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	1.4
5.0～5.9	0.4	0.0	0.8	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0
6.0～6.9	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.0～7.9	0.4	0.0	0.8	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0
9.0～9.9	0.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
10～19.9	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.8	0.3
30～39.9	0.8	0.0	1.6	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0
50～99.9	0.4	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	0.4	0.5
100～149	0.8	12.5	0.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5
150～199	0.8	0.0	0.0	1.7	0.3	0.0	0.4	0.3
200～249	0.4	0.0	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
250～299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3
450～599	0.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	6.6	15.9	5.2	7.5	3.5	1.8	3.2	3.8
標準偏差	37.2	40.9	24.5	47.0	22.1	0.5	19.9	23.6

注) 20歳以上

◆第98表の6◆ 遊戯場での受動喫煙状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (性別)

(%)

	男				女			
	総 数	遊戯場での受動喫煙			総 数	遊戯場での受動喫煙		
		ほぼ毎日	時々あった	全くない		ほぼ毎日	時々あった	全くない
総 数 (実 数)	100.0 ( 247)	100.0 ( 3)	100.0 ( 32)	100.0 ( 212)	100.0 ( 617)	100.0 ( 2)	100.0 ( 31)	100.0 ( 584)
0.9未満	65.2	0.0	43.8	69.3	67.9	0.0	38.7	69.7
1.0～	4.5	0.0	0.0	5.2	5.5	0.0	0.0	5.8
1.1～	4.9	0.0	9.4	4.2	2.6	0.0	0.0	2.7
1.2～	1.6	0.0	3.1	1.4	2.6	0.0	0.0	2.7
1.3～	1.2	0.0	0.0	1.4	2.4	0.0	0.0	2.6
1.4～	4.5	33.3	3.1	4.2	1.8	0.0	6.5	1.5
1.5～	1.2	0.0	0.0	1.4	1.3	0.0	0.0	1.4
1.6～	2.4	0.0	9.4	1.4	2.4	100.0	9.7	1.7
1.7～	0.8	0.0	3.1	0.5	1.5	0.0	6.5	1.2
1.8～	2.4	0.0	3.1	2.4	1.9	0.0	0.0	2.1
1.9～	1.2	0.0	3.1	0.9	0.6	0.0	0.0	0.7
2.0～2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.9
2.2～2.3	0.8	0.0	0.0	0.9	0.8	0.0	6.5	0.5
2.4～2.5	0.8	0.0	3.1	0.5	1.0	0.0	3.2	0.9
2.6～2.7	0.8	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0	0.0	0.7
2.8～2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
3.0～3.4	1.2	0.0	3.1	0.9	0.6	0.0	3.2	0.5
3.5～3.9	0.4	0.0	3.1	0.0	1.0	0.0	9.7	0.5
4.0～4.9	0.4	0.0	3.1	0.0	0.8	0.0	6.5	0.5
5.0～5.9	0.4	33.3	0.0	0.0	0.2	0.0	3.2	0.0
6.0～6.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
7.0～7.9	0.4	0.0	3.1	0.0	0.2	0.0	3.2	0.0
9.0～9.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
10～19.9	0.4	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	3.2	0.3
30～39.9	0.8	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.2
50～99.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5
100～149	0.8	33.3	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.3
150～199	0.8	0.0	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.3
200～249	0.4	0.0	3.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
250～299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3
450～599	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	6.6	41.1	8.9	5.8	3.5	1.6	2.6	3.6
標準偏差	37.2	65.7	39.9	36.3	22.1	0.0	3.9	22.7

注) 20歳以上

◆第98表の7◆ 行政機関での受動喫煙状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (性別)

(%)

	男				女			
	総数	行政機関での受動喫煙			総数	行政機関での受動喫煙		
		ほぼ毎日	時々あった	全くない		ほぼ毎日	時々あった	全くない
総数 (実数)	100.0 (247)	100.0 (1)	100.0 (29)	100.0 (217)	100.0 (618)	—	100.0 (42)	100.0 (576)
0.9未満	65.2	0.0	51.7	67.3	68.0	—	52.4	69.1
1.0～	4.5	100.0	13.8	2.8	5.5	—	9.5	5.2
1.1～	4.9	0.0	10.3	4.1	2.6	—	4.8	2.4
1.2～	1.6	0.0	3.4	1.4	2.6	—	0.0	2.8
1.3～	1.2	0.0	0.0	1.4	2.4	—	9.5	1.9
1.4～	4.5	0.0	0.0	5.1	1.8	—	2.4	1.7
1.5～	1.2	0.0	0.0	1.4	1.3	—	0.0	1.4
1.6～	2.4	0.0	3.4	2.3	2.4	—	2.4	2.4
1.7～	0.8	0.0	3.4	0.5	1.5	—	7.1	1.0
1.8～	2.4	0.0	0.0	2.8	1.9	—	2.4	1.9
1.9～	1.2	0.0	0.0	1.4	0.6	—	0.0	0.7
2.0～2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	—	0.0	1.9
2.2～2.3	0.8	0.0	0.0	0.9	0.8	—	2.4	0.7
2.4～2.5	0.8	0.0	3.4	0.5	1.0	—	4.8	0.7
2.6～2.7	0.8	0.0	0.0	0.9	0.6	—	2.4	0.5
2.8～2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	—	0.0	0.2
3.0～3.4	1.2	0.0	0.0	1.4	0.6	—	0.0	0.7
3.5～3.9	0.4	0.0	0.0	0.5	1.0	—	0.0	1.0
4.0～4.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.8	—	0.0	0.9
5.0～5.9	0.4	0.0	3.4	0.0	0.2	—	0.0	0.2
6.0～6.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	—	0.0	0.0
7.0～7.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.2	—	0.0	0.2
9.0～9.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	—	0.0	0.0
10～19.9	0.4	0.0	3.4	0.0	0.0	—	0.0	0.0
20～29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	—	0.0	0.5
30～39.9	0.8	0.0	0.0	0.9	0.2	—	0.0	0.2
50～99.9	0.4	0.0	3.4	0.0	0.5	—	0.0	0.5
100～149	0.8	0.0	0.0	0.9	0.3	—	0.0	0.3
150～199	0.8	0.0	0.0	0.9	0.3	—	0.0	0.3
200～249	0.4	0.0	0.0	0.5	0.2	—	0.0	0.2
250～299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	—	0.0	0.3
450～599	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	—	0.0	0.0
平均値	6.6	1.0	3.8	7.0	3.5	—	1.0	3.7
標準偏差	37.2	0.0	13.3	39.4	22.1	—	0.6	22.9

注) 20歳以上



◆第98表の8◆ 医療機関での受動喫煙状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (性別)

(%)

	男				女			
	総 数	医療機関での受動喫煙			総 数	医療機関での受動喫煙		
		ほぼ毎日	時々あった	全くない		ほぼ毎日	時々あった	全くない
総 数 (実 数)	100.0 ( 246)	100.0 ( 2)	100.0 ( 25)	100.0 ( 219)	100.0 ( 619)	100.0 ( 2)	100.0 ( 67)	100.0 ( 550)
0.9未満	65.0	0.0	64.0	65.8	68.0	50.0	70.1	67.8
1.0～	4.5	0.0	12.0	3.7	5.5	0.0	6.0	5.5
1.1～	4.9	0.0	4.0	5.0	2.6	0.0	1.5	2.7
1.2～	1.6	50.0	0.0	1.4	2.6	0.0	1.5	2.7
1.3～	1.2	0.0	0.0	1.4	2.4	0.0	4.5	2.2
1.4～	4.5	0.0	4.0	4.6	1.8	0.0	0.0	2.0
1.5～	1.2	0.0	0.0	1.4	1.3	0.0	0.0	1.5
1.6～	2.4	0.0	0.0	2.7	2.4	0.0	1.5	2.5
1.7～	0.8	0.0	0.0	0.9	1.5	0.0	3.0	1.3
1.8～	2.4	0.0	4.0	2.3	1.9	0.0	3.0	1.8
1.9～	1.2	0.0	0.0	1.4	0.6	0.0	3.0	0.4
2.0～2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.0	1.6
2.2～2.3	0.8	0.0	0.0	0.9	0.8	0.0	0.0	0.9
2.4～2.5	0.8	0.0	4.0	0.5	1.0	50.0	1.5	0.7
2.6～2.7	0.8	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0	1.5	0.5
2.8～2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
3.0～3.4	1.2	50.0	0.0	0.9	0.6	0.0	0.0	0.7
3.5～3.9	0.4	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	1.1
4.0～4.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.8	0.0	0.0	0.9
5.0～5.9	0.4	0.0	4.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
6.0～6.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
7.0～7.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2
9.0～9.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
10～19.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20～29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
30～39.9	0.8	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.2
50～99.9	0.4	0.0	4.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
100～149	0.8	0.0	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.4
150～199	0.8	0.0	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.4
200～249	0.4	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2
250～299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4
450～599	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	6.6	2.1	3.8	7.0	3.5	1.5	0.8	3.9
標準偏差	37.3	1.3	14.3	39.2	22.1	1.3	0.6	23.4

注) 20歳以上

◆第98表の9◆ その他での受動喫煙状況別、血中コチニン濃度の分布  
 [この1ヶ月吸っていない又は全く吸ったことがない者] (性別)

(%)

	男				女			
	総数	その他での受動喫煙			総数	その他での受動喫煙		
		ほぼ毎日	時々あった	全くない		ほぼ毎日	時々あった	全くない
総数 (実数)	100.0 (248)	100.0 (4)	100.0 (51)	100.0 (193)	100.0 (615)	100.0 (9)	100.0 (116)	100.0 (490)
0.9未満	65.3	25.0	72.5	64.2	67.8	44.4	72.4	67.1
1.0～	4.4	25.0	0.0	5.2	5.5	0.0	2.6	6.3
1.1～	4.8	25.0	5.9	4.1	2.6	0.0	1.7	2.9
1.2～	1.6	25.0	0.0	1.6	2.6	0.0	2.6	2.7
1.3～	1.2	0.0	0.0	1.6	2.4	11.1	3.4	2.0
1.4～	4.4	0.0	2.0	5.2	1.8	11.1	1.7	1.6
1.5～	1.2	0.0	0.0	1.6	1.5	0.0	1.7	1.4
1.6～	2.4	0.0	3.9	2.1	2.4	0.0	3.4	2.2
1.7～	0.8	0.0	0.0	1.0	1.5	11.1	2.6	1.0
1.8～	2.4	0.0	0.0	3.1	2.0	0.0	2.6	1.8
1.9～	1.2	0.0	2.0	1.0	0.7	0.0	0.9	0.6
2.0～2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	11.1	1.7	1.6
2.2～2.3	0.8	0.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.0	1.0
2.4～2.5	0.8	0.0	2.0	0.5	0.8	11.1	0.0	0.8
2.6～2.7	0.8	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.9	0.6
2.8～2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
3.0～3.4	1.2	0.0	2.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.8
3.5～3.9	0.4	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.2
4.0～4.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.8	0.0	0.0	1.0
5.0～5.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2
6.0～6.9	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.0～7.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2
9.0～9.9	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～19.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20～29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.6
30～39.9	0.8	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.9	0.0
50～99.9	0.4	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.6
100～149	0.8	0.0	2.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.4
150～199	0.8	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.9	0.2
200～249	0.4	0.0	2.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
250～299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4
450～599	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	6.6	1.0	8.0	6.3	3.5	1.2	2.5	3.8
標準偏差	37.1	0.3	36.1	37.8	22.2	0.8	15.5	23.7

注) 20歳以上

