

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

2. 年齢階級別状況(対象者数)

総数	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
生活習慣調査	7,047	—	—	—	629	1,032	1,090	1,128	1,392	1,776
男性	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
生活習慣調査	3,230	—	—	—	279	490	510	547	619	785
女性	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
生活習慣調査	3,817	—	—	—	350	542	580	581	773	991

(正)

2. 年齢階級別状況(対象者数)

総数	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
生活習慣調査	7,052	—	—	—	631	1,032	1,090	1,128	1,392	1,779
男性	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
生活習慣調査	3,232	—	—	—	280	490	510	547	619	786
女性	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
生活習慣調査	3,820	—	—	—	351	542	580	581	773	993

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第5表の2 食品群別摂取量(男性, 年齢階級別<再掲>)

食品群	食品群 番号	1～2歳		3～5歳		6～7歳		8～9歳		10～11歳		12～14歳		15～17歳		18～29歳		30～49歳		50～69歳	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
対象者数(人)		85		95		73		102		102		121		142		360		1038		1195	

(正)

第5表の2 食品群別摂取量(男性, 年齢階級別<再掲>)

食品群	食品群 番号	1～2歳		3～5歳		6～7歳		8～9歳		10～11歳		12～14歳		15～17歳		18～29歳		30～49歳		50～69歳	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
対象者数(人)		84		91		72		96		100		118		132		320		959		1121	

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第8表 果実類(ジャムを除く) 摂取量の状況 (20歳以上、性・年齢階級別)

		総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総数	平均値(g/日)	5.0	3.0	2.5	4.2	3.2	4.3	5.2
	標準偏差	12.2	10.1	8.9	11.2	10.5	11.9	13.2
男性	平均値(g/日)	4.4	2.7	2.5	3.7	2.3	2.9	4.9
	標準偏差	11.6	9.8	9.1	10.6	8.7	10.0	12.8
女性	平均値(g/日)	3.8	3.4	2.6	4.7	4.4	5.9	5.5
	標準偏差	11.0	10.5	8.7	11.7	12.3	13.6	13.6

(正)

第8表 果実類(ジャムを除く) 摂取量の状況 (20歳以上、性・年齢階級別)

		総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
総数	平均値(g/日)	109.1	71.2	57.0	66.5	102.0	147.2	153.4
	標準偏差	139.4	135.3	101.0	107.3	134.4	147.3	151.3
男性	平均値(g/日)	94.8	61.7	50.0	55.0	80.2	127.0	145.1
	標準偏差	132.6	139.7	107.9	102.0	118.9	133.7	146.3
女性	平均値(g/日)	121.2	78.6	63.4	76.4	122.5	163.5	159.9
	標準偏差	143.8	131.4	93.9	110.9	144.6	155.5	154.8

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第9表 食品群別栄養素等摂取量(総数)

Table with 15 columns: 食品群, 食品群番号, 摂取量 (g, kcal), エネルギー, たんぱく質, 脂質, 炭水化物, ナトリウム, 食塩相当量, カリウム, カルシウム, マグネシウム, リン, 鉄, 亜鉛. Rows include categories like 総量, 穀類, 肉類, 野菜類, etc.

Table with 22 columns: 銅, ビタミンA, ビタミンD, ビタミンE, ビタミンK, ビタミンB1, ビタミンB2, ナイアシン, ビタミンB6, ビタミンB12, 葉酸, パントテン酸, ビタミンC, 飽和脂肪酸, 一価不飽和脂肪酸, n-6系脂肪酸, n-3系脂肪酸, コレステロール, 食物繊維. Rows include categories like 総量, 穀類, 肉類, 野菜類, etc.

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第11表 身長・体重の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

年齢(歳)	男性						女性					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
(再掲)												
20歳以上	2,588	166.9	7.2	3,161	65.9	11.2	2,585	153.7	7.0	3,132	52.9	9.2
20-29	205	171.0	6.1	264	66.5	12.9	203	157.7	5.5	256	51.9	9.2
60-64	300	166.5	5.5	368	65.8	9.5	300	153.8	5.1	368	53.5	8.1
65-69	242	164.6	5.6	300	64.4	9.2	242	151.8	5.1	300	53.2	9.2
70-74	257	163.2	6.5	305	62.5	8.4	257	149.6	5.5	305	51.8	8.0
75-79	212	160.9	6.1	247	60.8	9.3	212	148.1	6.1	248	51.1	8.2
80歳以上	199	159.4	6.9	294	57.2	9.5	200	144.4	6.7	296	46.3	8.2
総数	3,134	161.7	17.9	3,129	60.8	17.1	3,722	150.5	13.9	3,690	50.0	12.5

(正)

第11表 身長・体重の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

年齢(歳)	男性						女性					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
(再掲)												
20歳以上	2,588	166.9	7.2	2,585	65.9	11.2	3,161	153.7	7.0	3,132	52.9	9.2
20-29	205	171.0	6.1	203	66.5	12.9	264	157.7	5.5	256	51.9	9.2
60-64	300	166.5	5.5	300	65.8	9.5	368	153.8	5.1	368	53.5	8.1
65-69	242	164.6	5.6	242	64.4	9.2	300	151.8	5.1	300	53.2	9.2
70-74	257	163.2	6.5	257	62.5	8.4	305	149.6	5.5	305	51.8	8.0
75-79	212	160.9	6.1	212	60.8	9.3	247	148.1	6.1	248	51.1	8.2
80歳以上	199	159.4	6.9	200	57.2	9.5	294	144.4	6.7	296	46.3	8.2
総数	3,134	161.7	17.9	3,722	60.8	17.1	3,129	150.5	13.9	3,690	50.0	12.5

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について訂正いたしました。

(誤)

第24表 ヘマトクリット値の分布(性・年齢階級別)

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.0	2	0.6	3	1.0
	30.0-34.9	28	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	0.8	24	5.0	6	1.7	19	6.6
	35.0-39.9	130	8.9	0	0.0	2	1.1	2	1.3	12	5.6	31	8.7	83	17.3	37	10.3	64	22.2
	40.0-44.9	580	39.8	12	16.4	64	35.4	54	35.3	89	41.4	158	44.4	203	42.2	155	43.2	123	42.7
	45.0-49.9	626	42.9	51	69.9	93	51.4	89	58.2	101	47.0	148	41.6	144	29.9	141	39.3	64	22.2
	50.0-54.9	84	5.8	9	12.3	21	11.6	8	5.2	12	5.6	15	4.2	19	4.0	18	5.0	12	4.2
	55.0%以上	5	0.3	1	1.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	3	1.0
	(再掲)39.8未満	119	8.2	0	0.0	1	0.6	1	0.7	8	3.7	22	6.2	87	18.1	32	8.9	66	22.9
	(再掲)51.9以上	25	1.7	2	2.7	6	3.3	0	0.0	4	1.9	5	1.4	8	1.7	6	1.7	7	2.4
総数	1,459	100.0	73	100.0	181	100.0	153	100.0	215	100.0	356	100.0	481	100.0	359	100.0	288	100.0	
平均値(%)	47.3		46.3		45.9		45.1		44.4		42.9		44.5		44.2		42.2		
標準偏差	2.5		3.1		2.8		3.3		3.6		4.7		4.0		4.0		4.8		
女性	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	17	0.8	0	0.0	3	1.1	6	2.2	1	0.3	0	0.0	7	1.2	1	0.2	6	1.7
	30.0-34.9	101	4.8	5	4.0	17	6.3	23	8.3	6	1.8	7	1.4	43	7.3	12	2.6	34	9.6
	35.0-39.9	746	35.8	54	43.2	112	41.2	107	38.5	96	29.4	147	29.9	230	39.0	148	32.0	153	43.1
	40.0-44.9	1,051	50.5	63	50.4	127	46.7	123	44.2	191	58.4	283	57.5	264	44.8	253	54.8	140	39.4
	45.0-49.9	163	7.8	3	2.4	13	4.8	19	6.8	32	9.8	55	11.2	41	7.0	44	9.5	22	6.2
	50.0-54.9	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	4	0.7	4	0.9	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	58	2.8	4	3.2	10	3.7	18	6.5	3	0.9	0	0.0	23	3.9	3	0.6	20	5.6
	(再掲)45.0以上	168	8.1	3	2.4	13	4.8	19	6.8	33	10.1	55	11.2	45	7.6	48	10.4	22	6.2
総数	2,083	100.0	125	100.0	272	100.0	278	100.0	327	100.0	492	100.0	589	100.0	462	100.0	355	100.0	
平均値(%)	39.9		39.7		39.8		41.2		41.5		40.0		40.5		41.1		39.5		
標準偏差	2.8		3.3		3.8		3.0		2.9		3.8		3.4		3.3		3.8		

(正)

第24表 ヘマトクリット値の分布(性・年齢階級別)

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.0	2	0.6	3	1.0
	30.0-34.9	28	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	0.8	24	5.0	6	1.7	19	6.6
	35.0-39.9	130	8.9	0	0.0	2	1.1	2	1.3	12	5.6	31	8.7	83	17.3	37	10.3	64	22.2
	40.0-44.9	580	39.8	12	16.4	64	35.4	54	35.3	89	41.4	158	44.4	203	42.2	155	43.2	123	42.7
	45.0-49.9	626	42.9	51	69.9	93	51.4	89	58.2	101	47.0	148	41.6	144	29.9	141	39.3	64	22.2
	50.0-54.9	84	5.8	9	12.3	21	11.6	8	5.2	12	5.6	15	4.2	19	4.0	18	5.0	12	4.2
	55.0%以上	5	0.3	1	1.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	3	1.0
	(再掲)39.8未満	119	8.2	0	0.0	1	0.6	1	0.7	8	3.7	22	6.2	87	18.1	32	8.9	66	22.9
	(再掲)51.9以上	25	1.7	2	2.7	6	3.3	0	0.0	4	1.9	5	1.4	8	1.7	6	1.7	7	2.4
総数	1,459	100.0	73	100.0	181	100.0	153	100.0	215	100.0	356	100.0	481	100.0	359	100.0	288	100.0	
平均値(%)	44.5		47.3		46.3		45.9		45.1		44.4		42.9		44.2		42.2		
標準偏差	4.0		2.5		3.1		2.8		3.3		3.6		4.7		4.0		4.8		
女性	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	17	0.8	0	0.0	3	1.1	6	2.2	1	0.3	0	0.0	7	1.2	1	0.2	6	1.7
	30.0-34.9	101	4.8	5	4.0	17	6.3	23	8.3	6	1.8	7	1.4	43	7.3	12	2.6	34	9.6
	35.0-39.9	746	35.8	54	43.2	112	41.2	107	38.5	96	29.4	147	29.9	230	39.0	148	32.0	153	43.1
	40.0-44.9	1,051	50.5	63	50.4	127	46.7	123	44.2	191	58.4	283	57.5	264	44.8	253	54.8	140	39.4
	45.0-49.9	163	7.8	3	2.4	13	4.8	19	6.8	32	9.8	55	11.2	41	7.0	44	9.5	22	6.2
	50.0-54.9	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	4	0.7	4	0.9	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	58	2.8	4	3.2	10	3.7	18	6.5	3	0.9	0	0.0	23	3.9	3	0.6	20	5.6
	(再掲)45.0以上	168	8.1	3	2.4	13	4.8	19	6.8	33	10.1	55	11.2	45	7.6	48	10.4	22	6.2
総数	2,083	100.0	125	100.0	272	100.0	278	100.0	327	100.0	492	100.0	589	100.0	462	100.0	355	100.0	
平均値(%)	40.5		39.9		39.7		39.8		41.2		41.5		40.0		41.1		39.5		
標準偏差	3.4		2.8		3.3		3.8		3.0		2.9		3.8		3.3		3.8		

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第25表 平均赤血球容積(MCV)の分布(性・年齢階級別)

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	70fl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.3
	75-80未満	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.4	0	0.4	2	0.7
	80-85未満	26	1.8	2	2.7	2	1.1	4	2.6	6	2.8	6	1.7	6	1.2	6	1.2	3	1.0
	85-90未満	193	13.2	25	34.2	44	24.3	30	19.6	24	11.2	31	8.7	39	8.1	32	8.1	23	8.0
	90-95未満	509	34.9	33	45.2	81	44.8	78	51.0	79	36.7	108	30.3	130	27.0	106	27.0	77	26.7
	95-100未満	455	31.2	13	17.8	46	25.4	32	20.9	70	32.6	126	35.4	168	34.9	125	34.9	99	34.4
	100-105未満	211	14.5	0	0.0	7	3.9	9	5.9	29	13.5	64	18.0	102	21.2	71	21.2	58	20.1
	105-110未満	42	2.9	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.9	15	4.2	24	5.0	16	5.0	17	5.9
	110-115未満	13	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	2	0.6	8	1.7	0	1.7	8	2.8
	115-120未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.0	0	0.0
	120fl以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	総数	1,459	100.0	73	100.0	181	100.0	153	100.0	215	100.0	356	100.0	481	100.0	359	100.0	288	100.0
平均値(fl)	95.2		91.4		92.8		92.8		95.0		96.1		96.8		96.3		97.0		
標準偏差	5.5		3.5		4.1		4.1		5.7		5.6		5.7		5.5		5.9		
女性	70fl未満	11	0.5	0	0.0	5	1.8	5	1.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	14	0.7	1	0.8	6	2.2	7	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	29	1.4	3	2.4	9	3.3	14	5.0	1	0.3	0	0.0	2	0.3	1	0.3	1	0.3
	80-85未満	81	3.9	7	5.6	16	5.9	19	6.8	15	4.6	6	1.2	18	3.1	11	3.1	11	3.1
	85-90未満	342	16.4	36	28.8	66	24.3	65	23.4	59	18.0	62	12.6	54	9.2	45	9.2	32	9.0
	90-95未満	806	38.7	56	44.8	104	38.2	98	35.3	129	39.4	222	45.1	197	33.4	183	33.4	112	31.5
	95-100未満	553	26.5	20	16.0	49	18.0	54	19.4	87	26.6	138	28.0	205	34.8	151	34.8	122	34.4
	100-105未満	201	9.6	1	0.8	15	5.5	13	4.7	31	9.5	51	10.4	90	15.3	58	15.3	62	17.5
	105-110未満	40	1.9	1	0.8	2	0.7	2	0.7	4	1.2	12	2.4	19	3.2	10	3.2	13	3.7
	110-115未満	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.2	3	0.5	3	0.5	1	0.3
	115-120未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.2	1	0.3
	120fl以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	総数	2,083	100.0	125	100.0	272	100.0	278	100.0	327	100.0	492	100.0	589	100.0	462	100.0	355	100.0
平均値(fl)	93.4		90.7		90.8		90.6		93.4		94.5		95.4		95.0		95.7		
標準偏差	6.0		5.0		6.8		7.1		5.3		4.6		5.4		5.0		5.5		

(正)

第25表 平均赤血球容積(MCV)の分布(性・年齢階級別)

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	70fl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.3
	75-80未満	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.4	0	0.0	2	0.7
	80-85未満	26	1.8	2	2.7	2	1.1	4	2.6	6	2.8	6	1.7	6	1.2	6	1.7	3	1.0
	85-90未満	193	13.2	25	34.2	44	24.3	30	19.6	24	11.2	31	8.7	39	8.1	32	8.1	23	8.0
	90-95未満	509	34.9	33	45.2	81	44.8	78	51.0	79	36.7	108	30.3	130	27.0	106	29.5	77	26.7
	95-100未満	455	31.2	13	17.8	46	25.4	32	20.9	70	32.6	126	35.4	168	34.9	125	34.8	99	34.4
	100-105未満	211	14.5	0	0.0	7	3.9	9	5.9	29	13.5	64	18.0	102	21.2	71	19.8	58	20.1
	105-110未満	42	2.9	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.9	15	4.2	24	5.0	16	4.5	17	5.9
	110-115未満	13	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	2	0.6	8	1.7	0	0.0	8	2.8
	115-120未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
	120fl以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
	総数	1,459	100.0	73	100.0	181	100.0	153	100.0	215	100.0	356	100.0	481	100.0	359	100.0	288	100.0
平均値(fl)	95.2		91.4		92.8		92.8		95.0		96.1		96.8		96.3		97.0		
標準偏差	5.5		3.5		4.1		4.1		5.7		5.6		5.7		5.5		5.9		
女性	70fl未満	11	0.5	0	0.0	5	1.8	5	1.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	14	0.7	1	0.8	6	2.2	7	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	29	1.4	3	2.4	9	3.3	14	5.0	1	0.3	0	0.0	2	0.3	1	0.2	1	0.3
	80-85未満	81	3.9	7	5.6	16	5.9	19	6.8	15	4.6	6	1.2	18	3.1	11	2.4	11	3.1
	85-90未満	342	16.4	36	28.8	66	24.3	65	23.4	59	18.0	62	12.6	54	9.2	45	9.7	32	9.0
	90-95未満	806	38.7	56	44.8	104	38.2	98	35.3	129	39.4	222	45.1	197	33.4	183	39.6	112	31.5
	95-100未満	553	26.5	20	16.0	49	18.0	54	19.4	87	26.6	138	28.0	205	34.8	151	32.7	122	34.4
	100-105未満	201	9.6	1	0.8	15	5.5	13	4.7	31	9.5	51	10.4	90	15.3	58	12.6	62	17.5
	105-110未満	40	1.9	1	0.8	2	0.7	2	0.7	4	1.2	12	2.4	19	3.2	10	2.2	13	3.7
	110-115未満	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.2	3	0.5	3	0.6	1	0.3
	115-120未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	120fl以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	総数	2,083	100.0	125	100.0	272	100.0	278	100.0	327	100.0	492	100.0	589	100.0	462	100.0	355	100.0
平均値(fl)	93.4		90.7		90.8		90.6		93.4		94.5		95.4		95.0		95.7		
標準偏差	6.0		5.0		6.8		7.1		5.3		4.6		5.4		5.0		5.5		

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第26表 平均赤血球血色素量(MCH)の分布(性・年齢階級別)

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	20pg未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	20-25未満	8	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	3	0.8	3	0.6	2	0.6	2	0.7
	25-27未満	20	1.4	0	0.0	0	0.0	3	2.0	1	0.5	6	1.7	10	2.1	9	2.5	6	2.1
	27-29未満	99	6.8	7	9.6	21	11.6	9	5.9	15	7.0	15	4.2	32	6.7	18	5.0	20	6.9
	29-31未満	526	36.1	43	58.9	97	53.6	83	54.2	71	33.0	102	28.7	130	27.0	102	28.4	79	27.4
	31-33未満	621	42.6	21	28.8	57	31.5	51	33.3	94	43.7	178	50.0	220	45.7	176	49.0	126	43.8
	33-35未満	161	11.0	2	2.7	6	3.3	7	4.6	28	13.0	40	11.2	78	16.2	42	11.7	52	18.1
	35-40未満	22	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.9	12	3.4	6	1.2	9	2.5	2	0.7
	40pg以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
	総数	1,459	100.0	73	100.0	181	100.0	153	100.0	215	100.0	356	100.0	481	100.0	359	100.0	288	100.0
平均値(pg)	31.1		30.4		30.4		30.6		31.3		31.4		31.4		31.4		31.3		
標準偏差	1.8		1.1		1.2		30.6		1.9		1.9		2.1		2.0		2.0		
女性	20pg未満	10	0.5	1	0.8	4	1.5	4	1.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	66	3.2	2	1.6	18	6.6	26	9.4	7	2.1	2	0.4	11	1.9	6	1.3	6	1.7
	25-27未満	79	3.8	8	6.4	18	6.6	20	7.2	13	4.0	5	1.0	15	2.5	7	1.5	11	3.1
	27-29未満	299	14.4	32	25.6	60	22.1	42	15.1	54	16.5	61	12.4	50	8.5	42	9.1	33	9.3
	29-31未満	1,050	50.4	68	54.4	127	46.7	128	46.0	164	50.2	283	57.5	280	47.5	254	55.0	156	43.9
	31-33未満	516	24.8	13	10.4	40	14.7	50	18.0	81	24.8	123	25.0	209	35.5	136	29.4	131	36.9
	33-35未満	58	2.8	1	0.8	5	1.8	7	2.5	6	1.8	16	3.3	23	3.9	16	3.5	17	4.8
	35-40未満	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	2	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.3
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	総数	2,083	100.0	125	100.0	272	100.0	278	100.0	327	100.0	492	100.0	589	100.0	462	100.0	355	100.0
平均値(pg)	29.9		29.3		29.0		29.0		29.9		30.3		30.4		30.3		30.5		
標準偏差	2.2		1.9		2.7		3.0		1.8		1.5		1.8		1.6		1.8		

(正)

第26表 平均赤血球血色素量(MCH)の分布(性・年齢階級別)

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	20pg未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	20-25未満	8	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	3	0.8	3	0.6	2	0.6	2	0.7
	25-27未満	20	1.4	0	0.0	0	0.0	3	2.0	1	0.5	6	1.7	10	2.1	9	2.5	6	2.1
	27-29未満	99	6.8	7	9.6	21	11.6	9	5.9	15	7.0	15	4.2	32	6.7	18	5.0	20	6.9
	29-31未満	526	36.1	43	58.9	97	53.6	83	54.2	71	33.0	102	28.7	130	27.0	102	28.4	79	27.4
	31-33未満	621	42.6	21	28.8	57	31.5	51	33.3	94	43.7	178	50.0	220	45.7	176	49.0	126	43.8
	33-35未満	161	11.0	2	2.7	6	3.3	7	4.6	28	13.0	40	11.2	78	16.2	42	11.7	52	18.1
	35-40未満	22	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.9	12	3.4	6	1.2	9	2.5	2	0.7
	40pg以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
	総数	1,459	100.0	73	100.0	181	100.0	153	100.0	215	100.0	356	100.0	481	100.0	359	100.0	288	100.0
平均値(pg)	31.1		30.4		30.4		30.6		31.3		31.4		31.4		31.4		31.3		
標準偏差	1.8		1.1		1.2		1.3		1.9		1.9		2.1		2.0		2.0		
女性	20pg未満	10	0.5	1	0.8	4	1.5	4	1.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	66	3.2	2	1.6	18	6.6	26	9.4	7	2.1	2	0.4	11	1.9	6	1.3	6	1.7
	25-27未満	79	3.8	8	6.4	18	6.6	20	7.2	13	4.0	5	1.0	15	2.5	7	1.5	11	3.1
	27-29未満	299	14.4	32	25.6	60	22.1	42	15.1	54	16.5	61	12.4	50	8.5	42	9.1	33	9.3
	29-31未満	1,050	50.4	68	54.4	127	46.7	128	46.0	164	50.2	283	57.5	280	47.5	254	55.0	156	43.9
	31-33未満	516	24.8	13	10.4	40	14.7	50	18.0	81	24.8	123	25.0	209	35.5	136	29.4	131	36.9
	33-35未満	58	2.8	1	0.8	5	1.8	7	2.5	6	1.8	16	3.3	23	3.9	16	3.5	17	4.8
	35-40未満	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	2	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.3
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	総数	2,083	100.0	125	100.0	272	100.0	278	100.0	327	100.0	492	100.0	589	100.0	462	100.0	355	100.0
平均値(pg)	29.9		29.3		29.0		29.0		29.9		30.3		30.4		30.3		30.5		
標準偏差	2.2		1.9		2.7		3.0		1.8		1.5		1.8		1.6		1.8		

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

(参考)第34表の3 血清LDL-コレステロール値(直接測定法)の分布(性・年齢階級別)

		総数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
女性	平均値(mg/dL)	119.8	31.5	105.3	115.6	130.3	129.5	118.6	124.7	117.0
	標準偏差	31.5	27.0	26.5	28.8	31.9	32.7	29.2	31.0	28.0

(正)

(参考)第34表の3 血清LDL-コレステロール値(直接測定法)の分布(性・年齢階級別)

		総数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
女性	平均値(mg/dL)	119.8	100.3	105.3	115.6	130.3	129.5	118.6	124.7	117.0
	標準偏差	31.5	27.0	26.5	28.8	31.9	32.7	29.2	31.0	28.0

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第35表の1 血清non HDL-コレステロール値の分布(性・年齢階級別)

		総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 65～74歳	(再掲) 75歳以上
女性	平均値 (mg/dL)	153.5	113.4	117.9	121.5	131.1	133.8	141.1	151.9	142.7
	標準偏差	34.3	28.9	31.1	28.3	33.2	31.4	33.8	33.5	30.3

(正)

第35表の1 血清non HDL-コレステロール値の分布(性・年齢階級別)

		総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 65～74歳	(再掲) 75歳以上
女性	平均値 (mg/dL)	142.6	113.4	121.5	133.8	153.5	156.4	145.1	151.9	142.7
	標準偏差	35.0	28.9	28.3	31.4	34.3	35.2	31.4	33.5	30.3

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第36表の1 血清中性脂肪(トリグリセライド)値の分布(性・年齢階級別)

		総数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
女性	平均値(mg/dL)	122.9	75.6	98.5	107.4	128.0	140.1	134.4	141.6	81.3
	標準偏差	77.5	41.6	64.4	81.5	77.2	83.8	73.7	128.1	64.2

(正)

第36表の1 血清中性脂肪(トリグリセライド)値の分布(性・年齢階級別)

		総数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
女性	平均値(mg/dL)	122.9	75.6	98.5	107.4	128.0	140.1	134.4	141.6	128.1
	標準偏差	77.5	41.6	64.4	81.5	77.2	83.8	73.7	81.3	64.2

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第44表 血清尿酸値の分布(性・年齢階級別)

		総数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
男性	平均値(mg/dL)	5.4	5.5	5.8	5.5	5.5	5.3	5.2	5.4	5.1
	標準偏差	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4
女性	平均値(mg/dL)	4.0	3.6	3.6	3.6	4.1	4.2	4.3	4.2	4.4
	標準偏差	1.1	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2

(正)

第44表 血清尿酸値の分布(性・年齢階級別)

		総数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
男性	平均値(mg/dL)	5.8	5.9	6.2	6.0	6.0	5.8	5.6	5.8	5.5
	標準偏差	1.3	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3
女性	平均値(mg/dL)	4.5	4.1	4.0	4.1	4.5	4.6	4.7	4.6	4.8
	標準偏差	1.1	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.2	1.1	1.2

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第46表の1 腹囲区分別、血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを有する割合(性・年齢階級別)

	腹囲	総数		リスク保有数								
				0		1つ		2つ		3つ		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	20～29歳	<85cm(男)/90cm(女)	171	100.0	153	89.5	16	9.4	2	1.2	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	26	100.0	12	46.2	10	38.5	4	15.4	0	0.0
	30～39歳	<85cm(男)/90cm(女)	347	100.0	275	79.3	63	18.2	9	2.6	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	101	100.0	41	40.6	39	38.6	19	18.8	2	2.0
	40～49歳	<85cm(男)/90cm(女)	313	100.0	213	68.1	82	26.2	16	5.1	2	0.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	117	100.0	34	29.1	55	47.0	23	19.7	5	4.3
	50～59歳	<85cm(男)/90cm(女)	367	100.0	150	40.9	154	42.0	57	15.5	6	1.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	175	100.0	13	7.4	79	45.1	60	34.3	23	13.1
	60～69歳	<85cm(男)/90cm(女)	505	100.0	109	21.6	226	44.8	123	24.4	47	9.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	342	100.0	13	3.8	131	38.3	128	37.4	70	20.5
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	606	100.0	48	7.9	284	46.9	204	33.7	70	11.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	466	100.0	18	3.9	147	31.5	183	39.3	118	25.3
	総数	<85cm(男)/90cm(女)	2,309	100.0	948	41.1	825	35.7	411	17.8	125	5.4
		≥85cm(男)/90cm(女)	1,227	100.0	131	10.7	461	37.6	417	34.0	218	17.8
	(再掲) 40～74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,417	100.0	494	34.9	574	40.5	271	19.1	78	5.5
≥85cm(男)/90cm(女)		830	100.0	73	8.8	332	40.0	277	33.4	148	17.8	
(再掲) 65～74歳	<85cm(男)/90cm(女)	452	100.0	55	12.2	215	47.6	128	28.3	54	11.9	
	≥85cm(男)/90cm(女)	369	100.0	19	5.1	130	35.2	132	35.8	88	23.8	
(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	374	100.0	26	7.0	172	46.0	129	34.5	47	12.6	
	≥85cm(男)/90cm(女)	270	100.0	5	1.9	80	29.6	117	43.3	68	25.2	
男性	20～29歳	<85cm	55	100.0	45	81.8	8	14.5	2	3.6	0	0.0
		≥85cm	18	100.0	6	33.3	10	55.6	2	11.1	0	0.0
	30～39歳	<85cm	100	100.0	66	66.0	28	28.0	6	6.0	0	0.0
		≥85cm	81	100.0	26	32.1	37	45.7	17	21.0	1	1.2
	40～49歳	<85cm	71	100.0	38	53.5	25	35.2	7	9.9	1	1.4
		≥85cm	82	100.0	25	30.5	38	46.3	16	19.5	3	3.7
	50～59歳	<85cm	99	100.0	27	27.3	50	50.5	21	21.2	1	1.0
		≥85cm	116	100.0	9	7.8	54	46.6	37	31.9	16	13.8
	60～69歳	<85cm	133	100.0	28	21.1	65	48.9	28	21.1	12	9.0
		≥85cm	223	100.0	4	1.8	89	39.9	84	37.7	46	20.6
	70歳以上	<85cm	188	100.0	13	6.9	84	44.7	65	34.6	26	13.8
		≥85cm	294	100.0	11	3.7	84	28.6	115	39.1	84	28.6
	総数	<85cm(男)/90cm(女)	646	100.0	217	33.6	260	40.2	129	20.0	40	6.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	814	100.0	81	10.0	312	38.3	271	33.3	150	18.4
	(再掲) 40～74歳	<85cm	374	100.0	97	25.9	171	45.7	83	22.2	23	6.1
≥85cm		542	100.0	46	8.5	222	41.0	174	32.1	100	18.5	
(再掲) 65～74歳	<85cm	128	100.0	15	11.7	59	46.1	36	28.1	18	14.1	
	≥85cm	229	100.0	9	3.9	80	34.9	80	34.9	60	26.2	
(再掲) 75歳以上	<85cm	117	100.0	9	7.7	53	45.3	38	32.5	17	14.5	
	≥85cm	173	100.0	3	1.7	43	24.9	78	45.1	49	28.3	
女性	20～29歳	<90cm	116	100.0	108	93.1	8	6.9	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	8	100.0	6	75.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0
	30～39歳	<90cm	247	100.0	209	84.6	35	14.2	3	1.2	0	0.0
		≥90cm	20	100.0	15	75.0	2	10.0	2	10.0	1	5.0
	40～49歳	<90cm	242	100.0	175	72.3	57	23.6	9	3.7	1	0.4
		≥90cm	35	100.0	9	25.7	17	48.6	7	20.0	2	5.7
	50～59歳	<90cm	268	100.0	123	45.9	104	38.8	36	13.4	5	1.9
		≥90cm	59	100.0	4	6.8	25	42.4	23	39.0	7	11.9
	60～69歳	<90cm	372	100.0	81	21.8	161	43.3	95	25.5	35	9.4
		≥90cm	119	100.0	9	7.6	42	35.3	44	37.0	24	20.2
	70歳以上	<90cm	418	100.0	35	8.4	200	47.8	139	33.3	44	10.5
		≥90cm	172	100.0	7	4.1	63	36.6	68	39.5	34	19.8
	総数	<85cm(男)/90cm(女)	1,663	100.0	731	44.0	565	34.0	282	17.0	85	5.1
		≥85cm(男)/90cm(女)	413	100.0	50	12.1	149	36.1	146	35.4	68	16.5
	(再掲) 40～74歳	<90cm	1,043	100.0	397	38.1	403	38.6	188	18.0	55	5.3
≥90cm		288	100.0	27	9.4	110	38.2	103	35.8	48	16.7	
(再掲) 65～74歳	<90cm	324	100.0	40	12.3	156	48.1	92	28.4	36	11.1	
	≥90cm	140	100.0	10	7.1	50	35.7	52	37.1	28	20.0	
(再掲) 75歳以上	<90cm	257	100.0	17	6.6	119	46.3	91	35.4	30	11.7	
	≥90cm	97	100.0	2	2.1	37	38.1	39	40.2	19	19.6	

注)妊婦除外、ヘモグロビンA1c≥5.5%の場合。リスクの項目は基準はp.12参照

(正)

第46表の1 腹囲区分別、血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを有する割合(性・年齢階級別)

	腹囲	総数		リスク保有数								
				0		1つ		2つ		3つ		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	20～29歳	<85cm(男)/90cm(女)	170	100.0	152	89.4	16	9.4	2	1.2	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	275	100.0	11	4.0	10	40.0	4	16.0	0	0.0
	30～39歳	<85cm(男)/90cm(女)	342	100.0	270	78.9	63	18.4	9	2.6	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	98	100.0	38	38.8	39	39.8	19	19.4	2	2.0
	40～49歳	<85cm(男)/90cm(女)	313	100.0	213	68.1	82	26.2	16	5.1	2	0.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	117	100.0	34	29.1	55	47.0	23	19.7	5	4.3
	50～59歳	<85cm(男)/90cm(女)	367	100.0	150	40.9	154	42.0	57	15.5	6	1.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	175	100.0	13	7.4	79	45.1	60	34.3	23	13.1
	60～69歳	<85cm(男)/90cm(女)	505	100.0	109	21.6	226	44.8	123	24.4	47	9.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	342	100.0	13	3.8	131	38.3	128	37.4	70	20.5
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	606	100.0	48	7.9	284	46.9	204	33.7	70	11.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	466	100.0	18	3.9	147	31.5	183	39.3	118	25.3
	総数	<85cm(男)/90cm(女)	2,303	100.0	948	41.2	825	35.8	411	17.8	125	5.4
		≥85cm(男)/90cm(女)	1,223	100.0	131	10.7	461	37.7	417	34.1	218	17.8
	(再掲) 40～74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,417	100.0	494	34.9	574	40.5	271	19.1	78	5.5
≥85cm(男)/90cm(女)		830	100.0	73	8.8	332	40.0	277	33.4	148	17.8	
(再掲) 65～74歳	<85cm(男)/90cm(女)	452	100.0	55	12.2	215	47.6	128	28.3	54	11.9	
	≥85cm(男)/90cm(女)	369	100.0	19	5.1	130	35.2	132	35.8	88	23.8	
(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	374	100.0	26	7.0	172	46.0	129	34.5	47	12.6	
	≥85cm(男)/90cm(女)	270	100.0	5	1.9	80	29.6	117	43.3	68	25.2	
男性	20～29歳	<85cm	55	100.0	45	81.8	8	14.5	2	3.6	0	0.0
		≥85cm	18	100.0	6	33.3	10	55.6	2	11.1	0	0.0
	30～39歳	<85cm	100	100.0	66	66.0	28	28.0	6	6.0	0	0.0
		≥85cm	81	100.0	26	32.1	37	45.7	17	21.0	1	1.2
	40～49歳	<85cm	71	100.0	38	53.5	25	35.2	7	9.9	1	1.4
		≥85cm	82	100.0	25	30.5	38	46.3	16	19.5	3	3.7
	50～59歳	<85cm	99	100.0	27	27.3	50	50.5	21	21.2	1	1.0
		≥85cm	116	100.0	9	7.8	54	46.6	37	31.9	16	13.8
	60～69歳	<85cm	133	100.0	28	21.1	65	48.9	28	21.1	12	9.0
		≥85cm	223	100.0	4	1.8	89	39.9	84	37.7	46	20.6
	70歳以上	<85cm	188	100.0	13	6.9	84	44.7	65	34.6	26	13.8
		≥85cm	294	100.0	11	3.7	84	28.6	115	39.1	84	28.6
	総数	<85cm(男)/90cm(女)	646	100.0	217	33.6	260	40.2	129	20.0	40	6.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	814	100.0	81	10.0	312	38.3	271	33.3	150	18.4
	(再掲) 40～74歳	<85cm	374	100.0	97	25.9	171	45.7	83	22.2	23	6.1
≥85cm		542	100.0	46	8.5	222	41.0	174	32.1	100	18.5	

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第46表の2 腹囲区別、血中脂質、血圧、血糖のリスク保有状況【すべての組み合わせ①血中脂質②血圧③血糖】(性・年齢階級別)

年齢(歳)	腹囲	総数		リスク保有組み合わせ																
		人数	%	①有②有③有		①有②有③無		①無②有③有		①有②無③有		①無②有③無		①有②無③無		①無②無③有		①無②無③無		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	171	100.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	4	2.3	11	6.4	1	0.6	153	89.5
		≥85cm(男)/90cm(女)	26	100.0	0	0.0	2	7.7	2	7.7	0	0.0	3	11.5	7	26.9	0	0.0	12	46.2
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	347	100.0	0	0.0	2	0.6	6	1.7	1	0.3	9	2.6	47	13.5	7	2.0	275	79.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	101	100.0	2	2.0	8	7.9	9	8.9	2	2.0	10	9.9	27	26.7	2	2.0	41	40.6
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	313	100.0	2	0.6	9	2.9	6	1.9	1	0.3	5	1.6	60	19.2	17	5.4	213	68.1
		≥85cm(男)/90cm(女)	117	100.0	5	4.3	14	12.0	6	5.1	3	2.6	7	6.0	44	37.6	4	3.4	34	29.1
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	367	100.0	6	1.6	19	5.2	34	9.3	4	1.1	6	1.6	129	35.1	19	5.2	150	40.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	175	100.0	23	13.1	17	9.7	39	22.3	4	2.3	6	3.4	64	36.6	9	5.1	13	7.4
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	505	100.0	47	9.3	46	9.1	69	13.7	8	1.6	14	2.8	186	36.8	26	5.1	109	21.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	342	100.0	70	20.5	47	13.7	77	22.5	4	1.2	5	1.5	119	34.8	7	2.0	13	3.8
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	606	100.0	70	11.6	88	14.5	110	18.2	6	1.0	20	3.3	241	39.8	23	3.8	48	7.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	466	100.0	118	25.3	73	15.7	101	21.7	9	1.9	5	1.1	132	28.3	10	2.1	18	3.9
	総数	<85cm(男)/90cm(女)	2,309	100.0	125	5.4	165	7.1	226	9.8	20	0.9	58	2.5	674	29.2	93	4.0	948	41.1
		≥85cm(男)/90cm(女)	1,227	100.0	218	17.8	161	13.1	234	19.1	22	1.8	36	2.9	393	32.0	32	2.6	131	10.7
	(再掲)40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,417	100.0	78	5.5	106	7.5	148	10.4	17	1.2	36	2.5	469	33.1	69	4.9	494	34.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	830	100.0	148	17.8	102	12.3	159	19.2	16	1.9	20	2.4	287	34.6	25	3.0	73	8.8
(再掲)65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	452	100.0	54	11.9	53	11.7	67	14.8	8	1.8	17	3.8	177	39.2	21	4.6	55	12.2	
	≥85cm(男)/90cm(女)	369	100.0	88	23.8	44	11.9	81	22.0	7	1.9	4	1.1	118	32.0	8	2.2	19	5.1	
(再掲)75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	374	100.0	47	12.6	56	15.0	71	19.0	2	0.5	9	2.4	147	39.3	16	4.3	26	7.0	
	≥85cm(男)/90cm(女)	270	100.0	68	25.2	49	18.1	64	23.7	4	1.5	3	1.1	72	26.7	5	1.9	5	1.9	
女性	20-29歳	<90cm	116	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	5	4.3	1	0.9	108	93.1
		≥90cm	8	100.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	75.0
	30-39歳	<90cm	247	100.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	4	1.6	25	10.1	6	2.4	209	84.6
		≥90cm	20	100.0	1	5.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	15	75.0
	40-49歳	<90cm	242	100.0	1	0.4	5	2.1	4	1.7	0	0.0	1	0.4	41	16.9	15	6.2	175	72.3
		≥90cm	35	100.0	2	5.7	5	14.3	2	5.7	0	0.0	1	2.9	14	40.0	2	5.7	9	25.7
	50-59歳	<90cm	268	100.0	5	1.9	12	4.5	21	7.8	3	1.1	4	1.5	86	32.1	14	5.2	123	45.9
		≥90cm	59	100.0	7	11.9	3	5.1	20	33.9	0	0.0	2	3.4	20	33.9	3	5.1	4	6.8
	60-69歳	<90cm	372	100.0	35	9.4	38	10.2	53	14.2	4	1.1	10	2.7	132	35.5	19	5.1	81	21.8
		≥90cm	119	100.0	24	20.2	17	14.3	26	21.8	1	0.8	2	1.7	38	31.9	2	1.7	9	7.6
	70歳以上	<90cm	418	100.0	44	10.5	67	16.0	69	16.5	3	0.7	16	3.8	173	41.4	11	2.6	35	8.4
		≥90cm	172	100.0	34	19.8	27	15.7	36	20.9	5	2.9	3	1.7	56	32.6	4	2.3	7	4.1
	総数	<85cm(男)/90cm(女)	1,663	100.0	85	5.1	122	7.3	150	9.0	10	0.6	37	2.2	462	27.8	66	4.0	731	44.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	413	100.0	68	16.5	52	12.6	88	21.3	6	1.5	10	2.4	128	31.0	11	2.7	50	12.1
	(再掲)40-74歳	<90cm	1,043	100.0	55	5.3	76	7.3	103	9.9	9	0.9	24	2.3	327	31.4	52	5.0	397	38.1
		≥90cm	288	100.0	48	16.7	36	12.5	62	21.5	5	1.7	6	2.1	95	33.0	9	3.1	27	9.4
(再掲)65-74歳	<90cm	452	100.0	54	11.9	53	11.7	67	14.8	8	1.8	17	3.8	177	39.2	21	4.6	55	12.2	
	≥90cm	369	100.0	88	23.8	44	11.9	81	22.0	7	1.9	4	1.1	118	32.0	8	2.2	19	5.1	
(再掲)75歳以上	<90cm	374	100.0	47	12.6	56	15.0	71	19.0	2	0.5	9	2.4	147	39.3	16	4.3	26	7.0	
	≥90cm	270	100.0	68	25.2	49	18.1	64	23.7	4	1.5	3	1.1	72	26.7	5	1.9	5	1.9	

注) 妊婦除外、ヘモグロビンA1c≧5.5%の場合、リスクの項目は基準はp.18参照

(正)

第46表の2 腹囲区別、血中脂質、血圧、血糖のリスク保有状況【すべての組み合わせ①血中脂質②血圧③血糖】(性・年齢階級別)

年齢(歳)	腹囲	総数		リスク保有組み合わせ																
		人数	%	①有②有③有		①有②有③無		①無②有③有		①有②無③有		①無②有③無		①有②無③無		①無②無③有		①無②無③無		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	170	100.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	4	2.4	11	6.5	1	0.6	152	89.4
		≥85cm(男)/90cm(女)	25	100.0	0	0.0	2	8.0	2	8.0	0	0.0	3	12.0	7	28.0	0	0.0	11	44.0
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	342	100.0	0	0.0	2	0.6	6	1.8	1	0.3	9	2.6	47	13.7	7	2.0	270	78.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	98	100.0	2	2.0	8	8.2	9	9.2	2	2.0	10	10.2	27	27.6	2	2.0	38	38.8
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	313	100.0	2	0.6	9	2.9	6	1.9	1	0.3	5	1.6	60	19.2	17	5.4	213	68.1
		≥85cm(男)/90cm(女)	117	100.0	5	4.3	14	12.0	6	5.1	3	2.6	7	6.0	44	37.6	4	3.4	34	29.1
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	367	100.0	6	1.6	19	5.2	34	9.3	4	1.1	6	1.6	129	35.1	19	5.2	150	40.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	175	100.0	23	13.1	17	9.7	39	22.3	4	2.3	6	3.4	64	36.6	9	5.1	13	7.4
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	505	100.0	47	9.3	46	9.1	69	13.7	8	1.6	14	2.8	186	36.8	26	5.1	109	21.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	342	100.0	70	20.5	47	13.7	77	22.5	4	1.2	5	1.5	119	34.8	7	2.0	13	3.8
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	606	100.0	70	11.6	88	14.5	110	18.2	6	1.0	20	3.3	241	39.8	23	3.8	48	7.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	466	100.0	118	25.3	73	15.7	101	21.7	9	1.9	5	1.1	132	28.3	10	2.1	18	3.9
	総数	<85cm(男)/90cm(女)	2,303	100.0	125	5.4	165	7.2	226	9.8	20	0.9	58	2.5	674	29.3	93	4.0	942	40.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	1,223	100.0	218	17.8	161	13.2	234	19.1	22	1.8	36	2.9	393	32.1	32	2.6	127	10.4
	(再掲)40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,417	100.0	78	5.5	106	7.5	148	10.4	17	1.2	36	2.5	469	33.1	69	4.9	494	34.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	830	100.0	148	17.8	102	12.3	159	19.2	16	1.9	20	2.4	287	34.6	25	3.0	73	8.8
(再掲)65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	452	100.0	54	11.9	53	11.7	67	14.8	8	1.8	17	3.8	177	39.2	21	4.6	55	12.2	
	≥85cm(男)/90cm(女)	369	100.0	88	23.8	44	11.9	81	22.0	7	1.9	4	1.1	118	32.0	8	2.2	19	5.1	
(再掲)75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	374	100.0	47	12.6	56	15.0	71	19.0	2	0.5	9	2.4	147	39.3	16	4.3	26	7.0	
	≥85cm(男)/90cm(女)	270	100.0	68	25.2	49	18.1	64	23.7	4										

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第47表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	糖尿病が強く疑われる人	384	10.9	1	0.5	8	1.8	15	3.5	41	7.6	141	16.8	178	16.9	264	11.9	141	17.4	111	17.5
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者*	196	51.0	1	100.0	1	12.5	7	46.7	20	48.8	72	51.1	95	53.4	133	50.4	84	59.6	61	55.0
	糖尿病の可能性を否定できない人	569	16.2	3	1.5	22	4.9	28	6.6	96	17.9	165	19.6	255	24.1	388	17.4	188	23.2	156	24.6
	上記以外	2,556	72.8	195	98.0	419	93.3	384	89.9	400	74.5	535	63.6	623	59.0	1,574	70.7	482	59.4	368	58.0
	総数	3,509	100.0	199	100.0	449	100.0	427	100.0	537	100.0	841	100.0	1,056	100.0	2,226	100.0	811	100.0	635	100.0
男性	糖尿病が強く疑われる人	226	15.7	0	0.0	4	2.2	10	6.7	23	10.8	80	22.7	109	23.0	153	16.9	86	24.3	69	24.3
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者*	123	54.4	0	0.0	1	25.0	4	40.0	12	52.2	47	58.8	59	54.1	82	53.6	53	61.6	40	58.0
	糖尿病の可能性を否定できない人	250	17.3	1	1.4	13	7.2	7	4.7	41	19.2	62	17.6	126	26.6	159	17.6	78	22.0	77	27.1
	上記以外	966	67.0	72	98.6	163	90.6	133	88.7	149	70.0	211	59.8	238	50.3	593	65.5	190	53.7	138	48.6
	総数	1,442	100.0	73	100.0	180	100.0	150	100.0	213	100.0	353	100.0	473	100.0	905	100.0	354	100.0	284	100.0
女性	糖尿病が強く疑われる人	158	7.6	1	0.8	4	1.5	5	1.8	18	5.6	61	12.5	69	11.8	111	8.4	55	12.0	42	12.0
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者*	73	46.2	1	100.0	0	0.0	3	60.0	8	44.4	25	41.0	36	52.2	51	45.9	31	56.4	21	50.0
	糖尿病の可能性を否定できない人	319	15.4	2	1.6	9	3.3	21	7.6	55	17.0	103	21.1	129	22.1	229	17.3	110	24.1	79	22.5
	上記以外	1,590	76.9	123	97.6	256	95.2	251	90.6	251	77.5	324	66.4	385	66.0	981	74.3	292	63.9	230	65.5
	総数	2,067	100.0	126	100.0	269	100.0	277	100.0	324	100.0	488	100.0	583	100.0	1,321	100.0	457	100.0	351	100.0

(正)

第47表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	糖尿病が強く疑われる人	384	10.9	1	0.5	8	1.8	15	3.5	41	7.6	141	16.8	178	16.9	264	11.9	141	17.4	111	17.5
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者*	201	52.3	1	100.0	1	12.5	8	53.3	20	48.8	74	52.5	97	54.5	136	51.5	86	61.0	63	56.8
	糖尿病の可能性を否定できない人	366	10.4	2	1.0	12	2.7	19	4.4	53	9.9	107	12.7	173	16.4	248	11.1	118	14.5	104	16.4
	上記以外	2,758	78.6	196	98.5	429	95.5	393	92.0	443	82.5	593	70.5	704	66.7	1,714	77.0	552	68.1	419	66.1
	総数	3,508	100.0	199	100.0	449	100.0	427	100.0	537	100.0	841	100.0	1,055	100.0	2,226	100.0	811	100.0	634	100.0
男性	糖尿病が強く疑われる人	226	15.7	0	0.0	4	2.2	10	6.7	23	10.8	80	22.7	109	23.1	153	16.9	86	24.3	69	24.4
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者*	124	54.9	0	0.0	1	25.0	4	40.0	12	52.2	48	60.0	59	54.1	83	54.2	54	62.8	40	58.0
	糖尿病の可能性を否定できない人	166	11.5	1	1.4	7	3.9	6	4.0	22	10.3	39	11.0	91	19.3	106	11.7	56	15.8	52	18.4
	上記以外	1,049	72.8	72	98.6	169	93.9	134	89.3	168	78.9	234	66.3	272	57.6	646	71.4	212	59.9	162	57.2
	総数	1,441	100.0	73	100.0	180	100.0	150	100.0	213	100.0	353	100.0	472	100.0	905	100.0	354	100.0	283	100.0
女性	糖尿病が強く疑われる人	158	7.6	1	0.8	4	1.5	5	1.8	18	5.6	61	12.5	69	11.8	111	8.4	55	12.0	42	12.0
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者*	77	48.7	1	100.0	0	0.0	4	80.0	8	44.4	26	42.6	38	55.1	53	47.7	32	58.2	23	54.8
	糖尿病の可能性を否定できない人	200	9.7	1	0.8	5	1.9	13	4.7	31	9.6	68	13.9	82	14.1	142	10.7	62	13.6	52	14.8
	上記以外	1,709	82.7	124	98.4	260	96.7	259	93.5	275	84.9	359	73.6	432	74.1	1,068	80.8	340	74.4	257	73.2
	総数	2,067	100.0	126	100.0	269	100.0	277	100.0	324	100.0	488	100.0	583	100.0	1,321	100.0	457	100.0	351	100.0

「平成23年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(誤)

第48表 高血圧症有病者の状況(性・年齢階級別)

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	高血圧症有病者	1,938	48.0	11	5.0	55	11.3	92	20.0	279	46.2	566	60.8	933	76.2	1,266	51.3	608	66.4	604	80.4
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	1,151	59.4	0	0.0	7	12.7	17	18.5	131	47.0	341	60.2	655	70.2	699	55.2	390	64.1	445	73.7
	正常高値血圧者	519	12.9	14	6.4	52	10.7	67	14.6	90	14.9	156	16.8	138	11.3	381	15.4	150	16.4	70	9.3
	上記以外	1,580	39.1	194	88.6	378	77.9	300	65.4	235	38.9	209	22.4	153	12.5	820	33.2	157	17.2	77	10.3
	総数	4,037	100.0	219	100.0	485	100.0	459	100.0	604	100.0	931	100.0	1,224	100.0	2,467	100.0	915	100.0	751	100.0
男性	高血圧症有病者	933	55.7	8	10.1	42	22.1	48	28.9	137	56.8	272	68.0	424	78.1	612	60.1	288	71.8	269	81.3
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	535	57.3	0	0.0	6	14.3	10	20.8	59	43.1	151	55.5	309	72.9	328	53.6	194	67.4	201	74.7
	正常高値血圧者	231	13.8	10	12.7	32	16.8	33	19.9	38	15.8	60	15.0	56	10.3	160	15.7	56	14.0	27	8.2
	上記以外	510	30.5	61	77.2	116	61.1	85	51.2	66	27.4	68	17.0	63	11.6	247	24.2	57	14.2	35	10.6
	総数	1,674	100.0	79	100.0	190	100.0	166	100.0	241	100.0	400	100.0	543	100.0	1,019	100.0	401	100.0	331	100.0
女性	高血圧症有病者	1,005	42.5	3	2.1	13	4.4	44	15.0	142	39.1	294	55.4	509	74.7	654	45.2	320	62.3	335	79.8
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	616	61.3	0	0.0	1	7.7	7	15.9	72	50.7	190	64.6	346	68.0	371	56.7	196	61.3	244	72.8
	正常高値血圧者	288	12.2	4	2.9	20	6.8	34	11.6	52	14.3	96	18.1	82	12.0	221	15.3	94	18.3	43	10.2
	上記以外	1,070	45.3	133	95.0	262	88.8	215	73.4	169	46.6	141	26.6	90	13.2	573	39.6	100	19.5	42	10.0
	総数	2,363	100.0	140	100.0	295	100.0	293	100.0	363	100.0	531	100.0	681	100.0	1,448	100.0	514	100.0	420	100.0

*「服薬者」とは、質問票で「血圧を下げる薬」の使用有と回答した者

「高血圧症有病者」の判定
収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者

(正)

第48表 高血圧症有病者の状況(性・年齢階級別)

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	高血圧症有病者	1,858	48.3	11	5.0	53	11.0	90	19.7	268	45.2	543	59.8	893	75.4	1,221	50.4	583	65.5	573	79.6
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	1,073	57.8	0	0.0	5	9.4	15	16.7	120	44.8	318	58.6	615	68.9	654	53.6	365	62.6	414	72.3
	正常高値血圧者	517	13.4	14	6.4	52	10.8	67	14.7	90	15.2	156	17.2	138	11.7	381	15.7	150	16.9	70	9.7
	上記以外	1,469	38.2	194	88.6	378	78.3	300	65.6	235	39.6	209	23.0	153	12.9	820	33.9	157	17.6	77	10.7
	総数	3,844	100.0	219	100.0	483	100.0	457	100.0	593	100.0	908	100.0	1,184	100.0	2,422	100.0	890	100.0	720	100.0
男性	高血圧症有病者	895	56.5	8	10.1	40	21.3	46	28.0	132	55.9	260	67.0	409	77.5	588	59.1	275	70.9	259	80.7
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	499	55.8	0	0.0	4	10.0	8	17.4	54	40.9	139	53.5	294	71.9	304	51.7	181	65.8	191	73.7
	正常高値血圧者	229	14.5	10	12.7	32	17.0	33	20.1	38	16.1	60	15.5	56	10.6	160	16.1	56	14.4	27	8.4
	上記以外	459	29.0	61	77.2	116	61.7	85	51.8	66	28.0	68	17.5	63	11.9	247	24.8	57	14.7	35	10.9
	総数	1,583	100.0	79	100.0	188	100.0	164	100.0	236	100.0	388	100.0	528	100.0	995	100.0	388	100.0	321	100.0
女性	高血圧症有病者	963	42.6	3	2.1	13	4.4	44	15.0	136	38.1	283	54.4	484	73.8	633	44.4	308	61.4	314	78.7
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	574	59.6	0	0.0	1	7.7	7	15.9	66	48.5	179	63.3	321	66.3	350	55.3	184	59.7	223	71.0
	正常高値血圧者	288	12.7	4	2.9	20	6.8	34	11.6	52	14.6	96	18.5	82	12.5	221	15.5	94	18.7	43	10.8
	上記以外	1,010	44.7	133	95.0	262	88.8	215	73.4	169	47.3	141	27.1	90	13.7	573	40.2	100	19.9	42	10.5
	総数	2,261	100.0	140	100.0	295	100.0	293	100.0	357	100.0	520	100.0	656	100.0	1,427	100.0	502	100.0	399	100.0

*「服薬者」とは、質問票で「血圧を下げる薬」の使用有と回答した者

「高血圧症有病者」の判定
収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者