

第2部 身体状況調査の結果

第11表 身長・体重の平均値および標準偏差—年齢階級，身長・体重別，人数，平均値，標準偏差—全国補正值，男性・女性，1歳以上〔体重は妊婦除外〕

	男 性						女 性					
	身 長(cm)			体 重(kg)			身 長(cm)			体 重(kg)		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	11,803	161.2	19.1	11,777	60.2	17.5	14,273	150.5	14.8	14,142	49.6	12.8
1 歳	114	78.8	4.3	118	10.4	1.0	100	78.7	5.3	100	10.0	1.7
2 歳	113	89.1	4.9	113	12.8	1.6	107	87.3	4.4	107	12.1	1.3
3 歳	109	95.3	4.0	109	14.2	1.5	123	95.2	5.2	125	13.8	1.5
4 歳	130	103.2	4.3	129	16.5	2.1	114	102.3	4.0	114	15.8	1.8
5 歳	111	109.5	5.5	111	18.5	2.8	131	110.7	5.4	131	18.2	2.2
6 歳	122	115.9	4.6	122	20.4	2.6	118	116.3	6.3	118	20.4	3.0
7 歳	121	121.1	4.5	121	23.4	3.5	145	121.8	5.4	145	23.4	4.2
8 歳	116	127.3	5.8	116	26.2	3.9	141	125.6	5.7	141	24.8	4.7
9 歳	128	133.1	5.3	128	29.8	5.7	138	134.0	6.2	137	29.5	5.3
10歳	130	137.5	5.9	128	32.9	5.9	126	139.0	6.2	125	32.5	6.4
11歳	121	145.0	7.8	121	37.1	7.3	125	145.7	7.8	125	37.2	7.2
12歳	111	149.9	7.1	111	42.2	9.0	131	151.1	6.3	131	43.1	8.7
13歳	123	158.8	7.7	122	45.8	7.1	100	156.4	5.6	98	45.9	7.2
14歳	111	164.1	7.0	111	51.9	9.4	97	155.3	5.0	94	47.2	5.1
15歳	107	169.2	5.7	106	57.2	7.5	100	157.3	4.9	100	49.0	6.8
16歳	82	169.4	5.8	82	58.1	8.9	77	158.3	5.7	75	49.1	8.2
17歳	104	170.0	5.3	102	61.0	10.3	78	160.8	5.7	74	53.8	7.5
18歳	76	170.6	7.8	75	61.2	12.4	68	159.0	5.7	64	50.9	6.4
19歳	54	169.8	6.1	54	62.4	9.7	47	157.7	5.2	46	47.1	5.5
20歳	76	170.9	5.2	75	64.6	10.1	68	157.8	5.6	66	51.6	6.5
21歳	84	171.9	5.2	84	64.3	10.3	71	157.9	4.8	70	51.9	10.4
22歳	63	171.5	6.3	63	65.0	9.9	72	157.4	5.1	69	51.1	8.3
23歳	66	171.6	7.6	66	64.3	10.9	77	158.2	4.8	76	51.5	7.5
24歳	62	171.2	3.9	62	64.9	11.1	78	157.7	6.2	78	50.6	7.3
25歳	78	172.1	7.2	77	67.3	9.9	62	159.6	4.8	59	54.5	10.1
26-29歳	334	171.6	5.9	333	66.5	10.7	435	157.8	5.5	401	52.0	9.3
30-39歳	1,334	171.2	5.8	1,328	69.2	12.0	1,634	158.4	5.3	1,573	53.5	8.8
40-49歳	1,403	170.9	6.0	1,399	70.5	11.0	1,751	157.9	5.0	1,738	54.7	9.1
50-59歳	1,437	168.6	5.7	1,431	68.0	10.2	1,939	156.1	5.3	1,935	55.2	9.2
60-69歳	2,273	165.5	6.1	2,268	64.7	9.3	2,778	152.8	5.3	2,775	53.2	8.6
70歳以上	2,510	162.1	6.3	2,512	61.4	9.2	3,242	148.2	6.3	3,252	50.3	8.5
(再掲)												
20歳以上	9,720	167.3	7.0	9,698	66.0	10.8	12,207	154.2	6.8	12,092	53.0	9.0
20-29歳	763	171.6	5.9	760	65.7	10.5	863	157.9	5.4	819	51.8	8.8
60-64歳	1,217	166.5	5.7	1,215	65.1	9.5	1,484	153.5	5.3	1,483	53.5	8.9
65-69歳	1,056	164.4	6.3	1,053	64.2	9.2	1,294	152.1	5.2	1,292	52.8	8.2
70-74歳	1,012	163.3	5.7	1,012	62.4	9.0	1,222	149.9	5.4	1,222	51.8	8.0
75-79歳	812	162.5	5.9	811	62.3	8.7	962	148.9	5.7	961	51.3	8.5
80歳以上	686	159.8	6.7	689	58.7	9.6	1,058	145.3	6.8	1,069	47.3	8.6

注)平均値，標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。
体重は妊婦除外。

(24年)

第12表 BMIの平均値および標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—
全国補正值，男性・女性，15歳以上〔妊婦除外〕(kg/m²)

	男 性			女 性		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	10,107	23.4	3.3	12,432	22.2	3.6
15-19歳	419	20.7	2.8	359	19.9	2.6
20-29歳	759	22.3	3.4	819	20.8	3.3
30-39歳	1,328	23.6	3.8	1,573	21.3	3.4
40-49歳	1,398	24.1	3.5	1,737	21.9	3.5
50-59歳	1,431	23.9	3.1	1,935	22.6	3.6
60-69歳	2,266	23.6	3.0	2,774	22.8	3.5
70歳以上	2,506	23.3	3.1	3,235	22.9	3.5
(再掲)						
20歳以上	9,688	23.6	3.3	12,073	22.3	3.6
20-69歳	7,182	23.6	3.4	8,838	22.1	3.6
40-69歳	5,095	23.8	3.2	6,446	22.5	3.6
65-69歳	1,051	23.7	2.9	1,292	22.8	3.4
70-74歳	1,010	23.4	3.0	1,221	23.1	3.4
75-79歳	811	23.6	2.8	959	23.1	3.7
80-84歳	437	23.3	3.5	617	22.8	3.4
80歳以上	685	23.0	3.4	1,055	22.4	3.5
85歳以上	248	22.5	3.3	438	21.8	3.7

注)平均値，標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。
妊婦除外。

(24年)

第13表 BMIの状況—年齢階級, 肥満度 (BMI) 別, 人数, 割合—全国補正值, 総数・男性・女性, 15歳以上〔妊婦除外〕

		総数		やせ		普通		肥満		(再掲) 20以下		(再掲) 25以上30未満		(再掲) 30以上		
				18.5未満		18.5以上25未満		25以上		人数		人数		人数		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数
総数	総数	22,539	100.0	1,870	8.7	15,224	68.3	5,445	23.0	4,772	22.4	4,600	19.5	845	3.5	
	15-19歳	778	100.0	158	22.1	565	72.7	55	5.2	371	54.2	43	4.2	12	0.9	
	20-29歳	1,578	100.0	238	14.9	1,116	73.8	224	11.3	575	37.0	158	7.6	66	3.7	
	30-39歳	2,901	100.0	328	11.1	2,003	69.5	570	19.4	817	28.8	424	15.1	146	4.3	
	40-49歳	3,135	100.0	241	7.8	2,102	66.7	792	25.5	698	22.5	639	20.4	153	5.1	
	50-59歳	3,366	100.0	197	5.9	2,282	68.2	887	25.9	558	17.5	752	22.3	135	3.5	
	60-69歳	5,040	100.0	276	6.3	3,386	67.8	1,378	25.9	773	16.6	1,216	23.0	162	2.9	
	70歳以上	5,741	100.0	432	7.7	3,770	66.5	1,539	25.8	980	17.2	1,368	23.0	171	2.8	
	(再掲)															
	20歳以上	21,761	100.0	1,712	8.2	14,659	68.1	5,390	23.7	4,401	21.2	4,557	20.1	833	3.6	
	20-69歳	16,020	100.0	1,280	8.3	10,889	68.6	3,851	23.1	3,421	22.5	3,189	19.2	662	3.9	
	40-69歳	11,541	100.0	714	6.6	7,770	67.6	3,057	25.8	2,029	18.6	2,607	22.0	450	3.8	
	65-69歳	2,343	100.0	116	5.4	1,575	68.0	652	26.7	328	15.0	583	24.3	69	2.3	
	70-74歳	2,231	100.0	135	6.2	1,459	67.3	637	26.4	326	14.9	556	23.5	81	2.9	
	75-79歳	1,770	100.0	107	6.3	1,169	67.5	494	26.2	262	14.9	437	22.9	57	3.3	
80-84歳	1,054	100.0	88	8.0	688	65.0	278	27.1	193	18.9	256	24.5	22	2.6		
80歳以上	1,740	100.0	190	11.3	1,142	64.4	408	24.4	392	22.9	375	22.3	33	2.1		
85歳以上	686	100.0	102	16.4	454	63.5	130	20.1	199	29.2	119	18.8	11	1.0		
男性	総数	10,107	100.0	477	4.7	6,707	67.3	2,923	28.0	1,385	14.1	2,528	24.3	395	3.7	
	15-19歳	419	100.0	75	16.0	312	78.5	32	5.4	189	50.0	23	4.1	9	1.4	
	20-29歳	759	100.0	58	7.2	547	77.5	154	15.2	188	25.0	113	11.3	41	4.0	
	30-39歳	1,328	100.0	56	4.1	901	67.9	371	28.0	189	13.3	282	21.9	89	6.1	
	40-49歳	1,398	100.0	46	3.8	834	59.5	518	36.6	142	10.5	423	30.0	95	6.6	
	50-59歳	1,431	100.0	36	2.3	935	66.1	460	31.6	124	8.4	409	28.0	51	3.6	
	60-69歳	2,266	100.0	72	3.2	1,512	67.1	682	29.6	237	10.8	633	27.8	49	1.9	
	70歳以上	2,506	100.0	134	5.5	1,666	67.2	706	27.3	316	12.6	645	25.0	61	2.3	
	(再掲)															
	20歳以上	9,688	100.0	402	4.2	6,395	66.8	2,891	29.1	1,196	12.4	2,505	25.3	386	3.8	
	20-69歳	7,182	100.0	268	3.8	4,729	66.6	2,185	29.6	880	12.3	1,860	25.4	325	4.3	
	40-69歳	5,095	100.0	154	3.1	3,281	64.6	1,660	32.3	503	10.1	1,465	28.5	195	3.8	
	65-69歳	1,051	100.0	34	3.1	711	66.4	306	30.5	106	9.7	287	28.9	19	1.6	
	70-74歳	1,010	100.0	45	5.2	648	66.9	317	27.9	104	11.2	286	25.7	31	2.1	
	75-79歳	811	100.0	28	3.1	556	69.5	227	27.4	91	10.3	210	24.9	17	2.5	
80-84歳	437	100.0	35	7.6	291	64.1	111	28.4	64	15.5	101	25.2	10	3.2		
80歳以上	685	100.0	61	8.8	462	65.0	162	26.3	121	17.4	149	23.9	13	2.4		
85歳以上	248	100.0	26	11.2	171	66.8	51	22.0	57	21.3	48	21.3	3	1.0		
女性	総数	12,432	100.0	1,393	12.0	8,517	69.1	2,522	18.9	3,387	29.4	2,072	15.6	450	3.3	
	15-19歳	359	100.0	83	29.5	253	65.7	23	4.9	182	59.2	20	4.5	3	0.4	
	20-29歳	819	100.0	180	21.8	569	70.4	70	7.8	387	47.7	45	4.3	25	3.4	
	30-39歳	1,573	100.0	272	17.1	1,102	70.8	199	12.1	628	42.0	142	9.3	57	2.8	
	40-49歳	1,737	100.0	195	11.1	1,268	72.8	274	16.2	556	32.5	216	12.3	58	3.8	
	50-59歳	1,935	100.0	161	8.6	1,347	69.8	427	21.6	434	24.3	343	18.1	84	3.5	
	60-69歳	2,774	100.0	204	8.9	1,874	68.3	696	22.8	536	21.4	583	19.0	113	3.9	
	70歳以上	3,235	100.0	298	9.5	2,104	66.0	833	24.6	664	20.9	723	21.4	110	3.2	
	(再掲)															
	20歳以上	12,073	100.0	1,310	11.4	8,264	69.2	2,499	19.4	3,205	28.4	2,052	15.9	447	3.4	
	20-69歳	8,838	100.0	1,012	12.1	6,160	70.2	1,666	17.7	2,541	30.9	1,329	14.1	337	3.5	
	40-69歳	6,446	100.0	560	9.4	4,489	70.1	1,397	20.5	1,526	25.5	1,142	16.8	255	3.7	
	65-69歳	1,292	100.0	82	7.3	864	69.3	346	23.3	222	19.6	296	20.3	50	3.0	
	70-74歳	1,221	100.0	90	7.1	811	67.7	320	25.2	222	18.0	270	21.6	50	3.6	
	75-79歳	959	100.0	79	9.0	613	65.8	267	25.3	171	18.7	227	21.3	40	4.0	
80-84歳	617	100.0	53	8.3	397	65.7	167	26.0	129	21.8	155	24.0	12	2.0		
80歳以上	1,055	100.0	129	13.0	680	64.0	246	23.0	271	26.8	226	21.1	20	1.9		
85歳以上	438	100.0	76	19.3	283	61.6	79	19.1	142	33.5	71	17.4	8	1.7		

注) 割合は全国補正值であり, 単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
妊婦除外。

BMIによる肥満の判定はp.14参照。

(24年)

第14表 学校保健統計調査方式による肥満区分—学校保健統計調査方式による肥満区分, 年齢階級別, 人数, 割合—全国補正值, 総数・男性・女性, 6—14歳

		総数		6-8歳		9-11歳		12-14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	2,192	100.0	761	100.0	764	100.0	667	100.0
	-30%以下	4	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.0
	-30%超～-20%以下	66	3.2	24	3.1	23	3.2	19	3.4
	-20%超～-10%以下	435	21.6	111	16.0	158	23.7	166	25.3
	-10%超～0%未満	835	38.4	329	43.5	261	33.7	245	38.4
	0%以上～+10%未満	498	22.4	190	24.7	181	23.9	127	18.1
	+10%以上～+20%未満	193	8.4	67	8.9	67	8.4	59	7.9
	+20%以上～+30%未満	100	3.6	27	2.6	43	4.0	30	4.0
	+30%以上～+40%未満	37	1.5	7	0.9	19	2.0	11	1.5
	+40%以上～+50%未満	9	0.3	3	0.2	3	0.3	3	0.4
	+50%以上	15	0.5	2	0.1	7	0.7	6	0.9
男性	総数	1,080	100.0	359	100.0	377	100.0	344	100.0
	-30%以下	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1
	-30%超～-20%以下	28	2.6	7	1.2	9	2.9	12	3.7
	-20%超～-10%以下	202	20.2	52	14.5	73	21.7	77	24.2
	-10%超～0%未満	405	39.7	153	45.9	128	34.4	124	39.2
	0%以上～+10%未満	249	22.1	96	26.2	93	24.7	60	15.0
	+10%以上～+20%未満	105	8.5	35	9.0	32	7.3	38	9.4
	+20%以上～+30%未満	56	4.2	10	2.1	23	4.8	23	5.7
	+30%以上～+40%未満	17	1.4	2	0.4	11	2.7	4	1.0
	+40%以上～+50%未満	8	0.5	3	0.5	3	0.5	2	0.4
	+50%以上	8	0.8	1	0.2	4	0.9	3	1.3
女性	総数	1,112	408.8	402	364.4	387	421.6	323	100.0
	-30%以下	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0
	-30%超～-20%以下	38	3.8	17	4.9	14	3.5	7	3.0
	-20%超～-10%以下	233	23.1	59	17.4	85	25.7	89	26.4
	-10%超～0%未満	430	37.1	176	41.2	133	33.0	121	37.5
	0%以上～+10%未満	249	22.6	94	23.2	88	23.0	67	21.4
	+10%以上～+20%未満	88	8.4	32	8.8	35	9.5	21	6.5
	+20%以上～+30%未満	44	2.9	17	3.2	20	3.2	7	2.4
	+30%以上～+40%未満	20	1.5	5	1.2	8	1.4	7	2.0
	+40%以上～+50%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4
	+50%以上	7	0.3	1	0.1	3	0.5	3	0.4

注) 割合は全国補正值であり, 単なる人数比とは異なる (p.8 参照)。
学校保健統計調査方式による区分は, p.14 参照。

(24年)

第 15 表 腹囲の区分—腹囲の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—全国補正值, 総数・男性・女性, 20 歳以上〔妊婦除外〕

	総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	20,094	100.0	1,338	100.0	2,607	100.0	2,894	100.0	3,141	100.0	4,790	100.0	5,324	100.0	12,945	100.0
	<85cm(男)/<90cm(女)	13,268	66.8	1,129	86.3	1,999	77.1	2,027	69.3	2,119	67.6	2,909	61.3	3,085	58.4	8,297	64.5
	≥85cm(男)/≥90cm(女)	6,826	33.2	209	13.7	608	22.9	867	30.7	1,022	32.4	1,881	38.7	2,239	41.6	4,648	35.5
男性	総数	8,854	100.0	622	100.0	1,171	100.0	1,280	100.0	1,314	100.0	2,134	100.0	2,333	100.0	5,683	100.0
	<85cm	4,201	48.2	454	76.6	693	59.3	598	45.8	607	46.9	882	41.5	967	41.8	2,490	44.2
	≥85cm	4,653	51.8	168	23.4	478	40.7	682	54.2	707	53.1	1,252	58.5	1,366	58.2	3,193	55.8
女性	総数	11,240	100.0	716	100.0	1,436	100.0	1,614	100.0	1,827	100.0	2,656	100.0	2,991	100.0	7,262	100.0
	<90cm	9,067	81.9	675	94.6	1,306	91.8	1,429	88.6	1,512	82.7	2,027	77.7	2,118	71.8	5,807	80.8
	≥90cm	2,173	18.1	41	5.4	130	8.2	185	11.4	315	17.3	629	22.3	873	28.2	1,455	19.2

注)割合は全国補正值であり, 単なる人数比とは異なる(p.8参照)。妊婦除外。

(24年)

第 16 表 BMI・腹囲の区分—BMI・腹囲の区分, 人数, 年齢階級別, 割合—全国補正值, 総数・男性・女性, 20 歳以上〔妊婦除外〕

	総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	20,015	100.0	1,334	100.0	2,600	100.0	2,883	100.0	3,132	100.0	4,774	100.0	5,292	100.0	12,900	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm(男)/90cm(女)	12,278	62.2	1,078	83.4	1,893	72.8	1,881	64.4	1,923	61.4	2,664	56.8	2,839	54.1	7,619	59.6
	BMIのみ超(BMI≥25)	947	4.7	47	2.8	101	4.3	142	5.0	190	6.2	239	4.6	228	4.4	656	5.0
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm(男)/90cm(女))	2,689	13.6	63	5.0	188	7.6	270	9.9	371	12.2	790	17.1	1,007	19.6	1,788	14.3
	BMI≥25, 腹囲≥85cm(男)/90cm(女)	4,101	19.5	146	8.7	418	15.2	590	20.7	648	20.2	1,081	21.6	1,218	22.0	2,837	21.1
男性	総数	8,812	100.0	620	100.0	1,168	100.0	1,272	100.0	1,307	100.0	2,124	100.0	2,321	100.0	5,653	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	4,017	46.0	433	73.5	662	56.0	554	43.2	572	43.8	857	40.2	939	40.4	2,373	42.2
	BMIのみ超(BMI≥25)	168	2.2	19	3.0	29	3.3	43	2.8	31	3.1	23	1.3	23	1.3	107	2.1
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm)	2,104	24.3	59	10.5	171	15.5	238	19.6	308	24.1	615	29.8	713	31.6	1,422	25.9
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	2,523	27.5	109	13.0	306	25.2	437	34.4	396	29.0	629	28.7	646	26.7	1,751	29.8
女性	総数	11,203	100.0	714	100.0	1,432	100.0	1,611	100.0	1,825	100.0	2,650	100.0	2,971	100.0	7,247	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	8,261	75.3	645	91.9	1,231	86.7	1,327	81.8	1,351	74.1	1,807	70.6	1,900	65.0	5,246	73.5
	BMIのみ超(BMI≥25)	779	6.7	28	2.7	72	5.2	99	6.7	159	8.5	216	7.2	205	6.9	549	7.4
	腹囲のみ超(腹囲≥90cm)	585	5.0	4	0.3	17	1.1	32	2.0	63	3.6	175	6.5	294	9.9	366	5.0
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	1,578	13.1	37	5.1	112	7.0	153	9.4	252	13.7	452	15.7	572	18.2	1,086	14.1

注)割合は全国補正值であり, 単なる人数比とは異なる(p.8参照)。妊婦除外。

(24年)

(参考) 内臓脂肪型肥満の診断基準:

- BMI 25 以上で, 男性のウエスト周囲長 85cm 以上, 女性のウエスト周囲長 90cm 以上を内臓脂肪蓄積の疑いとする。
- 内臓脂肪蓄積の疑いと判定され, 腹部CT法による内臓脂肪面積 100cm² 以上(男女とも)を内臓脂肪型肥満と診断する。(肥満症診断基準 2011 年, 日本肥満学会)

※国民健康・栄養調査の「腹囲」は, 「立位のへその高さ」で計測したが, 計測位置は「ウエスト周囲長」と同じである。

第17表 薬の服用状況—薬の服用状況, 年齢階級別, 人数, 割合—全国補正值, 総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	16,768	100.0	975	100.0	2,066	100.0	2,236	100.0	2,569	100.0	4,191	100.0	4,731	100.0
	使用なし	10,810	66.0	964	99.3	2,026	97.7	2,048	92.9	1,948	77.0	2,231	53.7	1,593	33.5
	使用あり(一つ以上)	5,958	34.0	11	0.7	40	2.3	188	7.1	621	23.0	1,960	46.3	3,138	66.5
	血压を下げる薬	4,645	26.1	5	0.4	24	1.6	129	4.7	429	15.2	1,461	34.6	2,597	53.8
	脈の乱れを治す薬	601	3.1	1	0.1	4	0.1	9	0.3	39	1.3	136	3.0	412	7.9
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	1,029	6.1	3	0.1	11	0.4	36	1.2	99	4.1	371	8.8	509	11.5
	コレステロールを下げる薬	2,246	13.2	4	0.2	10	0.5	62	2.5	247	8.8	803	19.1	1,120	25.3
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	641	3.9	0	0.0	3	0.1	29	0.9	68	2.3	219	5.5	322	7.6
男性	総数	7,016	100.0	415	100.0	834	100.0	885	100.0	1,004	100.0	1,818	100.0	2,060	100.0
	使用なし	4,386	63.5	408	98.9	807	95.3	773	89.1	721	73.8	953	52.1	724	35.3
	使用あり(一つ以上)	2,630	36.5	7	1.0	27	4.8	112	10.9	283	26.2	865	47.9	1,336	64.7
	血压を下げる薬	2,103	29.2	4	0.7	17	3.5	74	7.3	215	19.3	677	37.9	1,116	53.9
	脈の乱れを治す薬	337	4.3	1	0.2	3	0.2	6	0.5	24	2.3	76	3.7	227	10.2
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	579	8.2	2	0.2	9	0.9	20	1.7	51	4.6	206	11.0	291	15.2
	コレステロールを下げる薬	726	10.5	2	0.2	7	0.9	40	4.1	84	7.2	243	14.2	350	18.0
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	325	4.8	0	0.0	2	0.3	24	1.9	41	3.4	114	6.8	144	8.0
女性	総数	9,752	100.0	560	100.0	1,232	100.0	1,351	100.0	1,565	100.0	2,373	100.0	2,671	100.0
	使用なし	6,424	67.8	556	99.6	1,219	99.2	1,275	95.3	1,227	79.0	1,278	54.9	869	32.1
	使用あり(一つ以上)	3,328	32.2	4	0.4	13	0.8	76	4.7	338	21.0	1,095	45.1	1,802	67.9
	血压を下げる薬	2,542	23.8	1	0.2	7	0.3	55	3.1	214	12.7	784	32.0	1,481	53.7
	脈の乱れを治す薬	264	2.3	0	0.0	1	0.0	3	0.1	15	0.7	60	2.4	185	6.1
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	450	4.6	1	0.1	2	0.1	16	0.9	48	3.8	165	7.1	218	8.6
	コレステロールを下げる薬	1,520	15.2	2	0.2	3	0.3	22	1.5	163	9.9	560	23.0	770	31.1
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	316	3.2	0	0.0	1	0.1	5	0.3	27	1.7	105	4.5	178	7.2

注) 割合は全国補正值であり, 単なる人数比とは異なる (p.8 参照)。
複数回答。

(24年)

第18表の1 血圧の状況—年齢階級，日本高血圧学会による血圧の分類別，人数，割合—全国補正值，総数・男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

	総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	15,103	100.0	3,783	27.4	2,804	18.9	3,128	20.0	3,985	24.8	1,157	7.4	246	1.6	2,917	18.0
20-29歳	783	100.0	536	68.5	144	18.8	73	9.7	29	2.8	1	0.1	0	0.0	10	0.8
30-39歳	1,752	100.0	987	60.1	383	19.9	197	10.7	155	7.5	21	1.0	9	0.8	28	1.3
40-49歳	1,937	100.0	788	44.4	422	21.8	338	15.7	287	13.7	82	3.7	20	0.7	80	3.5
50-59歳	2,334	100.0	516	25.1	459	18.8	487	20.4	609	24.6	212	8.9	51	2.2	272	10.7
60-69歳	3,887	100.0	517	13.3	715	19.9	951	24.4	1,247	30.7	367	9.4	90	2.3	881	21.7
70歳以上	4,410	100.0	439	10.3	681	16.0	1,082	24.0	1,658	37.2	474	10.8	76	1.8	1,646	36.6
(再掲) 65-74歳	3,655	100.0	418	11.3	671	19.7	885	24.2	1,277	33.2	337	9.7	67	1.8	1,071	27.9
(再掲) 75歳以上	2,615	100.0	251	10.0	358	13.4	655	24.1	1,005	39.8	299	10.8	47	1.9	1,050	40.7
男性	6,163	100.0	940	17.1	1,140	18.6	1,383	22.6	1,958	29.9	605	9.7	137	2.2	1,271	19.8
20-29歳	318	100.0	147	46.5	94	29.2	50	17.7	27	6.6	0	0.0	0	0.0	10	2.1
30-39歳	658	100.0	223	38.2	175	23.9	126	18.0	113	15.8	13	1.8	8	2.3	21	2.9
40-49歳	732	100.0	159	27.7	170	22.8	156	20.0	180	21.9	53	6.3	14	1.4	38	4.3
50-59歳	868	100.0	94	13.6	140	14.7	191	22.3	303	33.3	113	13.2	27	2.9	111	12.5
60-69歳	1,663	100.0	150	9.0	285	19.3	387	23.6	586	33.2	207	11.9	48	2.9	374	21.1
70歳以上	1,924	100.0	167	8.7	276	14.2	473	25.3	749	37.9	219	12.1	40	1.8	717	37.3
(再掲) 65-74歳	1,567	100.0	128	7.8	274	18.4	373	24.4	588	35.2	168	11.9	36	2.3	466	27.7
(再掲) 75歳以上	1,137	100.0	109	9.8	147	12.6	283	25.9	434	38.5	142	11.7	22	1.5	446	40.5
女性	8,940	100.0	2,843	34.4	1,664	19.1	1,745	18.2	2,027	21.4	552	5.8	109	1.2	1,646	16.9
20-29歳	465	100.0	389	83.5	50	11.8	23	4.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
30-39歳	1,094	100.0	764	72.0	208	17.7	71	6.8	42	2.9	8	0.5	1	0.1	7	0.4
40-49歳	1,205	100.0	629	54.2	252	21.3	182	13.2	107	8.8	29	2.1	6	0.3	42	3.0
50-59歳	1,466	100.0	422	31.7	319	21.2	296	19.3	306	19.6	99	6.4	24	1.8	161	9.7
60-69歳	2,224	100.0	367	16.7	430	20.5	564	24.9	661	28.7	160	7.4	42	1.8	507	22.3
70歳以上	2,486	100.0	272	11.5	405	17.4	609	22.9	909	36.7	255	9.7	36	1.7	929	36.1
(再掲) 65-74歳	2,088	100.0	290	14.0	397	20.7	512	24.0	689	31.7	169	8.0	31	1.5	605	28.0
(再掲) 75歳以上	1,478	100.0	142	10.2	211	14.1	372	22.6	571	40.8	157	10.1	25	2.2	604	40.8

注)割合は全国補正值であり，単なる人数比とは異なる(p.8参照)。 (24年)
日本高血圧学会による血圧の分類はp.14を参照。なお，本調査においては「正常血圧」からは「至適血圧」の者を除いて集計した。
数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお，1回しか測定できなかった者については，その値を採用した。

第18表の2 血圧の状況—年齢階級，日本高血圧学会による血圧の分類別，人数，割合—全国補正值，総数・男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

	総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	10,785	100.0	3,508	35.0	2,215	20.5	2,082	18.3	2,183	19.0	643	5.7	154	1.5	1,354	11.9
20-29歳	777	100.0	534	69.0	141	18.2	72	9.7	29	2.9	1	0.1	0	0.0	10	0.8
30-39歳	1,727	100.0	984	61.0	381	20.1	190	10.0	145	7.1	18	0.9	9	0.9	28	1.3
40-49歳	1,827	100.0	775	45.8	404	21.8	318	15.8	248	12.6	63	3.2	19	0.7	67	3.1
50-59歳	1,945	100.0	491	28.3	412	19.9	399	20.0	452	22.2	153	7.7	38	2.0	196	9.5
60-69歳	2,522	100.0	453	17.5	526	22.8	604	23.8	663	24.9	224	8.9	52	2.1	444	17.0
70歳以上	1,987	100.0	271	14.0	351	18.1	499	23.6	646	32.9	184	9.4	36	2.0	609	31.6
(再掲) 65-74歳	2,035	100.0	329	16.0	417	21.6	487	23.3	589	28.1	176	9.0	37	2.0	475	23.1
(再掲) 75歳以上	1,061	100.0	134	12.5	175	16.3	274	23.9	356	36.2	101	9.2	21	1.9	353	35.7
男性	4,228	100.0	841	22.2	886	20.9	910	21.1	1,155	25.4	342	8.1	94	2.3	618	14.0
20-29歳	315	100.0	147	47.1	92	28.3	49	17.8	27	6.7	0	0.0	0	0.0	10	2.1
30-39歳	641	100.0	222	39.8	173	24.4	119	16.2	107	15.4	12	1.7	8	2.4	21	3.1
40-49歳	673	100.0	154	28.3	157	22.5	147	20.6	161	21.4	40	5.7	14	1.5	32	4.2
50-59歳	678	100.0	85	15.9	123	16.4	144	21.0	226	32.4	78	11.2	22	3.0	78	11.9
60-69歳	1,037	100.0	127	11.4	195	21.7	233	23.1	328	28.4	124	12.3	30	3.1	194	16.8
70歳以上	884	100.0	106	12.2	146	16.7	218	24.3	306	34.1	88	10.5	20	2.1	283	33.2
(再掲) 65-74歳	831	100.0	101	11.5	165	21.1	186	22.8	274	29.9	85	12.0	20	2.7	203	22.8
(再掲) 75歳以上	496	100.0	63	12.1	76	15.5	122	24.6	171	35.7	53	10.3	11	1.6	171	37.1
女性	6,557	100.0	2,667	43.1	1,329	20.2	1,172	16.5	1,028	15.0	301	4.2	60	0.9	736	10.6
20-29歳	462	100.0	387	83.9	49	11.4	23	4.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
30-39歳	1,086	100.0	762	72.1	208	17.9	71	6.8	38	2.7	6	0.4	1	0.1	7	0.4
40-49歳	1,154	100.0	621	55.8	247	21.5	171	13.1	87	7.6	23	1.7	5	0.3	35	2.5
50-59歳	1,267	100.0	406	34.9	289	21.7	255	19.4	226	16.7	75	5.8	16	1.4	118	8.2
60-69歳	1,485	100.0	326	21.8	331	23.6	371	24.3	335	22.4	100	6.4	22	1.4	250	17.1
70歳以上	1,103	100.0	165	15.4	205	19.2	281	23.1	340	31.9	96	8.6	16	1.9	326	30.3
(再掲) 65-74歳	1,204	100.0	228	19.0	252	22.0	301	23.6	315	26.8	91	7.0	17	1.6	272	23.3
(再掲) 75歳以上	565	100.0	71	12.8	99	17.0	152	23.3	185	36.5	48	8.2	10	2.2	182	34.4

注)割合は全国補正值であり，単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

(24年)

血圧を下げる薬の使用者除外。

日本高血圧学会による血圧の分類はp.14を参照。なお，本調査においては「正常血圧」から「至適血圧」の者を除いて集計した。

数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお，1回しか測定できなかった者については，その値を採用した。

第19表の1 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の平均値および標準偏差一年齢階級別、人数、平均値、標準偏差一全国補正值、男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)40～89歳									
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差						
男性	6,163	134.6	17.8	318	119.2	11.2	658	122.4	13.7	732	126.5	15.1	868	135.7	17.2	1,663	138.7	17.3	1,924	140.7	16.7	5,152	137.1	17.4
女性	6,163	81.2	11.3	318	73.6	9.5	658	79.2	11.2	732	82.3	11.4	868	86.1	11.0	1,663	83.2	11.0	1,924	78.7	10.6	5,152	81.9	11.2
収縮期(最高)血圧	8,940	127.3	19.5	465	107.3	10.6	1,094	111.1	12.0	1,205	117.9	15.1	1,466	128.1	18.4	2,224	134.3	17.2	2,486	138.5	17.5	7,341	131.4	18.7
拡張期(最低)血圧	8,940	76.5	10.8	465	67.2	8.3	1,094	70.6	9.5	1,205	75.0	10.4	1,466	79.8	10.5	2,224	79.8	10.2	2,486	77.2	10.4	7,341	78.1	10.5

注) 平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。
 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。(24年)

第19表の2 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の平均値および標準偏差一年齢階級別、人数、平均値、標準偏差一全国補正值、男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)40～89歳									
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差						
男性	4,228	131.6	17.8	315	119.1	11.3	641	122.1	13.8	673	126.3	14.9	678	134.6	17.6	1,037	137.3	18.1	884	138.5	17.8	3,257	134.6	17.9
女性	4,228	81.1	11.4	315	73.5	9.5	641	78.9	11.3	673	82.2	11.3	678	85.5	11.1	1,037	83.0	11.4	884	78.8	10.2	3,257	82.3	11.3
収縮期(最高)血圧	6,557	123.2	18.6	462	107.3	10.6	1,086	111.0	11.8	1,154	117.2	14.6	1,267	126.6	18.0	1,485	131.4	17.4	1,103	136.2	18.2	4,999	127.6	18.4
拡張期(最低)血圧	6,557	75.6	10.7	462	67.2	8.3	1,086	70.6	9.4	1,154	74.7	10.1	1,267	79.0	10.3	1,485	79.0	10.4	1,103	77.5	10.6	4,999	77.6	10.5

注) 平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。
 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。(24年)

第19表の3 収縮期（最高）血圧 140mmHg以上の者の割合—年齢階級別，人数，割合—全国補正值，男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-89歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	6,163	100.0	318	100.0	658	100.0	732	100.0	868	100.0	1,663	100.0	1,924	100.0	5,152	100.0
男性	3,853	64.3	301	96.0	592	90.3	576	81.0	523	61.7	904	57.0	957	50.4	2,941	59.0
140mmHg未満	2,310	35.7	17	4.0	66	9.7	156	19.0	345	38.3	759	43.0	967	49.6	2,211	41.0
140mmHg以上	8,940	100.0	465	100.0	1,094	100.0	1,205	100.0	1,466	100.0	2,224	100.0	2,486	100.0	7,341	100.0
女性	6,493	74.5	464	99.8	1,065	98.1	1,108	92.2	1,093	76.3	1,432	65.4	1,331	54.2	4,947	68.9
140mmHg未満	2,447	25.5	1	0.2	29	1.9	97	7.8	373	23.7	792	34.6	1,155	45.8	2,394	31.1
140mmHg以上																

注) 平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。

数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお，1回しか測定できなかつた者については，その値を採用した。

(24年)

第20表の1 ヘモグロビンA1c (NGSP) の平均値および標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—全国補正值，男性・女性，20歳以上〔インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上										
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差									
男性	5,752	5.8	0.8	299	5.3	0.3	626	5.4	0.5	687	5.6	0.7	824	5.8	0.8	1,552	5.9	0.8	1,764	6.0	0.7	1,464	6.0	0.8	1,034	6.0	0.7
女性	8,344	5.7	0.6	435	5.3	0.3	1,028	5.4	0.4	1,148	5.5	0.4	1,376	5.7	0.6	2,078	5.9	0.8	2,279	5.9	0.7	1,943	5.9	0.7	1,339	5.9	0.6

注) 平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。

(24年)

第20表の2 ヘモグロビンA1c (NGSP) の平均値および標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—全国補正值，男性・女性，20歳以上〔インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上										
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差									
男性	5,261	5.7	0.6	298	5.3	0.3	620	5.4	0.4	672	5.6	0.6	780	5.7	0.7	1,375	5.8	0.7	1,516	5.8	0.6	1,288	5.8	0.6	880	5.8	0.6
女性	7,944	5.6	0.5	433	5.3	0.3	1,023	5.4	0.4	1,136	5.5	0.4	1,336	5.6	0.5	1,933	5.8	0.6	2,083	5.8	0.5	1,760	5.8	0.5	1,231	5.8	0.5

注) 平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。

インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外。

(24年)

第21表の1 血清総コレステロール値の平均値および標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—全国補正值, 男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用を含む〕 (mg/dL)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上										
	人数	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差									
男性	5,766	195.3	299	179.9	29.7	628	198.7	34.5	690	205.0	31.6	823	205.7	32.5	1,554	196.7	33.2	1,772	186.8	32.7	4,373	197.2	33.4	1,470	193.5	32.8	1,036	183.6	31.4
女性	8,371	204.1	438	181.4	32.5	1,031	186.4	32.5	1,149	198.8	31.3	1,380	218.8	33.1	2,083	215.4	33.2	2,290	202.2	32.8	6,264	209.8	33.6	1,949	209.5	32.6	1,346	198.8	32.7

注)平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。(24年)

第21表の2 血清総コレステロール値の平均値および標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—全国補正值, 男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用を除く〕 (mg/dL)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上										
	人数	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差									
男性	5,059	196.7	297	179.5	28.8	622	198.7	34.5	653	205.4	31.6	744	205.8	31.9	1,305	199.1	33.2	1,438	188.4	32.2	3,775	199.2	32.9	1,212	196.1	32.3	836	184.7	31.2
女性	6,960	205.8	434	181.3	32.5	1,025	186.5	32.5	1,128	198.7	31.3	1,224	220.6	32.9	1,568	220.2	32.9	1,581	207.5	33.4	5,053	212.8	33.8	1,370	216.4	31.9	937	202.6	33.5

注)平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。(24年)
コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用を除く。

第21表の3 血清総コレステロール値240mg/dL以上の者の割合—年齢階級別, 人数, 割合—全国補正值, 男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用を含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	5,766	100.0	299	100.0	628	100.0	690	100.0	823	100.0	1,554	100.0	1,772	100.0	4,373	100.0	1,470	100.0	1,036	100.0
男性	5,192	90.2	292	97.9	561	89.1	583	86.3	697	85.0	1,392	89.3	1,667	93.9	3,895	89.2	1,360	91.8	983	95.0
	574	9.8	7	2.1	67	10.9	107	13.8	126	15.1	162	10.7	105	6.1	478	10.8	110	8.2	53	5.0
総数	8,371	100.0	438	100.0	1,031	100.0	1,149	100.0	1,380	100.0	2,083	100.0	2,290	100.0	6,264	100.0	1,949	100.0	1,346	100.0
女性	7,174	85.3	422	95.1	973	94.2	1,040	89.4	1,061	75.7	1,644	78.5	2,034	88.2	5,199	82.5	1,652	84.2	1,212	89.6
	1,197	14.7	16	4.9	58	5.8	109	10.6	319	24.3	439	21.5	256	11.8	1,065	17.5	297	15.8	134	10.4

注)割合は全国補正值であり, 単なる人数比とは異なる(p.8参照)。(24年)

第22表の1 血清HDL-コレステロール値の平均値および標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—全国補正值，男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用を含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	標準偏差
男性	5,766	54.7	299	56.3	628	54.5	690	54.7	823	55.6	1,554	55.4	1,772	53.3	4,373	54.8	1,470	54.3	1,036	52.8	14.5
女性	8,371	64.3	438	66.0	1,031	65.2	1,149	67.4	1,380	67.9	2,083	64.1	2,290	59.8	6,264	64.5	1,949	62.1	1,346	58.7	14.5

(mg/dL)

(24年)

注)平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。

第22表の2 血清HDL-コレステロール値の平均値および標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—全国補正值，男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用を除く〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	標準偏差
男性	5,059	55.0	297	56.3	622	54.6	653	55.0	744	55.8	1,305	56.2	1,438	53.5	3,775	55.2	1,212	54.8	836	53.1	14.9
女性	6,960	64.8	434	66.0	1,025	65.2	1,128	67.5	1,224	68.2	1,568	64.2	1,581	59.8	5,053	65.1	1,370	62.0	937	58.6	14.8

(mg/dL)

(24年)

注)平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。
コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用を除く。

第23表の1 血清LDL-コレステロール値（直接法）の平均値および標準偏差－年齢階級別、人数、平均値、標準偏差－全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕
(mg/dL)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上										
	人数	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差									
男性	5,766	114.5	299	106.8	27.1	628	120.0	31.4	690	123.8	29.8	823	122.1	30.7	1,554	113.4	29.7	1,772	107.5	28.4	4,373	115.3	30.3	1,470	111.4	29.3	1,036	105.2	26.3
女性	8,371	118.0	306	102.3	28.1	1,031	106.4	29.2	1,149	114.5	29.6	1,380	128.4	29.6	2,083	126.0	30.7	2,290	115.8	28.8	6,264	121.9	30.3	1,949	121.3	29.2	1,346	113.9	28.6

注)平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。(24年)

第23表の2 血清LDL-コレステロール値（直接法）の平均値および標準偏差－年齢階級別、人数、平均値、標準偏差－全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕
(mg/dL)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上										
	人数	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差									
男性	5,059	115.9	301	106.4	26.0	622	120.1	31.3	653	124.2	29.7	744	122.4	30.5	1,305	115.5	29.8	1,438	108.9	28.3	3,775	117.0	30.1	1,212	113.7	29.4	836	106.4	26.1
女性	6,960	120.0	31.2	102.3	28.0	1,025	106.4	29.3	1,128	114.4	29.5	1,224	130.2	29.6	1,568	130.9	30.4	1,581	121.5	29.3	5,053	125.1	30.5	1,370	128.4	28.4	937	118.2	29.5

注)平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。
コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。(24年)

第23表の3 血清LDL-コレステロール値（直接法）160mg/dL以上の者の割合－年齢階級別、人数、割合－全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	5,766	100.0	299	100.0	628	100.0	690	100.0	823	100.0	1,554	100.0	1,772	100.0	4,373	100.0	1,470	100.0	1,036	100.0
男性	5,338	92.8	290	96.1	563	89.7	598	87.6	731	89.4	1,454	94.0	1,702	96.0	4,032	92.5	1,404	94.6	1,001	97.9
160mg/dL未満	428	7.2	9	3.9	65	10.3	92	12.4	92	10.6	100	6.0	70	4.0	341	7.5	66	5.4	35	2.1
160mg/dL以上	8,371	100.0	438	100.0	1,031	100.0	1,149	100.0	1,380	100.0	2,083	100.0	2,290	100.0	6,264	100.0	1,949	100.0	1,346	100.0
女性	7,616	90.7	423	96.0	982	94.8	1,070	91.9	1,182	85.1	1,814	87.4	2,145	92.9	5,597	89.0	1,762	90.7	1,280	93.9
160mg/dL未満	755	9.3	15	4.0	49	5.2	79	8.1	198	14.9	269	12.6	145	7.1	667	11.0	187	9.3	66	6.1
160mg/dL以上																				

注)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。(24年)

第24表の1 血清 non HDL-コレステロール値の平均値および標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—全国補正值，男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕
(mg/dL)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上											
	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	標準偏差									
男性	5,766	140.7	342	299	1,237	31.3	628	144.2	374	690	150.3	32.9	823	150.1	34.7	1,554	141.3	33.4	1,772	133.5	31.8	4,373	142.4	33.8	1,470	139.2	32.8	1,036	130.8	29.8
女性	8,371	139.8	344	438	1,154	29.5	1,031	121.2	31.8	1,149	131.4	32.3	1,380	150.9	32.2	2,083	151.3	33.6	2,290	142.4	31.8	6,264	145.2	33.5	1,949	147.4	32.1	1,346	140.2	31.4

注)平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。(24年)

第24表の2 血清 non HDL-コレステロール値の平均値および標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—全国補正值，男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕
(mg/dL)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上											
	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	標準偏差									
男性	5,059	141.7	341	297	1,232	30.3	622	144.2	374	653	150.4	33.0	744	149.9	34.1	1,305	142.9	33.5	1,438	134.8	31.6	3,775	144.0	33.6	1,212	141.3	32.8	836	131.5	29.6
女性	6,960	141.0	35.3	434	1,154	29.5	1,025	121.2	31.8	1,128	131.3	32.3	1,224	152.4	32.3	1,568	156.1	33.7	1,581	147.7	32.2	5,053	147.8	34.1	1,370	154.5	31.2	937	143.9	32.3

注)平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。(24年)

$$\text{non HDL-コレステロール (mg/dL)} = \text{総コレステロール (mg/dL)} - \text{HDL-コレステロール (mg/dL)}$$

第25表 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況－メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の疑い、年齢階級別、人数、割合－全国補正值，総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	13,951	100.0	708	100.0	1,613	100.0	1,829	100.0	2,186	100.0	3,612	100.0	4,003	100.0	9,288	100.0	3,392	100.0	2,342	100.0	
総数	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	2,238	15.6	13	1.3	56	3.0	138	6.7	287	13.6	760	20.8	984	24.8	1,572	16.5	771	22.3	597	26.5
	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	2,020	14.2	42	5.4	168	9.8	259	14.0	334	15.3	562	15.1	655	16.5	1,420	15.1	543	16.1	390	16.6
	上記以外	9,693	70.2	653	93.3	1,389	87.2	1,432	79.3	1,565	71.1	2,290	64.2	2,364	58.7	6,296	68.3	2,078	61.7	1,355	56.9
	総数	5,719	100.0	299	100.0	625	100.0	685	100.0	818	100.0	1,544	100.0	1,748	100.0	3,774	100.0	1,459	100.0	1,021	100.0
男性	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	1,436	24.7	12	3.0	45	6.1	105	13.1	197	24.6	492	32.0	585	33.7	1,020	26.6	468	32.2	359	36.3
	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	1,354	23.6	34	10.3	131	21.5	198	29.0	216	27.0	367	22.9	408	23.7	957	25.2	352	24.1	232	23.0
	上記以外	2,929	51.6	253	86.7	449	72.4	382	57.9	405	48.4	685	45.2	755	42.5	1,797	48.2	639	43.6	430	40.7
	総数	8,232	100.0	409	100.0	988	100.0	1,144	100.0	1,368	100.0	2,068	100.0	2,255	100.0	5,514	100.0	1,933	100.0	1,321	100.0
女性	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	802	9.4	1	0.1	11	1.3	33	3.2	90	7.2	268	12.0	399	17.9	552	9.7	303	14.6	238	18.4
	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	666	7.7	8	1.7	37	3.1	61	5.6	118	8.6	195	9.0	247	10.8	463	8.3	191	9.8	158	11.4
	上記以外	6,764	82.9	400	98.2	940	95.6	1,050	91.3	1,160	84.3	1,605	79.0	1,609	71.3	4,499	82.0	1,439	75.6	925	70.1
	総数	8,232	100.0	409	100.0	988	100.0	1,144	100.0	1,368	100.0	2,068	100.0	2,255	100.0	5,514	100.0	1,933	100.0	1,321	100.0

注)割合は全国補正值であり，単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
妊婦除外，ヘモグロビンA1c(NGSP)値 \geq 6.0%の場合。
判定基準はp.15参照。

(24年)

第26表の1 腹囲区分別，血中脂質，血圧，血糖のいずれかのリスクを有する者の割合—年齢階級，腹囲の区分，血中脂質・血圧・血糖のリスク保有数別，人数，割合—全国補正值，総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除外〕

	腹囲(cm)	総数		リスク保有数								
				0		1つ		2つ		3つ		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	<85cm(男)/90cm(女)	9,093	100.0	3,711	40.8	3,428	37.7	1,522	16.7	432	4.8	
	≥85cm(男)/90cm(女)	4,858	100.0	600	12.4	2,020	41.6	1,567	32.3	671	13.8	
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	593	100.0	520	87.7	66	11.1	7	1.2	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	115	100.0	60	52.2	42	36.5	11	9.6	2	1.7
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,240	100.0	1,016	81.9	212	17.1	12	1.0	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	373	100.0	149	39.9	168	45.0	45	12.1	11	2.9
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,300	100.0	873	67.2	374	28.8	49	3.8	4	0.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	529	100.0	132	25.0	259	49.0	107	20.2	31	5.9
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,472	100.0	587	39.9	667	45.3	195	13.2	23	1.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	714	100.0	93	13.0	334	46.8	210	29.4	77	10.8
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	2,192	100.0	480	21.9	1,048	47.8	514	23.4	150	6.8
		≥85cm(男)/90cm(女)	1,420	100.0	98	6.9	562	39.6	527	37.1	233	16.4
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	2,296	100.0	235	10.2	1,061	46.2	745	32.4	255	11.1
		≥85cm(男)/90cm(女)	1,707	100.0	68	4.0	655	38.4	667	39.1	317	18.6
	(再掲) 40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	5,939	100.0	2,056	34.6	2,561	43.1	1,050	17.7	272	4.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	3,349	100.0	357	10.7	1,420	42.4	1,115	33.3	457	13.6
(再掲) 65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	2,010	100.0	312	15.5	965	48.0	556	27.7	177	8.8	
	≥85cm(男)/90cm(女)	1,382	100.0	68	4.9	543	39.3	534	38.6	237	17.1	
(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	1,321	100.0	119	9.0	589	44.6	453	34.3	160	12.1	
	≥85cm(男)/90cm(女)	1,021	100.0	34	3.3	390	38.2	396	38.8	201	19.7	
男性	<85cm	2,575	100.0	840	32.6	1,173	45.6	466	18.1	96	3.7	
	≥85cm	3,144	100.0	354	11.3	1,354	43.1	1,039	33.0	397	12.6	
	20-29歳	<85cm	211	100.0	164	77.7	43	20.4	4	1.9	0	0.0
		≥85cm	88	100.0	42	47.7	34	38.6	10	11.4	2	2.3
	30-39歳	<85cm	358	100.0	237	66.2	113	31.6	8	2.2	0	0.0
		≥85cm	267	100.0	91	34.1	131	49.1	39	14.6	6	2.2
	40-49歳	<85cm	303	100.0	154	50.8	130	42.9	18	5.9	1	0.3
		≥85cm	382	100.0	79	20.7	198	51.8	80	20.9	25	6.5
	50-59歳	<85cm	359	100.0	96	26.7	203	56.5	57	15.9	3	0.8
		≥85cm	459	100.0	46	10.0	216	47.1	144	31.4	53	11.5
	60-69歳	<85cm	625	100.0	114	18.2	331	53.0	149	23.8	31	5.0
		≥85cm	919	100.0	60	6.5	367	39.9	357	38.8	135	14.7
	70歳以上	<85cm	719	100.0	75	10.4	353	49.1	230	32.0	61	8.5
		≥85cm	1,029	100.0	36	3.5	408	39.7	409	39.7	176	17.1
	(再掲) 40-74歳	<85cm	1,594	100.0	395	24.8	823	51.6	314	19.7	62	3.9
		≥85cm	2,180	100.0	203	9.3	957	43.9	751	34.4	269	12.3
(再掲) 65-74歳	<85cm	602	100.0	88	14.6	301	50.0	171	28.4	42	7.0	
	≥85cm	857	100.0	37	4.3	352	41.1	345	40.3	123	14.4	
(再掲) 75歳以上	<85cm	412	100.0	44	10.7	194	47.1	140	34.0	34	8.3	
	≥85cm	609	100.0	18	3.0	232	38.1	239	39.2	120	19.7	
女性	<90cm	6,518	100.0	2,871	44.0	2,255	34.6	1,056	16.2	336	5.2	
	≥90cm	1,714	100.0	246	14.4	666	38.9	528	30.8	274	16.0	
	20-29歳	<90cm	382	100.0	356	93.2	23	6.0	3	0.8	0	0.0
		≥90cm	27	100.0	18	66.7	8	29.6	1	3.7	0	0.0
	30-39歳	<90cm	882	100.0	779	88.3	99	11.2	4	0.5	0	0.0
		≥90cm	106	100.0	58	54.7	37	34.9	6	5.7	5	4.7
	40-49歳	<90cm	997	100.0	719	72.1	244	24.5	31	3.1	3	0.3
		≥90cm	147	100.0	53	36.1	61	41.5	27	18.4	6	4.1
	50-59歳	<90cm	1,113	100.0	491	44.1	464	41.7	138	12.4	20	1.8
		≥90cm	255	100.0	47	18.4	118	46.3	66	25.9	24	9.4
	60-69歳	<90cm	1,567	100.0	366	23.4	717	45.8	365	23.3	119	7.6
		≥90cm	501	100.0	38	7.6	195	38.9	170	33.9	98	19.6
	70歳以上	<90cm	1,577	100.0	160	10.1	708	44.9	515	32.7	194	12.3
		≥90cm	678	100.0	32	4.7	247	36.4	258	38.1	141	20.8
	(再掲) 40-74歳	<90cm	4,345	100.0	1,661	38.2	1,738	40.0	736	16.9	210	4.8
		≥90cm	1,169	100.0	154	13.2	463	39.6	364	31.1	188	16.1
(再掲) 65-74歳	<90cm	1,408	100.0	224	15.9	664	47.2	385	27.3	135	9.6	
	≥90cm	525	100.0	31	5.9	191	36.4	189	36.0	114	21.7	
(再掲) 75歳以上	<90cm	909	100.0	75	8.3	395	43.5	313	34.4	126	13.9	
	≥90cm	412	100.0	16	3.9	158	38.3	157	38.1	81	19.7	

注)割合は全国補正值であり，単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
妊婦除外，ヘモグロビンA1c(NGSP)値≥6.0%の場合。
リスクの項目は基準はp.16参照。

(24年)

第26表の2 腹囲区分別、血中脂質、血圧、血糖のリスクの保有状況〔すべての組み合わせ（①血中脂質②血圧③血糖）〕一年齢階級、腹囲の区分、血中脂質・血圧・血糖のリスク保有組合せ別、人数、割合-全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

	腹囲 (cm)	総数		リスク保有組み合わせ																
		人数	%	①有②有③有		①有②有③無		①無②有③有		①有②無③有		①有②無③無		①無②有③無		①無②無③有		①無②無③無		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	<85cm(男)/90cm(女)	9,093	100.0	432	4.8	680	7.5	753	8.3	89	1.0	234	2.6	2,896	31.8	298	3.3	3,711	40.8
		≥85cm(男)/90cm(女)	4,858	100.0	671	13.8	652	13.4	839	17.3	76	1.6	155	3.2	1,738	35.8	127	2.6	600	12.4
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	593	100.0	0	0.0	6	1.0	1	0.2	0	0.0	10	1.7	53	8.9	3	0.5	520	87.7
		≥85cm(男)/90cm(女)	115	100.0	2	1.7	9	7.8	0	0.0	2	1.7	10	8.7	31	27.0	1	0.9	60	52.2
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,240	100.0	0	0.0	8	0.6	3	0.2	1	0.1	22	1.8	167	13.5	23	1.9	1,016	81.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	373	100.0	11	2.9	26	7.0	17	4.6	2	0.5	33	8.8	127	34.0	8	2.1	149	39.9
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,300	100.0	4	0.3	21	1.6	23	1.8	5	0.4	14	1.1	322	24.8	38	2.9	873	67.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	529	100.0	31	5.9	43	8.1	54	10.2	10	1.9	28	5.3	214	40.5	17	3.2	132	25.0
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,472	100.0	23	1.6	77	5.2	105	7.1	13	0.9	44	3.0	566	38.5	57	3.9	587	39.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	714	100.0	77	10.8	88	12.3	111	15.5	11	1.5	20	2.8	289	40.5	25	3.5	93	13.0
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	2,192	100.0	150	6.8	220	10.0	256	11.7	38	1.7	82	3.7	862	39.3	104	4.7	480	21.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	1,420	100.0	233	16.4	215	15.1	295	20.8	17	1.2	43	3.0	476	33.5	43	3.0	98	6.9
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	2,296	100.0	255	11.1	348	15.2	365	15.9	32	1.4	62	2.7	926	40.3	73	3.2	235	10.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	1,707	100.0	317	18.6	271	15.9	362	21.2	34	2.0	21	1.2	601	35.2	33	1.9	68	4.0
	(再掲) 40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	5,939	100.0	272	4.6	449	7.6	527	8.9	74	1.2	178	3.0	2,143	36.1	240	4.0	2,056	34.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	3,349	100.0	457	13.6	454	13.6	609	18.2	52	1.6	100	3.0	1,217	36.3	103	3.1	357	10.7
(再掲) 65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	2,010	100.0	177	8.8	245	12.2	274	13.6	37	1.8	74	3.7	792	39.4	99	4.9	312	15.5	
	≥85cm(男)/90cm(女)	1,382	100.0	237	17.1	226	16.4	285	20.6	23	1.7	31	2.2	466	33.7	46	3.3	68	4.9	
(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	1,321	100.0	160	12.1	217	16.4	222	16.8	14	1.1	24	1.8	533	40.3	32	2.4	119	9.0	
	≥85cm(男)/90cm(女)	1,021	100.0	201	19.7	163	16.0	213	20.9	20	2.0	12	1.2	363	35.6	15	1.5	34	3.3	
男性	総数	<85cm	2,575	100.0	96	3.7	162	6.3	279	10.8	25	1.0	75	2.9	1,018	39.5	80	3.1	840	32.6
		≥85cm	3,144	100.0	397	12.6	457	14.5	531	16.9	51	1.6	104	3.3	1,181	37.6	69	2.2	354	11.3
	20-29歳	<85cm	211	100.0	0	0.0	3	1.4	1	0.5	0	0.0	6	2.8	36	17.1	1	0.5	164	77.7
		≥85cm	88	100.0	2	2.3	9	10.2	0	0.0	1	1.1	9	10.2	25	28.4	0	0.0	42	47.7
	30-39歳	<85cm	358	100.0	0	0.0	6	1.7	1	0.3	1	0.3	16	4.5	97	27.1	0	0.0	237	66.2
		≥85cm	267	100.0	6	2.2	23	8.6	14	5.2	2	0.7	27	10.1	101	37.8	3	1.1	91	34.1
	40-49歳	<85cm	303	100.0	1	0.3	12	4.0	4	1.3	2	0.7	9	3.0	114	37.6	7	2.3	154	50.8
		≥85cm	382	100.0	25	6.5	38	9.9	36	9.4	6	1.6	22	5.8	166	43.5	10	2.6	79	20.7
	50-59歳	<85cm	359	100.0	3	0.8	21	5.8	32	8.9	4	1.1	9	2.5	187	52.1	7	1.9	96	26.7
		≥85cm	459	100.0	53	11.5	66	14.4	70	15.3	8	1.7	12	2.6	192	41.8	12	2.6	46	10.0
	60-69歳	<85cm	625	100.0	31	5.0	44	7.0	99	15.8	6	1.0	15	2.4	280	44.8	36	5.8	114	18.2
		≥85cm	919	100.0	135	14.7	153	16.6	191	20.8	13	1.4	24	2.6	317	34.5	26	2.8	60	6.5
	70歳以上	<85cm	719	100.0	61	8.5	76	10.6	142	19.7	12	1.7	20	2.8	304	42.3	29	4.0	75	10.4
		≥85cm	1,029	100.0	176	17.1	168	16.3	220	21.4	21	2.0	10	1.0	380	36.9	18	1.7	36	3.5
	(再掲) 40-74歳	<85cm	1,594	100.0	62	3.9	105	6.6	191	12.0	18	1.1	42	2.6	717	45.0	64	4.0	395	24.8
		≥85cm	2,180	100.0	269	12.3	329	15.1	386	17.7	36	1.7	62	2.8	838	38.4	57	2.6	203	9.3
(再掲) 65-74歳	<85cm	602	100.0	42	7.0	49	8.1	113	18.8	9	1.5	15	2.5	251	41.7	35	5.8	88	14.6	
	≥85cm	857	100.0	123	14.4	151	17.6	179	20.9	15	1.8	19	2.2	307	35.8	26	3.0	37	4.3	
(再掲) 75歳以上	<85cm	412	100.0	34	8.3	48	11.7	86	20.9	6	1.5	11	2.7	168	40.8	15	3.6	44	10.7	
	≥85cm	609	100.0	120	19.7	96	15.8	131	21.5	12	2.0	6	1.0	217	35.6	9	1.5	18	3.0	
女性	総数	<90cm	6,518	100.0	336	5.2	518	7.9	474	7.3	64	1.0	159	2.4	1,878	28.8	218	3.3	2,871	44.0
		≥90cm	1,714	100.0	274	16.0	195	11.4	308	18.0	25	1.5	51	3.0	557	32.5	58	3.4	246	14.4
	20-29歳	<90cm	382	100.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0	4	1.0	17	4.5	2	0.5	356	93.2
		≥90cm	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	3.7	6	22.2	1	3.7	18	66.7
	30-39歳	<90cm	882	100.0	0	0.0	2	0.2	2	0.2	0	0.0	6	0.7	70	7.9	23	2.6	779	88.3
		≥90cm	106	100.0	5	4.7	3	2.8	3	2.8	0	0.0	6	5.7	26	24.5	5	4.7	58	54.7
	40-49歳	<90cm	997	100.0	3	0.3	9	0.9	19	1.9	3	0.3	5	0.5	208	20.9	31	3.1	719	72.1
		≥90cm	147	100.0	6	4.1	5	3.4	18	12.2	4	2.7	6	4.1	48	32.7	7	4.8	53	36.1
	50-59歳	<90cm	1,113	100.0	20	1.8	56	5.0	73	6.6	9	0.8	35	3.1	379	34.1	50	4.5	491	44.1
		≥90cm	255	100.0	24	9.4	22	8.6	41	16.1	3	1.2	8	3.1	97	38.0	13	5.1	47	18.4
	60-69歳	<90cm	1,567	100.0	119	7.6	176	11.2	157	10.0	32	2.0	67	4.3	582	37.1	68	4.3	366	23.4
		≥90cm	501	100.0	98	19.6	62	12.4	104	20.8	4	0.8	19	3.8	159	31.7	17	3.4	38	7.6
	70歳以上	<90cm	1,577	100.0	194	12.3	272	17.2	223	14.1	20	1.3	42	2.7	622	39.4	44	2.8	160	10.1
		≥90cm	678	100.0	141	20.8	103	15.2	142	20.9	13	1.9	11	1.6	221	32.6	15	2.2	32	4.7
	(再掲) 40-74歳	<90cm	4,345	100.0	210	4.8	344	7.9	336	7.7	56	1.3	136	3.1	1,426	32.8	176	4.1	1,661	38.2
		≥90cm	1,169	100.0	188	16.1	125	10.7	223	19.1	16	1.4	38	3.3	379	32.4	46	3.9	154	13.2
(再掲) 65-74歳	<90cm	1,408	100.0	135	9.6	196	13.9	161	11.4	28	2.0	59	4.2	541	38.4	64	4.5	224	15.9	
	≥90cm	525	100.0	114	21.7	75	14.3	106	20.2	8	1.5	12	2.3	159	30.3	20	3.8	31	5.9	
(再掲) 75歳以上	<90cm	909	100.0	126	13.9	169	18.6	136	15.0	8	0.9	13	1.4	365	40.2	17	1.9	75	8.3	
	≥90cm	412	100.0	81	19.7	67	16.3	82	19.9	8	1.9	6	1.5	146	35.4	6	1.5	16	3.9	

注)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
妊婦除外、ヘモグロビンA1c(NGSP)値≥6.0%の場合。
リスクの項目は基準はp.16参照。

(24年)

第27表 「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況—糖尿病が疑われる者の状況、年齢階級別、人数、割合—全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	14,089	100.0	734	100.0	1,654	100.0	1,834	100.0	2,200	100.0	3,627	100.0	4,040	100.0	9,331	100.0	3,405	100.0	2,370	100.0
糖尿病が強く疑われる者	1,637	11.4	3	0.3	27	1.2	64	3.0	198	8.4	573	16.2	772	19.6	1,167	12.2	636	18.8	440	19.7
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち服薬者*	825	50.8	1	33.3	8	23.7	24	33.3	79	43.6	303	53.0	410	53.0	580	50.4	339	54.1	236	53.2
糖尿病の可能性が否定できない者	1,712	12.7	6	0.7	41	2.6	121	7.4	240	11.4	584	16.6	720	19.5	1,215	13.8	559	17.7	450	20.1
上記以外	10,740	75.9	725	99.1	1,586	96.2	1,649	89.5	1,762	80.2	2,470	67.3	2,548	61.0	6,949	73.9	2,210	63.5	1,480	60.2
総数	5,752	100.0	299	100.0	626	100.0	687	100.0	824	100.0	1,552	100.0	1,764	100.0	3,793	100.0	1,464	100.0	1,034	100.0
糖尿病が強く疑われる者	909	15.2	3	0.6	14	1.4	42	5.4	113	12.2	325	20.7	412	23.2	655	16.5	339	23.0	237	23.7
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち服薬者*	467	51.9	1	33.3	6	47.9	14	27.8	44	39.0	170	52.6	232	56.9	321	50.3	171	54.1	139	56.5
糖尿病の可能性が否定できない者	661	12.1	2	0.5	13	1.8	52	7.2	82	10.2	227	15.5	285	17.7	461	13.2	220	16.9	185	18.1
上記以外	4,182	72.7	294	98.9	599	96.8	593	87.4	629	77.6	1,000	63.8	1,067	59.0	2,677	70.3	905	60.1	612	58.3
総数	8,337	100.0	435	100.0	1,028	100.0	1,147	100.0	1,376	100.0	2,075	100.0	2,276	100.0	5,538	100.0	1,941	100.0	1,336	100.0
糖尿病が強く疑われる者	728	8.7	0	0.0	13	1.1	22	1.7	85	6.2	248	12.6	360	16.7	512	9.3	297	15.6	203	16.4
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち服薬者*	358	49.4	0	0.0	2	5.8	10	42.9	35	49.0	133	53.4	178	48.7	259	50.6	168	54.1	97	49.2
糖尿病の可能性が否定できない者	1,051	13.1	4	0.8	28	3.1	69	7.5	158	12.1	357	17.4	435	20.8	754	14.3	339	18.3	265	21.7
上記以外	6,558	78.1	431	99.2	987	95.8	1,056	90.7	1,133	81.7	1,470	70.0	1,481	62.5	4,272	76.4	1,305	66.1	868	61.8

注) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

判定基準はp.16参照。

* 「服薬者」とは、身体状況調査票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者。

(24年)

「糖尿病が強く疑われる者」の判定

ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c (NGSP) 値が6.5%以上、または、生活習慣調査票の問6「これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか」に「1あり」と回答し、問6-1「糖尿病の治療を受けたことがありますか」に「1過去から現在にかけて継続的に受けている」又は「2過去に中断したことがあるが、現在は受けている」と回答した者

「糖尿病の可能性を否定できない者」の判定

ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c (NGSP) 値が6.0%以上、6.5%未満で、「糖尿病が強く疑われる者」以外の者

第28表 高血圧症有病者の状況－高血圧症有病者の状況、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	15,061	100.0	780	100.0	1,747	100.0	1,929	100.0	2,329	100.0	3,878	100.0	4,398	100.0	9,926	100.0	3,647	100.0	2,608	100.0
高血圧症有病者	7,256	46.1	33	3.4	192	10.1	432	19.8	1,027	42.2	2,295	58.3	3,277	74.2	5,006	48.7	2,414	65.8	2,025	77.8
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	4,276	58.5	3	10.8	20	13.6	102	20.2	384	36.1	1,356	59.8	2,411	72.4	2,706	54.4	1,612	66.5	1,547	74.5
正常高値血圧者	2,082	13.4	72	9.7	190	9.9	318	15.2	399	16.9	604	15.5	499	10.9	1,546	15.1	487	13.1	274	10.0
上記以外	5,723	40.6	675	86.9	1,365	80.0	1,179	65.0	903	40.9	979	26.2	622	14.8	3,374	36.2	746	21.1	309	12.1
総数	6,145	100.0	317	100.0	655	100.0	727	100.0	867	100.0	1,660	100.0	1,919	100.0	4,038	100.0	1,563	100.0	1,135	100.0
高血圧症有病者	3,508	55.5	29	7.3	141	22.2	269	32.3	515	57.3	1,105	65.2	1,449	75.5	2,464	59.0	1,111	70.9	874	76.9
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	1,917	55.2	2	7.6	14	14.8	54	16.3	189	34.7	623	58.4	1,035	71.5	1,262	52.2	732	67.0	639	72.6
正常高値血圧者	910	14.7	49	17.7	119	15.7	147	19.5	144	16.8	233	14.3	218	11.2	620	15.3	186	12.0	122	10.9
上記以外	1,727	29.9	239	75.0	395	62.1	311	48.2	208	25.9	322	20.5	252	13.3	954	25.7	266	17.1	139	12.2
総数	8,916	100.0	463	100.0	1,092	100.0	1,202	100.0	1,462	100.0	2,218	100.0	2,479	100.0	5,888	100.0	2,084	100.0	1,473	100.0
高血圧症有病者	3,748	39.6	4	0.7	51	3.5	163	12.6	512	33.5	1,190	52.8	1,828	73.3	2,542	41.6	1,303	61.8	1,151	78.6
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	2,359	61.6	1	29.6	6	9.7	48	26.0	195	37.5	733	61.2	1,376	73.2	1,444	56.5	880	66.1	908	76.0
正常高値血圧者	1,172	12.5	23	4.3	71	6.8	171	12.7	255	17.0	371	16.5	281	10.7	926	15.0	301	14.0	152	9.4
上記以外	3,996	47.9	436	95.0	970	89.7	868	74.7	695	49.5	657	30.7	370	16.0	2,420	43.4	480	24.2	170	12.0

注)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

判定の基準はp.14参照。

*「服薬者」とは、身体状況調査票で「血圧を下げる薬」の使用有と回答した者。

(24年)

「高血圧症有病者」の判定
収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者

第29表 「脂質異常症が疑われる者」の状況－脂質異常症が疑われる者の状況、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	14,097	100.0	735	100.0	1,656	100.0	1,837	100.0	2,198	100.0	3,626	100.0	4,045	100.0	9,336	100.0	3,411	100.0	2,370	100.0
脂質異常症が疑われる者	3,021	21.1	39	4.2	104	6.3	157	7.6	357	16.4	1,000	27.7	1,364	34.3	2,051	22.0	1,059	31.9	827	35.0
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	2,078	69.3	4	6.9	9	7.2	56	32.0	230	59.3	753	75.8	1,026	77.9	1,468	71.5	829	79.9	597	75.1
上記以外	11,076	78.9	696	95.8	1,552	93.7	1,680	92.4	1,841	83.6	2,626	72.3	2,681	65.7	7,285	78.0	2,352	68.1	1,543	65.0
総数	5,755	100.0	299	100.0	628	100.0	689	100.0	823	100.0	1,549	100.0	1,767	100.0	3,797	100.0	1,469	100.0	1,031	100.0
脂質異常症が疑われる者	1,384	24.3	30	8.0	82	13.1	116	15.4	178	23.6	422	28.0	556	31.8	932	24.9	428	29.5	340	33.8
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	696	50.4	2	3.6	6	6.0	36	24.7	79	34.4	244	60.6	329	61.5	493	51.9	257	63.2	195	60.7
上記以外	4,371	75.7	269	92.0	546	86.9	573	84.6	645	76.4	1,127	72.0	1,211	68.2	2,865	75.1	1,041	70.5	691	66.2
総数	8,342	100.0	436	100.0	1,028	100.0	1,148	100.0	1,375	100.0	2,077	100.0	2,278	100.0	5,539	100.0	1,942	100.0	1,339	100.0
脂質異常症が疑われる者	1,637	18.9	9	1.5	22	2.5	41	3.2	179	12.2	578	27.5	808	36.4	1,119	19.9	631	33.7	487	35.9
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	1,382	85.8	2	17.0	3	10.9	20	51.2	151	87.1	509	87.9	697	89.2	975	88.0	572	91.2	402	86.2
上記以外	6,705	81.1	427	98.5	1,006	97.5	1,107	96.8	1,196	87.8	1,499	72.5	1,470	63.6	4,420	80.1	1,311	66.3	852	64.1

注)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(D.8参照)。

* 「服薬者」とは、身体状況調査票で「コレステロールを下げる薬」または「中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用有と回答した者。

「脂質異常症が疑われる者」の判定
国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記の通りとした。
HDL-コレステロールが40mg/dL未満、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬を服用している者。

第30表 運動習慣の有無一運動習慣の有無、年齢階級別、人数、割合一全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

運動習慣の有無	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-64歳		(再掲)65歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	16,595	100.0	965	100.0	2,043	100.0	2,216	100.0	2,548	100.0	4,132	100.0	4,691	100.0	9,936	100.0	6,659	100.0	3,850	100.0	2,809	100.0
習慣無し(健康上の理由)	1,151	6.4	10	1.1	32	1.9	62	2.8	104	3.8	230	5.2	713	14.1	304	3.0	847	11.6	322	8.1	525	17.1
習慣無し(その他)	10,506	62.1	771	79.3	1,646	81.5	1,739	78.0	1,818	70.4	2,349	53.3	2,183	43.5	7,330	73.5	3,176	44.5	1,859	44.5	1,317	44.3
習慣有り	4,938	31.5	184	19.7	365	16.6	415	19.2	626	25.7	1,553	41.5	1,795	42.3	2,302	23.5	2,636	44.0	1,669	47.4	967	38.6
総数	6,935	100.0	411	100.0	824	100.0	875	100.0	998	100.0	1,785	100.0	2,042	100.0	4,053	100.0	2,882	100.0	1,672	100.0	1,210	100.0
習慣無し(健康上の理由)	364	5.0	3	0.9	10	1.3	22	3.0	31	3.0	67	3.3	231	10.8	92	2.4	272	8.5	101	5.2	171	13.5
習慣無し(その他)	4,197	59.0	297	71.8	624	77.8	663	75.8	695	69.3	1,020	53.5	898	40.0	2,881	71.1	1,316	41.8	770	42.0	546	41.6
習慣有り	2,374	36.1	111	27.4	190	20.8	190	21.2	272	27.6	698	43.2	913	49.2	1,080	26.5	1,294	49.6	801	52.8	493	44.9
総数	9,660	100.0	554	100.0	1,219	100.0	1,341	100.0	1,550	100.0	2,347	100.0	2,649	100.0	5,883	100.0	3,777	100.0	2,178	100.0	1,599	100.0
習慣無し(健康上の理由)	787	7.4	7	1.2	22	2.3	40	2.7	73	4.4	163	6.7	482	16.7	212	3.4	575	14.0	221	10.3	354	19.9
習慣無し(その他)	6,309	64.4	474	84.8	1,022	83.8	1,076	79.3	1,123	71.1	1,329	53.2	1,285	46.4	4,449	75.1	1,860	46.5	1,089	46.6	771	46.5
習慣有り	2,564	28.2	73	14.0	175	13.9	225	18.0	354	24.5	855	40.1	882	36.9	1,222	21.5	1,342	39.4	868	43.2	474	33.6

注)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

身体状況調査票の(7)運動に「1 健康上の理由で運動が出来ない」または「2 上記以外の理由で運動が出来ない」と回答した者、及び「3 運動の習慣有り」と回答し、かつ(a)-(c)すべてに回答した者について集計。

(24年)

第31表 1週間の運動日数－1週間の運動日数、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-64歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	16,595	100.0	965	100.0	2,043	100.0	2,216	100.0	2,548	100.0	4,132	100.0	4,691	100.0	9,936	100.0	6,659	100.0	3,850	100.0	2,809	100.0
運動習慣無し	11,657	68.5	781	80.3	1,678	83.4	1,801	80.8	1,922	74.3	2,579	58.5	2,896	57.7	7,634	76.5	4,023	56.0	2,181	52.6	1,842	61.4
2日/週	1,042	6.9	63	6.3	130	6.5	126	6.0	173	7.4	281	7.4	269	7.0	647	6.8	395	7.1	238	7.4	157	6.7
3日/週	875	5.6	35	4.2	77	3.2	88	4.1	117	5.1	243	6.2	315	7.5	429	4.4	446	7.3	272	7.7	174	6.7
4日/週	458	3.0	14	1.1	40	1.6	33	1.8	58	2.4	168	4.6	145	3.7	216	2.2	242	4.4	175	5.5	67	2.7
5日/週	558	3.7	32	3.7	45	1.9	70	3.5	76	3.5	173	5.3	162	3.4	305	3.4	253	4.2	177	5.0	76	3.0
6日/週	231	1.4	12	1.2	13	0.6	19	0.7	34	1.2	67	1.6	86	2.0	107	1.0	124	1.9	79	2.1	45	1.6
7日/週	1,774	10.9	28	3.3	60	2.8	79	3.2	168	6.1	621	16.3	818	18.7	598	5.7	1,176	19.0	728	19.8	448	17.8
総数	6,935	100.0	411	100.0	824	100.0	875	100.0	998	100.0	1,785	100.0	2,042	100.0	4,053	100.0	2,882	100.0	1,672	100.0	1,210	100.0
運動習慣無し	4,561	63.9	300	72.6	634	79.1	685	78.8	726	72.4	1,087	56.8	1,129	50.8	2,973	73.5	1,588	50.4	871	47.2	717	55.1
2日/週	462	7.4	43	10.5	69	8.7	54	6.5	74	8.0	113	7.2	109	6.4	304	8.0	158	6.5	101	7.3	57	5.3
3日/週	377	5.6	24	5.6	45	4.5	40	4.1	44	4.4	84	5.0	140	7.4	191	4.5	186	7.0	106	6.9	80	7.3
4日/週	209	3.2	5	0.6	20	2.1	18	2.2	23	1.8	73	4.3	70	4.5	94	2.0	115	5.0	82	6.1	33	3.3
5日/週	294	4.7	19	5.0	25	2.4	31	4.0	38	4.7	81	5.9	100	5.0	154	4.2	140	5.5	87	5.9	53	5.0
6日/週	127	1.7	8	2.0	9	0.9	7	0.4	14	1.1	36	1.9	53	2.8	53	1.2	74	2.4	47	2.5	27	2.3
7日/週	905	13.5	12	3.7	22	2.3	40	3.9	79	6.9	311	18.9	441	23.1	284	6.6	621	23.2	378	24.1	243	21.8
総数	9,660	100.0	554	100.0	1,219	100.0	1,341	100.0	1,550	100.0	2,347	100.0	2,649	100.0	5,883	100.0	3,777	100.0	2,178	100.0	1,599	100.0
運動習慣無し	7,096	71.8	481	86.0	1,044	86.1	1,116	82.0	1,196	75.5	1,492	59.9	1,767	63.1	4,661	78.5	2,435	60.6	1,310	56.8	1,125	66.4
2日/週	580	6.6	20	3.2	61	5.2	72	5.6	99	7.0	168	7.7	160	7.4	343	6.0	237	7.6	137	7.4	100	7.9
3日/週	498	5.6	11	3.1	32	2.3	48	4.0	73	5.1	159	7.2	175	7.6	238	4.3	260	7.6	166	8.4	94	6.3
4日/週	249	2.9	9	1.5	20	1.3	15	1.6	35	2.8	95	4.9	75	3.1	122	2.3	127	3.9	93	5.1	34	2.2
5日/週	264	3.0	13	2.6	20	1.6	39	3.1	38	2.7	92	4.8	62	2.2	151	2.9	113	3.1	90	4.2	23	1.4
6日/週	104	1.1	4	0.7	4	0.4	12	0.8	20	1.3	31	1.4	33	1.4	54	0.9	50	1.5	32	1.7	18	1.1
7日/週	869	9.1	16	3.0	38	3.1	39	2.8	89	5.5	310	14.2	377	15.1	314	5.2	555	15.7	350	16.4	205	14.6

(注)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

身体状況調査票の(7)運動に「1.健康上の理由で運動が出来ない」または「2.上記以外の理由で運動が出来ない」と回答した者、及び「3.運動の習慣有り」と回答し、かつ(a)-(c)すべてに回答した者について集計。

(24年)

第32表 運動を行う日の平均運動時間－運動を行う日の平均運動時間、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-64歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	16,595	100.0	965	100.0	2,043	100.0	2,216	100.0	2,548	100.0	4,132	100.0	4,691	100.0	9,936	100.0	6,659	100.0	3,850	100.0	2,809	100.0
運動習慣無し	11,657	68.5	781	80.3	1,678	83.4	1,801	80.8	1,922	74.3	2,579	58.5	2,896	57.7	7,634	76.5	4,023	56.0	2,181	52.6	1,842	61.4
30分以上60分未満	2,193	13.5	72	8.1	123	5.5	177	8.1	295	11.4	689	17.4	837	19.2	1,006	10.0	1,187	18.9	719	19.5	468	17.9
60分以上120分未満	1,731	11.5	55	6.7	145	6.7	149	6.8	220	9.1	567	15.9	595	14.9	826	8.6	905	16.0	601	17.6	304	13.6
120分以上180分未満	716	4.7	37	3.2	73	3.0	55	2.7	76	3.8	219	6.1	256	6.0	329	3.4	387	6.6	252	7.6	135	5.2
180分以上	298	1.9	20	1.8	24	1.4	34	1.6	35	1.5	78	2.1	107	2.2	141	1.5	157	2.4	97	2.7	60	2.0
総数	6,935	100.0	411	100.0	824	100.0	875	100.0	998	100.0	1,785	100.0	2,042	100.0	4,053	100.0	2,882	100.0	1,672	100.0	1,210	100.0
運動習慣無し	4,561	63.9	300	72.6	634	79.1	685	78.8	726	72.4	1,087	56.8	1,129	50.8	2,973	73.5	1,588	50.4	871	47.2	717	55.1
30分以上60分未満	913	13.0	32	7.9	59	6.0	73	7.0	111	9.7	257	15.0	381	19.7	407	9.3	506	18.2	287	18.2	219	18.2
60分以上120分未満	879	14.4	36	10.2	68	7.9	73	8.7	102	10.8	279	18.0	321	19.5	405	10.6	474	19.8	314	21.4	160	17.4
120分以上180分未満	409	6.1	27	5.6	46	4.5	29	3.5	42	5.6	117	7.6	148	7.2	188	4.6	221	8.4	141	9.5	80	6.7
180分以上	173	2.5	16	3.7	17	2.5	15	2.0	17	1.5	45	2.7	63	2.9	80	2.0	93	3.3	59	3.8	34	2.6
総数	9,660	100.0	554	100.0	1,219	100.0	1,341	100.0	1,550	100.0	2,347	100.0	2,649	100.0	5,883	100.0	3,777	100.0	2,178	100.0	1,599	100.0
運動習慣無し	7,096	71.8	481	86.0	1,044	86.1	1,116	82.0	1,196	75.5	1,492	59.9	1,767	63.1	4,661	78.5	2,435	60.6	1,310	56.8	1,125	66.4
30分以上60分未満	1,280	13.8	40	8.2	64	5.2	104	8.8	184	12.4	432	19.4	456	18.8	599	10.5	681	19.4	432	20.6	249	17.6
60分以上120分未満	852	9.4	19	4.0	77	5.9	76	5.7	118	8.0	288	14.2	274	11.3	421	7.2	431	13.1	287	14.7	144	10.4
120分以上180分未満	307	3.6	10	1.3	27	2.1	26	2.2	34	2.6	102	5.0	108	5.1	141	2.6	166	5.3	111	6.0	55	4.1
180分以上	125	1.4	4	0.5	7	0.8	19	1.4	18	1.5	33	1.6	44	1.7	61	1.2	64	1.7	38	1.8	26	1.5

注)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8 参照)。

身体状況調査票の(7)運動に「1.健康上の理由で運動が出来ない」または「2.上記以外の理由で運動が出来ない」と回答した者、及び「3.運動の習慣有り」と回答し、かつ(a)-(c)すべてに回答した者について集計。

(24年)

第33表 運動強度の状況－運動強度，年齢階級別，人数，割合－全国補正值，総数・男性・女性，20歳以上

総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-64歳		(再掲)65歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	16,595	100.0	965	100.0	2,043	100.0	2,216	100.0	2,548	100.0	4,132	100.0	4,691	100.0	9,936	100.0	6,659	100.0	3,850	100.0	2,809	100.0
運動習慣無し	11,657	68.5	781	80.3	1,678	83.4	1,801	80.8	1,922	74.3	2,579	58.5	2,896	57.7	7,634	76.5	4,023	56.0	2,181	52.6	1,842	61.4
高強度	339	2.4	47	4.5	80	3.6	61	3.0	52	2.3	65	2.3	34	1.1	275	2.9	64	1.6	48	2.1	16	0.9
中強度	1,509	9.6	77	8.1	135	6.2	166	7.8	250	10.2	484	12.9	397	9.2	880	9.1	629	10.3	447	12.5	182	7.1
低強度	3,090	19.5	60	7.2	150	6.8	188	8.4	324	13.2	1,004	26.3	1,364	32.1	1,147	11.6	1,943	32.0	1,174	32.8	769	30.7
総数	6,935	100.0	411	100.0	824	100.0	875	100.0	998	100.0	1,785	100.0	2,042	100.0	4,053	100.0	2,882	100.0	1,672	100.0	1,210	100.0
運動習慣無し	4,561	63.9	300	72.6	634	79.1	685	78.8	726	72.4	1,087	56.8	1,129	50.8	2,973	73.5	1,588	50.4	871	47.2	717	55.1
高強度	212	3.2	38	8.4	60	6.6	35	4.0	27	3.1	34	2.1	18	1.3	181	4.3	31	1.6	22	2.1	9	0.9
中強度	752	11.2	50	11.8	78	8.8	85	9.6	108	10.7	211	13.0	220	11.5	421	10.1	331	12.8	226	15.0	105	9.6
低強度	1,410	21.6	23	7.1	52	5.5	70	7.6	137	13.8	453	28.1	675	36.4	478	12.1	932	35.2	553	35.7	379	34.4
総数	9,660	100.0	554	100.0	1,219	100.0	1,341	100.0	1,550	100.0	2,347	100.0	2,649	100.0	5,883	100.0	3,777	100.0	2,178	100.0	1,599	100.0
運動習慣無し	7,096	71.8	481	86.0	1,044	86.1	1,116	82.0	1,196	75.5	1,492	59.9	1,767	63.1	4,661	78.5	2,435	60.6	1,310	56.8	1,125	66.4
高強度	127	1.8	9	1.5	20	1.7	26	2.3	25	1.8	31	2.5	16	0.9	94	1.9	33	1.6	26	2.1	7	0.8
中強度	757	8.4	27	5.2	57	4.6	81	6.7	142	9.9	273	12.7	177	7.4	459	8.4	298	8.4	221	10.5	77	5.0
低強度	1,680	18.0	37	7.2	98	7.7	118	8.9	187	12.8	551	24.9	689	28.6	669	11.2	1,011	29.5	621	30.6	390	27.7

注)割合は全国補正值であり，単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
 身体状況調査票の(7)運動に「1 健康上の理由で運動が出来ない」または「2 上記以外の理由で運動が出来ない」と回答した者，及び「3 運動の習慣有り」と回答し，かつ(a)-(c)すべてに回答した者について集計。

(24年)

第34表 歩数の平均値および標準偏差一年齢階級別，平均値，標準偏差－全国補正值，総数・男性・女性，20歳以上

総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-64歳		(再掲)65歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上									
	人数	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差							
総数	24,369	6,661	4,080	7,459	4,612	3,411	3,667	7,345	3,971	3,871	7,354	3,915	5,536	6,955	4,017	5,881	4,710	3,492	15,985	7,303	4,083	8,384	5,368	3,755	4,841	6,332	3,783	3,543	3,890	3,188
男性	11,151	7,139	4,400	953	8,059	4,907	1,587	8,004	4,493	1,676	7,753	4,252	1,718	7,698	4,323	2,588	7,303	4,299	7,367	7,788	4,440	3,784	5,829	4,010	2,245	6,680	4,072	1,539	4,451	3,496
女性	13,218	6,257	3,741	1,050	6,948	4,281	1,824	6,653	3,448	1,991	7,003	3,686	2,153	7,086	3,545	2,948	6,644	3,722	8,618	6,893	3,704	4,600	4,979	3,478	2,596	6,027	3,483	2,004	3,445	2,843

注)平均値および標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。
 栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動量(歩数)」および「歩数計の装着状況」の両方に回答した者について集計。

(24年)

(歩/日)

<参考> 1の1 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の分布－収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の区分，年齢階級別，人数，割合－粗集計，男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-89歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	収縮期(最高)血圧	総数	6,163	100.0	318	100.0	658	100.0	732	100.0	868	100.0	1,663	100.0	1,924	100.0	5,152	100.0
	90mmHg未満	3	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.0	
	90-99	41	0.7	8	2.5	9	1.4	11	1.5	3	0.3	6	0.4	4	0.2	24	0.5	
	100-109	308	5.0	49	15.4	82	12.5	62	8.5	29	3.3	50	3.0	36	1.9	176	3.4	
	110-119	795	12.9	111	34.9	176	26.7	148	20.2	98	11.3	122	7.3	140	7.3	506	9.8	
	120-129	1,285	20.9	89	28.0	205	31.2	203	27.7	174	20.0	312	18.8	302	15.7	986	19.1	
	130-139	1,421	23.1	43	13.5	120	18.2	151	20.6	219	25.2	414	24.9	474	24.6	1,247	24.2	
	140-149	1,084	17.6	12	3.8	40	6.1	95	13.0	182	21.0	323	19.4	432	22.5	1,022	19.8	
	150-159	661	10.7	5	1.6	19	2.9	31	4.2	80	9.2	227	13.7	299	15.5	634	12.3	
	160-169	317	5.1	0	0.0	3	0.5	18	2.5	43	5.0	110	6.6	143	7.4	313	6.1	
	170-179	162	2.6	0	0.0	3	0.5	7	1.0	29	3.3	66	4.0	57	3.0	157	3.0	
	180mmHg以上	86	1.4	0	0.0	1	0.2	5	0.7	11	1.3	33	2.0	36	1.9	85	1.6	
	拡張期(最低)血圧	総数	6,163	100.0	318	100.0	658	100.0	732	100.0	868	100.0	1,663	100.0	1,924	100.0	5,152	100.0
	40mmHg未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0	
	40-49	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.2	4	0.1	
	50-59	101	1.6	26	8.2	11	1.7	3	0.4	2	0.2	16	1.0	43	2.2	63	1.2	
	60-69	705	11.4	85	26.7	108	16.4	66	9.0	33	3.8	116	7.0	297	15.4	505	9.8	
	70-79	1,838	29.8	118	37.1	228	34.7	185	25.3	188	21.7	470	28.3	649	33.7	1,478	28.7	
	80-89	2,085	33.8	72	22.6	198	30.1	268	36.6	313	36.1	594	35.7	640	33.3	1,806	35.1	
	90-99	1,087	17.6	17	5.3	93	14.1	156	21.3	230	26.5	352	21.2	239	12.4	973	18.9	
100-109	274	4.4	0	0.0	13	2.0	42	5.7	80	9.2	93	5.6	46	2.4	261	5.1		
110-119	52	0.8	0	0.0	7	1.1	6	0.8	19	2.2	15	0.9	5	0.3	45	0.9		
120-129	14	0.2	0	0.0	0	0.0	4	0.5	3	0.3	6	0.4	1	0.1	14	0.3		
130-139	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0		
140mmHg以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.0		
女性	収縮期(最高)血圧	総数	8,940	100.0	465	100.0	1,094	100.0	1,205	100.0	1,466	100.0	2,224	100.0	2,486	100.0	7,341	100.0
	90mmHg未満	32	0.4	7	1.5	12	1.1	7	0.6	1	0.1	3	0.1	2	0.1	13	0.2	
	90-99	411	4.6	104	22.4	160	14.6	91	7.6	26	1.8	19	0.9	11	0.4	147	2.0	
	100-109	1,152	12.9	175	37.6	344	31.4	255	21.2	170	11.6	134	6.0	74	3.0	632	8.6	
	110-119	1,512	16.9	118	25.4	306	28.0	335	27.8	284	19.4	255	11.5	214	8.6	1,084	14.8	
	120-129	1,736	19.4	45	9.7	187	17.1	267	22.2	346	23.6	474	21.3	417	16.8	1,500	20.4	
	130-139	1,650	18.5	15	3.2	56	5.1	153	12.7	266	18.1	547	24.6	613	24.7	1,571	21.4	
	140-149	1,189	13.3	0	0.0	19	1.7	56	4.6	185	12.6	388	17.4	541	21.8	1,163	15.8	
	150-159	689	7.7	0	0.0	6	0.5	23	1.9	97	6.6	223	10.0	340	13.7	672	9.2	
	160-169	330	3.7	1	0.2	4	0.4	10	0.8	52	3.5	103	4.6	160	6.4	323	4.4	
	170-179	154	1.7	0	0.0	0	0.0	4	0.3	19	1.3	50	2.2	81	3.3	152	2.1	
	180mmHg以上	85	1.0	0	0.0	0	0.0	4	0.3	20	1.4	28	1.3	33	1.3	84	1.1	
	拡張期(最低)血圧	総数	8,940	100.0	465	100.0	1,094	100.0	1,205	100.0	1,466	100.0	2,224	100.0	2,486	100.0	7,341	100.0
	40mmHg未満	2	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	
	40-49	34	0.4	7	1.5	11	1.0	4	0.3	1	0.1	4	0.2	7	0.3	16	0.2	
	50-59	347	3.9	72	15.5	81	7.4	47	3.9	19	1.3	26	1.2	102	4.1	193	2.6	
	60-69	1,784	20.0	204	43.9	400	36.6	271	22.5	185	12.6	286	12.9	438	17.6	1,176	16.0	
	70-79	3,289	36.8	143	30.8	408	37.3	508	42.2	513	35.0	781	35.1	936	37.7	2,720	37.1	
	80-89	2,442	27.3	35	7.5	150	13.7	275	22.8	480	32.7	771	34.7	731	29.4	2,247	30.6	
	90-99	835	9.3	3	0.6	37	3.4	70	5.8	204	13.9	287	12.9	234	9.4	791	10.8	
100-109	168	1.9	0	0.0	6	0.5	27	2.2	53	3.6	50	2.2	32	1.3	161	2.2		
110-119	33	0.4	0	0.0	1	0.1	2	0.2	9	0.6	17	0.8	4	0.2	32	0.4		
120-129	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.0	3	0.0		
130-139	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0		
140mmHg以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0		

注)本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

<参考> 1の2 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の分布－収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の区分，年齢階級別，人数，割合－粗集計，男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-89歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	収縮期(最高)血圧	総数	4,228	100.0	315	100.0	641	100.0	673	100.0	678	100.0	1,037	100.0	884	100.0	3,257	100.0
		90mmHg未満	3	0.1	1	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1
		90-99	38	0.9	8	2.5	9	1.4	10	1.5	3	0.4	6	0.6	2	0.2	21	0.6
		100-109	289	6.8	49	15.6	81	12.6	60	8.9	26	3.8	45	4.3	28	3.2	158	4.9
		110-119	700	16.6	110	34.9	176	27.5	142	21.1	92	13.6	95	9.2	85	9.6	414	12.7
		120-129	980	23.2	88	27.9	198	30.9	184	27.3	142	20.9	215	20.7	153	17.3	692	21.2
		130-139	933	22.1	42	13.3	114	17.8	142	21.1	166	24.5	246	23.7	223	25.2	772	23.7
		140-149	607	14.4	12	3.8	38	5.9	82	12.2	130	19.2	178	17.2	167	18.9	553	17.0
		150-159	362	8.6	5	1.6	18	2.8	28	4.2	58	8.6	127	12.2	126	14.3	338	10.4
		160-169	167	3.9	0	0.0	3	0.5	14	2.1	27	4.0	66	6.4	57	6.4	163	5.0
		170-179	95	2.2	0	0.0	3	0.5	5	0.7	25	3.7	39	3.8	23	2.6	91	2.8
	180mmHg以上	54	1.3	0	0.0	1	0.2	5	0.7	9	1.3	20	1.9	19	2.1	53	1.6	
	拡張期(最低)血圧	総数	4,228	100.0	315	100.0	641	100.0	673	100.0	678	100.0	1,037	100.0	884	100.0	3,257	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
		50-59	80	1.9	26	8.3	11	1.7	3	0.4	2	0.3	14	1.4	24	2.7	43	1.3
		60-69	492	11.6	85	27.0	108	16.8	62	9.2	30	4.4	82	7.9	125	14.1	296	9.1
		70-79	1,274	30.1	118	37.5	227	35.4	175	26.0	149	22.0	290	28.0	315	35.6	921	28.3
		80-89	1,408	33.3	69	21.9	189	29.5	249	37.0	249	36.7	363	35.0	289	32.7	1,148	35.2
		90-99	731	17.3	17	5.4	87	13.6	141	21.0	173	25.5	206	19.9	107	12.1	625	19.2
100-109		187	4.4	0	0.0	12	1.9	31	4.6	57	8.4	66	6.4	21	2.4	175	5.4	
110-119		43	1.0	0	0.0	7	1.1	6	0.9	16	2.4	11	1.1	3	0.3	36	1.1	
120-129		10	0.2	0	0.0	0	0.0	4	0.6	2	0.3	4	0.4	0	0.0	10	0.3	
130-139	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0		
140mmHg以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.0		
女性	収縮期(最高)血圧	総数	6,557	100.0	462	100.0	1,086	100.0	1,154	100.0	1,267	100.0	1,485	100.0	1,103	100.0	4,999	100.0
		90mmHg未満	30	0.5	7	1.5	12	1.1	7	0.6	0	0.0	3	0.2	1	0.1	11	0.2
		90-99	405	6.2	103	22.3	160	14.7	88	7.6	25	2.0	19	1.3	10	0.9	142	2.8
		100-109	1,118	17.1	174	37.7	343	31.6	255	22.1	168	13.3	127	8.6	51	4.6	601	12.0
		110-119	1,351	20.6	118	25.5	305	28.1	329	28.5	268	21.2	212	14.3	119	10.8	927	18.5
		120-129	1,366	20.8	44	9.5	186	17.1	258	22.4	312	24.6	358	24.1	208	18.9	1,134	22.7
		130-139	1,065	16.2	15	3.2	55	5.1	139	12.0	219	17.3	355	23.9	282	25.6	990	19.8
		140-149	599	9.1	0	0.0	18	1.7	48	4.2	132	10.4	195	13.1	206	18.7	581	11.6
		150-159	322	4.9	0	0.0	4	0.4	16	1.4	76	6.0	105	7.1	121	11.0	316	6.3
		160-169	176	2.7	1	0.2	3	0.3	7	0.6	41	3.2	65	4.4	59	5.3	172	3.4
		170-179	79	1.2	0	0.0	0	0.0	4	0.3	12	0.9	32	2.2	31	2.8	79	1.6
	180mmHg以上	46	0.7	0	0.0	0	0.0	3	0.3	14	1.1	14	0.9	15	1.4	46	0.9	
	拡張期(最低)血圧	総数	6,557	100.0	462	100.0	1,086	100.0	1,154	100.0	1,267	100.0	1,485	100.0	1,103	100.0	4,999	100.0
		40mmHg未満	1	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	28	0.4	7	1.5	11	1.0	3	0.3	0	0.0	4	0.3	3	0.3	10	0.2
		50-59	275	4.2	72	15.6	81	7.5	47	4.1	18	1.4	21	1.4	36	3.3	122	2.4
		60-69	1,458	22.2	202	43.7	398	36.6	267	23.1	174	13.7	221	14.9	196	17.8	857	17.1
		70-79	2,441	37.2	142	30.7	408	37.6	499	43.2	477	37.6	520	35.0	395	35.8	1,885	37.7
		80-89	1,701	25.9	35	7.6	150	13.8	258	22.4	399	31.5	512	34.5	347	31.5	1,514	30.3
		90-99	515	7.9	3	0.6	32	2.9	54	4.7	152	12.0	167	11.2	107	9.7	479	9.6
100-109		110	1.7	0	0.0	5	0.5	23	2.0	38	3.0	28	1.9	16	1.5	105	2.1	
110-119		24	0.4	0	0.0	1	0.1	2	0.2	7	0.6	11	0.7	3	0.3	23	0.5	
120-129		2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.0	
130-139	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0		
140mmHg以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0		

注)本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

血圧を下げる薬の使用者除外。

数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

＜参考＞2の1 ヘモグロビン A1c (NGSP) の分布—ヘモグロビン A1c (NGSP) の区分,
〔インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	14,096	100.0	734	100.0	1,654	100.0	1,835	100.0	2,200	100.0	3,630	100.0	4,043	100.0	3,407	100.0	2,373	100.0
4.2%以下	6	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0
4.3-4.4	12	0.1	1	0.1	5	0.3	2	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	46	0.3	8	1.1	10	0.6	12	0.7	6	0.3	6	0.2	4	0.1	3	0.1	3	0.1
4.7-4.8	181	1.3	40	5.4	49	3.0	33	1.8	26	1.2	20	0.6	13	0.3	14	0.4	7	0.3
4.9-5.0	652	4.6	120	16.3	186	11.2	141	7.7	62	2.8	80	2.2	63	1.6	65	1.9	35	1.5
5.1-5.2	1,448	10.3	189	25.7	357	21.6	274	14.9	203	9.2	216	6.0	209	5.2	186	5.5	110	4.6
5.3	1,139	8.1	105	14.3	213	12.9	210	11.4	189	8.6	203	5.6	219	5.4	187	5.5	122	5.1
5.4	1,346	9.5	88	12.0	229	13.8	249	13.6	217	9.9	287	7.9	276	6.8	240	7.0	170	7.2
5.5	1,440	10.2	88	12.0	196	11.9	222	12.1	257	11.7	328	9.0	349	8.6	303	8.9	196	8.3
5.6	1,412	10.0	42	5.7	148	8.9	193	10.5	260	11.8	374	10.3	395	9.8	336	9.9	229	9.7
5.7	1,199	8.5	29	4.0	90	5.4	133	7.2	209	9.5	369	10.2	369	9.1	325	9.5	216	9.1
5.8	1,117	7.9	11	1.5	67	4.1	117	6.4	199	9.0	352	9.7	371	9.2	323	9.5	215	9.1
5.9	851	6.0	4	0.5	36	2.2	71	3.9	145	6.6	261	7.2	334	8.3	259	7.6	216	9.1
6.0	674	4.8	3	0.4	19	1.1	64	3.5	97	4.4	229	6.3	262	6.5	193	5.7	167	7.0
6.1	488	3.5	0	0.0	10	0.6	28	1.5	60	2.7	172	4.7	218	5.4	197	5.8	126	5.3
6.2	336	2.4	1	0.1	8	0.5	20	1.1	51	2.3	107	2.9	149	3.7	102	3.0	92	3.9
6.3	245	1.7	2	0.3	3	0.2	9	0.5	28	1.3	86	2.4	117	2.9	93	2.7	73	3.1
6.4	207	1.5	0	0.0	2	0.1	3	0.2	24	1.1	79	2.2	99	2.4	79	2.3	64	2.7
6.5	191	1.4	1	0.1	4	0.2	8	0.4	24	1.1	63	1.7	91	2.3	86	2.5	45	1.9
6.6-6.7	255	1.8	0	0.0	0	0.0	10	0.5	25	1.1	83	2.3	137	3.4	107	3.1	76	3.2
6.8-6.9	184	1.3	0	0.0	5	0.3	7	0.4	19	0.9	70	1.9	83	2.1	84	2.5	43	1.8
7.0-7.1	139	1.0	0	0.0	5	0.3	5	0.3	18	0.8	53	1.5	58	1.4	58	1.7	27	1.1
7.2-7.3	107	0.8	1	0.1	3	0.2	1	0.1	12	0.5	25	0.7	65	1.6	30	0.9	42	1.8
7.4-7.5	88	0.6	1	0.1	0	0.0	0	0.0	16	0.7	33	0.9	38	0.9	31	0.9	24	1.0
7.6-7.7	64	0.5	0	0.0	2	0.1	1	0.1	10	0.5	24	0.7	27	0.7	18	0.5	20	0.8
7.8-7.9	43	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	7	0.3	16	0.4	19	0.5	17	0.5	10	0.4
8.0-8.1	40	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	0.3	19	0.5	14	0.3	16	0.5	7	0.3
8.2-8.3	24	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.2	4	0.2	9	0.2	8	0.2	6	0.2	7	0.3
8.4-8.5	29	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0	11	0.3	16	0.4	8	0.2	12	0.5
8.6-8.7	26	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	12	0.3	11	0.3	12	0.4	4	0.2
8.8-8.9	17	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	8	0.2	6	0.1	6	0.2	3	0.1
9.0-9.1	8	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	3	0.1	2	0.0	2	0.1	1	0.0
9.2-9.3	14	0.1	0	0.0	1	0.1	3	0.2	5	0.2	3	0.1	2	0.0	4	0.1	0	0.0
9.4%以上	68	0.5	0	0.0	4	0.2	8	0.4	13	0.6	25	0.7	18	0.4	15	0.4	11	0.5
総 数	5,752	100.0	299	100.0	626	100.0	687	100.0	824	100.0	1,552	100.0	1,764	100.0	1,464	100.0	1,034	100.0
4.2%以下	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0
4.3-4.4	5	0.1	1	0.3	1	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	23	0.4	3	1.0	5	0.8	6	0.9	5	0.6	3	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1
4.7-4.8	75	1.3	14	4.7	15	2.4	7	1.0	19	2.3	10	0.6	10	0.6	7	0.5	6	0.6
4.9-5.0	279	4.9	55	18.4	70	11.2	48	7.0	30	3.6	43	2.8	33	1.9	45	3.1	12	1.2
5.1-5.2	605	10.5	85	28.4	127	20.3	94	13.7	79	9.6	118	7.6	102	5.8	97	6.6	53	5.1
5.3	469	8.2	41	13.7	72	11.5	77	11.2	76	9.2	95	6.1	108	6.1	97	6.6	55	5.3
5.4	539	9.4	40	13.4	92	14.7	108	15.7	70	8.5	113	7.3	116	6.6	88	6.0	73	7.1
5.5	576	10.0	29	9.7	92	14.7	85	12.4	92	11.2	142	9.1	136	7.7	120	8.2	79	7.6
5.6	543	9.4	12	4.0	54	8.6	70	10.2	91	11.0	145	9.3	171	9.7	138	9.4	103	10.0
5.7	434	7.5	10	3.3	30	4.8	41	6.0	67	8.1	129	8.3	157	8.9	122	8.3	94	9.1
5.8	402	7.0	4	1.3	27	4.3	44	6.4	70	8.5	120	7.7	137	7.8	116	7.9	71	6.9
5.9	294	5.1	0	0.0	14	2.2	17	2.5	34	4.1	99	6.4	130	7.4	98	6.7	87	8.4
6.0	257	4.5	1	0.3	4	0.6	31	4.5	31	3.8	88	5.7	102	5.8	81	5.5	65	6.3
6.1	200	3.5	0	0.0	4	0.6	12	1.7	27	3.3	76	4.9	81	4.6	80	5.5	48	4.6
6.2	135	2.3	0	0.0	3	0.5	7	1.0	14	1.7	40	2.6	71	4.0	45	3.1	44	4.3
6.3	101	1.8	1	0.3	2	0.3	2	0.3	11	1.3	32	2.1	53	3.0	32	2.2	38	3.7
6.4	113	2.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	12	1.5	43	2.8	56	3.2	42	2.9	36	3.5
6.5	90	1.6	1	0.3	0	0.0	4	0.6	11	1.3	35	2.3	39	2.2	45	3.1	18	1.7
6.6-6.7	138	2.4	0	0.0	0	0.0	7	1.0	13	1.6	45	2.9	73	4.1	55	3.8	38	3.7
6.8-6.9	96	1.7	0	0.0	3	0.5	3	0.4	12	1.5	40	2.6	38	2.2	48	3.3	16	1.5
7.0-7.1	82	1.4	0	0.0	3	0.5	3	0.4	10	1.2	32	2.1	34	1.9	33	2.3	18	1.7
7.2-7.3	64	1.1	1	0.3	3	0.5	1	0.1	8	1.0	15	1.0	36	2.0	14	1.0	25	2.4
7.4-7.5	46	0.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	8	1.0	17	1.1	20	1.1	16	1.1	13	1.3
7.6-7.7	33	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	6	0.7	12	0.8	14	0.8	8	0.5	10	1.0
7.8-7.9	26	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	7	0.8	11	0.7	7	0.4	7	0.5	5	0.5
8.0-8.1	23	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.5	11	0.7	7	0.4	7	0.5	5	0.5
8.2-8.3	14	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.4	3	0.4	4	0.3	4	0.2	2	0.1	3	0.3
8.4-8.5	18	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	8	0.5	9	0.5	5	0.3	6	0.6
8.6-8.7	12	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	7	0.5	3	0.2	4	0.3	2	0.2
8.8-8.9	6	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1
9.0-9.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1
9.2-9.3	8	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.5	1	0.1	2	0.1	3	0.2	0	0.0
9.4%以上	40	0.7	0	0.0	3	0.5	6	0.9	7	0.8	13	0.8	11	0.6	6</			

年齢級別, 人数, 割合—粗集計, 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
	総数	8,344	100.0	435	100.0	1,028	100.0	1,148	100.0	1,376	100.0	2,078	100.0	2,279	100.0	1,943	100.0	1,339	100.0
女性	4.2%以下	3	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
	4.3-4.4	7	0.1	0	0.0	4	0.4	0	0.0	2	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	23	0.3	5	1.1	5	0.5	6	0.5	1	0.1	3	0.1	3	0.1	2	0.1	2	0.1
	4.7-4.8	106	1.3	26	6.0	34	3.3	26	2.3	7	0.5	10	0.5	3	0.1	7	0.4	1	0.1
	4.9-5.0	373	4.5	65	14.9	116	11.3	93	8.1	32	2.3	37	1.8	30	1.3	20	1.0	23	1.7
	5.1-5.2	843	10.1	104	23.9	230	22.4	180	15.7	124	9.0	98	4.7	107	4.7	89	4.6	57	4.3
	5.3	670	8.0	64	14.7	141	13.7	133	11.6	113	8.2	108	5.2	111	4.9	90	4.6	67	5.0
	5.4	807	9.7	48	11.0	137	13.3	141	12.3	147	10.7	174	8.4	160	7.0	152	7.8	97	7.2
	5.5	864	10.4	59	13.6	104	10.1	137	11.9	165	12.0	186	9.0	213	9.3	183	9.4	117	8.7
	5.6	869	10.4	30	6.9	94	9.1	123	10.7	169	12.3	229	11.0	224	9.8	198	10.2	126	9.4
	5.7	765	9.2	19	4.4	60	5.8	92	8.0	142	10.3	240	11.5	212	9.3	203	10.4	122	9.1
	5.8	715	8.6	7	1.6	40	3.9	73	6.4	129	9.4	232	11.2	234	10.3	207	10.7	144	10.8
	5.9	557	6.7	4	0.9	22	2.1	54	4.7	111	8.1	162	7.8	204	9.0	161	8.3	129	9.6
	6.0	417	5.0	2	0.5	15	1.5	33	2.9	66	4.8	141	6.8	160	7.0	112	5.8	102	7.6
	6.1	288	3.5	0	0.0	6	0.6	16	1.4	33	2.4	96	4.6	137	6.0	117	6.0	78	5.8
	6.2	201	2.4	1	0.2	5	0.5	13	1.1	37	2.7	67	3.2	78	3.4	57	2.9	48	3.6
	6.3	144	1.7	1	0.2	1	0.1	7	0.6	17	1.2	54	2.6	64	2.8	61	3.1	35	2.6
	6.4	94	1.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	12	0.9	36	1.7	43	1.9	37	1.9	28	2.1
	6.5	101	1.2	0	0.0	4	0.4	4	0.3	13	0.9	28	1.3	52	2.3	41	2.1	27	2.0
	6.6-6.7	117	1.4	0	0.0	0	0.0	3	0.3	12	0.9	38	1.8	64	2.8	52	2.7	38	2.8
	6.8-6.9	88	1.1	0	0.0	2	0.2	4	0.3	7	0.5	30	1.4	45	2.0	36	1.9	27	2.0
	7.0-7.1	57	0.7	0	0.0	2	0.2	2	0.2	8	0.6	21	1.0	24	1.1	25	1.3	9	0.7
	7.2-7.3	43	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.3	10	0.5	29	1.3	16	0.8	17	1.3
7.4-7.5	42	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.6	16	0.8	18	0.8	15	0.8	11	0.8	
7.6-7.7	31	0.4	0	0.0	1	0.1	1	0.1	4	0.3	12	0.6	13	0.6	10	0.5	10	0.7	
7.8-7.9	17	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.2	12	0.5	10	0.5	5	0.4	
8.0-8.1	17	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	8	0.4	7	0.3	9	0.5	2	0.1	
8.2-8.3	10	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	5	0.2	4	0.2	4	0.2	4	0.3	
8.4-8.5	11	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.1	7	0.3	3	0.2	6	0.4	
8.6-8.7	14	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	5	0.2	8	0.4	8	0.4	2	0.1	
8.8-8.9	11	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	5	0.2	5	0.2	5	0.3	2	0.1	
9.0-9.1	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	
9.2-9.3	6	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	
9.4%以上	28	0.3	0	0.0	1	0.1	2	0.2	6	0.4	12	0.6	7	0.3	9	0.5	3	0.2	

注) 本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

<参考> 2の2 ヘモグロビン A1c (NGSP) の分布—ヘモグロビン A1c (NGSP) の区分,
〔インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	13,205	100.0	731	100.0	1,643	100.0	1,808	100.0	2,116	100.0	3,308	100.0	3,599	100.0	3,048	100.0	2,111	100.0
4.2%以下	6	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0
4.3-4.4	12	0.1	1	0.1	5	0.3	2	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	46	0.3	8	1.1	10	0.6	12	0.7	6	0.3	6	0.2	4	0.1	3	0.1	3	0.1
4.7-4.8	178	1.3	39	5.3	49	3.0	33	1.8	26	1.2	19	0.6	12	0.3	13	0.4	6	0.3
4.9-5.0	651	4.9	120	16.4	186	11.3	141	7.8	62	2.9	79	2.4	63	1.8	65	2.1	35	1.7
5.1-5.2	1,443	10.9	189	25.9	356	21.7	272	15.0	203	9.6	215	6.5	208	5.8	185	6.1	109	5.2
5.3	1,132	8.6	105	14.4	213	13.0	210	11.6	189	8.9	202	6.1	213	5.9	186	6.1	117	5.5
5.4	1,343	10.2	88	12.0	229	13.9	249	13.8	217	10.3	286	8.6	274	7.6	238	7.8	169	8.0
5.5	1,430	10.8	87	11.9	196	11.9	221	12.2	256	12.1	326	9.9	344	9.6	296	9.7	196	9.3
5.6	1,403	10.6	42	5.7	146	8.9	193	10.7	260	12.3	373	11.3	389	10.8	335	11.0	224	10.6
5.7	1,182	9.0	29	4.0	89	5.4	132	7.3	208	9.8	365	11.0	359	10.0	320	10.5	209	9.9
5.8	1,100	8.3	11	1.5	67	4.1	117	6.5	195	9.2	348	10.5	362	10.1	322	10.6	207	9.8
5.9	833	6.3	4	0.5	36	2.2	68	3.8	145	6.9	257	7.8	323	9.0	254	8.3	207	9.8
6.0	652	4.9	3	0.4	19	1.2	62	3.4	96	4.5	222	6.7	250	6.9	181	5.9	163	7.7
6.1	458	3.5	0	0.0	10	0.6	28	1.5	59	2.8	159	4.8	202	5.6	182	6.0	116	5.5
6.2	308	2.3	1	0.1	8	0.5	20	1.1	47	2.2	99	3.0	133	3.7	90	3.0	84	4.0
6.3	214	1.6	2	0.3	3	0.2	8	0.4	27	1.3	72	2.2	102	2.8	82	2.7	62	2.9
6.4	158	1.2	0	0.0	2	0.1	3	0.2	20	0.9	60	1.8	73	2.0	58	1.9	46	2.2
6.5	140	1.1	1	0.1	4	0.2	7	0.4	19	0.9	46	1.4	63	1.8	58	1.9	33	1.6
6.6-6.7	152	1.2	0	0.0	0	0.0	7	0.4	18	0.9	48	1.5	79	2.2	63	2.1	42	2.0
6.8-6.9	95	0.7	0	0.0	3	0.2	6	0.3	14	0.7	36	1.1	36	1.0	36	1.2	20	0.9
7.0-7.1	75	0.6	0	0.0	3	0.2	4	0.2	7	0.3	28	0.8	33	0.9	33	1.1	16	0.8
7.2-7.3	40	0.3	0	0.0	2	0.1	1	0.1	6	0.3	7	0.2	24	0.7	10	0.3	15	0.7
7.4-7.5	39	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	6	0.3	10	0.3	22	0.6	14	0.5	12	0.6
7.6-7.7	17	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0	6	0.3	3	0.1	6	0.2	2	0.1	5	0.2
7.8-7.9	11	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	6	0.2	3	0.1	4	0.1	2	0.1
8.0-8.1	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	6	0.2	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8.2-8.3	10	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.2	1	0.0	2	0.1	4	0.1	2	0.1	4	0.2
8.4-8.5	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	3	0.1	1	0.0	2	0.1
8.6-8.7	8	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	2	0.1	3	0.1	2	0.1	1	0.0
8.8-8.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	4	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0
9.0-9.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	7	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4%以上	44	0.3	0	0.0	3	0.2	4	0.2	10	0.5	17	0.5	10	0.3	9	0.3	6	0.3
男性	5,261	100.0	298	100.0	620	100.0	672	100.0	780	100.0	1,375	100.0	1,516	100.0	1,288	100.0	880	100.0
4.2%以下	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0
4.3-4.4	5	0.1	1	0.3	1	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	23	0.4	3	1.0	5	0.8	6	0.9	5	0.6	3	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1
4.7-4.8	75	1.4	14	4.7	15	2.4	7	1.0	19	2.4	10	0.7	10	0.7	7	0.5	6	0.7
4.9-5.0	279	5.3	55	18.5	70	11.3	48	7.1	30	3.8	43	3.1	33	2.2	45	3.5	12	1.4
5.1-5.2	603	11.5	85	28.5	127	20.5	93	13.8	79	10.1	118	8.6	101	6.7	97	7.5	52	5.9
5.3	463	8.8	41	13.8	72	11.6	77	11.5	76	9.7	94	6.8	103	6.8	96	7.5	51	5.8
5.4	536	10.2	40	13.4	92	14.8	108	16.1	70	9.0	112	8.1	114	7.5	86	6.7	72	8.2
5.5	571	10.9	29	9.7	92	14.8	84	12.5	92	11.8	141	10.3	133	8.8	116	9.0	79	9.0
5.6	542	10.3	12	4.0	54	8.7	70	10.4	91	11.7	145	10.5	170	11.2	138	10.7	102	11.6
5.7	426	8.1	10	3.4	30	4.8	40	6.0	66	8.5	127	9.2	153	10.1	121	9.4	90	10.2
5.8	393	7.5	4	1.3	27	4.4	44	6.5	70	9.0	117	8.5	131	8.6	116	9.0	65	7.4
5.9	286	5.4	0	0.0	14	2.3	15	2.2	34	4.4	97	7.1	126	8.3	95	7.4	84	9.5
6.0	243	4.6	1	0.3	4	0.6	30	4.5	31	4.0	83	6.0	94	6.2	74	5.7	62	7.0
6.1	184	3.5	0	0.0	4	0.6	12	1.8	26	3.3	68	4.9	74	4.9	71	5.5	44	5.0
6.2	115	2.2	0	0.0	3	0.5	7	1.0	12	1.5	34	2.5	59	3.9	36	2.8	39	4.4
6.3	84	1.6	1	0.3	2	0.3	2	0.3	10	1.3	26	1.9	43	2.8	28	2.2	30	3.4
6.4	82	1.6	0	0.0	0	0.0	2	0.3	11	1.4	34	2.5	35	2.3	30	2.3	22	2.5
6.5	65	1.2	1	0.3	0	0.0	3	0.4	10	1.3	25	1.8	26	1.7	28	2.2	14	1.6
6.6-6.7	73	1.4	0	0.0	0	0.0	4	0.6	9	1.2	24	1.7	36	2.4	32	2.5	16	1.8
6.8-6.9	48	0.9	0	0.0	1	0.2	3	0.4	7	0.9	24	1.7	13	0.9	22	1.7	5	0.6
7.0-7.1	48	0.9	0	0.0	2	0.3	3	0.4	6	0.8	15	1.1	22	1.5	21	1.6	11	1.3
7.2-7.3	23	0.4	0	0.0	2	0.3	1	0.1	4	0.5	5	0.4	11	0.7	5	0.4	7	0.8
7.4-7.5	24	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.4	7	0.5	13	0.9	10	0.8	7	0.8
7.6-7.7	9	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	4	0.5	1	0.1	3	0.2	0	0.0	3	0.3
7.8-7.9	8	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	5	0.4	1	0.1	3	0.2	1	0.1
8.0-8.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0
8.2-8.3	5	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1
8.4-8.5	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1
8.6-8.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-8.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
9.0-9.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4%以上	27	0.5	0	0.0	2	0.3	4	0.6	6	0.8	9	0.7	6	0.4	6	0.5	3	0.3

年齢階級別，人数，割合－粗集計，総数・男性・女性，20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
	総数	7,944	100.0	433	100.0	1,023	100.0	1,136	100.0	1,336	100.0	1,933	100.0	2,083	100.0	1,760	100.0	1,231	100.0
女性	4.2%以下	3	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
	4.3-4.4	7	0.1	0	0.0	4	0.4	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	23	0.3	5	1.2	5	0.5	6	0.5	1	0.1	3	0.2	3	0.1	2	0.1	2	0.2
	4.7-4.8	103	1.3	25	5.8	34	3.3	26	2.3	7	0.5	9	0.5	2	0.1	6	0.3	0	0.0
	4.9-5.0	372	4.7	65	15.0	116	11.3	93	8.2	32	2.4	36	1.9	30	1.4	20	1.1	23	1.9
	5.1-5.2	840	10.6	104	24.0	229	22.4	179	15.8	124	9.3	97	5.0	107	5.1	88	5.0	57	4.6
	5.3	669	8.4	64	14.8	141	13.8	133	11.7	113	8.5	108	5.6	110	5.3	90	5.1	66	5.4
	5.4	807	10.2	48	11.1	137	13.4	141	12.4	147	11.0	174	9.0	160	7.7	152	8.6	97	7.9
	5.5	859	10.8	58	13.4	104	10.2	137	12.1	164	12.3	185	9.6	211	10.1	180	10.2	117	9.5
	5.6	861	10.8	30	6.9	92	9.0	123	10.8	169	12.6	228	11.8	219	10.5	197	11.2	122	9.9
	5.7	756	9.5	19	4.4	59	5.8	92	8.1	142	10.6	238	12.3	206	9.9	199	11.3	119	9.7
	5.8	707	8.9	7	1.6	40	3.9	73	6.4	125	9.4	231	12.0	231	11.1	206	11.7	142	11.5
	5.9	547	6.9	4	0.9	22	2.2	53	4.7	111	8.3	160	8.3	197	9.5	159	9.0	123	10.0
	6.0	409	5.1	2	0.5	15	1.5	32	2.8	65	4.9	139	7.2	156	7.5	107	6.1	101	8.2
	6.1	274	3.4	0	0.0	6	0.6	16	1.4	33	2.5	91	4.7	128	6.1	111	6.3	72	5.8
	6.2	193	2.4	1	0.2	5	0.5	13	1.1	35	2.6	65	3.4	74	3.6	54	3.1	45	3.7
	6.3	130	1.6	1	0.2	1	0.1	6	0.5	17	1.3	46	2.4	59	2.8	54	3.1	32	2.6
	6.4	76	1.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	9	0.7	26	1.3	38	1.8	28	1.6	24	1.9
	6.5	75	0.9	0	0.0	4	0.4	4	0.4	9	0.7	21	1.1	37	1.8	30	1.7	19	1.5
	6.6-6.7	79	1.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	9	0.7	24	1.2	43	2.1	31	1.8	26	2.1
	6.8-6.9	47	0.6	0	0.0	2	0.2	3	0.3	7	0.5	12	0.6	23	1.1	14	0.8	15	1.2
	7.0-7.1	27	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	13	0.7	11	0.5	12	0.7	5	0.4
	7.2-7.3	17	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	13	0.6	5	0.3	8	0.6
7.4-7.5	15	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	3	0.2	9	0.4	4	0.2	5	0.4	
7.6-7.7	8	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.1	2	0.1	3	0.1	2	0.1	2	0.2	
7.8-7.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	
8.0-8.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8.2-8.3	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	3	0.1	2	0.1	3	0.2	
8.4-8.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	
8.6-8.7	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	3	0.1	2	0.1	1	0.1	
8.8-8.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.2-9.3	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.4%以上	17	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	4	0.3	8	0.4	4	0.2	3	0.2	3	0.2	

注) 本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。
インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外。

(24年)

<参考> 3の1 血清総コレステロール値の分布—血清総コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—粗集計, 男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	5,766	100.0	299	100.0	628	100.0	690	100.0	823	100.0	1,554	100.0	1,772	100.0	4,373	100.0	1,470	100.0	1,036	100.0
	120mg/dL未満	53	0.9	2	0.7	3	0.5	1	0.1	3	0.4	10	0.6	34	1.9	36	0.8	17	1.2	22	2.1
	120-139	206	3.6	19	6.4	16	2.5	10	1.4	10	1.2	42	2.7	109	6.2	136	3.1	56	3.8	74	7.1
	140-159	564	9.8	63	21.1	53	8.4	43	6.2	40	4.9	139	8.9	226	12.8	387	8.8	146	9.9	144	13.9
	160-179	1,106	19.2	74	24.7	112	17.8	102	14.8	123	14.9	294	18.9	401	22.6	809	18.5	302	20.5	249	24.0
	180-199	1,337	23.2	68	22.7	135	21.5	156	22.6	188	22.8	364	23.4	426	24.0	1,015	23.2	340	23.1	248	23.9
	200-219	1,246	21.6	39	13.0	162	25.8	177	25.7	207	25.2	343	22.1	318	17.9	972	22.2	331	22.5	159	15.3
	220-239	680	11.8	27	9.0	80	12.7	94	13.6	126	15.3	200	12.9	153	8.6	540	12.3	168	11.4	87	8.4
	240-259	375	6.5	4	1.3	40	6.4	65	9.4	77	9.4	114	7.3	75	4.2	314	7.2	79	5.4	41	4.0
	260-279	137	2.4	1	0.3	17	2.7	26	3.8	36	4.4	36	2.3	21	1.2	116	2.7	24	1.6	7	0.7
	280-299	39	0.7	1	0.3	7	1.1	12	1.7	9	1.1	4	0.3	6	0.3	30	0.7	4	0.3	2	0.2
300mg/dL以上	23	0.4	1	0.3	3	0.5	4	0.6	4	0.5	8	0.5	3	0.2	18	0.4	3	0.2	3	0.3	
女性	総数	8,371	100.0	438	100.0	1,031	100.0	1,149	100.0	1,380	100.0	2,083	100.0	2,290	100.0	6,264	100.0	1,949	100.0	1,346	100.0
	120mg/dL未満	17	0.2	1	0.2	2	0.2	1	0.1	1	0.1	3	0.1	9	0.4	11	0.2	5	0.3	6	0.4
	120-139	152	1.8	28	6.4	43	4.2	22	1.9	7	0.5	12	0.6	40	1.7	62	1.0	21	1.1	29	2.2
	140-159	557	6.7	80	18.3	130	12.6	82	7.1	28	2.0	69	3.3	168	7.3	283	4.5	88	4.5	113	8.4
	160-179	1,362	16.3	120	27.4	297	28.8	212	18.5	118	8.6	217	10.4	398	17.4	818	13.1	274	14.1	254	18.9
	180-199	1,892	22.6	106	24.2	259	25.1	333	29.0	240	17.4	408	19.6	546	23.8	1,368	21.8	407	20.9	342	25.4
	200-219	1,856	22.2	56	12.8	167	16.2	256	22.3	320	23.2	519	24.9	538	23.5	1,506	24.0	497	25.5	289	21.5
	220-239	1,338	16.0	31	7.1	75	7.3	134	11.7	347	25.1	416	20.0	335	14.6	1,151	18.4	360	18.5	179	13.3
	240-259	698	8.3	9	2.1	32	3.1	66	5.7	179	13.0	250	12.0	162	7.1	614	9.8	160	8.2	92	6.8
	260-279	313	3.7	3	0.7	11	1.1	25	2.2	84	6.1	125	6.0	65	2.8	286	4.6	95	4.9	32	2.4
	280-299	115	1.4	2	0.5	6	0.6	14	1.2	42	3.0	34	1.6	17	0.7	106	1.7	25	1.3	6	0.4
300mg/dL以上	71	0.8	2	0.5	9	0.9	4	0.3	14	1.0	30	1.4	12	0.5	59	0.9	17	0.9	4	0.3	

注) 本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

<参考> 3の2 血清総コレステロール値の分布—血清総コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—粗集計, 男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	5,059	100.0	297	100.0	622	100.0	653	100.0	744	100.0	1,305	100.0	1,438	100.0	3,775	100.0	1,212	100.0	836	100.0
	120mg/dL未満	42	0.8	2	0.7	3	0.5	1	0.2	3	0.4	8	0.6	25	1.7	28	0.7	13	1.1	16	1.9
	120-139	165	3.3	19	6.4	16	2.6	9	1.4	8	1.1	35	2.7	78	5.4	106	2.8	44	3.6	52	6.2
	140-159	477	9.4	63	21.2	52	8.4	42	6.4	37	5.0	108	8.3	175	12.2	317	8.4	107	8.8	113	13.5
	160-179	943	18.6	74	24.9	111	17.8	91	13.9	107	14.4	240	18.4	320	22.3	671	17.8	249	20.5	198	23.7
	180-199	1,167	23.1	68	22.9	133	21.4	148	22.7	173	23.3	294	22.5	351	24.4	866	22.9	271	22.4	207	24.8
	200-219	1,125	22.2	39	13.1	161	25.9	170	26.0	188	25.3	298	22.8	269	18.7	868	23.0	284	23.4	132	15.8
	220-239	620	12.3	27	9.1	80	12.9	91	13.9	112	15.1	181	13.9	129	9.0	488	12.9	145	12.0	73	8.7
	240-259	341	6.7	4	1.3	39	6.3	62	9.5	72	9.7	99	7.6	65	4.5	284	7.5	70	5.8	35	4.2
	260-279	123	2.4	1	0.3	17	2.7	23	3.5	33	4.4	31	2.4	18	1.3	102	2.7	22	1.8	6	0.7
	280-299	37	0.7	0	0	7	1.1	12	1.8	8	1.1	4	0.3	6	0.4	29	0.8	4	0.3	2	0.2
300mg/dL以上	19	0.4	0	0	3	0.5	4	0.6	3	0.4	7	0.5	2	0.1	16	0.4	3	0.2	2	0.2	
女性	総数	6,960	100.0	434	100.0	1,025	100.0	1,128	100.0	1,224	100.0	1,568	100.0	1,581	100.0	5,053	100.0	1,370	100.0	937	100.0
	120mg/dL未満	16	0.2	1	0.2	2	0.2	1	0.1	1	0.1	3	0.2	8	0.5	10	0.2	4	0.3	6	0.6
	120-139	127	1.8	27	6.2	43	4.2	22	2.0	6	0.5	5	0.3	24	1.5	42	0.8	6	0.4	22	2.3
	140-159	446	6.4	80	18.4	129	12.6	82	7.3	20	1.6	34	2.2	101	6.4	198	3.9	48	3.5	67	7.2
	160-179	1,060	15.2	120	27.6	293	28.6	208	18.4	98	8.0	123	7.8	218	13.8	574	11.4	146	10.7	144	15.4
	180-199	1,508	21.7	105	24.2	258	25.2	329	29.2	199	16.3	272	17.3	345	21.8	1,042	20.6	239	17.4	229	24.4
	200-219	1,531	22.0	55	12.7	167	16.3	250	22.2	276	22.5	392	25.0	391	24.7	1,209	23.9	361	26.4	214	22.8
	220-239	1,174	16.9	31	7.1	75	7.3	131	11.6	319	26.1	345	22.0	273	17.3	1,001	19.8	300	21.9	142	15.2
	240-259	633	9.1	8	1.8	32	3.1	63	5.6	172	14.1	220	14.0	138	8.7	558	11.0	143	10.4	76	8.1
	260-279	288	4.1	3	0.7	11	1.1	25	2.2	80	6.5	113	7.2	56	3.5	263	5.2	84	6.1	28	3.0
	280-299	109	1.6	2	0.5	6	0.6	13	1.2	40	3.3	32	2.0	16	1.0	100	2.0	23	1.7	6	0.6
300mg/dL以上	68	1.0	2	0.5	9	0.9	4	0.4	13	1.1	29	1.8	11	0.7	56	1.1	16	1.2	3	0.3	

注) 本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。

＜参考＞4の1 血清HDL-コレステロール値の分布-血清HDL-コレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合-粗集計、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	5,766	100.0	299	100.0	628	100.0	690	100.0	823	100.0	1,554	100.0	1,772	100.0	4,373	100.0	1,470	100.0	1,036	100.0
	30mg/dL未満	71	1.2	3	1.0	7	1.1	4	0.6	8	1.0	22	1.4	27	1.5	52	1.2	18	1.2	21	2.0
	30-39	724	12.6	25	8.4	70	11.1	82	11.9	105	12.8	195	12.5	247	13.9	552	12.6	190	12.9	156	15.1
	40-49	1,569	27.2	80	26.8	165	26.3	176	25.5	197	23.9	408	26.3	543	30.6	1,184	27.1	409	27.8	320	30.9
	50-59	1,508	26.2	87	29.1	186	29.6	204	29.6	212	25.8	390	25.1	429	24.2	1,130	25.8	377	25.6	246	23.7
	60-69	1,011	17.5	62	20.7	108	17.2	119	17.2	158	19.2	270	17.4	294	16.6	762	17.4	245	16.7	170	16.4
	70-79	503	8.7	27	9.0	51	8.1	68	9.9	76	9.2	136	8.8	145	8.2	393	9.0	137	9.3	72	6.9
	80-89	239	4.1	9	3.0	22	3.5	20	2.9	42	5.1	84	5.4	62	3.5	191	4.4	67	4.6	38	3.7
	90-99	90	1.6	3	1.0	13	2.1	14	2.0	14	1.7	33	2.1	13	0.7	70	1.6	16	1.1	7	0.7
100mg/dL以上	51	0.9	3	1.0	6	1.0	3	0.4	11	1.3	16	1.0	12	0.7	39	0.9	11	0.7	6	0.6	
女性	総数	8,371	100.0	438	100.0	1,031	100.0	1,149	100.0	1,380	100.0	2,083	100.0	2,290	100.0	6,264	100.0	1,949	100.0	1,346	100.0
	30mg/dL未満	20	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	6	0.3	11	0.5	15	0.2	9	0.5	7	0.5
	30-39	318	3.8	7	1.6	20	1.9	19	1.7	32	2.3	84	4.0	156	6.8	234	3.7	79	4.1	117	8.7
	40-49	1,118	13.4	40	9.1	99	9.6	108	9.4	152	11.0	295	14.2	424	18.5	869	13.9	316	16.2	264	19.6
	50-59	2,059	24.6	98	22.4	230	22.3	239	20.8	296	21.4	537	25.8	659	28.8	1,542	24.6	534	27.4	383	28.5
	60-69	2,172	25.9	141	32.2	305	29.6	309	26.9	332	24.1	522	25.1	563	24.6	1,573	25.1	509	26.1	321	23.8
	70-79	1,475	17.6	101	23.1	223	21.6	259	22.5	261	18.9	359	17.2	272	11.9	1,080	17.2	281	14.4	144	10.7
	80-89	755	9.0	39	8.9	103	10.0	132	11.5	186	13.5	170	8.2	125	5.5	580	9.3	140	7.2	67	5.0
	90-99	304	3.6	10	2.3	34	3.3	49	4.3	79	5.7	76	3.6	56	2.4	245	3.9	57	2.9	30	2.2
100mg/dL以上	150	1.8	2	0.5	17	1.6	32	2.8	41	3.0	34	1.6	24	1.0	126	2.0	24	1.2	13	1.0	

注)本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

＜参考＞4の2 血清HDL-コレステロール値の分布-血清HDL-コレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合-粗集計、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	5,059	100.0	297	100.0	622	100.0	653	100.0	744	100.0	1,305	100.0	1,438	100.0	3,775	100.0	1,212	100.0	836	100.0
	30mg/dL未満	59	1.2	3	1.0	7	1.1	3	0.5	7	0.9	16	1.2	23	1.6	42	1.1	14	1.2	18	2.2
	30-39	629	12.4	25	8.4	69	11.1	77	11.8	92	12.4	162	12.4	204	14.2	474	12.6	157	13.0	127	15.2
	40-49	1,349	26.7	78	26.3	163	26.2	162	24.8	174	23.4	337	25.8	435	30.3	1,008	26.7	343	28.3	248	29.7
	50-59	1,316	26.0	87	29.3	184	29.6	194	29.7	190	25.5	320	24.5	341	23.7	961	25.5	303	25.0	197	23.6
	60-69	906	17.9	62	20.9	107	17.2	115	17.6	148	19.9	236	18.1	238	16.6	672	17.8	201	16.6	140	16.7
	70-79	453	9.0	27	9.1	51	8.2	65	10.0	69	9.3	116	8.9	125	8.7	347	9.2	116	9.6	62	7.4
	80-89	214	4.2	9	3.0	22	3.5	20	3.1	40	5.4	72	5.5	51	3.5	169	4.5	54	4.5	33	3.9
	90-99	86	1.7	3	1.0	13	2.1	14	2.1	14	1.9	30	2.3	12	0.8	67	1.8	15	1.2	6	0.7
100mg/dL以上	47	0.9	3	1.0	6	1.0	3	0.5	10	1.3	16	1.2	9	0.6	35	0.9	9	0.7	5	0.6	
女性	総数	6,960	100.0	434	100.0	1,025	100.0	1,128	100.0	1,224	100.0	1,568	100.0	1,581	100.0	5,053	100.0	1,370	100.0	937	100.0
	30mg/dL未満	15	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	3	0.2	9	0.6	10	0.2	5	0.4	7	0.7
	30-39	240	3.4	7	1.6	19	1.9	19	1.7	27	2.2	66	4.2	102	6.5	177	3.5	54	3.9	78	8.3
	40-49	897	12.9	40	9.2	97	9.5	102	9.0	135	11.0	217	13.8	306	19.4	678	13.4	221	16.1	196	20.9
	50-59	1,658	23.8	97	22.4	229	22.3	234	20.7	251	20.5	394	25.1	453	28.7	1,199	23.7	364	26.6	269	28.7
	60-69	1,817	26.1	140	32.3	304	29.7	302	26.8	293	23.9	394	25.1	384	24.3	1,267	25.1	367	26.8	216	23.1
	70-79	1,258	18.1	99	22.8	222	21.7	258	22.9	233	19.0	261	16.6	185	11.7	894	17.7	192	14.0	94	10.0
	80-89	677	9.7	39	9.0	103	10.0	131	11.6	174	14.2	144	9.2	86	5.4	509	10.1	109	8.0	46	4.9
	90-99	270	3.9	10	2.3	34	3.3	49	4.3	75	6.1	61	3.9	41	2.6	214	4.2	42	3.1	23	2.5
100mg/dL以上	128	1.8	2	0.5	17	1.7	31	2.7	35	2.9	28	1.8	15	0.9	105	2.1	16	1.2	8	0.9	

注)本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。

<参考> 5の1 血清 LDL - コレステロール値の分布 - 血清 LDL - コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合 - 粗集計, 男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	5,766	100.0	299	100.0	628	100.0	690	100.0	823	100.0	1,554	100.0	1,772	100.0	4,373	100.0	1,470	100.0	1,036	100.0
	40mg/dL未満	33	0.6	0	0.0	2	0.3	3	0.4	5	0.6	8	0.5	15	0.8	27	0.6	12	0.8	8	0.8
	40-49	41	0.7	1	0.3	3	0.5	1	0.1	3	0.4	8	0.5	25	1.4	30	0.7	12	0.8	18	1.7
	50-59	98	1.7	7	2.3	8	1.3	6	0.9	11	1.3	20	1.3	46	2.6	74	1.7	29	2.0	27	2.6
	60-69	177	3.1	15	5.0	12	1.9	10	1.4	13	1.6	51	3.3	76	4.3	128	2.9	52	3.5	45	4.3
	70-79	348	6.0	22	7.4	25	4.0	28	4.1	37	4.5	96	6.2	140	7.9	261	6.0	92	6.3	89	8.6
	80-89	558	9.7	45	15.1	55	8.8	48	7.0	54	6.6	153	9.8	203	11.5	406	9.3	152	10.3	130	12.5
	90-99	646	11.2	50	16.7	58	9.2	60	8.7	77	9.4	181	11.6	220	12.4	475	10.9	172	11.7	133	12.8
	100-109	756	13.1	43	14.4	87	13.9	89	12.9	74	9.0	212	13.6	251	14.2	547	12.5	213	14.5	147	14.2
	110-119	712	12.3	29	9.7	74	11.8	71	10.3	97	11.8	196	12.6	245	13.8	544	12.4	190	12.9	143	13.8
	120-129	712	12.3	24	8.0	74	11.8	93	13.5	123	14.9	203	13.1	195	11.0	572	13.1	198	13.5	103	9.9
	130-139	559	9.7	24	8.0	69	11.0	81	11.7	105	12.8	147	9.5	133	7.5	437	10.0	127	8.6	73	7.0
	140-149	415	7.2	15	5.0	56	8.9	68	9.9	80	9.7	95	6.1	101	5.7	319	7.3	95	6.5	56	5.4
	150-159	283	4.9	15	5.0	40	6.4	40	5.8	52	6.3	84	5.4	52	2.9	212	4.8	60	4.1	29	2.8
	160-169	188	3.3	5	1.7	25	4.0	36	5.2	41	5.0	49	3.2	32	1.8	154	3.5	34	2.3	16	1.5
	170-179	111	1.9	2	0.7	13	2.1	28	4.1	20	2.4	29	1.9	19	1.1	89	2.0	17	1.2	11	1.1
	180-189	68	1.2	1	0.3	17	2.7	11	1.6	17	2.1	13	0.8	9	0.5	50	1.1	9	0.6	3	0.3
	190-199	27	0.5	0	0.0	5	0.8	7	1.0	5	0.6	5	0.3	5	0.3	21	0.5	4	0.3	2	0.2
	200-209	16	0.3	0	0.0	2	0.3	6	0.9	4	0.5	1	0.1	3	0.2	13	0.3	1	0.1	2	0.2
	210-219	6	0.1	0	0.0	3	0.5	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	3	0.1	1	0.1	0	0.0
220mg/dL以上	12	0.2	1	0.3	0	0.0	3	0.4	4	0.5	3	0.2	1	0.1	11	0.3	0	0.0	1	0.1	
女性	総数	8,371	100.0	438	100.0	1,031	100.0	1,149	100.0	1,380	100.0	2,083	100.0	2,290	100.0	6,264	100.0	1,949	100.0	1,346	100.0
	40mg/dL未満	7	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.0	3	0.1	6	0.1	0	0.0	3	0.2
	40-49	28	0.3	1	0.2	5	0.5	5	0.4	3	0.2	5	0.2	9	0.4	21	0.3	10	0.5	2	0.1
	50-59	89	1.1	14	3.2	21	2.0	15	1.3	5	0.4	13	0.6	21	0.9	44	0.7	18	0.9	12	0.9
	60-69	222	2.7	15	3.4	55	5.3	31	2.7	15	1.1	34	1.6	72	3.1	125	2.0	45	2.3	46	3.4
	70-79	434	5.2	58	13.2	87	8.4	70	6.1	36	2.6	64	3.1	119	5.2	241	3.8	67	3.4	82	6.1
	80-89	700	8.4	69	15.8	132	12.8	105	9.1	51	3.7	125	6.0	218	9.5	429	6.8	142	7.3	138	10.3
	90-99	1,004	12.0	75	17.1	184	17.8	160	13.9	102	7.4	220	10.6	263	11.5	670	10.7	230	11.8	164	12.2
	100-109	1,073	12.8	56	12.8	144	14.0	163	14.2	159	11.5	221	10.6	330	14.4	791	12.6	255	13.1	191	14.2
	110-119	1,106	13.2	55	12.6	126	12.2	167	14.5	182	13.2	245	11.8	331	14.5	832	13.3	250	12.8	199	14.8
	120-129	975	11.6	27	6.2	85	8.2	130	11.3	179	13.0	272	13.1	282	12.3	787	12.6	236	12.1	166	12.3
	130-139	890	10.6	27	6.2	82	8.0	102	8.9	187	13.6	251	12.0	241	10.5	720	11.5	237	12.2	129	9.6
	140-149	639	7.6	14	3.2	33	3.2	73	6.4	158	11.4	210	10.1	151	6.6	545	8.7	143	7.3	90	6.7
	150-159	449	5.4	12	2.7	28	2.7	48	4.2	103	7.5	153	7.3	105	4.6	386	6.2	129	6.6	58	4.3
	160-169	319	3.8	9	2.1	20	1.9	32	2.8	69	5.0	115	5.5	74	3.2	277	4.4	89	4.6	33	2.5
	170-179	174	2.1	2	0.5	13	1.3	20	1.7	51	3.7	62	3.0	26	1.1	153	2.4	38	1.9	13	1.0
	180-189	119	1.4	1	0.2	6	0.6	12	1.0	39	2.8	38	1.8	23	1.0	108	1.7	29	1.5	10	0.7
	190-199	51	0.6	1	0.2	3	0.3	6	0.5	17	1.2	15	0.7	9	0.4	46	0.7	7	0.4	5	0.4
	200-209	41	0.5	0	0.0	1	0.1	4	0.3	13	0.9	18	0.9	5	0.2	40	0.6	11	0.6	2	0.1
	210-219	22	0.3	1	0.2	1	0.1	2	0.2	6	0.4	8	0.4	4	0.2	20	0.3	8	0.4	0	0.0
220mg/dL以上	29	0.3	1	0.2	5	0.5	3	0.3	3	0.2	13	0.6	4	0.2	23	0.4	5	0.3	3	0.2	

注) 本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

<参考> 5の2 血清LDL-コレステロール値の分布-血清LDL-コレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合-粗集計、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	5,059	100.0	297	100.0	622	100.0	653	100.0	744	100.0	1,305	100.0	1,438	100.0	3,775	100.0	1,212	100.0	836	100.0
	40mg/dL未満	29	0.6	0	0.0	2	0.3	2	0.3	4	0.5	7	0.5	14	1.0	23	0.6	11	0.9	7	0.8
	40-49	26	0.5	1	0.3	3	0.5	0	0.0	2	0.3	6	0.5	14	1.0	19	0.5	8	0.7	10	1.2
	50-59	81	1.6	7	2.4	8	1.3	6	0.9	8	1.1	15	1.1	37	2.6	59	1.6	27	2.2	19	2.3
	60-69	150	3.0	15	5.1	12	1.9	10	1.5	13	1.7	43	3.3	57	4.0	104	2.8	33	2.7	39	4.7
	70-79	280	5.5	22	7.4	24	3.9	27	4.1	32	4.3	76	5.8	99	6.9	209	5.5	67	5.5	60	7.2
	80-89	472	9.3	45	15.2	53	8.5	42	6.4	48	6.5	123	9.4	161	11.2	334	8.8	125	10.3	102	12.2
	90-99	549	10.9	50	16.8	58	9.3	57	8.7	70	9.4	132	10.1	182	12.7	389	10.3	130	10.7	114	13.6
	100-109	649	12.8	43	14.5	87	14.0	84	12.9	64	8.6	171	13.1	200	13.9	457	12.1	168	13.9	118	14.1
	110-119	627	12.4	29	9.8	74	11.9	68	10.4	88	11.8	169	13.0	199	13.8	473	12.5	153	12.6	117	14.0
	120-129	640	12.7	24	8.1	73	11.7	87	13.3	113	15.2	179	13.7	164	11.4	507	13.4	173	14.3	86	10.3
	130-139	517	10.2	24	8.1	68	10.9	78	11.9	96	12.9	133	10.2	118	8.2	402	10.6	117	9.7	63	7.5
	140-149	386	7.6	15	5.1	56	9.0	65	10.0	72	9.7	88	6.7	90	6.3	294	7.8	87	7.2	50	6.0
	150-159	258	5.1	15	5.1	40	6.4	38	5.8	47	6.3	76	5.8	42	2.9	191	5.1	53	4.4	22	2.6
	160-169	175	3.5	5	1.7	25	4.0	35	5.4	40	5.4	43	3.3	27	1.9	142	3.8	30	2.5	12	1.4
	170-179	103	2.0	2	0.7	13	2.1	27	4.1	19	2.6	25	1.9	17	1.2	82	2.2	16	1.3	10	1.2
	180-189	63	1.2	0	0.0	17	2.7	11	1.7	16	2.2	11	0.8	8	0.6	46	1.2	8	0.7	3	0.4
	190-199	25	0.5	0	0.0	4	0.6	7	1.1	4	0.5	5	0.4	5	0.3	20	0.5	4	0.3	2	0.2
	200-209	15	0.3	0	0.0	2	0.3	6	0.9	4	0.5	1	0.1	2	0.1	13	0.3	1	0.1	1	0.1
	210-219	5	0.1	0	0.0	3	0.5	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0
	220mg/dL以上	9	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.5	3	0.4	2	0.2	1	0.1	9	0.2	0	0.0	1	0.1
女性	総数	6,960	100.0	434	100.0	1,025	100.0	1,128	100.0	1,224	100.0	1,568	100.0	1,581	100.0	5,053	100.0	1,370	100.0	937	100.0
	40mg/dL未満	7	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	3	0.2	6	0.1	0	0.0	3	0.3
	40-49	23	0.3	1	0.2	5	0.5	5	0.4	3	0.2	4	0.3	5	0.3	16	0.3	6	0.4	1	0.1
	50-59	73	1.0	13	3.0	21	2.0	15	1.3	4	0.3	10	0.6	10	0.6	33	0.7	8	0.6	8	0.9
	60-69	166	2.4	15	3.5	54	5.3	31	2.7	13	1.1	14	0.9	39	2.5	79	1.6	19	1.4	25	2.7
	70-79	346	5.0	58	13.4	87	8.5	69	6.1	29	2.4	39	2.5	64	4.0	174	3.4	36	2.6	46	4.9
	80-89	517	7.4	69	15.9	131	12.8	104	9.2	36	2.9	63	4.0	114	7.2	278	5.5	63	4.6	75	8.0
	90-99	777	11.2	75	17.3	184	18.0	159	14.1	82	6.7	131	8.4	146	9.2	470	9.3	121	8.8	99	10.6
	100-109	846	12.2	55	12.7	141	13.8	162	14.4	130	10.6	151	9.6	207	13.1	597	11.8	158	11.5	125	13.3
	110-119	907	13.0	55	12.7	126	12.3	162	14.4	159	13.0	179	11.4	226	14.3	666	13.2	177	12.9	134	14.3
	120-129	822	11.8	26	6.0	84	8.2	125	11.1	161	13.2	211	13.5	215	13.6	649	12.8	182	13.3	129	13.8
	130-139	779	11.2	27	6.2	82	8.0	99	8.8	171	14.0	208	13.3	192	12.1	623	12.3	190	13.9	103	11.0
	140-149	570	8.2	14	3.2	33	3.2	72	6.4	146	11.9	175	11.2	130	8.2	482	9.5	121	8.8	76	8.1
	150-159	417	6.0	12	2.8	28	2.7	46	4.1	94	7.7	135	8.6	102	6.5	354	7.0	118	8.6	56	6.0
	160-169	296	4.3	8	1.8	20	2.0	32	2.8	68	5.6	104	6.6	64	4.0	257	5.1	79	5.8	27	2.9
	170-179	166	2.4	2	0.5	13	1.3	20	1.8	50	4.1	58	3.7	23	1.5	146	2.9	37	2.7	11	1.2
	180-189	115	1.7	1	0.2	6	0.6	12	1.1	39	3.2	35	2.2	22	1.4	104	2.1	28	2.0	10	1.1
	190-199	47	0.7	1	0.2	3	0.3	6	0.5	16	1.3	13	0.8	8	0.5	42	0.8	6	0.4	5	0.5
	200-209	38	0.5	0	0.0	1	0.1	3	0.3	13	1.1	17	1.1	4	0.3	37	0.7	9	0.7	2	0.2
	210-219	20	0.3	1	0.2	1	0.1	2	0.2	5	0.4	7	0.4	4	0.3	18	0.4	7	0.5	0	0.0
	220mg/dL以上	28	0.4	1	0.2	5	0.5	3	0.3	3	0.2	13	0.8	3	0.2	22	0.4	5	0.4	2	0.2

注) 本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。

<参考> 6の1 血清 non HDL-コレステロール値の分布－血清 non HDL-コレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合－粗集計、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	5,766	100.0	299	100.0	628	100.0	690	100.0	823	100.0	1,554	100.0	1,772	100.0	4,373	100.0	1,470	100.0	1,036	100.0
	70mg/dL未満	65	1.1	4	1.3	4	0.6	2	0.3	4	0.5	12	0.8	39	2.2	48	1.1	25	1.7	21	2.0
	70-80未満	82	1.4	14	4.7	5	0.8	5	0.7	9	1.1	18	1.2	31	1.7	55	1.3	17	1.2	22	2.1
	80-90未満	184	3.2	19	6.4	26	4.1	11	1.6	14	1.7	48	3.1	66	3.7	117	2.7	48	3.3	42	4.1
	90-100未満	305	5.3	36	12.0	31	4.9	29	4.2	21	2.6	72	4.6	116	6.5	203	4.6	69	4.7	77	7.4
	100-110未満	471	8.2	50	16.7	46	7.3	33	4.8	47	5.7	124	8.0	171	9.7	333	7.6	126	8.6	106	10.2
	110-120未満	559	9.7	34	11.4	59	9.4	50	7.2	77	9.4	148	9.5	191	10.8	411	9.4	139	9.5	120	11.6
	120-130未満	662	11.5	26	8.7	70	11.1	73	10.6	67	8.1	184	11.8	242	13.7	501	11.5	186	12.7	139	13.4
	130-140未満	653	11.3	26	8.7	63	10.0	79	11.4	84	10.2	180	11.6	221	12.5	489	11.2	173	11.8	140	13.5
	140-150未満	642	11.1	21	7.0	61	9.7	80	11.6	108	13.1	179	11.5	193	10.9	514	11.8	167	11.4	104	10.0
	150-160未満	594	10.3	21	7.0	65	10.4	83	12.0	90	10.9	158	10.2	177	10.0	473	10.8	166	11.3	97	9.4
	160-170未満	464	8.0	11	3.7	62	9.9	73	10.6	78	9.5	140	9.0	100	5.6	366	8.4	121	8.2	49	4.7
	170-180未満	340	5.9	19	6.4	42	6.7	41	5.9	74	9.0	81	5.2	83	4.7	259	5.9	84	5.7	42	4.1
	180-190未満	249	4.3	9	3.0	22	3.5	35	5.1	47	5.7	78	5.0	58	3.3	205	4.7	63	4.3	32	3.1
	190-200未満	184	3.2	6	2.0	20	3.2	32	4.6	33	4.0	54	3.5	39	2.2	152	3.5	41	2.8	23	2.2
	200-210未満	127	2.2	0	0.0	22	3.5	25	3.6	26	3.2	35	2.3	19	1.1	100	2.3	21	1.4	9	0.9
	210-220未満	78	1.4	0	0.0	13	2.1	16	2.3	21	2.6	19	1.2	9	0.5	63	1.4	9	0.6	6	0.6
220mg/dL以上	107	1.9	3	1.0	17	2.7	23	3.3	23	2.8	24	1.5	17	1.0	84	1.9	15	1.0	7	0.7	
女性	総数	8,371	100.0	438	100.0	1,031	100.0	1,149	100.0	1,380	100.0	2,083	100.0	2,290	100.0	6,264	100.0	1,949	100.0	1,346	100.0
	70mg/dL未満	50	0.6	12	2.7	13	1.3	10	0.9	5	0.4	5	0.2	5	0.2	25	0.4	6	0.3	3	0.2
	70-80未満	118	1.4	22	5.0	45	4.4	23	2.0	3	0.2	3	0.1	22	1.0	41	0.7	12	0.6	13	1.0
	80-90未満	243	2.9	40	9.1	73	7.1	49	4.3	15	1.1	24	1.2	42	1.8	110	1.8	27	1.4	28	2.1
	90-100未満	460	5.5	68	15.5	109	10.6	88	7.7	39	2.8	56	2.7	100	4.4	251	4.0	68	3.5	60	4.5
	100-110未満	731	8.7	76	17.4	178	17.3	137	11.9	56	4.1	120	5.8	164	7.2	434	6.9	127	6.5	95	7.1
	110-120未満	887	10.6	57	13.0	141	13.7	163	14.2	102	7.4	169	8.1	255	11.1	603	9.6	190	9.7	163	12.1
	120-130未満	936	11.2	44	10.0	141	13.7	147	12.8	130	9.4	192	9.2	282	12.3	669	10.7	206	10.6	179	13.3
	130-140未満	992	11.9	39	8.9	103	10.0	139	12.1	163	11.8	230	11.0	318	13.9	757	12.1	227	11.6	204	15.2
	140-150未満	903	10.8	28	6.4	74	7.2	105	9.1	172	12.5	251	12.0	273	11.9	724	11.6	239	12.3	156	11.6
	150-160未満	822	9.8	17	3.9	47	4.6	85	7.4	172	12.5	254	12.2	247	10.8	697	11.1	228	11.7	128	9.5
	160-170未満	713	8.5	7	1.6	41	4.0	74	6.4	164	11.9	221	10.6	206	9.0	616	9.8	192	9.9	117	8.7
	170-180未満	477	5.7	15	3.4	14	1.4	44	3.8	112	8.1	161	7.7	131	5.7	409	6.5	123	6.3	82	6.1
	180-190未満	348	4.2	8	1.8	14	1.4	34	3.0	78	5.7	131	6.3	83	3.6	310	4.9	112	5.7	39	2.9
	190-200未満	265	3.2	1	0.2	16	1.6	17	1.5	63	4.6	99	4.8	69	3.0	235	3.8	72	3.7	35	2.6
	200-210未満	154	1.8	1	0.2	7	0.7	10	0.9	36	2.6	60	2.9	40	1.7	135	2.2	46	2.4	19	1.4
	210-220未満	108	1.3	0	0.0	5	0.5	11	1.0	31	2.2	39	1.9	22	1.0	100	1.6	28	1.4	12	0.9
220mg/dL以上	164	2.0	3	0.7	10	1.0	13	1.1	39	2.8	68	3.3	31	1.4	148	2.4	46	2.4	13	1.0	

注)本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

$$\text{non HDL -コレステロール (mg/dL)} = \text{総コレステロール (mg/dL)} - \text{HDL-コレステロール (mg/dL)}$$

<参考> 6の2 血清 non HDL-コレステロール値の分布－血清 non HDL-コレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合－粗集計、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	5,059	100.0	297	100.0	622	100.0	653	100.0	744	100.0	1,305	100.0	1,438	100.0	3,775	100.0	1,212	100.0	836	100.0
	70mg/dL未満	56	1.1	4	1.3	4	0.6	2	0.3	4	0.5	12	0.9	30	2.1	42	1.1	22	1.8	15	1.8
	70-80未満	69	1.4	14	4.7	5	0.8	5	0.8	8	1.1	14	1.1	23	1.6	43	1.1	13	1.1	16	1.9
	80-90未満	160	3.2	19	6.4	26	4.2	11	1.7	11	1.5	39	3.0	54	3.8	96	2.5	35	2.9	37	4.4
	90-100未満	258	5.1	36	12.1	31	5.0	27	4.1	19	2.6	60	4.6	85	5.9	167	4.4	50	4.1	57	6.8
	100-110未満	396	7.8	50	16.8	44	7.1	33	5.1	42	5.6	99	7.6	128	8.9	272	7.2	101	8.3	77	9.2
	110-120未満	482	9.5	34	11.4	59	9.5	44	6.7	72	9.7	118	9.0	155	10.8	346	9.2	111	9.2	98	11.7
	120-130未満	562	11.1	26	8.8	70	11.3	68	10.4	62	8.3	143	11.0	193	13.4	412	10.9	148	12.2	111	13.3
	130-140未満	563	11.1	26	8.8	62	10.0	74	11.3	72	9.7	150	11.5	179	12.4	415	11.0	138	11.4	117	14.0
	140-150未満	573	11.3	21	7.1	60	9.6	77	11.8	99	13.3	158	12.1	158	11.0	456	12.1	134	11.1	88	10.5
	150-160未満	540	10.7	21	7.1	65	10.5	79	12.1	83	11.2	137	10.5	155	10.8	425	11.3	150	12.4	80	9.6
	160-170未満	419	8.3	11	3.7	62	10.0	70	10.7	68	9.1	124	9.5	84	5.8	326	8.6	105	8.7	41	4.9
	170-180未満	307	6.1	19	6.4	41	6.6	40	6.1	66	8.9	69	5.3	72	5.0	233	6.2	74	6.1	34	4.1
	180-190未満	228	4.5	9	3.0	22	3.5	34	5.2	43	5.8	70	5.4	50	3.5	185	4.9	55	4.5	27	3.2
	190-200未満	165	3.3	6	2.0	20	3.2	29	4.4	31	4.2	45	3.4	34	2.4	134	3.5	35	2.9	21	2.5
	200-210未満	115	2.3	0	0.0	21	3.4	24	3.7	25	3.4	29	2.2	16	1.1	92	2.4	19	1.6	6	0.7
210-220未満	70	1.4	0	0.0	13	2.1	14	2.1	19	2.6	17	1.3	7	0.5	55	1.5	8	0.7	5	0.6	
220mg/dL以上	96	1.9	1	0.3	17	2.7	22	3.4	20	2.7	21	1.6	15	1.0	76	2.0	14	1.2	6	0.7	
女性	総数	6,960	100.0	434	100.0	1,025	100.0	1,128	100.0	1,224	100.0	1,568	100.0	1,581	100.0	5,053	100.0	1,370	100.0	937	100.0
	70mg/dL未満	46	0.7	11	2.5	13	1.3	10	0.9	5	0.4	3	0.2	4	0.3	22	0.4	3	0.2	3	0.3
	70-80未満	108	1.6	22	5.1	45	4.4	23	2.0	2	0.2	2	0.1	14	0.9	32	0.6	5	0.4	11	1.2
	80-90未満	210	3.0	40	9.2	72	7.0	49	4.3	14	1.1	11	0.7	24	1.5	84	1.7	10	0.7	18	1.9
	90-100未満	387	5.6	68	15.7	109	10.6	87	7.7	36	2.9	35	2.2	52	3.3	192	3.8	36	2.6	31	3.3
	100-110未満	579	8.3	76	17.5	176	17.2	136	12.1	42	3.4	58	3.7	91	5.8	301	6.0	63	4.6	51	5.4
	110-120未満	687	9.9	56	12.9	141	13.8	161	14.3	82	6.7	109	7.0	138	8.7	440	8.7	100	7.3	95	10.1
	120-130未満	733	10.5	44	10.1	139	13.6	147	13.0	109	8.9	128	8.2	166	10.5	504	10.0	120	8.8	113	12.1
	130-140未満	797	11.5	39	9.0	102	10.0	136	12.1	137	11.2	165	10.5	218	13.8	594	11.8	159	11.6	136	14.5
	140-150未満	745	10.7	28	6.5	74	7.2	100	8.9	158	12.9	187	11.9	198	12.5	582	11.5	176	12.8	113	12.1
	150-160未満	687	9.9	16	3.7	47	4.6	84	7.4	153	12.5	196	12.5	191	12.1	574	11.4	169	12.3	102	10.9
	160-170未満	616	8.9	7	1.6	41	4.0	70	6.2	150	12.3	178	11.4	170	10.8	525	10.4	158	11.5	98	10.5
	170-180未満	423	6.1	14	3.2	14	1.4	42	3.7	101	8.3	141	9.0	111	7.0	361	7.1	108	7.9	71	7.6
	180-190未満	306	4.4	8	1.8	14	1.4	33	2.9	72	5.9	115	7.3	64	4.0	272	5.4	90	6.6	28	3.0
	190-200未満	242	3.5	1	0.2	16	1.6	17	1.5	59	4.8	90	5.7	59	3.7	215	4.3	64	4.7	30	3.2
	200-210未満	144	2.1	1	0.2	7	0.7	10	0.9	36	2.9	55	3.5	35	2.2	128	2.5	45	3.3	14	1.5
210-220未満	97	1.4	0	0.0	5	0.5	11	1.0	31	2.5	31	2.0	19	1.2	89	1.8	23	1.7	12	1.3	
220mg/dL以上	153	2.2	3	0.7	10	1.0	12	1.1	37	3.0	64	4.1	27	1.7	138	2.7	41	3.0	11	1.2	

注)本表の割合は重み付けをしていない粗集計の値である。

(24年)

コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。

non HDL -コレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDL-コレステロール (mg/dL)

