

## 第2部 身体状況調査の結果

第12表 身長・体重の平均値及び標準偏差—年齢階級，身長・体重別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，1歳以上〔体重は妊婦除外〕

	男 性						女 性					
	身 長(cm)			体 重(kg)			身 長(cm)			体 重(kg)		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	3,045	161.7	18.6	3,033	60.8	17.8	3,576	151.1	14.0	3,552	50.0	12.4
1 歳	20	77.8	5.2	20	10.1	0.9	27	78.4	4.1	28	10.0	1.3
2 歳	24	88.7	3.6	24	12.5	0.9	19	87.2	4.7	19	12.1	0.9
3 歳	28	96.7	5.0	28	14.3	1.5	20	96.2	4.3	20	14.1	1.7
4 歳	46	103.2	4.6	46	16.6	2.2	23	101.2	3.8	23	15.6	1.5
5 歳	24	110.9	4.5	24	18.7	2.4	30	108.3	5.0	30	17.2	2.6
6 歳	34	115.3	3.5	34	20.5	2.9	30	113.1	6.0	30	20.2	3.6
7 歳	29	121.6	5.7	29	23.4	4.4	20	121.1	4.7	20	22.0	3.7
8 歳	29	127.4	4.4	29	25.9	4.2	43	127.1	5.5	43	25.4	4.0
9 歳	23	133.6	6.4	23	29.6	6.2	39	133.1	7.4	39	29.9	6.6
10歳	32	137.3	6.5	32	32.7	6.2	17	138.5	5.6	17	32.6	6.6
11歳	41	145.7	6.6	41	38.0	8.4	33	146.8	7.2	33	38.0	6.6
12歳	39	152.3	7.5	39	42.9	11.5	33	150.8	5.5	33	39.7	6.4
13歳	31	159.3	7.0	30	47.6	9.4	31	155.5	5.8	31	46.1	6.2
14歳	35	164.3	5.6	35	51.2	5.8	26	157.2	6.6	26	47.2	6.4
15歳	31	167.5	5.1	30	55.6	8.2	31	155.9	4.9	31	48.1	6.3
16歳	25	168.9	7.3	25	58.2	7.3	22	157.8	5.5	22	50.5	7.0
17歳	25	172.4	6.7	25	64.6	15.5	31	155.0	4.9	31	49.6	7.3
18歳	22	170.5	7.7	22	60.7	9.0	17	158.8	5.3	16	53.4	4.4
19歳	19	174.9	6.1	19	68.0	11.5	16	157.0	5.0	16	50.5	10.9
20歳	15	173.2	4.8	13	64.6	7.1	22	156.4	4.4	22	50.0	7.0
21歳	14	170.7	9.1	14	68.5	14.7	19	156.6	6.4	18	50.2	9.2
22歳	13	170.7	10.5	12	66.1	16.1	20	158.1	6.6	20	51.0	6.9
23歳	20	172.9	5.8	20	71.3	16.5	21	156.1	5.5	20	52.5	9.7
24歳	15	171.3	5.8	14	64.1	13.7	12	159.5	4.2	12	51.5	8.0
25歳	13	170.9	6.7	13	61.1	12.7	26	160.4	5.6	26	53.1	8.9
26-29歳	83	171.7	6.0	83	70.3	13.2	93	159.0	5.7	88	53.1	10.2
30-39歳	296	172.0	6.0	295	71.2	14.0	332	158.2	5.9	316	52.0	7.1
40-49歳	378	170.8	5.4	375	70.6	11.8	535	158.0	5.5	531	55.5	10.1
50-59歳	374	169.2	5.9	373	68.1	10.3	476	156.6	5.1	476	55.0	9.9
60-69歳	585	167.0	5.8	585	66.3	9.8	701	153.3	5.4	700	53.3	8.0
70歳以上	682	162.0	6.4	681	61.0	9.4	811	148.5	6.7	815	50.3	8.8
(再掲)												
20歳以上	2,488	167.5	7.1	2,478	66.5	11.6	3,068	154.2	7.0	3,044	52.9	9.1
20-29歳	173	171.7	6.6	169	68.3	13.8	213	158.3	5.7	206	52.2	9.2
60-64歳	264	167.2	6.0	264	66.7	10.4	317	154.0	5.4	316	53.3	7.7
65-69歳	321	166.7	5.7	321	65.9	9.2	384	152.6	5.3	384	53.3	8.4
70-74歳	262	163.8	5.9	262	63.1	8.7	283	151.2	5.7	283	52.6	8.4
75-79歳	202	162.9	5.4	202	62.4	9.6	248	149.3	6.1	249	51.5	8.6
80歳以上	218	159.0	6.8	217	57.0	8.8	280	145.0	6.8	283	47.0	8.5

注)女性の体重の集計は妊婦18名を除外して行った。

(27年)

第13表 BMIの平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 15歳以上〔妊婦除外〕

	男 性			女 性		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	2,598	23.52	3.52	3,156	22.21	3.61
15-19歳	121	20.83	2.82	116	20.37	2.69
20-29歳	169	23.12	4.24	206	20.82	3.42
30-39歳	294	24.02	4.41	316	20.78	2.60
40-49歳	375	24.18	3.81	531	22.27	3.93
50-59歳	373	23.78	3.25	476	22.41	3.97
60-69歳	585	23.74	3.13	700	22.69	3.35
70歳以上	681	23.19	3.01	811	22.82	3.55
(再掲)						
20歳以上	2,477	23.65	3.50	3,040	22.28	3.62
20-69歳	1,796	23.83	3.65	2,229	22.09	3.62
40-69歳	1,333	23.88	3.37	1,707	22.48	3.72
65-69歳	321	23.69	2.97	384	22.88	3.57
70-74歳	262	23.51	2.80	283	22.98	3.39
75-79歳	202	23.51	3.27	248	23.14	3.70
80-84歳	156	22.67	2.83	166	22.76	3.65
80歳以上	217	22.50	2.90	280	22.37	3.56
85歳以上	61	22.05	3.03	114	21.80	3.36

注1)身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦18名を除外している。

(27年)

注2)BMIは体重(kg)／(身長(m))<sup>2</sup>で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

第14表 BMIの分布－BMIの区分，人数，割合－総数・男性・女性，15歳以上〔妊婦除外〕

	総数		男性		女性	
	人数	%	人数	%	人数	%
総数	5,754	100.0	2,598	100.0	3,156	100.0
15未満	10	0.2	4	0.2	6	0.2
15－16未満	23	0.4	8	0.3	15	0.5
16－17未満	96	1.7	22	0.8	74	2.3
17－18未満	203	3.5	50	1.9	153	4.8
18－19未満	394	6.8	108	4.2	286	9.1
19－20未満	538	9.4	154	5.9	384	12.2
20－21未満	678	11.8	246	9.5	432	13.7
21－22未満	698	12.1	318	12.2	380	12.0
22－23未満	628	10.9	323	12.4	305	9.7
23－24未満	601	10.4	311	12.0	290	9.2
24－25未満	558	9.7	316	12.2	242	7.7
25－26未満	362	6.3	207	8.0	155	4.9
26－27未満	304	5.3	170	6.5	134	4.2
27－28未満	221	3.8	127	4.9	94	3.0
28－29未満	133	2.3	68	2.6	65	2.1
29－30未満	101	1.8	55	2.1	46	1.5
30－31未満	45	0.8	26	1.0	19	0.6
31－32未満	49	0.9	29	1.1	20	0.6
32－33未満	38	0.7	21	0.8	17	0.5
33－34未満	20	0.3	11	0.4	9	0.3
34－35未満	18	0.3	12	0.5	6	0.2
35以上	36	0.6	12	0.5	24	0.8

注1)身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦18名を除外している。

(27年)

注2)BMIは体重(kg)／(身長(m))<sup>2</sup>で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

第15表の1 BMIの状況—年齢階級, 肥満度(BMI)別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 15歳以上〔妊婦除外〕

	総数	やせ		普通		肥満		(再掲) 20以下		(再掲) 25以上30未満		(再掲) 30以上			
		18.5未満		18.5以上25未満		25以上									
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	5,754	100.0	487	8.5	3,940	68.5	1,327	23.1	1,273	22.1	1,121	19.5	206	3.6
	15-19歳	237	100.0	47	19.8	178	75.1	12	5.1	110	46.4	10	4.2	2	0.8
	20-29歳	375	100.0	61	16.3	248	66.1	66	17.6	145	38.7	48	12.8	18	4.8
	30-39歳	610	100.0	60	9.8	440	72.1	110	18.0	179	29.3	86	14.1	24	3.9
	40-49歳	906	100.0	63	7.0	606	66.9	237	26.2	198	21.9	191	21.1	46	5.1
	50-59歳	849	100.0	65	7.7	562	66.2	222	26.1	176	20.7	184	21.7	38	4.5
	60-69歳	1,285	100.0	68	5.3	892	69.4	325	25.3	202	15.7	287	22.3	38	3.0
	70歳以上	1,492	100.0	123	8.2	1,014	68.0	355	23.8	263	17.6	315	21.1	40	2.7
	(再掲)														
	20歳以上	5,517	100.0	440	8.0	3,762	68.2	1,315	23.8	1,163	21.1	1,111	20.1	204	3.7
	20-69歳	4,025	100.0	317	7.9	2,748	68.3	960	23.9	900	22.4	796	19.8	164	4.1
	40-69歳	3,040	100.0	196	6.4	2,060	67.8	784	25.8	576	18.9	662	21.8	122	4.0
	65-69歳	705	100.0	36	5.1	486	68.9	183	26.0	104	14.8	159	22.6	24	3.4
	70-74歳	545	100.0	34	6.2	378	69.4	133	24.4	75	13.8	118	21.7	15	2.8
	75-79歳	450	100.0	35	7.8	290	64.4	125	27.8	72	16.0	108	24.0	17	3.8
80-84歳	322	100.0	27	8.4	223	69.3	72	22.4	65	20.2	65	20.2	7	2.2	
80歳以上	497	100.0	54	10.9	346	69.6	97	19.5	116	23.3	89	17.9	8	1.6	
85歳以上	175	100.0	27	15.4	123	70.3	25	14.3	51	29.1	24	13.7	1	0.6	
男性	総数	2,598	100.0	127	4.9	1,733	66.7	738	28.4	349	13.4	627	24.1	111	4.3
	15-19歳	121	100.0	24	19.8	89	73.6	8	6.6	49	40.5	7	5.8	1	0.8
	20-29歳	169	100.0	15	8.9	109	64.5	45	26.6	42	24.9	32	18.9	13	7.7
	30-39歳	294	100.0	11	3.7	194	66.0	89	30.3	37	12.6	67	22.8	22	7.5
	40-49歳	375	100.0	10	2.7	228	60.8	137	36.5	33	8.8	115	30.7	22	5.9
	50-59歳	373	100.0	10	2.7	239	64.1	124	33.2	39	10.5	108	29.0	16	4.3
	60-69歳	585	100.0	21	3.6	391	66.8	173	29.6	58	9.9	152	26.0	21	3.6
	70歳以上	681	100.0	36	5.3	483	70.9	162	23.8	91	13.4	146	21.4	16	2.3
	(再掲)														
	20歳以上	2,477	100.0	103	4.2	1,644	66.4	730	29.5	300	12.1	620	25.0	110	4.4
	20-69歳	1,796	100.0	67	3.7	1,161	64.6	568	31.6	209	11.6	474	26.4	94	5.2
	40-69歳	1,333	100.0	41	3.1	858	64.4	434	32.6	130	9.8	375	28.1	59	4.4
	65-69歳	321	100.0	10	3.1	219	68.2	92	28.7	30	9.3	82	25.5	10	3.1
	70-74歳	262	100.0	10	3.8	184	70.2	68	26.0	26	9.9	63	24.0	5	1.9
	75-79歳	202	100.0	11	5.4	135	66.8	56	27.7	23	11.4	46	22.8	10	5.0
80-84歳	156	100.0	9	5.8	118	75.6	29	18.6	27	17.3	28	17.9	1	0.6	
80歳以上	217	100.0	15	6.9	164	75.6	38	17.5	42	19.4	37	17.1	1	0.5	
85歳以上	61	100.0	6	9.8	46	75.4	9	14.8	15	24.6	9	14.8	0	0.0	
女性	総数	3,156	100.0	360	11.4	2,207	69.9	589	18.7	924	29.3	494	15.7	95	3.0
	15-19歳	116	100.0	23	19.8	89	76.7	4	3.4	61	52.6	3	2.6	1	0.9
	20-29歳	206	100.0	46	22.3	139	67.5	21	10.2	103	50.0	16	7.8	5	2.4
	30-39歳	316	100.0	49	15.5	246	77.8	21	6.6	142	44.9	19	6.0	2	0.6
	40-49歳	531	100.0	53	10.0	378	71.2	100	18.8	165	31.1	76	14.3	24	4.5
	50-59歳	476	100.0	55	11.6	323	67.9	98	20.6	137	28.8	76	16.0	22	4.6
	60-69歳	700	100.0	47	6.7	501	71.6	152	21.7	144	20.6	135	19.3	17	2.4
	70歳以上	811	100.0	87	10.7	531	65.5	193	23.8	172	21.2	169	20.8	24	3.0
	(再掲)														
	20歳以上	3,040	100.0	337	11.1	2,118	69.7	585	19.2	863	28.4	491	16.2	94	3.1
	20-69歳	2,229	100.0	250	11.2	1,587	71.2	392	17.6	691	31.0	322	14.4	70	3.1
	40-69歳	1,707	100.0	155	9.1	1,202	70.4	350	20.5	446	26.1	287	16.8	63	3.7
	65-69歳	384	100.0	26	6.8	267	69.5	91	23.7	74	19.3	77	20.1	14	3.6
	70-74歳	283	100.0	24	8.5	194	68.6	65	23.0	49	17.3	55	19.4	10	3.5
	75-79歳	248	100.0	24	9.7	155	62.5	69	27.8	49	19.8	62	25.0	7	2.8
80-84歳	166	100.0	18	10.8	105	63.3	43	25.9	38	22.9	37	22.3	6	3.6	
80歳以上	280	100.0	39	13.9	182	65.0	59	21.1	74	26.4	52	18.6	7	2.5	
85歳以上	114	100.0	21	18.4	77	67.5	16	14.0	36	31.6	15	13.2	1	0.9	

注1)身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦18名を除外している。

(27年)

注2)BMIは体重(kg)/(身長(m))<sup>2</sup>で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3)BMIの判定は下記のとおり。

低体重(やせ):18.5未満

普通:18.5以上25.0未満

肥満:25.0以上

第 15 表の 2 目標とする BMI の範囲の分布—年齢階級, 目標とする BMI の範囲, 人数, 割合—総数・男性・女性, 18 歳以上〔妊婦除外〕

		総数		範囲未満		範囲内		範囲以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	18-49歳	1,964	100.0	192	9.8	1,354	68.9	418	21.3
	50-69歳	2,134	100.0	375	17.6	1,212	56.8	547	25.6
	70歳以上	1,492	100.0	497	33.3	640	42.9	355	23.8
男性	18-49歳	879	100.0	39	4.4	566	64.4	274	31.2
	50-69歳	958	100.0	96	10.0	565	59.0	297	31.0
	70歳以上	681	100.0	188	27.6	331	48.6	162	23.8
女性	18-49歳	1,085	100.0	153	14.1	788	72.6	144	13.3
	50-69歳	1,176	100.0	279	23.7	647	55.0	250	21.3
	70歳以上	811	100.0	309	38.1	309	38.1	193	23.8

注 1) 身長と体重の測定を行った 18 歳以上の者を集計対象とした。なお, 女性は妊婦 18 名(すべて 18-49 歳)を除外している。 (27 年)  
 注 2) BMI は体重(kg) / (身長(m))<sup>2</sup> で算出し, 小数点第 3 位で四捨五入した値を使用した。

<参考> 目標とする BMI の範囲 (18 歳以上) <sup>1,2</sup>

年齢(歳)	目標とする BMI (kg/m <sup>2</sup> )
18-49	18.5-24.9
50-69	20.0-24.9
70以上	21.5-24.9 <sup>3</sup>

(27 年)

<sup>1</sup> 男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。

<sup>2</sup> 観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かった BMI を基に, 疾患別の発症率と BMI との関連, 死因と BMI との関連, 日本人の BMI の実態に配慮し, 総合的に判断し目標とする範囲を設定。

<sup>3</sup> 70 歳以上では, 総死亡率が最も低かった BMI と実態との乖離が見られるため, 虚弱の予防及び生活習慣病の予防の両者に配慮する必要があることも踏まえ, 当面目標とする BMI の範囲を 21.5-24.9 とした。(厚生労働省「日本人の食事摂取基準 2015 年版」)

第16表 学校保健統計調査方式による肥満区分—学校保健統計調査方式による肥満区分, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 6-14歳

		総数		6-8歳		9-11歳		12-14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	564	100.0	185	100.0	185	100.0	194	100.0
	-30%以下	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0
	-30%超～-20%以下	23	4.1	4	2.2	9	4.9	10	5.2
	-20%超～-10%以下	125	22.2	35	18.9	39	21.1	51	26.3
	-10%超～0%未満	215	38.1	77	41.6	63	34.1	75	38.7
	0%以上～+10%未満	132	23.4	50	27.0	43	23.2	39	20.1
	+10%以上～+20%未満	37	6.6	13	7.0	14	7.6	10	5.2
	+20%以上～+30%未満	17	3.0	3	1.6	7	3.8	7	3.6
	+30%以上～+40%未満	8	1.4	2	1.1	6	3.2	0	0.0
	+40%以上～+50%未満	3	0.5	1	0.5	2	1.1	0	0.0
+50%以上	3	0.5	0	0.0	1	0.5	2	1.0	
男性	総数	292	100.0	92	100.0	96	100.0	104	100.0
	-30%以下	1	0.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0
	-30%超～-20%以下	9	3.1	0	0.0	7	7.3	2	1.9
	-20%超～-10%以下	69	23.6	20	21.7	20	20.8	29	27.9
	-10%超～0%未満	105	36.0	37	40.2	31	32.3	37	35.6
	0%以上～+10%未満	69	23.6	27	29.3	19	19.8	23	22.1
	+10%以上～+20%未満	20	6.8	5	5.4	8	8.3	7	6.7
	+20%以上～+30%未満	10	3.4	1	1.1	5	5.2	4	3.8
	+30%以上～+40%未満	5	1.7	1	1.1	4	4.2	0	0.0
	+40%以上～+50%未満	2	0.7	1	1.1	1	1.0	0	0.0
+50%以上	2	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.9	
女性	総数	272	100.0	93	100.0	89	100.0	90	100.0
	-30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	-30%超～-20%以下	14	5.1	4	4.3	2	2.2	8	8.9
	-20%超～-10%以下	56	20.6	15	16.1	19	21.3	22	24.4
	-10%超～0%未満	110	40.4	40	43.0	32	36.0	38	42.2
	0%以上～+10%未満	63	23.2	23	24.7	24	27.0	16	17.8
	+10%以上～+20%未満	17	6.3	8	8.6	6	6.7	3	3.3
	+20%以上～+30%未満	7	2.6	2	2.2	2	2.2	3	3.3
	+30%以上～+40%未満	3	1.1	1	1.1	2	2.2	0	0.0
	+40%以上～+50%未満	1	0.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0
+50%以上	1	0.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	

注1)身長と体重の測定を行った6-14歳の者を集計対象とした。

注2)学校保健統計調査方式による区分は, p.14参照。

(27年)

第17表 腹围の分布—腹围の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 6歳以上〔妊婦除外〕

総数	6-8歳		9-11歳		12-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 40-74歳							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%						
総数	5,786	100.0	161	100.0	153	100.0	100.0	100.0	180	100.0	338	100.0	550	100.0	816	100.0	803	100.0	1,228	100.0	1,394	100.0	5,129	100.0	3,366	100.0				
50cm未満	18	0.3	17	10.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
50-55cm未満	100	1.7	69	42.9	29	19.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0		
55-60	159	2.7	51	31.7	46	30.1	26	16.0	9	5.0	4	1.2	2	0.4	4	0.5	4	0.5	5	0.4	8	0.6	27	0.5	16	0.5	16	0.5		
60-65	243	4.2	15	9.3	41	26.8	43	26.4	19	10.6	30	8.9	17	3.1	22	2.7	22	2.7	14	1.1	20	1.4	125	2.4	64	1.9	24	0.7		
65-70	446	7.7	4	2.5	22	14.4	48	29.4	51	28.3	55	16.3	57	10.4	60	7.4	53	6.6	45	3.7	51	3.7	321	6.3	172	5.1	11.1	0.3		
70-75	725	12.5	3	1.9	7	4.6	26	16.0	45	25.0	84	24.9	128	23.3	129	15.8	90	11.2	114	9.3	99	7.1	644	12.6	372	11.1	583	17.3		
75-80	921	15.9	2	1.2	2	1.3	13	8.0	25	13.9	58	17.2	106	19.3	175	21.4	152	18.9	185	15.1	203	14.6	879	17.1	583	17.3	173	5.1		
80-85	989	17.1	0	0.0	2	1.3	4	2.5	17	9.4	37	10.9	86	15.6	134	16.4	160	19.9	265	21.6	284	20.4	966	18.8	673	20.0	200	6.0		
85-90	900	15.6	0	0.0	2	1.3	0	0.0	5	2.8	28	8.3	46	8.4	122	15.0	127	15.8	257	20.9	296	21.2	893	17.4	626	18.6	186	5.5		
90-95	665	11.5	0	0.0	1	0.7	1	0.6	5	2.8	17	5.0	46	8.4	90	11.0	98	12.2	178	14.5	229	16.4	658	12.8	445	13.2	132	3.9		
95-100	338	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.8	20	3.6	37	4.5	53	6.6	105	8.6	110	7.9	338	6.6	235	7.0	70	2.1		
100-105	140	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	4	1.2	5	0.9	18	2.2	22	2.7	30	2.4	58	4.2	137	2.7	88	2.6	26	0.8		
105-110	74	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.8	6	1.1	12	1.5	11	1.4	17	1.4	21	1.5	73	1.4	50	1.5	15	0.5		
110-115	36	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.3	5	0.9	6	0.7	4	0.5	8	0.7	11	0.8	35	0.7	23	0.7	7	0.2		
115-120	14	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	0.7	1	0.1	3	0.4	3	0.2	2	0.1	14	0.3	7	0.2	2	0.1		
120cm以上	18	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.7	6	0.7	4	0.5	2	0.2	2	0.1	18	0.4	12	0.4	4	0.1		
総数	2,611	100.0	77	100.0	79	100.0	84	100.0	89	100.0	150	100.0	261	100.0	335	100.0	340	100.0	557	100.0	639	100.0	2,282	100.0	1,480	100.0	100.0	0.0	0.0	
50cm未満	8	0.3	7	9.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-55cm未満	49	1.9	36	46.8	13	16.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55-60	60	2.3	21	27.3	24	30.1	12	14.3	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0
60-65	66	2.5	8	10.4	22	27.8	23	27.4	4	4.5	3	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	0.8	9	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0
65-70	102	3.9	1	1.3	11	13.9	22	26.2	20	22.5	11	7.3	8	3.1	3	0.9	6	1.8	6	1.1	14	2.2	48	1.1	17	1.1	17	1.1	17	1.1
70-75	219	8.4	2	2.6	5	6.3	16	19.0	29	32.6	36	24.0	26	10.0	26	7.8	20	5.9	33	5.9	26	4.1	167	7.3	89	6.0	60	2.1		
75-80	347	13.3	2	2.6	1	1.3	7	8.3	13	14.6	28	18.7	51	19.5	59	17.6	49	14.4	54	9.7	83	13.0	324	14.2	191	12.9	129	4.7		
80-85	510	19.5	0	0.0	0	0.0	2	2.4	13	14.6	21	14.0	58	22.2	76	22.7	80	23.5	126	22.6	134	21.0	495	21.7	341	23.0	230	8.4		
85-90	520	19.9	0	0.0	1	1.3	0	0.0	3	3.4	20	13.3	45	17.2	66	19.7	81	23.8	137	24.6	167	26.1	516	22.6	354	23.9	239	8.8		
90-95	377	14.4	0	0.0	1	1.3	1	1.2	2	2.2	12	8.0	36	13.8	54	16.1	52	15.3	104	18.7	115	18.0	373	16.3	252	17.0	170	6.2		
95-100	188	7.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	7.3	15	5.7	25	7.5	29	8.5	60	10.8	48	7.5	188	8.2	135	9.1	91	3.3		
100-105	84	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	3	2.0	4	1.5	12	3.6	13	3.8	18	3.2	31	4.9	81	3.5	52	3.5	35	1.3		
105-110	45	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	4	2.7	6	2.3	8	2.4	7	2.1	12	2.2	7	1.1	44	1.9	30	2.0	20	0.7		
110-115	22	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.7	5	1.9	4	1.2	1	0.3	4	0.7	6	0.9	21	0.9	12	0.8	8	0.3		
115-120	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.5	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	7	0.3	2	0.1	1	0.0		
120cm以上	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	2	0.6	1	0.3	1	0.2	0	0.0	7	0.3	4	0.3	4	0.1		
総数	3,175	100.0	84	100.0	74	100.0	79	100.0	91	100.0	188	100.0	289	100.0	481	100.0	463	100.0	671	100.0	755	100.0	2,847	100.0	1,886	100.0	100.0	0.0	0.0	
50cm未満	10	0.3	10	11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-55cm未満	51	1.6	33	39.3	16	21.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
55-60	99	3.1	30	35.7	22	29.7	14	17.7	8	8.8	4	2.1	2	0.7	4	0.8	4	0.9	5	0.7	6	0.8	25	0.8	16	0.8	16	0.8	16	0.8
60-65	177	5.6	7	8.3	19	25.7	20	25.3	15	16.5	27	14.4	17	5.9	22	4.6	22	4.8	13	1.9	15	2.0	116	4.1	63	3.3	63	3.3		
65-70	344	10.8	3	3.6	11	14.9	26	32.9	31	34.1	44	23.4	49	17.0	57	11.9	47	10.2	39	5.8	37	4.9	273	9.6	155	8.2	155	8.2		
70-75	506	15.9	1	1.2	2	2.7	10	12.7	16	17.6	46	25.5	102	35.3	103	10.3	70	15.1	81	12.1	73	9.7	477	16.8	283	15.0	283	15.0		
75-80	574	18.1	0	0.0	1	1.4	6	7.6	12	13.2	30	16.0	55	19.0	116	24.1	103	22.2	131	19.5	120	15.9	555	19.5	392	20.8	392	20.8		
80-85	479	15.1	0	0.0	2	2.7	2	2.5	4	4.4	16	8.5	28	9.7	58	12.1	80	17.3	139	20.7	150	19.9	471	16.5	332	17.6	332	17.6		
85-90	288	9.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0	2	2.2	8	4.3	10	3.5	16	6.2	46	9.9	120	17.9	129	17.1	377	13.2	272	14.4	272	14.4		
90-95	150	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.3	5	2.7	10	3.5	36	7.5	46	9.9	74	11.0	114	15.1	285	10.0	193	10.2	193	10.2		
95-100	56	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0																						



第18表 腹囲の分布—腹囲の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	5,129	100.0	338	100.0	550	100.0	816	100.0	803	100.0	1,228	100.0	1,394	100.0	3,366	100.0
	<85cm(男)/<90cm(女)	3,340	65.1	276	81.7	415	75.5	580	71.1	527	65.6	748	60.9	794	57.0	2,152	63.9
	≥85cm(男)/≥90cm(女)	1,789	34.9	62	18.3	135	24.5	236	28.9	276	34.4	480	39.1	600	43.0	1,214	36.1
男性	総数	2,282	100.0	150	100.0	261	100.0	335	100.0	340	100.0	557	100.0	639	100.0	1,480	100.0
	<85cm	1,045	45.8	99	66.0	143	54.8	164	49.0	155	45.6	220	39.5	264	41.3	639	43.2
	≥85cm	1,237	54.2	51	34.0	118	45.2	171	51.0	185	54.4	337	60.5	375	58.7	841	56.8
女性	総数	2,847	100.0	188	100.0	289	100.0	481	100.0	463	100.0	671	100.0	755	100.0	1,886	100.0
	<90cm	2,295	80.6	177	94.1	272	94.1	416	86.5	372	80.3	528	78.7	530	70.2	1,513	80.2
	≥90cm	552	19.4	11	5.9	17	5.9	65	13.5	91	19.7	143	21.3	225	29.8	373	19.8

注) 腹囲の測定を行った6歳以上の者を集計対象とした。なお女性は妊婦6名(30-39歳の6名)を除外した。

(27年)

第19表 BMI・腹囲の分布—BMI・腹囲の区分, 人数, 年齢階級別, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	5,115	100.0	335	100.0	548	100.0	815	100.0	800	100.0	1,226	100.0	1,391	100.0	3,360	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm(男)/90cm(女)	3,112	60.8	262	78.2	400	73.0	528	64.8	490	61.3	693	56.5	739	53.1	1,985	59.1
	BMIのみ超(BMI≥25)	219	4.3	11	3.3	14	2.6	52	6.4	34	4.3	55	4.5	53	3.8	164	4.9
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm(男)/90cm(女))	774	15.1	15	4.5	51	9.3	73	9.0	99	12.4	218	17.8	318	22.9	508	15.1
	BMI≥25, 腹囲≥85cm(男)/90cm(女)	1,010	19.7	47	14.0	83	15.1	162	19.9	177	22.1	260	21.2	281	20.2	703	20.9
男性	総数	2,274	100.0	149	100.0	259	100.0	334	100.0	338	100.0	556	100.0	638	100.0	1,476	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	1,001	44.0	97	65.1	137	52.9	153	45.8	143	42.3	212	38.1	259	40.6	606	41.1
	BMIのみ超(BMI≥25)	39	1.7	1	0.7	5	1.9	11	3.3	10	3.0	8	1.4	4	0.6	31	2.1
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm)	597	26.3	14	9.4	45	17.4	59	17.7	79	23.4	176	31.7	224	35.1	399	27.0
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	637	28.0	37	24.8	72	27.8	111	33.2	106	31.4	160	28.8	151	23.7	440	29.8
女性	総数	2,841	100.0	186	100.0	289	100.0	481	100.0	462	100.0	670	100.0	753	100.0	1,884	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	2,111	74.3	165	88.7	263	91.0	375	78.0	347	75.1	481	71.8	480	63.7	1,379	73.2
	BMIのみ超(BMI≥25)	180	6.3	10	5.4	9	3.1	41	8.5	24	5.2	47	7.0	49	6.5	133	7.1
	腹囲のみ超(腹囲≥90cm)	177	6.2	1	0.5	6	2.1	14	2.9	20	4.3	42	6.3	94	12.5	109	5.8
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	373	13.1	10	5.4	11	3.8	51	10.6	71	15.4	100	14.9	130	17.3	263	14.0

注) 身長と体重および腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお女性は妊婦6名(30-39歳の6名)を除外した。

(27年)

(参考) 内臓脂肪型肥満の診断基準:

- BMI 25 以上で, 男性のウエスト周囲径 85cm 以上, 女性のウエスト周囲径 90cm 以上を上半身肥満の疑いとする。
- 上半身肥満の疑いと判定され, 腹部CT法による内臓脂肪面積 100cm<sup>2</sup> 以上(男女とも)を内臓脂肪型肥満と診断する。(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会, 2000年)

※国民健康・栄養調査の「腹囲」は, 「立位のへその高さ」で計測したが, 計測位置は「ウエスト周囲径」と同じである。

第20表 薬の服用状況—薬の服用状況，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	3,955	100.0	201	100.0	384	100.0	592	100.0	591	100.0	1,014	100.0	1,173	100.0
	使用なし	2,501	63.2	200	99.5	374	97.4	518	87.5	434	73.4	577	56.9	398	33.9
	使用あり(一つ以上)	1,454	36.8	1	0.5	10	2.6	74	12.5	157	26.6	437	43.1	775	66.1
	血圧を下げる薬	1,068	27.0	0	0.0	2	0.5	35	5.9	106	17.9	303	29.9	622	53.0
	脈の乱れを治す薬	173	4.4	0	0.0	0	0.0	8	1.4	9	1.5	36	3.6	120	10.2
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	308	7.8	1	0.5	1	0.3	11	1.9	30	5.1	90	8.9	175	14.9
	コレステロールを下げる薬	607	15.3	0	0.0	2	0.5	27	4.6	59	10.0	218	21.5	301	25.7
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	184	4.7	0	0.0	0	0.0	9	1.5	18	3.0	61	6.0	96	8.2
	貧血治療のための薬(鉄剤)	48	1.2	0	0.0	5	1.3	16	2.7	3	0.5	4	0.4	20	1.7
男性	総数	1,650	100.0	80	100.0	146	100.0	212	100.0	230	100.0	442	100.0	540	100.0
	使用なし	983	59.6	79	98.8	142	97.3	181	85.4	149	64.8	235	53.2	197	36.5
	使用あり(一つ以上)	667	40.4	1	1.3	4	2.7	31	14.6	81	35.2	207	46.8	343	63.5
	血圧を下げる薬	516	31.3	0	0.0	0	0.0	20	9.4	58	25.2	157	35.5	281	52.0
	脈の乱れを治す薬	90	5.5	0	0.0	0	0.0	4	1.9	4	1.7	24	5.4	58	10.7
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	185	11.2	1	1.3	1	0.7	7	3.3	22	9.6	58	13.1	96	17.8
	コレステロールを下げる薬	230	13.9	0	0.0	2	1.4	12	5.7	27	11.7	80	18.1	109	20.2
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	102	6.2	0	0.0	0	0.0	6	2.8	10	4.3	35	7.9	51	9.4
	貧血治療のための薬(鉄剤)	13	0.8	0	0.0	1	0.7	1	0.5	0	0.0	3	0.7	8	1.5
女性	総数	2,305	100.0	121	100.0	238	100.0	380	100.0	361	100.0	572	100.0	633	100.0
	使用なし	1,518	65.9	121	100.0	232	97.5	337	88.7	285	78.9	342	59.8	201	31.8
	使用あり(一つ以上)	787	34.1	0	0.0	6	2.5	43	11.3	76	21.1	230	40.2	432	68.2
	血圧を下げる薬	552	23.9	0	0.0	2	0.8	15	3.9	48	13.3	146	25.5	341	53.9
	脈の乱れを治す薬	83	3.6	0	0.0	0	0.0	4	1.1	5	1.4	12	2.1	62	9.8
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	123	5.3	0	0.0	0	0.0	4	1.1	8	2.2	32	5.6	79	12.5
	コレステロールを下げる薬	377	16.4	0	0.0	0	0.0	15	3.9	32	8.9	138	24.1	192	30.3
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	82	3.6	0	0.0	0	0.0	3	0.8	8	2.2	26	4.5	45	7.1
	貧血治療のための薬(鉄剤)	35	1.5	0	0.0	4	1.7	15	3.9	3	0.8	1	0.2	12	1.9

注1) 血圧を下げる薬，脈の乱れを治す薬，インスリン注射又は血糖を下げる薬，コレステロールを下げる薬，中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬，貧血治療のための薬(鉄剤)のすべての服用状況に回答した者を集計対象とした。(27年)

注2) 複数回答。

第21表の1 血圧の状況—年齢階級, 日本高血圧学会による血圧の分類別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*
総数	総数	3,541	100.0	946	26.7	669	18.9	751	21.2	874	24.7	239	6.7	62	1.8	611	17.3
	20-29歳	157	100.0	117	74.5	23	14.6	11	7.0	5	3.2	1	0.6	0	0.0	2	1.3
	30-39歳	335	100.0	208	62.1	63	18.8	36	10.7	24	7.2	3	0.9	1	0.3	6	1.8
	40-49歳	510	100.0	216	42.4	120	23.5	76	14.9	77	15.1	14	2.7	7	1.4	14	2.7
	50-59歳	507	100.0	124	24.5	108	21.3	110	21.7	119	23.5	35	6.9	11	2.2	42	8.3
	60-69歳	942	100.0	157	16.7	165	17.5	221	23.5	305	32.4	72	7.6	22	2.3	189	20.1
	70歳以上	1,090	100.0	124	11.4	190	17.4	297	27.2	344	31.6	114	10.5	21	1.9	358	32.8
	(再掲) 65-74歳	959	100.0	128	13.3	162	16.9	247	25.8	324	33.8	71	7.4	27	2.8	248	25.9
	(再掲) 75歳以上	668	100.0	77	11.5	118	17.7	179	26.8	204	30.5	79	11.8	11	1.6	227	34.0
男性	総数	1,433	100.0	230	16.1	274	19.1	343	23.9	432	30.1	125	8.7	29	2.0	266	18.6
	20-29歳	62	100.0	35	56.5	15	24.2	9	14.5	3	4.8	0	0.0	0	0.0	1	1.6
	30-39歳	119	100.0	41	34.5	33	27.7	22	18.5	20	16.8	2	1.7	1	0.8	5	4.2
	40-49歳	165	100.0	36	21.8	44	26.7	33	20.0	39	23.6	8	4.8	5	3.0	4	2.4
	50-59歳	178	100.0	24	13.5	39	21.9	43	24.2	46	25.8	21	11.8	5	2.8	8	4.5
	60-69歳	401	100.0	45	11.2	57	14.2	90	22.4	156	38.9	41	10.2	12	3.0	86	21.4
	70歳以上	508	100.0	49	9.6	86	16.9	146	28.7	168	33.1	53	10.4	6	1.2	162	31.9
	(再掲) 65-74歳	438	100.0	45	10.3	66	15.1	111	25.3	170	38.8	34	7.8	12	2.7	112	25.6
	(再掲) 75歳以上	303	100.0	32	10.6	52	17.2	87	28.7	92	30.4	36	11.9	4	1.3	99	32.7
女性	総数	2,108	100.0	716	34.0	395	18.7	408	19.4	442	21.0	114	5.4	33	1.6	345	16.4
	20-29歳	95	100.0	82	86.3	8	8.4	2	2.1	2	2.1	1	1.1	0	0.0	1	1.1
	30-39歳	216	100.0	167	77.3	30	13.9	14	6.5	4	1.9	1	0.5	0	0.0	1	0.5
	40-49歳	345	100.0	180	52.2	76	22.0	43	12.5	38	11.0	6	1.7	2	0.6	10	2.9
	50-59歳	329	100.0	100	30.4	69	21.0	67	20.4	73	22.2	14	4.3	6	1.8	34	10.3
	60-69歳	541	100.0	112	20.7	108	20.0	131	24.2	149	27.5	31	5.7	10	1.8	103	19.0
	70歳以上	582	100.0	75	12.9	104	17.9	151	25.9	176	30.2	61	10.5	15	2.6	196	33.7
	(再掲) 65-74歳	521	100.0	83	15.9	96	18.4	136	26.1	154	29.6	37	7.1	15	2.9	136	26.1
	(再掲) 75歳以上	365	100.0	45	12.3	66	18.1	92	25.2	112	30.7	43	11.8	7	1.9	128	35.1

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお、拡張期血圧の値が欠損している者(男性1名)を除外した。(27年)

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

注3) 日本高血圧学会による血圧の分類はp.15を参照。

\* 総数に対する割合。

第 21 表の 2 血圧の状況—年齢階級, 日本高血圧学会による血圧の分類別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20 歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I 度高血圧		II 度高血圧		III 度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*
総数	総数	2,553	100.0	876	34.3	523	20.5	481	18.8	501	19.6	131	5.1	41	1.6	280	11.0
	20-29歳	157	100.0	117	74.5	23	14.6	11	7.0	5	3.2	1	0.6	0	0.0	2	1.3
	30-39歳	334	100.0	208	62.3	62	18.6	36	10.8	24	7.2	3	0.9	1	0.3	6	1.8
	40-49歳	479	100.0	214	44.7	114	23.8	69	14.4	68	14.2	9	1.9	5	1.0	13	2.7
	50-59歳	415	100.0	122	29.4	95	22.9	87	21.0	76	18.3	25	6.0	10	2.4	22	5.3
	60-69歳	660	100.0	138	20.9	122	18.5	152	23.0	192	29.1	44	6.7	12	1.8	109	16.5
	70歳以上	508	100.0	77	15.2	107	21.1	126	24.8	136	26.8	49	9.6	13	2.6	128	25.2
	(再掲) 65-74歳	570	100.0	99	17.4	110	19.3	144	25.3	162	28.4	37	6.5	18	3.2	109	19.1
	(再掲) 75歳以上	293	100.0	47	16.0	58	19.8	67	22.9	84	28.7	32	10.9	5	1.7	83	28.3
男性	総数	959	100.0	203	21.2	201	21.0	213	22.2	255	26.6	69	7.2	18	1.9	119	12.4
	20-29歳	62	100.0	35	56.5	15	24.2	9	14.5	3	4.8	0	0.0	0	0.0	1	1.6
	30-39歳	119	100.0	41	34.5	33	27.7	22	18.5	20	16.8	2	1.7	1	0.8	5	4.2
	40-49歳	148	100.0	36	24.3	40	27.0	30	20.3	35	23.6	4	2.7	3	2.0	3	2.0
	50-59歳	129	100.0	22	17.1	31	24.0	31	24.0	28	21.7	13	10.1	4	3.1	4	3.1
	60-69歳	260	100.0	37	14.2	36	13.8	58	22.3	96	36.9	26	10.0	7	2.7	47	18.1
	70歳以上	241	100.0	32	13.3	46	19.1	63	26.1	73	30.3	24	10.0	3	1.2	59	24.5
	(再掲) 65-74歳	247	100.0	34	13.8	40	16.2	62	25.1	83	33.6	19	7.7	9	3.6	45	18.2
	(再掲) 75歳以上	138	100.0	20	14.5	23	16.7	33	23.9	46	33.3	15	10.9	1	0.7	40	29.0
女性	総数	1,594	100.0	673	42.2	322	20.2	268	16.8	246	15.4	62	3.9	23	1.4	161	10.1
	20-29歳	95	100.0	82	86.3	8	8.4	2	2.1	2	2.1	1	1.1	0	0.0	1	1.1
	30-39歳	215	100.0	167	77.7	29	13.5	14	6.5	4	1.9	1	0.5	0	0.0	1	0.5
	40-49歳	331	100.0	178	53.8	74	22.4	39	11.8	33	10.0	5	1.5	2	0.6	10	3.0
	50-59歳	286	100.0	100	35.0	64	22.4	56	19.6	48	16.8	12	4.2	6	2.1	18	6.3
	60-69歳	400	100.0	101	25.3	86	21.5	94	23.5	96	24.0	18	4.5	5	1.3	62	15.5
	70歳以上	267	100.0	45	16.9	61	22.8	63	23.6	63	23.6	25	9.4	10	3.7	69	25.8
	(再掲) 65-74歳	323	100.0	65	20.1	70	21.7	82	25.4	79	24.5	18	5.6	9	2.8	64	19.8
	(再掲) 75歳以上	155	100.0	27	17.4	35	22.6	34	21.9	38	24.5	17	11.0	4	2.6	43	27.7

注 1) 血圧の測定を行い, 身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した 20 歳以上の者を集計対象とした。なお, 拡張期血圧の値が欠損している者(男性 1 名)を除外した。

(27年)

注 2) 数値は 2 回の測定値の平均値を用いた。なお, 1 回しか測定できなかった者については, その値を採用した。

注 3) 日本高血圧学会による血圧の分類は p.15 を参照。

\* 総数に対する割合。

第22表の1 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布—収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-89歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男	収縮期(最高)血圧	総数	1,433	100.0	62	100.0	119	100.0	165	100.0	178	100.0	401	100.0	508	100.0	1,243	100.0
		90mmHg未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1
		90-99	18	1.3	5	8.1	3	2.5	4	2.4	1	0.6	2	0.5	3	0.6	10	0.8
		100-109	73	5.1	9	14.5	13	10.9	14	8.5	10	5.6	12	3.0	15	3.0	51	4.1
		110-119	198	13.8	25	40.3	34	28.6	40	24.2	23	12.9	38	9.5	38	7.5	138	11.1
		120-129	303	21.1	13	21.0	32	26.9	49	29.7	49	27.5	70	17.5	90	17.7	257	20.7
		130-139	351	24.5	7	11.3	23	19.3	29	17.6	45	25.3	100	24.9	147	28.9	316	25.4
		140-149	242	16.9	2	3.2	10	8.4	18	10.9	25	14.0	87	21.7	100	19.7	230	18.5
		150-159	134	9.4	1	1.6	3	2.5	7	4.2	10	5.6	52	13.0	61	12.0	129	10.4
		160-169	71	5.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	7	3.9	25	6.2	36	7.1	71	5.7
170-179	23	1.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	4	2.2	5	1.2	13	2.6	22	1.8		
180mmHg以上	19	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	4	2.2	10	2.5	4	0.8	18	1.4		
女	拡張期(最低)血圧	総数	1,433	100.0	62	100.0	119	100.0	165	100.0	178	100.0	401	100.0	508	100.0	1,243	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	4	0.3
		50-59	24	1.7	3	4.8	0	0.0	1	0.6	0	0.0	4	1.0	16	3.1	19	1.5
		60-69	171	11.9	22	35.5	18	15.1	9	5.5	12	6.7	32	8.0	78	15.4	130	10.5
		70-79	436	30.4	27	43.5	51	42.9	45	27.3	39	21.9	98	24.4	176	34.6	355	28.6
		80-89	478	33.4	8	12.9	32	26.9	62	37.6	63	35.4	143	35.7	170	33.5	436	35.1
		90-99	248	17.3	2	3.2	15	12.6	35	21.2	47	26.4	97	24.2	52	10.2	230	18.5
		100-109	56	3.9	0	0.0	2	1.7	8	4.8	14	7.9	21	5.2	11	2.2	54	4.3
		110-119	14	1.0	0	0.0	0	0.0	5	3.0	3	1.7	4	1.0	2	0.4	14	1.1
120-129	2	0.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1		
130-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
男	収縮期(最高)血圧	総数	2,108	100.0	95	100.0	216	100.0	345	100.0	329	100.0	541	100.0	582	100.0	1,782	100.0
		90mmHg未満	15	0.7	3	3.2	9	4.2	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.2
		90-99	108	5.1	18	18.9	39	18.1	27	7.8	11	3.3	6	1.1	7	1.2	51	2.9
		100-109	288	13.7	33	34.7	76	35.2	85	24.6	45	13.7	28	5.2	21	3.6	179	10.0
		110-119	374	17.7	31	32.6	56	25.9	88	25.5	61	18.5	89	16.5	49	8.4	287	16.1
		120-129	401	19.0	6	6.3	24	11.1	71	20.6	73	22.2	113	20.9	114	19.6	366	20.5
		130-139	393	18.6	3	3.2	8	3.7	42	12.2	61	18.5	131	24.2	148	25.4	378	21.2
		140-149	261	12.4	1	1.1	1	0.5	17	4.9	46	14.0	96	17.7	100	17.2	257	14.4
		150-159	139	6.6	0	0.0	2	0.9	6	1.7	14	4.3	46	8.5	71	12.2	136	7.6
		160-169	80	3.8	0	0.0	1	0.5	4	1.2	10	3.0	21	3.9	44	7.6	76	4.3
170-179	26	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	0.9	4	0.7	17	2.9	26	1.5		
180mmHg以上	23	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	1.2	7	1.3	11	1.9	23	1.3		
女	拡張期(最低)血圧	総数	2,108	100.0	95	100.0	216	100.0	345	100.0	329	100.0	541	100.0	582	100.0	1,782	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.5	4	0.2
		50-59	83	3.9	9	9.5	28	13.0	14	4.1	6	1.8	5	0.9	21	3.6	46	2.6
		60-69	475	22.5	50	52.6	93	43.1	94	27.2	55	16.7	72	13.3	111	19.1	325	18.2
		70-79	731	34.7	27	28.4	69	31.9	123	35.7	96	29.2	200	37.0	216	37.1	629	35.3
		80-89	571	27.1	7	7.4	22	10.2	78	22.6	113	34.3	176	32.5	175	30.1	542	30.4
		90-99	196	9.3	1	1.1	4	1.9	32	9.3	46	14.0	67	12.4	46	7.9	189	10.6
		100-109	36	1.7	1	1.1	0	0.0	2	0.6	10	3.0	17	3.1	6	1.0	35	2.0
		110-119	10	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.9	2	0.4	4	0.7	10	0.6
120-129	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1		
130-139	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお、拡張期血圧の値が欠損している者(男性1名)を除外した。(27年)  
 注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

第22表の2 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-89歳		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	収縮期(最高)血圧	1,433	133.8	17.3	62	117.5	12.1	119	123.3	13.3	165	125.7	14.8	178	133.1	17.3	401	137.9	17.1	508	137.8	16.5	1,243	135.5	17.1
	拡張期(最低)血圧	1,433	81.3	11.2	62	72.3	8.4	119	79.0	10.1	165	84.3	10.8	178	85.1	10.8	401	84.0	11.1	508	78.5	10.7	1,243	82.0	11.2
女性	収縮期(最高)血圧	2,108	127.2	19.5	95	106.9	10.2	216	109.0	12.8	345	118.1	15.7	329	127.2	18.5	541	132.5	16.7	582	137.8	17.9	1,782	130.4	18.6
	拡張期(最低)血圧	2,108	76.6	10.8	95	68.0	8.4	216	69.2	8.7	345	75.4	10.5	329	79.8	10.9	541	79.7	10.3	582	76.6	10.4	1,782	78.0	10.6

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお、拡張期血圧の値が欠損している者(男性1名)を除外した。(27年)  
 注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

第22表の3 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布—収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の区分、年齢階級別、人数、割合—男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-89歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男	収縮期(最高)血圧	総数	959	100.0	62	100.0	119	100.0	148	100.0	129	100.0	260	100.0	241	100.0	772	100.0
		90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90-99	17	1.8	5	8.1	3	2.5	4	2.7	1	0.8	2	0.8	2	0.8	9	1.2
		100-109	67	7.0	9	14.5	13	10.9	14	9.5	10	7.8	11	4.2	10	4.1	45	5.8
		110-119	170	17.7	25	40.3	34	28.6	38	25.7	21	16.3	27	10.4	25	10.4	110	14.2
		120-129	224	23.4	13	21.0	32	26.9	45	30.4	38	29.5	50	19.2	46	19.1	179	23.2
		130-139	215	22.4	7	11.3	23	19.3	26	17.6	29	22.5	64	24.6	66	27.4	182	23.6
		140-149	134	14.0	2	3.2	10	8.4	14	9.5	16	12.4	49	18.8	43	17.8	122	15.8
		150-159	78	8.1	1	1.6	3	2.5	6	4.1	7	5.4	33	12.7	28	11.6	73	9.5
		160-169	31	3.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	2.3	15	5.8	12	5.0	31	4.0
	170-179	11	1.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.8	2	0.8	7	2.9	10	1.3	
	180mmHg以上	12	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3	7	2.7	2	0.8	11	1.4	
	拡張期(最低)血圧	総数	959	100.0	62	100.0	119	100.0	148	100.0	129	100.0	260	100.0	241	100.0	772	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-59	11	1.1	3	4.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.8	5	2.1	7	0.9
		60-69	120	12.5	22	35.5	18	15.1	9	6.1	12	9.3	20	7.7	39	16.2	80	10.4
		70-79	300	31.3	27	43.5	51	42.9	44	29.7	28	21.7	64	24.6	86	35.7	220	28.5
		80-89	305	31.8	8	12.9	32	26.9	55	37.2	48	37.2	92	35.4	70	29.0	263	34.1
90-99		171	17.8	2	3.2	15	12.6	32	21.6	26	20.2	64	24.6	32	13.3	153	19.8	
100-109		42	4.4	0	0.0	2	1.7	4	2.7	12	9.3	16	6.2	8	3.3	40	5.2	
110-119		8	0.8	0	0.0	0	0.0	3	2.0	3	2.3	1	0.4	1	0.4	8	1.0	
120-129	2	0.2	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1		
130-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
女	収縮期(最高)血圧	総数	1,594	100.0	95	100.0	215	100.0	331	100.0	286	100.0	400	100.0	267	100.0	1,277	100.0
		90mmHg未満	15	0.9	3	3.2	9	4.2	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.2
		90-99	105	6.6	18	18.9	39	18.1	27	8.2	11	3.8	5	1.3	5	1.9	48	3.8
		100-109	275	17.3	33	34.7	76	35.3	84	25.4	45	15.7	27	6.8	10	3.7	166	13.0
		110-119	342	21.5	31	32.6	56	26.0	87	26.3	60	21.0	78	19.5	30	11.2	255	20.0
		120-129	318	19.9	6	6.3	23	10.7	68	20.5	65	22.7	88	22.0	68	25.5	286	22.4
		130-139	251	15.7	3	3.2	8	3.7	35	10.6	50	17.5	95	23.8	60	22.5	238	18.6
		140-149	150	9.4	1	1.1	1	0.5	16	4.8	28	9.8	66	16.5	38	14.2	147	11.5
		150-159	66	4.1	0	0.0	2	0.9	6	1.8	11	3.8	24	6.0	23	8.6	63	4.9
		160-169	41	2.6	0	0.0	1	0.5	3	0.9	9	3.1	10	2.5	18	6.7	40	3.1
	170-179	15	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.7	2	0.5	9	3.4	15	1.2	
	180mmHg以上	16	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	1.4	5	1.3	6	2.2	16	1.3	
	拡張期(最低)血圧	総数	1,594	100.0	95	100.0	215	100.0	331	100.0	286	100.0	400	100.0	267	100.0	1,277	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	0.2
		50-59	70	4.4	9	9.5	28	13.0	14	4.2	6	2.1	3	0.8	10	3.7	33	2.6
		60-69	399	25.0	50	52.6	93	43.3	94	28.4	54	18.9	58	14.5	50	18.7	252	19.7
		70-79	557	34.9	27	28.4	68	31.6	121	36.6	86	30.1	157	39.3	98	36.7	460	36.0
		80-89	396	24.8	7	7.4	22	10.2	72	21.8	92	32.2	124	31.0	79	29.6	367	28.7
90-99		134	8.4	1	1.1	4	1.9	27	8.2	36	12.6	44	11.0	22	8.2	128	10.0	
100-109		27	1.7	1	1.1	0	0.0	1	0.3	9	3.1	13	3.3	3	1.1	26	2.0	
110-119		8	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.0	0	0.0	4	1.5	8	0.6	
120-129	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1		
130-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)  
 なお、拡張期血圧の値が欠損している者(男性1名)を除外した。  
 注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

第22表の4 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-89歳		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	収縮期(最高)血圧	959	130.8	17.2	62	117.5	12.1	119	123.3	13.3	148	124.1	13.4	129	130.4	17.0	260	136.6	17.9	241	135.8	16.7	772	132.9	17.2
	拡張期(最低)血圧	959	81.5	11.1	62	72.3	8.4	119	79.0	10.1	148	83.2	10.2	129	84.6	11.6	260	84.3	10.9	241	79.3	10.9	772	82.6	11.1
女性	収縮期(最高)血圧	1,594	123.3	18.7	95	106.9	10.2	215	108.9	12.7	331	117.6	15.5	286	125.4	18.5	400	130.2	16.3	267	135.2	18.6	1,277	126.9	18.3
	拡張期(最低)血圧	1,594	75.8	10.8	95	68.0	8.4	215	69.2	8.7	331	74.9	10.3	286	79.0	11.1	400	78.9	9.8	267	77.1	10.9	1,277	77.5	10.6

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)  
 なお、拡張期血圧の値が欠損している者(男性1名)を除外した。  
 注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。



第23表の1 血色素量の分布—血色素量の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,326	100.0	57	100.0	112	100.0	150	100.0	165	100.0	380	100.0	462	100.0	405	100.0	275	100.0
	10.0g/dL未満	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.1	0	0.0	5	1.8
	10.0-10.9	12	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	11	2.4	2	0.5	9	3.3
	11.0-11.9	36	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.3	31	6.7	13	3.2	21	7.6
	12.0-12.9	91	6.9	0	0.0	2	1.8	3	2.0	4	2.4	26	6.8	56	12.1	23	5.7	45	16.4
	13.0-13.9	281	21.2	4	7.0	6	5.4	17	11.3	38	23.0	76	20.0	140	30.3	101	24.9	80	29.1
	14.0-14.9	390	29.4	20	35.1	34	30.4	45	30.0	50	30.3	120	31.6	121	26.2	129	31.9	68	24.7
	15.0-15.9	354	26.7	23	40.4	43	38.4	59	39.3	48	29.1	102	26.8	79	17.1	100	24.7	40	14.5
	16.0-16.9	128	9.7	7	12.3	24	21.4	23	15.3	17	10.3	42	11.1	15	3.2	31	7.7	6	2.2
	17.0-17.9	27	2.0	3	5.3	2	1.8	3	2.0	8	4.8	8	2.1	3	0.6	5	1.2	1	0.4
	18.0g/dL以上	2	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
女性	総数	1,976	100.0	84	100.0	208	100.0	328	100.0	308	100.0	510	100.0	538	100.0	475	100.0	342	100.0
	10.0g/dL未満	47	2.4	0	0.0	10	4.8	17	5.2	7	2.3	2	0.4	11	2.0	6	1.3	7	2.0
	10.0-10.9	69	3.5	3	3.6	14	6.7	20	6.1	4	1.3	3	0.6	25	4.6	6	1.3	21	6.1
	11.0-11.9	225	11.4	11	13.1	25	12.0	33	10.1	23	7.5	45	8.8	88	16.4	53	11.2	59	17.3
	12.0-12.9	618	31.3	30	35.7	67	32.2	94	28.7	82	26.6	159	31.2	186	34.6	151	31.8	122	35.7
	13.0-13.9	706	35.7	29	34.5	66	31.7	118	36.0	126	40.9	210	41.2	157	29.2	185	38.9	89	26.0
	14.0-14.9	253	12.8	10	11.9	21	10.1	38	11.6	54	17.5	72	14.1	58	10.8	58	12.2	36	10.5
	15.0-15.9	54	2.7	1	1.2	5	2.4	6	1.8	11	3.6	18	3.5	13	2.4	15	3.2	8	2.3
	16.0-16.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注)血色素量の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第23表の2 血色素量の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

(g/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,326	14.5	1.3	57	15.2	0.9	112	15.3	1.0	150	15.0	1.0	165	14.8	1.1	380	14.6	1.2	462	13.8	1.4	405	14.4	1.2	275	13.6	1.5
女性	1,976	12.9	1.2	84	12.8	1.0	208	12.6	1.3	328	12.7	1.4	308	13.2	1.2	510	13.2	0.9	538	12.7	1.2	475	13.0	1.0	342	12.6	1.2

注)血色素量の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第23表の3 血色素量の分布—血色素量の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上  
[貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,311	100.0	57	100.0	111	100.0	150	100.0	164	100.0	377	100.0	452	100.0	400	100.0	269	100.0
	10.0g/dL未満	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.1	0	0.0	5	1.9
	10.0-10.9	11	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	10	2.2	1	0.3	9	3.3
	11.0-11.9	35	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.3	30	6.6	12	3.0	21	7.8
	12.0-12.9	86	6.6	0	0.0	2	1.8	3	2.0	4	2.4	25	6.6	52	11.5	22	5.5	42	15.6
	13.0-13.9	277	21.1	4	7.0	6	5.4	17	11.3	38	23.2	75	19.9	137	30.3	99	24.8	78	29.0
	14.0-14.9	387	29.5	20	35.1	33	29.7	45	30.0	50	30.5	119	31.6	120	26.5	129	32.3	67	24.9
	15.0-15.9	353	26.9	23	40.4	43	38.7	59	39.3	47	28.7	102	27.1	79	17.5	100	25.0	40	14.9
	16.0-16.9	128	9.8	7	12.3	24	21.6	23	15.3	17	10.4	42	11.1	15	3.3	31	7.8	6	2.2
	17.0-17.9	27	2.1	3	5.3	2	1.8	3	2.0	8	4.9	8	2.1	3	0.7	5	1.3	1	0.4
	18.0g/dL以上	2	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,941	100.0	84	100.0	204	100.0	313	100.0	305	100.0	509	100.0	526	100.0	471	100.0	333	100.0
	10.0g/dL未満	45	2.3	0	0.0	10	4.9	16	5.1	7	2.3	2	0.4	10	1.9	6	1.3	6	1.8
	10.0-10.9	63	3.2	3	3.6	13	6.4	18	5.8	4	1.3	3	0.6	22	4.2	6	1.3	18	5.4
	11.0-11.9	219	11.3	11	13.1	24	11.8	31	9.9	22	7.2	45	8.8	86	16.3	52	11.0	58	17.4
	12.0-12.9	610	31.4	30	35.7	67	32.8	90	28.8	80	26.2	159	31.2	184	35.0	151	32.1	120	36.0
	13.0-13.9	697	35.9	29	34.5	65	31.9	113	36.1	126	41.3	210	41.3	154	29.3	184	39.1	87	26.1
	14.0-14.9	249	12.8	10	11.9	20	9.8	37	11.8	54	17.7	71	13.9	57	10.8	56	11.9	36	10.8
	15.0-15.9	54	2.8	1	1.2	5	2.5	6	1.9	11	3.6	18	3.5	13	2.5	15	3.2	8	2.4
	16.0-16.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注)血色素量の測定を行い、身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第23表の4 血色素量の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,311	14.5	1.3	57	15.2	0.9	111	15.3	1.0	150	15.0	1.0	164	14.8	1.1	377	14.6	1.2	452	13.8	1.4	400	14.4	1.2	269	13.6	1.5
女性	1,941	12.9	1.2	84	12.8	1.0	204	12.6	1.3	313	12.7	1.4	305	13.2	1.2	509	13.2	0.9	526	12.7	1.1	471	13.0	1.0	333	12.6	1.1

注)血色素量の測定を行い、身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)



第24表の1 赤血球数の分布—赤血球数の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	1,326	100.0	57	100.0	112	100.0	150	100.0	165	100.0	380	100.0	462	100.0	405	100.0	275	100.0
	400万個/mm <sup>3</sup> 未満	104	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	24	6.3	78	16.9	30	7.4	61	22.2
	400-449	346	26.1	2	3.5	4	3.6	14	9.3	35	21.2	115	30.3	176	38.1	132	32.6	108	39.3
	450-499	556	41.9	25	43.9	50	44.6	78	52.0	84	50.9	156	41.1	163	35.3	173	42.7	85	30.9
	500-549	288	21.7	27	47.4	51	45.5	53	35.3	38	23.0	76	20.0	43	9.3	63	15.6	21	7.6
	550-599	31	2.3	3	5.3	7	6.3	5	3.3	5	3.0	9	2.4	2	0.4	7	1.7	0	0.0
	600-649	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm <sup>3</sup> 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	1,976	100.0	84	100.0	208	100.0	328	100.0	308	100.0	510	100.0	538	100.0	475	100.0	342	100.0
	400万個/mm <sup>3</sup> 未満	339	17.2	8	9.5	21	10.1	36	11.0	25	8.1	77	15.1	172	32.0	96	20.2	125	36.5
	400-449	992	50.2	45	53.6	115	55.3	169	51.5	161	52.3	253	49.6	249	46.3	231	48.6	152	44.4
	450-499	576	29.1	27	32.1	62	29.8	115	35.1	105	34.1	162	31.8	105	19.5	135	28.4	57	16.7
	500-549	67	3.4	4	4.8	9	4.3	8	2.4	16	5.2	18	3.5	12	2.2	13	2.7	8	2.3
	550-599	2	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm <sup>3</sup> 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 赤血球数の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第24表の2 赤血球数の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,326	465.3	46.4	57	501.2	29.7	112	500.3	30.5	150	490.5	32.4	165	476.2	39.5	380	464.7	43.0	462	440.7	46.3	405	459.0	41.2	275	433.1	48.3
女性	1,976	433.2	36.7	84	441.4	32.6	208	439.6	36.8	328	439.0	33.6	308	441.4	34.3	510	435.9	33.7	538	418.7	39.2	475	430.8	35.3	342	415.0	40.3

注) 赤血球数の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第25表の1 ヘマトクリット値の分布—ヘマトクリット値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,326	100.0	57	100.0	112	100.0	150	100.0	165	100.0	380	100.0	462	100.0	405	100.0	275	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	3	1.1
	30.0-34.9	25	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	21	4.5	5	1.2	17	6.2
	35.0-39.9	174	13.1	1	1.8	4	3.6	5	3.3	10	6.1	45	11.8	109	23.6	57	14.1	77	28.0
	40.0-44.9	645	48.6	28	49.1	44	39.3	68	45.3	83	50.3	198	52.1	224	48.5	210	51.9	129	46.9
	45.0-49.9	436	32.9	25	43.9	58	51.8	71	47.3	63	38.2	123	32.4	96	20.8	120	29.6	48	17.5
	50.0-54.9	43	3.2	3	5.3	6	5.4	6	4.0	9	5.5	10	2.6	9	1.9	13	3.2	1	0.4
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)39.8未満	182	13.7	0	0.0	3	2.7	4	2.7	8	4.8	42	11.1	125	27.1	51	12.6	94	34.2
(再掲)51.9以上	8	0.6	0	0.0	2	1.8	1	0.7	0	0.0	1	0.3	4	0.9	4	1.0	0	0.0	
女性	総数	1,976	100.0	84	100.0	208	100.0	328	100.0	308	100.0	510	100.0	538	100.0	475	100.0	342	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	20	1.0	0	0.0	5	2.4	7	2.1	2	0.6	1	0.2	5	0.9	2	0.4	4	1.2
	30.0-34.9	132	6.7	5	6.0	20	9.6	34	10.4	13	4.2	9	1.8	51	9.5	19	4.0	36	10.5
	35.0-39.9	914	46.3	48	57.1	104	50.0	146	44.5	120	39.0	228	44.7	268	49.8	221	46.5	170	49.7
	40.0-44.9	829	42.0	29	34.5	75	36.1	129	39.3	156	50.6	244	47.8	196	36.4	211	44.4	120	35.1
	45.0-49.9	81	4.1	2	2.4	4	1.9	12	3.7	17	5.5	28	5.5	18	3.3	22	4.6	12	3.5
	50.0-54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	80	4.0	2	2.4	18	8.7	22	6.7	9	2.9	2	0.4	27	5.0	9	1.9	20	5.8
(再掲)45.0以上	81	4.1	2	2.4	4	1.9	12	3.7	17	5.5	28	5.5	18	3.3	22	4.6	12	3.5	

注)ヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第25表の2 ヘマトクリット値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—  
男性・女性, 20歳以上

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,326	43.5	3.7	57	45.1	2.5	112	45.4	2.7	150	45.0	2.9	165	44.4	3.1	380	43.7	3.3	462	41.8	4.1	405	43.3	3.4	275	41.1	4.2
女性	1,976	39.5	3.3	84	39.1	2.6	208	38.6	3.5	328	39.1	3.6	308	40.2	3.2	510	40.3	2.8	538	39.0	3.4	475	39.9	3.0	342	38.8	3.5

注)ヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第26表の1 平均赤血球容積（MCV）の分布—平均赤血球容積の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,326	100.0	57	100.0	112	100.0	150	100.0	165	100.0	380	100.0	462	100.0	405	100.0	275	100.0
	70fl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	75-80未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	3	0.7	0	0.0
	80-85未満	31	2.3	6	10.5	4	3.6	3	2.0	6	3.6	5	1.3	7	1.5	5	1.2	5	1.8
	85-90未満	246	18.6	21	36.8	44	39.3	50	33.3	32	19.4	59	15.5	40	8.7	49	12.1	24	8.7
	90-95未満	550	41.5	25	43.9	48	42.9	61	40.7	74	44.8	160	42.1	182	39.4	164	40.5	105	38.2
	95-100未満	373	28.1	4	7.0	14	12.5	27	18.0	37	22.4	112	29.5	179	38.7	138	34.1	109	39.6
	100-105未満	105	7.9	1	1.8	2	1.8	7	4.7	13	7.9	36	9.5	46	10.0	41	10.1	27	9.8
	105-110未満	12	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.8	4	1.1	4	0.9	4	1.0	3	1.1
	110-115未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	115-120未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	120fl以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	1,976	100.0	84	100.0	208	100.0	328	100.0	308	100.0	510	100.0	538	100.0	475	100.0	342	100.0
	70fl未満	15	0.8	0	0.0	4	1.9	6	1.8	5	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	12	0.6	2	2.4	2	1.0	7	2.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	45	2.3	2	2.4	12	5.8	22	6.7	3	1.0	5	1.0	1	0.2	2	0.4	1	0.3
	80-85未満	108	5.5	10	11.9	29	13.9	30	9.1	12	3.9	13	2.5	14	2.6	14	2.9	8	2.3
	85-90未満	519	26.3	35	41.7	82	39.4	102	31.1	85	27.6	121	23.7	94	17.5	104	21.9	52	15.2
	90-95未満	830	42.0	30	35.7	62	29.8	108	32.9	144	46.8	239	46.9	247	45.9	219	46.1	154	45.0
	95-100未満	365	18.5	4	4.8	15	7.2	41	12.5	49	15.9	107	21.0	149	27.7	113	23.8	101	29.5
	100-105未満	69	3.5	1	1.2	1	0.5	11	3.4	7	2.3	22	4.3	27	5.0	21	4.4	21	6.1
	105-110未満	12	0.6	0	0.0	1	0.5	1	0.3	2	0.6	3	0.6	5	0.9	2	0.4	4	1.2
	110-115未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120fl以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 赤血球数およびヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第26表の2 平均赤血球容積（MCV）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上

(fl)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,326	93.7	4.8	57	90.1	3.7	112	90.8	3.9	150	91.9	4.5	165	93.4	4.7	380	94.3	4.8	462	95.0	4.5	405	94.6	4.5	275	95.1	4.5
女性	1,976	91.3	5.6	84	88.8	5.1	208	88.0	6.1	328	89.2	6.8	308	91.2	5.3	510	92.5	4.4	538	93.3	4.4	475	92.7	4.3	342	93.7	4.6

注) 赤血球数およびヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第 27 表の 1 平均赤血球血色素量 (MCH) の分布—平均赤血球血色素量の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	1,326	100.0	57	100.0	112	100.0	150	100.0	165	100.0	380	100.0	462	100.0	405	100.0	275	100.0
	20pg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	3	0.6	3	0.7	1	0.4
	25-27未満	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	3	0.6	3	0.7	2	0.7
	27-29未満	83	6.3	9	15.8	10	8.9	16	10.7	14	8.5	15	3.9	19	4.1	14	3.5	14	5.1
	29-31未満	498	37.6	30	52.6	64	57.1	69	46.0	57	34.5	139	36.6	139	30.1	140	34.6	79	28.7
	31-33未満	574	43.3	16	28.1	37	33.0	53	35.3	73	44.2	155	40.8	240	51.9	180	44.4	145	52.7
	33-35未満	145	10.9	2	3.5	1	0.9	10	6.7	19	11.5	60	15.8	53	11.5	59	14.6	31	11.3
	35-40未満	14	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.2	6	1.6	5	1.1	6	1.5	3	1.1
	40pg以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	1,976	100.0	84	100.0	208	100.0	328	100.0	308	100.0	510	100.0	538	100.0	475	100.0	342	100.0
	20pg未満	11	0.6	0	0.0	3	1.4	5	1.5	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	61	3.1	4	4.8	14	6.7	28	8.5	5	1.6	4	0.8	6	1.1	5	1.1	3	0.9
	25-27未満	73	3.7	3	3.6	20	9.6	29	8.8	6	1.9	7	1.4	8	1.5	7	1.5	6	1.8
	27-29未満	328	16.6	22	26.2	62	29.8	54	16.5	48	15.6	79	15.5	63	11.7	69	14.5	37	10.8
	29-31未満	1,014	51.3	47	56.0	82	39.4	155	47.3	172	55.8	267	52.4	291	54.1	253	53.3	181	52.9
	31-33未満	431	21.8	7	8.3	24	11.5	49	14.9	65	21.1	136	26.7	150	27.9	125	26.3	100	29.2
	33-35未満	55	2.8	1	1.2	3	1.4	7	2.1	9	2.9	17	3.3	18	3.3	16	3.4	13	3.8
	35-40未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	2	0.6
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 血色素量および赤血球数の測定を行った 20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第 27 表の 2 平均赤血球血色素量 (MCH) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,326	31.2	1.6	57	30.4	1.2	112	30.5	1.1	150	30.7	1.5	165	31.2	1.7	380	31.5	1.7	462	31.4	1.6	405	31.5	1.7	275	31.4	1.7
女性	1,976	29.8	2.1	84	29.2	2.1	208	28.7	2.5	328	28.9	2.8	308	29.9	2.1	510	30.2	1.5	538	30.4	1.6	475	30.3	1.5	342	30.4	1.6

注) 血色素量および赤血球数の測定を行った 20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第28表の1 平均赤血球血色素濃度（MCHC）の分布—平均赤血球血色素濃度の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,326	100.0	57	100.0	112	100.0	150	100.0	165	100.0	380	100.0	462	100.0	405	100.0	275	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	2	0.5	1	0.4
	30-32未満	113	8.5	2	3.5	4	3.6	10	6.7	16	9.7	28	7.4	53	11.5	37	9.1	32	11.6
	32-34未満	888	67.0	33	57.9	65	58.0	101	67.3	112	67.9	251	66.1	326	70.6	273	67.4	196	71.3
	34%以上	322	24.3	22	38.6	43	38.4	39	26.0	37	22.4	100	26.3	81	17.5	93	23.0	46	16.7
女性	総数	1,976	100.0	84	100.0	208	100.0	328	100.0	308	100.0	510	100.0	538	100.0	475	100.0	342	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	6	0.3	0	0.0	1	0.5	3	0.9	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	28-30未満	38	1.9	2	2.4	3	1.4	23	7.0	5	1.6	3	0.6	2	0.4	4	0.8	1	0.3
	30-32未満	401	20.3	11	13.1	47	22.6	66	20.1	52	16.9	98	19.2	127	23.6	90	18.9	92	26.9
	32-34未満	1,412	71.5	65	77.4	142	68.3	214	65.2	224	72.7	381	74.7	386	71.7	349	73.5	237	69.3
	34%以上	119	6.0	6	7.1	15	7.2	22	6.7	26	8.4	28	5.5	22	4.1	32	6.7	11	3.2

注) 血色素量およびヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第28表の2 平均赤血球血色素濃度（MCHC）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,326	33.3	1.0	57	33.7	1.0	112	33.7	0.9	150	33.4	0.9	165	33.4	1.0	380	33.4	1.0	462	33.1	1.0	405	33.3	1.0	275	33.0	1.0
女性	1,976	32.6	1.1	84	32.8	1.0	208	32.6	1.2	328	32.4	1.4	308	32.7	1.1	510	32.7	0.9	538	32.5	0.9	475	32.7	0.9	342	32.5	0.9

注) 血色素量およびヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第29表の1 血清総たんぱく質値の分布—血清総たんぱく質値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	143	100.0	135	100.0
	6.0g/dL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.7	0	0.0
	6.0-6.4	18	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	6	1.6	10	2.2	6	1.5	3	2.1	4	3.0
	6.5-6.9	186	13.9	6	10.5	4	3.5	20	13.1	23	13.9	65	17.0	68	14.6	60	14.8	17	11.9	24	17.8
	7.0-7.4	610	45.7	18	31.6	46	40.4	73	47.7	87	52.7	171	44.8	215	46.2	193	47.5	68	47.6	53	39.3
	7.5-7.9	436	32.6	29	50.9	50	43.9	55	35.9	46	27.9	117	30.6	139	29.9	127	31.3	43	30.1	42	31.1
	8.0-8.4	83	6.2	4	7.0	14	12.3	5	3.3	7	4.2	22	5.8	31	6.7	18	4.4	11	7.7	12	8.9
	8.5g/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5未満	20	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	6	1.6	12	2.6	7	1.7	4	2.8	4	3.0
女性	総数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	477	100.0	180	100.0	164	100.0
	6.0g/dL未満	3	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	6.0-6.4	18	0.9	0	0.0	3	1.4	2	0.6	3	1.0	3	0.6	7	1.3	4	0.8	4	2.2	1	0.6
	6.5-6.9	280	14.1	6	7.1	23	11.1	46	14.0	42	13.7	72	14.1	91	16.8	79	16.6	24	13.3	31	18.9
	7.0-7.4	911	46.0	39	45.9	95	45.7	142	43.2	144	46.9	239	46.9	252	46.5	225	47.2	82	45.6	75	45.7
	7.5-7.9	623	31.4	31	36.5	79	38.0	115	35.0	97	31.6	156	30.6	145	26.8	134	28.1	55	30.6	40	24.4
	8.0-8.4	127	6.4	9	10.6	6	2.9	20	6.1	18	5.9	33	6.5	41	7.6	30	6.3	12	6.7	15	9.1
	8.5g/dL以上	19	1.0	0	0.0	1	0.5	3	0.9	3	1.0	7	1.4	5	0.9	5	1.0	3	1.7	1	0.6
	(再掲)6.5未満	21	1.1	0	0.0	4	1.9	3	0.9	3	1.0	3	0.6	8	1.5	4	0.8	4	2.2	2	1.2

注)血清総たんぱく質値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第29表の2 血清総たんぱく質値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—  
男性・女性, 20歳以上

(g/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75-79歳			(再掲)80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	7.3	0.4	57	7.5	0.4	114	7.5	0.3	153	7.4	0.4	165	7.3	0.4	382	7.3	0.4	465	7.3	0.4	406	7.3	0.4	143	7.3	0.4	135	7.3	0.5
女性	1,981	7.4	0.4	85	7.5	0.4	208	7.4	0.4	329	7.4	0.4	307	7.4	0.4	510	7.4	0.4	542	7.3	0.4	477	7.3	0.4	180	7.4	0.4	164	7.3	0.5

注)血清総たんぱく質値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第30表の1 血清アルブミン値の分布—血清アルブミン値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	143	100.0	135	100.0
	3.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.7
	3.2-3.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.1	1	0.2	1	0.7	3	2.2
	3.6-3.7	19	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	15	3.2	6	1.5	1	0.7	11	8.1
	3.8-3.9	64	4.8	0	0.0	0	0.0	2	1.3	3	1.8	16	4.2	43	9.2	25	6.2	11	7.7	20	14.8
	4.0-4.1	140	10.5	0	0.0	1	0.9	7	4.6	7	4.2	39	10.2	86	18.5	59	14.5	24	16.8	24	17.8
	4.2-4.3	279	20.9	2	3.5	6	5.3	15	9.8	36	21.8	86	22.5	134	28.8	96	23.6	50	35.0	34	25.2
	4.4-4.5	331	24.8	7	12.3	23	20.2	30	19.6	44	26.7	131	34.3	96	20.6	116	28.6	29	20.3	28	20.7
	4.6-4.7	265	19.8	15	26.3	27	23.7	42	27.5	47	28.5	70	18.3	64	13.8	73	18.0	23	16.1	9	6.7
	4.8-4.9	151	11.3	13	22.8	38	33.3	39	25.5	22	13.3	23	6.0	16	3.4	22	5.4	2	1.4	5	3.7
	5.0-5.1	54	4.0	14	24.6	12	10.5	10	6.5	5	3.0	10	2.6	3	0.6	6	1.5	2	1.4	0	0.0
	5.2g/dL以上	23	1.7	6	10.5	7	6.1	8	5.2	1	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	10	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	8	1.7	3	0.7	1	0.7	4	3.0
女性	総数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	477	100.0	180	100.0	164	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	7	0.4	0	0.0	5	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.6
	3.4-3.5	5	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.3	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.6
	3.6-3.7	27	1.4	1	1.2	1	0.5	1	0.3	3	1.0	5	1.0	16	3.0	10	2.1	4	2.2	7	4.3
	3.8-3.9	70	3.5	1	1.2	1	0.5	8	2.4	8	2.6	17	3.3	35	6.5	21	4.4	7	3.9	16	9.8
	4.0-4.1	259	13.1	5	5.9	14	6.7	40	12.2	34	11.1	46	9.0	120	22.1	61	12.8	41	22.8	50	30.5
	4.2-4.3	428	21.6	6	7.1	39	18.8	84	25.5	59	19.2	109	21.4	131	24.2	112	23.5	47	26.1	33	20.1
	4.4-4.5	566	28.6	20	23.5	45	21.6	93	28.3	84	27.4	175	34.3	149	27.5	152	31.9	56	31.1	35	21.3
	4.6-4.7	412	20.8	24	28.2	55	26.4	66	20.1	80	26.1	119	23.3	68	12.5	94	19.7	22	12.2	15	9.1
	4.8-4.9	163	8.2	22	25.9	36	17.3	29	8.8	30	9.8	30	5.9	16	3.0	21	4.4	2	1.1	5	3.0
	5.0-5.1	38	1.9	3	3.5	11	5.3	7	2.1	8	2.6	5	1.0	4	0.7	4	0.8	0	0.0	1	0.6
	5.2g/dL以上	6	0.3	3	3.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	(再掲)3.5以下	12	0.6	0	0.0	6	2.9	1	0.3	0	0.0	3	0.6	2	0.4	2	0.4	0	0.0	2	1.2

注)血清アルブミン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第30表の2 血清アルブミン値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—  
男性・女性, 20歳以上

(g/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75-79歳			(再掲) 80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	4.4	0.3	57	4.8	0.3	114	4.7	0.3	153	4.6	0.3	165	4.5	0.2	382	4.4	0.3	465	4.3	0.3	406	4.4	0.3	143	4.3	0.3	135	4.2	0.3
女性	1,981	4.4	0.3	85	4.6	0.3	208	4.5	0.3	329	4.4	0.3	307	4.5	0.3	510	4.4	0.3	542	4.3	0.3	477	4.4	0.3	180	4.3	0.3	164	4.2	0.3

注)血清アルブミン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)



第31表の1 ヘモグロビンA1c (NGSP) の分布—ヘモグロビンA1c (NGSP) の区分, 年齢階級別,

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	3,300	100.0	140	100.0	320	100.0	477	100.0	473	100.0	890	100.0	1,000	100.0	880	100.0	617	100.0
4.2%以下	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	5	0.2	0	0.0	3	0.9	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.7-4.8	23	0.7	3	2.1	5	1.6	10	2.1	0	0.0	2	0.2	3	0.3	2	0.2	2	0.3
4.9-5.0	86	2.6	23	16.4	21	6.6	18	3.8	6	1.3	12	1.3	6	0.6	13	1.5	2	0.3
5.1-5.2	256	7.8	29	20.7	58	18.1	61	12.8	29	6.1	44	4.9	35	3.5	34	3.9	21	3.4
5.3	223	6.8	21	15.0	46	14.4	50	10.5	41	8.7	24	2.7	41	4.1	25	2.8	30	4.9
5.4	301	9.1	25	17.9	36	11.3	53	11.1	46	9.7	73	8.2	68	6.8	64	7.3	45	7.3
5.5	335	10.2	17	12.1	45	14.1	64	13.4	59	12.5	79	8.9	71	7.1	73	8.3	39	6.3
5.6	340	10.3	7	5.0	28	8.8	64	13.4	54	11.4	89	10.0	98	9.8	88	10.0	50	8.1
5.7	330	10.0	7	5.0	41	12.8	48	10.1	48	10.1	100	11.2	86	8.6	72	8.2	58	9.4
5.8	278	8.4	4	2.9	16	5.0	38	8.0	46	9.7	90	10.1	84	8.4	82	9.3	54	8.8
5.9	223	6.8	2	1.4	9	2.8	18	3.8	34	7.2	70	7.9	90	9.0	66	7.5	58	9.4
6.0	200	6.1	1	0.7	2	0.6	19	4.0	27	5.7	70	7.9	81	8.1	73	8.3	50	8.1
6.1	125	3.8	0	0.0	3	0.9	10	2.1	18	3.8	41	4.6	53	5.3	37	4.2	40	6.5
6.2	102	3.1	0	0.0	1	0.3	5	1.0	13	2.7	34	3.8	49	4.9	49	5.6	25	4.1
6.3	74	2.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	28	3.1	43	4.3	38	4.3	22	3.6
6.4	60	1.8	0	0.0	2	0.6	2	0.4	5	1.1	24	2.7	27	2.7	31	3.5	11	1.8
6.5	45	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	1.1	18	2.0	21	2.1	14	1.6	18	2.9
6.6-6.7	80	2.4	0	0.0	1	0.3	3	0.6	11	2.3	25	2.8	40	4.0	35	4.0	24	3.9
6.8-6.9	47	1.4	0	0.0	1	0.3	4	0.8	6	1.3	10	1.1	26	2.6	20	2.3	16	2.6
7.0-7.1	35	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	13	1.5	18	1.8	13	1.5	14	2.3
7.2-7.3	37	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8	10	1.1	23	2.3	14	1.6	16	2.6
7.4-7.5	29	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.8	13	1.5	11	1.1	12	1.4	7	1.1
7.6-7.7	14	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	4	0.4	9	0.9	6	0.7	6	1.0
7.8-7.9	10	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8	3	0.3	3	0.3	3	0.3	2	0.3
8.0-8.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.2	3	0.3	0	0.0
8.2-8.3	5	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.2	3	0.3	1	0.2
8.4-8.5	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	2	0.2	1	0.1	2	0.3
8.6-8.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2
8.8-8.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2
9.0-9.1	5	0.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0
9.2-9.3	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.2
9.4%以上	12	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.1	4	0.4	3	0.3	5	0.6	1	0.2
総 数	1,325	100.0	56	100.0	112	100.0	150	100.0	165	100.0	380	100.0	462	100.0	405	100.0	275	100.0
4.2%以下	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	1	0.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.7-4.8	14	1.1	2	3.6	3	2.7	6	4.0	0	0.0	2	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.4
4.9-5.0	34	2.6	8	14.3	8	7.1	4	2.7	3	1.8	6	1.6	5	1.1	8	2.0	2	0.7
5.1-5.2	111	8.4	12	21.4	22	19.6	18	12.0	12	7.3	27	7.1	20	4.3	19	4.7	12	4.4
5.3	94	7.1	11	19.6	19	17.0	20	13.3	14	8.5	13	3.4	17	3.7	10	2.5	12	4.4
5.4	115	8.7	9	16.1	13	11.6	21	14.0	15	9.1	30	7.9	27	5.8	27	6.7	18	6.5
5.5	116	8.8	7	12.5	17	15.2	16	10.7	20	12.1	26	6.8	30	6.5	32	7.9	11	4.0
5.6	125	9.4	2	3.6	5	4.5	21	14.0	17	10.3	31	8.2	49	10.6	41	10.1	22	8.0
5.7	111	8.4	2	3.6	12	10.7	13	8.7	12	7.3	35	9.2	37	8.0	31	7.7	26	9.5
5.8	93	7.0	1	1.8	7	6.3	8	5.3	17	10.3	30	7.9	30	6.5	31	7.7	17	6.2
5.9	75	5.7	0	0.0	2	1.8	7	4.7	6	3.6	28	7.4	32	6.9	26	6.4	22	8.0
6.0	71	5.4	1	1.8	0	0.0	2	1.3	7	4.2	27	7.1	34	7.4	25	6.2	23	8.4
6.1	49	3.7	0	0.0	1	0.9	5	3.3	8	4.8	15	3.9	20	4.3	11	2.7	16	5.8
6.2	55	4.2	0	0.0	0	0.0	2	1.3	5	3.0	18	4.7	30	6.5	29	7.2	14	5.1
6.3	38	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	12	3.2	25	5.4	22	5.4	11	4.0
6.4	24	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	12	3.2	10	2.2	14	3.5	4	1.5
6.5	25	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	10	2.6	12	2.6	9	2.2	9	3.3
6.6-6.7	49	3.7	0	0.0	0	0.0	2	1.3	6	3.6	15	3.9	26	5.6	22	5.4	15	5.5
6.8-6.9	33	2.5	0	0.0	1	0.9	4	2.7	5	3.0	8	2.1	15	3.2	13	3.2	10	3.6
7.0-7.1	18	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	7	1.8	9	1.9	6	1.5	7	2.5
7.2-7.3	23	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	7	1.8	15	3.2	8	2.0	11	4.0
7.4-7.5	15	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	9	2.4	4	0.9	6	1.5	3	1.1
7.6-7.7	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	6	1.3	4	1.0	3	1.1
7.8-7.9	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	3	0.8	0	0.0	2	0.5	0	0.0
8.0-8.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
8.2-8.3	4	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	2	0.5	1	0.4
8.4-8.5	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	0	0.0	2	0.7
8.6-8.7	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.4
8.8-8.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.4
9.0-9.1	3	0.2	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
9.2-9.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
9.4%以上	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	2	0.5	1	0.2	2	0.5	1	0.4



人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,975	100.0	84	100.0	208	100.0	327	100.0	308	100.0	510	100.0	538	100.0	475	100.0	342	100.0	
女性	4.2%以下	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	4	0.2	0	0.0	2	1.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.7-4.8	9	0.5	1	1.2	2	1.0	4	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.3
	4.9-5.0	52	2.6	15	17.9	13	6.3	14	4.3	3	1.0	6	1.2	1	0.2	5	1.1	0	0.0
	5.1-5.2	145	7.3	17	20.2	36	17.3	43	13.1	17	5.5	17	3.3	15	2.8	15	3.2	9	2.6
	5.3	129	6.5	10	11.9	27	13.0	30	9.2	27	8.8	11	2.2	24	4.5	15	3.2	18	5.3
	5.4	186	9.4	16	19.0	23	11.1	32	9.8	31	10.1	43	8.4	41	7.6	37	7.8	27	7.9
	5.5	219	11.1	10	11.9	28	13.5	48	14.7	39	12.7	53	10.4	41	7.6	41	8.6	28	8.2
	5.6	215	10.9	5	6.0	23	11.1	43	13.1	37	12.0	58	11.4	49	9.1	47	9.9	28	8.2
	5.7	219	11.1	5	6.0	29	13.9	35	10.7	36	11.7	65	12.7	49	9.1	41	8.6	32	9.4
	5.8	185	9.4	3	3.6	9	4.3	30	9.2	29	9.4	60	11.8	54	10.0	51	10.7	37	10.8
	5.9	148	7.5	2	2.4	7	3.4	11	3.4	28	9.1	42	8.2	58	10.8	40	8.4	36	10.5
	6.0	129	6.5	0	0.0	2	1.0	17	5.2	20	6.5	43	8.4	47	8.7	48	10.1	27	7.9
	6.1	76	3.8	0	0.0	2	1.0	5	1.5	10	3.2	26	5.1	33	6.1	26	5.5	24	7.0
	6.2	47	2.4	0	0.0	1	0.5	3	0.9	8	2.6	16	3.1	19	3.5	20	4.2	11	3.2
	6.3	36	1.8	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	16	3.1	18	3.3	16	3.4	11	3.2
	6.4	36	1.8	0	0.0	2	1.0	1	0.3	4	1.3	12	2.4	17	3.2	17	3.6	7	2.0
	6.5	20	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	8	1.6	9	1.7	5	1.1	9	2.6
	6.6-6.7	31	1.6	0	0.0	1	0.5	1	0.3	5	1.6	10	2.0	14	2.6	13	2.7	9	2.6
	6.8-6.9	14	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	11	2.0	7	1.5	6	1.8
	7.0-7.1	17	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	6	1.2	9	1.7	7	1.5	7	2.0
	7.2-7.3	14	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	3	0.6	8	1.5	6	1.3	5	1.5
	7.4-7.5	14	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	4	0.8	7	1.3	6	1.3	4	1.2
	7.6-7.7	7	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	0.6	3	0.6	2	0.4	3	0.9
	7.8-7.9	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	3	0.6	1	0.2	2	0.6
	8.0-8.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.4	0	0.0
	8.2-8.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	8.4-8.5	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	8.6-8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.8-8.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	9.2-9.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	9.4%以上	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.4	2	0.4	3	0.6	0	0.0

注)ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第31表の2 ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—総数・男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	3,300	5.8	0.7	140	5.3	0.4	320	5.4	0.4	477	5.5	0.4	473	5.8	0.8	890	5.9	0.7	1,000	6.0	0.7	880	6.0	0.7	617	6.0	0.7
男性	1,325	5.9	0.8	56	5.4	0.6	112	5.4	0.4	150	5.5	0.4	165	5.9	1.0	380	6.0	0.8	462	6.0	0.7	405	6.0	0.7	275	6.1	0.8
女性	1,975	5.8	0.6	84	5.3	0.3	208	5.4	0.3	327	5.6	0.4	308	5.8	0.7	510	5.9	0.6	538	6.0	0.7	475	5.9	0.7	342	5.9	0.5

注)ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第31表の3 ヘモグロビンA1c (NGSP) の分布—ヘモグロビンA1c (NGSP) の区分, 年齢階級別,

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	3,058	100.0	139	100.0	320	100.0	469	100.0	454	100.0	813	100.0	863	100.0	770	100.0	534	100.0
4.2%以下	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	5	0.2	0	0.0	3	0.9	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.7-4.8	23	0.8	3	2.2	5	1.6	10	2.1	0	0.0	2	0.2	3	0.3	2	0.3	2	0.4
4.9-5.0	86	2.8	23	16.5	21	6.6	18	3.8	6	1.3	12	1.5	6	0.7	13	1.7	2	0.4
5.1-5.2	256	8.4	29	20.9	58	18.1	61	13.0	29	6.4	44	5.4	35	4.1	34	4.4	21	3.9
5.3	223	7.3	21	15.1	46	14.4	50	10.7	41	9.0	24	3.0	41	4.8	25	3.2	30	5.6
5.4	300	9.8	25	18.0	36	11.3	53	11.3	46	10.1	73	9.0	67	7.8	64	8.3	44	8.2
5.5	334	10.9	17	12.2	45	14.1	64	13.6	59	13.0	79	9.7	70	8.1	72	9.4	39	7.3
5.6	338	11.1	7	5.0	28	8.8	63	13.4	54	11.9	89	10.9	97	11.2	87	11.3	50	9.4
5.7	328	10.7	7	5.0	41	12.8	48	10.2	48	10.6	100	12.3	84	9.7	71	9.2	57	10.7
5.8	272	8.9	4	2.9	16	5.0	38	8.1	46	10.1	88	10.8	80	9.3	78	10.1	52	9.7
5.9	220	7.2	2	1.4	9	2.8	18	3.8	34	7.5	68	8.4	89	10.3	64	8.3	57	10.7
6.0	194	6.3	1	0.7	2	0.6	18	3.8	27	5.9	70	8.6	76	8.8	70	9.1	48	9.0
6.1	118	3.9	0	0.0	3	0.9	10	2.1	17	3.7	39	4.8	49	5.7	35	4.5	36	6.7
6.2	94	3.1	0	0.0	1	0.3	5	1.1	13	2.9	30	3.7	45	5.2	43	5.6	24	4.5
6.3	65	2.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	27	3.3	35	4.1	33	4.3	18	3.4
6.4	49	1.6	0	0.0	2	0.6	2	0.4	4	0.9	19	2.3	22	2.5	25	3.2	9	1.7
6.5	35	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	1.1	13	1.6	16	1.9	12	1.6	13	2.4
6.6-6.7	48	1.6	0	0.0	1	0.3	3	0.6	8	1.8	14	1.7	22	2.5	19	2.5	14	2.6
6.8-6.9	17	0.6	0	0.0	1	0.3	1	0.2	4	0.9	4	0.5	7	0.8	5	0.6	6	1.1
7.0-7.1	12	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	4	0.5	5	0.6	1	0.1	5	0.9
7.2-7.3	12	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.5	7	0.8	6	0.8	5	0.9
7.4-7.5	7	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	3	0.4	2	0.2	1	0.1	2	0.4
7.6-7.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	3	0.4	0	0.0
7.8-7.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
8.0-8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.2-8.3	1	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.4-8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.6-8.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-8.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4%以上	10	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	4	0.5	2	0.2	5	0.6	0	0.0
総 数	1,179	100.0	55	100.0	112	100.0	146	100.0	152	100.0	331	100.0	383	100.0	340	100.0	225	100.0
4.2%以下	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	1	0.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.7-4.8	14	1.2	2	3.6	3	2.7	6	4.1	0	0.0	2	0.6	1	0.3	1	0.3	1	0.4
4.9-5.0	34	2.9	8	14.5	8	7.1	4	2.7	3	2.0	6	1.8	5	1.3	8	2.4	2	0.9
5.1-5.2	111	9.4	12	21.8	22	19.6	18	12.3	12	7.9	27	8.2	20	5.2	19	5.6	12	5.3
5.3	94	8.0	11	20.0	19	17.0	20	13.7	14	9.2	13	3.9	17	4.4	10	2.9	12	5.3
5.4	114	9.7	9	16.4	13	11.6	21	14.4	15	9.9	30	9.1	26	6.8	27	7.9	17	7.6
5.5	115	9.8	7	12.7	17	15.2	16	11.0	20	13.2	26	7.9	29	7.6	31	9.1	11	4.9
5.6	123	10.4	2	3.6	5	4.5	20	13.7	17	11.2	31	9.4	48	12.5	40	11.8	22	9.8
5.7	110	9.3	2	3.6	12	10.7	13	8.9	12	7.9	35	10.6	36	9.4	30	8.8	26	11.6
5.8	89	7.5	1	1.8	7	6.3	8	5.5	17	11.2	28	8.5	28	7.3	27	7.9	17	7.6
5.9	74	6.3	0	0.0	2	1.8	7	4.8	6	3.9	27	8.2	32	8.4	25	7.4	22	9.8
6.0	68	5.8	1	1.8	0	0.0	2	1.4	7	4.6	27	8.2	31	8.1	24	7.1	21	9.3
6.1	44	3.7	0	0.0	1	0.9	5	3.4	7	4.6	14	4.2	17	4.4	10	2.9	13	5.8
6.2	50	4.2	0	0.0	0	0.0	2	1.4	5	3.3	16	4.8	27	7.0	25	7.4	13	5.8
6.3	32	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	12	3.6	19	5.0	19	5.6	8	3.6
6.4	17	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	8	2.4	8	2.1	11	3.2	2	0.9
6.5	19	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0	7	2.1	9	2.3	8	2.4	6	2.7
6.6-6.7	28	2.4	0	0.0	0	0.0	2	1.4	4	2.6	7	2.1	15	3.9	11	3.2	10	4.4
6.8-6.9	13	1.1	0	0.0	1	0.9	1	0.7	4	2.6	3	0.9	4	1.0	4	1.2	3	1.3
7.0-7.1	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	3	0.9	2	0.5	0	0.0	2	0.9
7.2-7.3	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	5	1.3	3	0.9	4	1.8
7.4-7.5	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.3	0	0.0	1	0.4
7.6-7.7	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	3	0.9	0	0.0
7.8-7.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
8.0-8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.2-8.3	1	0.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.4-8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.6-8.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4%以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	0.6	0	0.0	2	0.6	0	0.0

人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,879	100.0	84	100.0	208	100.0	323	100.0	302	100.0	482	100.0	480	100.0	430	100.0	309	100.0
女性	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	4	0.2	0	0.0	2	1.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	9	0.5	1	1.2	2	1.0	4	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.3
4.7-4.8	52	2.8	15	17.9	13	6.3	14	4.3	3	1.0	6	1.2	1	0.2	5	1.2	0	0.0
4.9-5.0	145	7.7	17	20.2	36	17.3	43	13.3	17	5.6	17	3.5	15	3.1	15	3.5	9	2.9
5.1-5.2	129	6.9	10	11.9	27	13.0	30	9.3	27	8.9	11	2.3	24	5.0	15	3.5	18	5.8
5.3	186	9.9	16	19.0	23	11.1	32	9.9	31	10.3	43	8.9	41	8.5	37	8.6	27	8.7
5.4	219	11.7	10	11.9	28	13.5	48	14.9	39	12.9	53	11.0	41	8.5	41	9.5	28	9.1
5.5	215	11.4	5	6.0	23	11.1	43	13.3	37	12.3	58	12.0	49	10.2	47	10.9	28	9.1
5.6	218	11.6	5	6.0	29	13.9	35	10.8	36	11.9	65	13.5	48	10.0	41	9.5	31	10.0
5.7	183	9.7	3	3.6	9	4.3	30	9.3	29	9.6	60	12.4	52	10.8	51	11.9	35	11.3
5.8	146	7.8	2	2.4	7	3.4	11	3.4	28	9.3	41	8.5	57	11.9	39	9.1	35	11.3
5.9	126	6.7	0	0.0	2	1.0	16	5.0	20	6.6	43	8.9	45	9.4	46	10.7	27	8.7
6.0	74	3.9	0	0.0	2	1.0	5	1.5	10	3.3	25	5.2	32	6.7	25	5.8	23	7.4
6.1	44	2.3	0	0.0	1	0.5	3	0.9	8	2.6	14	2.9	18	3.8	18	4.2	11	3.6
6.2	33	1.8	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	15	3.1	16	3.3	14	3.3	10	3.2
6.3	32	1.7	0	0.0	2	1.0	1	0.3	4	1.3	11	2.3	14	2.9	14	3.3	7	2.3
6.4	16	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	6	1.2	7	1.5	4	0.9	7	2.3
6.5	20	1.1	0	0.0	1	0.5	1	0.3	4	1.3	7	1.5	7	1.5	8	1.9	4	1.3
6.6-6.7	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	1	0.2	3	1.0
6.8-6.9	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	3	0.6	1	0.2	3	1.0
7.0-7.1	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	2	0.4	3	0.7	1	0.3
7.2-7.3	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.3
7.4-7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7.6-7.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7.8-7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.0-8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.2-8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.4-8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.6-8.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-8.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4%以上	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.4	2	0.4	3	0.7	0	0.0

注)ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行い，身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第31表の4 ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—総数・男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	3,058	5.7	0.6	139	5.3	0.3	320	5.4	0.4	469	5.5	0.4	454	5.7	0.7	813	5.8	0.6	863	5.8	0.5	770	5.9	0.6	534	5.8	0.4
男性	1,179	5.7	0.6	55	5.3	0.2	112	5.4	0.4	146	5.5	0.4	152	5.8	0.8	331	5.8	0.7	383	5.9	0.5	340	5.9	0.6	225	5.9	0.5
女性	1,879	5.7	0.5	84	5.3	0.3	208	5.4	0.3	323	5.5	0.4	302	5.7	0.7	482	5.8	0.5	480	5.8	0.5	430	5.8	0.6	309	5.8	0.4

注)ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行い，身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第 32 表の 1 血糖値の分布－血糖値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上  
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男 性	総 数	1,005	100.0	43	100.0	92	100.0	108	100.0	125	100.0	292	100.0	345	100.0	302	100.0	209	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0
	60-79	63	6.3	4	9.3	9	9.8	11	10.2	5	4.0	18	6.2	16	4.6	19	6.3	5	2.4
	80-99	551	54.8	30	69.8	70	76.1	81	75.0	84	67.2	155	53.1	131	38.0	145	48.0	76	36.4
	100-119	243	24.2	7	16.3	11	12.0	12	11.1	31	24.8	77	26.4	105	30.4	82	27.2	64	30.6
	120-139	67	6.7	1	2.3	1	1.1	3	2.8	2	1.6	19	6.5	41	11.9	26	8.6	27	12.9
	140-159	28	2.8	1	2.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	4	1.4	22	6.4	6	2.0	19	9.1
	160-179	18	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	9	3.1	8	2.3	10	3.3	4	1.9
	180-199	13	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.7	8	2.3	5	1.7	5	2.4
	200-219	5	0.5	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.8	1	0.3	2	0.6	2	0.7	1	0.5
	220-239	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.4	2	0.7	4	1.9
	240-259	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	2	0.7	1	0.5
	260mg/dL以上	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.3	4	1.2	2	0.7	3	1.4
	(再掲)110以上	234	23.3	3	7.0	6	6.5	6	5.6	17	13.6	69	23.6	133	38.6	87	28.8	90	43.1
女 性	総 数	1,407	100.0	64	100.0	147	100.0	223	100.0	218	100.0	369	100.0	386	100.0	343	100.0	242	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4
	60-79	76	5.4	12	18.8	11	7.5	15	6.7	9	4.1	19	5.1	10	2.6	12	3.5	6	2.5
	80-99	823	58.5	48	75.0	113	76.9	168	75.3	142	65.1	197	53.4	155	40.2	167	48.7	89	36.8
	100-119	358	25.4	2	3.1	22	15.0	33	14.8	49	22.5	112	30.4	140	36.3	109	31.8	92	38.0
	120-139	77	5.5	2	3.1	0	0.0	5	2.2	12	5.5	19	5.1	39	10.1	21	6.1	28	11.6
	140-159	33	2.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.9	9	2.4	21	5.4	15	4.4	13	5.4
	160-179	13	0.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	3	0.8	9	2.3	4	1.2	8	3.3
	180-199	10	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	6	1.6	7	2.0	3	1.2
	200-219	8	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	1.1	3	0.8	6	1.7	1	0.4
	220-239	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
	240-259	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260mg/dL以上	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.3	2	0.5	1	0.3	1	0.4
	(再掲)110以上	250	17.8	2	3.1	7	4.8	9	4.0	34	15.6	69	18.7	129	33.4	93	27.1	82	33.9

注)血糖値の測定を行った 20歳以上の者のうち，血液採取が食後3時間以降に行われた者を集計対象とした。

(27年)

第 32 表の 2 血糖値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上  
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,005	103.9	32.8	43	92.5	13.2	92	91.8	15.0	108	91.3	12.2	125	98.2	21.4	292	103.6	29.2	345	114.7	43.5	302	107.5	33.1	209	118.4	48.9
女性	1,407	100.6	27.3	64	87.3	10.3	147	90.6	10.9	223	92.1	10.5	218	100.0	27.4	369	103.1	31.8	386	109.7	31.8	343	107.2	32.7	242	109.9	27.1

注)血糖値の測定を行った 20歳以上の者のうち，血液採取が食後3時間以降に行われた者を集計対象とした。

(27年)

第32表の3 血糖値の分布－血糖値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	892	100.0	43	100.0	92	100.0	104	100.0	119	100.0	251	100.0	283	100.0	250	100.0	170	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-79	57	6.4	4	9.3	9	9.8	11	10.6	5	4.2	14	5.6	14	4.9	15	6.0	5	2.9
	80-99	530	59.4	30	69.8	70	76.1	80	76.9	83	69.7	144	57.4	123	43.5	134	53.6	71	41.8
	100-119	222	24.9	7	16.3	11	12.0	11	10.6	28	23.5	71	28.3	94	33.2	72	28.8	58	34.1
	120-139	52	5.8	1	2.3	1	1.1	1	1.0	2	1.7	13	5.2	34	12.0	16	6.4	25	14.7
	140-159	11	1.2	1	2.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.4	8	2.8	4	1.6	5	2.9
	160-179	10	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.0	5	1.8	5	2.0	3	1.8
	180-199	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	3	1.1	3	1.2	2	1.2
	200-219	2	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0
	220-239	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.6
	240-259	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260mg/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)110以上	159	17.8	3	7.0	6	6.5	4	3.8	12	10.1	44	17.5	90	31.8	55	22.0	60	35.3
女性	総数	1,336	100.0	64	100.0	147	100.0	222	100.0	214	100.0	349	100.0	340	100.0	307	100.0	217	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5
	60-79	76	5.7	12	18.8	11	7.5	15	6.8	9	4.2	19	5.4	10	2.9	12	3.9	6	2.8
	80-99	810	60.6	48	75.0	113	76.9	168	75.7	141	65.9	194	55.6	146	42.9	161	52.4	84	38.7
	100-119	343	25.7	2	3.1	22	15.0	33	14.9	48	22.4	108	30.9	130	38.2	100	32.6	88	40.6
	120-139	65	4.9	2	3.1	0	0.0	5	2.3	10	4.7	15	4.3	33	9.7	19	6.2	22	10.1
	140-159	20	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	8	2.3	10	2.9	10	3.3	7	3.2
	160-179	7	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.5	1	0.3	5	2.3
	180-199	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	0.9	2	0.7	3	1.4
	200-219	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.5
	220-239	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240-259	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260mg/dL以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0
	(再掲)110以上	197	14.7	2	3.1	7	4.8	8	3.6	31	14.5	55	15.8	94	27.6	65	21.2	64	29.5

注)血糖値の測定を行った20歳以上の者のうち、血液採取を食後3時間以降に行い、かつ身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した者を集計対象とした。(27年)

第32表の4 血糖値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	892	98.9	19.7	43	92.5	13.2	92	91.8	15.0	104	90.7	11.7	119	96.4	18.3	251	99.4	19.4	283	105.8	22.5	250	101.7	21.4	170	107.3	22.5
女性	1,336	98.5	24.3	64	87.3	10.3	147	90.6	10.9	222	91.9	9.7	214	99.6	27.4	349	100.4	28.7	340	105.7	27.4	307	102.4	27.3	217	106.7	21.3

注)血糖値の測定を行った20歳以上の者のうち、血液採取を食後3時間以降に行い、かつ身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した者を集計対象とした。(27年)

第33表の1 血清総コレステロール値の分布—血清総コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	1,030	100.0	406	100.0	278	100.0
	120mg/dL未満	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	4	0.9	4	0.4	0	0.0	4	1.4
	120-139	34	2.5	4	7.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	5	1.3	24	5.2	18	1.7	9	2.2	18	6.5
	140-159	145	10.9	12	21.1	9	7.9	10	6.5	8	4.8	36	9.4	70	15.1	98	9.5	51	12.6	43	15.5
	160-179	241	18.0	15	26.3	18	15.8	33	21.6	20	12.1	66	17.3	89	19.1	186	18.1	77	19.0	55	19.8
	180-199	337	25.2	16	28.1	31	27.2	32	20.9	41	24.8	94	24.6	123	26.5	254	24.7	100	24.6	74	26.6
	200-219	264	19.8	6	10.5	24	21.1	29	19.0	50	30.3	82	21.5	73	15.7	218	21.2	72	17.7	41	14.7
	220-239	178	13.3	2	3.5	19	16.7	23	15.0	25	15.2	57	14.9	52	11.2	145	14.1	65	16.0	26	9.4
	240-259	85	6.4	1	1.8	10	8.8	13	8.5	15	9.1	25	6.5	21	4.5	68	6.6	22	5.4	13	4.7
	260-279	29	2.2	1	1.8	2	1.8	8	5.2	3	1.8	11	2.9	4	0.9	25	2.4	7	1.7	1	0.4
	280-299	12	0.9	0	0.0	1	0.9	3	2.0	2	1.2	3	0.8	3	0.6	10	1.0	2	0.5	2	0.7
	300mg/dL以上	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	1	0.3	2	0.4	4	0.4	1	0.2	1	0.4
女性	総数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	1,524	100.0	477	100.0	344	100.0
	120mg/dL未満	3	0.2	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.1	1	0.2	1	0.3
	120-139	34	1.7	2	2.4	8	3.8	3	0.9	0	0.0	6	1.2	15	2.8	16	1.0	11	2.3	10	2.9
	140-159	109	5.5	11	12.9	34	16.3	19	5.8	3	1.0	10	2.0	32	5.9	52	3.4	15	3.1	23	6.7
	160-179	284	14.3	26	30.6	46	22.1	57	17.3	19	6.2	48	9.4	88	16.2	178	11.7	56	11.7	61	17.7
	180-199	438	22.1	21	24.7	55	26.4	82	24.9	54	17.6	99	19.4	127	23.4	325	21.3	97	20.3	87	25.3
	200-219	444	22.4	10	11.8	36	17.3	72	21.9	82	26.7	109	21.4	135	24.9	358	23.5	111	23.3	87	25.3
	220-239	317	16.0	8	9.4	17	8.2	49	14.9	66	21.5	103	20.2	74	13.7	274	18.0	90	18.9	38	11.0
	240-259	188	9.5	3	3.5	9	4.3	30	9.1	34	11.1	70	13.7	42	7.7	168	11.0	52	10.9	21	6.1
	260-279	96	4.8	0	0.0	0	0.0	11	3.3	28	9.1	41	8.0	16	3.0	93	6.1	29	6.1	9	2.6
	280-299	40	2.0	2	2.4	2	1.0	4	1.2	11	3.6	12	2.4	9	1.7	33	2.2	10	2.1	6	1.7
	300mg/dL以上	28	1.4	1	1.2	1	0.5	2	0.6	10	3.3	11	2.2	3	0.6	25	1.6	5	1.0	1	0.3

注)血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第33表の2 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	195.8	33.6	57	178.9	30.0	114	202.1	30.8	153	203.8	35.4	165	205.7	30.3	382	198.5	33.2	465	188.0	33.2	1,030	197.7	33.2	406	194.2	31.9	278	185.7	33.3
女性	1,981	207.9	36.3	85	188.6	34.5	208	187.0	30.9	329	203.5	33.1	307	223.7	35.9	510	218.9	36.5	542	202.2	33.2	1,524	213.1	35.7	477	211.9	35.7	344	199.2	32.4

注)血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)



第33表の3 血清総コレステロール値の分布－血清総コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,122	100.0	57	100.0	112	100.0	144	100.0	139	100.0	307	100.0	363	100.0	845	100.0	309	100.0	224	100.0
	120mg/dL未満	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.8	3	0.4	0	0.0	3	1.3
	120-139	22	2.0	4	7.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	3	1.0	14	3.9	9	1.1	4	1.3	12	5.4
	140-159	112	10.0	12	21.1	9	8.0	10	6.9	4	2.9	28	9.1	49	13.5	74	8.8	37	12.0	32	14.3
	160-179	187	16.7	15	26.3	18	16.1	31	21.5	13	9.4	44	14.3	66	18.2	138	16.3	50	16.2	43	19.2
	180-199	284	25.3	16	28.1	30	26.8	28	19.4	37	26.6	75	24.4	98	27.0	207	24.5	76	24.6	60	26.8
	200-219	228	20.3	6	10.5	24	21.4	29	20.1	43	30.9	67	21.8	59	16.3	183	21.7	56	18.1	35	15.6
	220-239	162	14.4	2	3.5	18	16.1	21	14.6	23	16.5	52	16.9	46	12.7	130	15.4	57	18.4	24	10.7
	240-259	78	7.0	1	1.8	10	8.9	13	9.0	13	9.4	22	7.2	19	5.2	63	7.5	19	6.1	11	4.9
	260-279	28	2.5	1	1.8	2	1.8	7	4.9	3	2.2	11	3.6	4	1.1	24	2.8	7	2.3	1	0.4
	280-299	12	1.1	0	0.0	1	0.9	3	2.1	2	1.4	3	1.0	3	0.8	10	1.2	2	0.6	2	0.9
	300mg/dL以上	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.3	2	0.6	4	0.5	1	0.3	1	0.4
女性	総数	1,624	100.0	85	100.0	208	100.0	316	100.0	278	100.0	378	100.0	359	100.0	1,224	100.0	321	100.0	233	100.0
	120mg/dL未満	3	0.2	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.2	1	0.3	1	0.4
	120-139	23	1.4	2	2.4	8	3.8	2	0.6	0	0.0	2	0.5	9	2.5	6	0.5	4	1.2	7	3.0
	140-159	87	5.4	11	12.9	34	16.3	19	6.0	3	1.1	4	1.1	16	4.5	36	2.9	6	1.9	12	5.2
	160-179	210	12.9	26	30.6	46	22.1	53	16.8	16	5.8	23	6.1	46	12.8	118	9.6	28	8.7	32	13.7
	180-199	343	21.1	21	24.7	55	26.4	82	25.9	46	16.5	61	16.1	78	21.7	242	19.8	52	16.2	59	25.3
	200-219	360	22.2	10	11.8	36	17.3	67	21.2	74	26.6	80	21.2	93	25.9	289	23.6	74	23.1	60	25.8
	220-239	275	16.9	8	9.4	17	8.2	48	15.2	58	20.9	86	22.8	58	16.2	238	19.4	76	23.7	30	12.9
	240-259	169	10.4	3	3.5	9	4.3	29	9.2	33	11.9	62	16.4	33	9.2	151	12.3	42	13.1	17	7.3
	260-279	90	5.5	0	0.0	0	0.0	11	3.5	27	9.7	39	10.3	13	3.6	88	7.2	26	8.1	8	3.4
	280-299	38	2.3	2	2.4	2	1.0	4	1.3	11	4.0	10	2.6	9	2.5	31	2.5	8	2.5	6	2.6
	300mg/dL以上	26	1.6	1	1.2	1	0.5	1	0.3	10	3.6	10	2.6	3	0.8	23	1.9	4	1.2	1	0.4

注)血清総コレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第33表の4 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,122	198.3	33.7	57	178.9	30.0	112	202.0	30.9	144	204.0	35.6	139	208.5	29.9	307	201.6	33.3	363	191.1	33.8	845	200.6	33.4	309	197.4	32.4	224	187.9	33.7
女性	1,624	210.3	36.9	85	188.6	34.5	208	187.0	30.9	316	203.5	32.4	278	225.3	36.6	378	225.5	35.4	359	207.4	34.3	1,224	216.9	35.6	321	219.0	34.8	233	203.7	34.0

注)血清総コレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第34表の1 血清HDLコレステロール値の分布—血清HDLコレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	1,030	100.0	406	100.0	278	100.0
	30mg/dL未満	15	1.1	1	1.8	2	1.8	1	0.7	1	0.6	2	0.5	8	1.7	7	0.7	5	1.2	5	1.8
	30-39	161	12.1	3	5.3	12	10.5	7	4.6	12	7.3	45	11.8	82	17.6	117	11.4	58	14.3	54	19.4
	40-49	365	27.3	17	29.8	28	24.6	49	32.0	44	26.7	98	25.7	129	27.7	279	27.1	105	25.9	76	27.3
	50-59	345	25.8	16	28.1	39	34.2	34	22.2	46	27.9	94	24.6	116	24.9	265	25.7	106	26.1	65	23.4
	60-69	236	17.7	12	21.1	18	15.8	38	24.8	30	18.2	72	18.8	66	14.2	189	18.3	64	15.8	40	14.4
	70-79	123	9.2	5	8.8	8	7.0	11	7.2	21	12.7	37	9.7	41	8.8	97	9.4	37	9.1	26	9.4
	80-89	49	3.7	1	1.8	5	4.4	8	5.2	7	4.2	14	3.7	14	3.0	39	3.8	14	3.4	6	2.2
	90-99	26	1.9	1	1.8	2	1.8	5	3.3	2	1.2	10	2.6	6	1.3	23	2.2	8	2.0	4	1.4
	100mg/dL以上	16	1.2	1	1.8	0	0.0	0	0.0	2	1.2	10	2.6	3	0.6	14	1.4	9	2.2	2	0.7
女性	総数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	1,524	100.0	477	100.0	344	100.0
	30mg/dL未満	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	3	0.6	5	0.3	3	0.6	2	0.6
	30-39	57	2.9	0	0.0	2	1.0	8	2.4	6	2.0	14	2.7	27	5.0	46	3.0	20	4.2	16	4.7
	40-49	229	11.6	6	7.1	19	9.1	26	7.9	21	6.8	61	12.0	96	17.7	176	11.5	74	15.5	66	19.2
	50-59	453	22.9	17	20.0	43	20.7	63	19.1	59	19.2	117	22.9	154	28.4	343	22.5	123	25.8	98	28.5
	60-69	511	25.8	23	27.1	60	28.8	91	27.7	77	25.1	137	26.9	123	22.7	391	25.7	118	24.7	79	23.0
	70-79	378	19.1	22	25.9	52	25.0	63	19.1	63	20.5	95	18.6	83	15.3	279	18.3	78	16.4	51	14.8
	80-89	201	10.1	9	10.6	23	11.1	48	14.6	40	13.0	49	9.6	32	5.9	161	10.6	35	7.3	19	5.5
	90-99	82	4.1	5	5.9	6	2.9	18	5.5	26	8.5	16	3.1	11	2.0	67	4.4	8	1.7	7	2.0
	100mg/dL以上	64	3.2	3	3.5	3	1.4	12	3.6	14	4.6	19	3.7	13	2.4	56	3.7	18	3.8	6	1.7

注)血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第34表の2 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	55.1	15.1	57	55.4	13.4	114	54.3	13.5	153	57.0	14.2	165	56.2	14.6	382	57.0	16.2	465	52.7	14.9	1,030	55.7	15.2	406	55.2	16.1	278	52.4	15.1
女性	1,981	65.5	16.1	85	68.8	14.7	208	66.6	13.2	329	68.3	15.7	307	69.8	17.3	510	65.2	16.7	542	60.8	15.3	1,524	65.8	16.6	477	62.6	16.4	344	60.3	15.0

注)血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)



第34表の3 血清HDLコレステロール値の分布—血清HDLコレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,122	100.0	57	100.0	112	100.0	144	100.0	139	100.0	307	100.0	363	100.0	845	100.0	309	100.0	224	100.0
	30mg/dL未満	11	1.0	1	1.8	2	1.8	1	0.7	1	0.7	2	0.7	4	1.1	4	0.5	2	0.6	4	1.8
	30-39	124	11.1	3	5.3	12	10.7	4	2.8	9	6.5	34	11.1	62	17.1	89	10.5	42	13.6	42	18.8
	40-49	299	26.6	17	29.8	27	24.1	45	31.3	38	27.3	74	24.1	98	27.0	224	26.5	79	25.6	60	26.8
	50-59	294	26.2	16	28.1	39	34.8	33	22.9	37	26.6	78	25.4	91	25.1	218	25.8	82	26.5	52	23.2
	60-69	201	17.9	12	21.1	17	15.2	37	25.7	24	17.3	58	18.9	53	14.6	157	18.6	48	15.5	34	15.2
	70-79	111	9.9	5	8.8	8	7.1	11	7.6	19	13.7	33	10.7	35	9.6	86	10.2	31	10.0	22	9.8
	80-89	46	4.1	1	1.8	5	4.5	8	5.6	7	5.0	12	3.9	13	3.6	36	4.3	12	3.9	6	2.7
	90-99	22	2.0	1	1.8	2	1.8	5	3.5	2	1.4	8	2.6	4	1.1	19	2.2	6	1.9	2	0.9
	100mg/dL以上	14	1.2	1	1.8	0	0.0	0	0.0	2	1.4	8	2.6	3	0.8	12	1.4	7	2.3	2	0.9
女性	総数	1,624	100.0	85	100.0	208	100.0	316	100.0	278	100.0	378	100.0	359	100.0	1,224	100.0	321	100.0	233	100.0
	30mg/dL未満	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	2	0.6	4	0.3	2	0.6	1	0.4
	30-39	41	2.5	0	0.0	2	1.0	7	2.2	5	1.8	8	2.1	19	5.3	34	2.8	14	4.4	11	4.7
	40-49	170	10.5	6	7.1	19	9.1	23	7.3	21	7.6	39	10.3	62	17.3	125	10.2	44	13.7	46	19.7
	50-59	355	21.9	17	20.0	43	20.7	61	19.3	48	17.3	82	21.7	104	29.0	262	21.4	82	25.5	66	28.3
	60-69	429	26.4	23	27.1	60	28.8	86	27.2	72	25.9	105	27.8	83	23.1	319	26.1	82	25.5	56	24.0
	70-79	317	19.5	22	25.9	52	25.0	61	19.3	56	20.1	73	19.3	53	14.8	228	18.6	53	16.5	31	13.3
	80-89	180	11.1	9	10.6	23	11.1	48	15.2	38	13.7	41	10.8	21	5.8	144	11.8	25	7.8	13	5.6
	90-99	74	4.6	5	5.9	6	2.9	18	5.7	25	9.0	14	3.7	6	1.7	61	5.0	6	1.9	4	1.7
	100mg/dL以上	54	3.3	3	3.5	3	1.4	12	3.8	12	4.3	15	4.0	9	2.5	47	3.8	13	4.0	5	2.1

注)血清HDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第34表の4 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,122	55.8	15.1	57	55.4	13.4	112	54.3	13.6	144	57.9	14.1	139	57.0	15.1	307	57.4	16.1	363	53.6	15.1	845	56.4	15.2	309	55.8	16.1	224	53.0	15.2
女性	1,624	66.3	16.2	85	68.8	14.7	208	66.6	13.2	316	68.8	15.7	278	70.1	17.3	378	66.4	16.9	359	60.5	15.1	1,224	66.7	16.7	321	63.2	16.8	233	60.1	14.9

注)血清HDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第 35 表の 1 血清 LDL コレステロール値 (直接法) の分布-血清 LDL コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合-男性・女性, 20 歳以上 [コレステロールを下げる薬又は中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の使用を含む]

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総 数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	1,030	100.0	406	100.0	278	100.0
	40mg/dL未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0
	40-49	9	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	2	0.5	5	1.1	8	0.8	4	1.0	1	0.4
	50-59	13	1.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	8	1.7	10	1.0	5	1.2	6	2.2
	60-69	26	1.9	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.2	8	2.1	14	3.0	20	1.9	8	2.0	11	4.0
	70-79	93	7.0	9	15.8	3	2.6	8	5.2	9	5.5	30	7.9	34	7.3	65	6.3	31	7.6	25	9.0
	80-89	113	8.5	8	14.0	9	7.9	8	5.2	5	3.0	33	8.6	50	10.8	85	8.3	45	11.1	30	10.8
	90-99	176	13.2	8	14.0	8	7.0	19	12.4	12	7.3	53	13.9	76	16.3	138	13.4	57	14.0	46	16.5
	100-109	172	12.9	8	14.0	14	12.3	19	12.4	22	13.3	47	12.3	62	13.3	133	12.9	53	13.1	35	12.6
	110-119	197	14.7	11	19.3	22	19.3	20	13.1	26	15.8	51	13.4	67	14.4	140	13.6	50	12.3	43	15.5
	120-129	141	10.6	4	7.0	15	13.2	12	7.8	20	12.1	42	11.0	48	10.3	107	10.4	48	11.8	28	10.1
	130-139	129	9.7	3	5.3	15	13.2	19	12.4	22	13.3	33	8.6	37	8.0	104	10.1	39	9.6	18	6.5
	140-149	103	7.7	2	3.5	10	8.8	11	7.2	13	7.9	37	9.7	30	6.5	83	8.1	28	6.9	20	7.2
	150-159	56	4.2	1	1.8	6	5.3	12	7.8	11	6.7	14	3.7	12	2.6	49	4.8	15	3.7	3	1.1
	160-169	36	2.7	0	0.0	5	4.4	6	3.9	6	3.6	10	2.6	9	1.9	29	2.8	12	3.0	4	1.4
	170-179	28	2.1	0	0.0	3	2.6	7	4.6	5	3.0	6	1.6	7	1.5	22	2.1	4	1.0	5	1.8
	180-189	18	1.3	1	1.8	3	2.6	2	1.3	4	2.4	5	1.3	3	0.6	13	1.3	4	1.0	2	0.7
	190-199	11	0.8	1	1.8	0	0.0	2	1.3	3	1.8	3	0.8	2	0.4	10	1.0	2	0.5	1	0.4
	200-209	6	0.4	0	0.0	1	0.9	4	2.6	0	0.0	1	0.3	0	0.0	5	0.5	0	0.0	0	0.0
	210-219	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	1	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	1	0.2	3	0.3	1	0.2	0	0.0
女性	総 数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	1,524	100.0	477	100.0	344	100.0
	40mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	40-49	5	0.3	1	1.2	1	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.1	1	0.2	1	0.3
	50-59	21	1.1	2	2.4	6	2.9	3	0.9	0	0.0	3	0.6	7	1.3	9	0.6	4	0.8	5	1.5
	60-69	39	2.0	3	3.5	11	5.3	4	1.2	3	1.0	11	2.2	7	1.3	22	1.4	11	2.3	5	1.5
	70-79	89	4.5	4	4.7	17	8.2	18	5.5	1	0.3	12	2.4	37	6.8	55	3.6	22	4.6	23	6.7
	80-89	150	7.6	17	20.0	28	13.5	20	6.1	14	4.6	25	4.9	46	8.5	90	5.9	29	6.1	32	9.3
	90-99	225	11.4	17	20.0	32	15.4	45	13.7	24	7.8	41	8.0	66	12.2	154	10.1	48	10.1	42	12.2
	100-109	239	12.1	5	5.9	31	14.9	40	12.2	38	12.4	61	12.0	64	11.8	186	12.2	57	11.9	42	12.2
	110-119	254	12.8	13	15.3	16	7.7	47	14.3	40	13.0	54	10.6	84	15.5	195	12.8	59	12.4	59	17.2
	120-129	252	12.7	6	7.1	18	8.7	42	12.8	37	12.1	79	15.5	70	12.9	205	13.5	60	12.6	50	14.5
	130-139	222	11.2	7	8.2	21	10.1	36	10.9	47	15.3	55	10.8	56	10.3	176	11.5	54	11.3	36	10.5
	140-149	169	8.5	3	3.5	13	6.3	23	7.0	31	10.1	56	11.0	43	7.9	146	9.6	49	10.3	18	5.2
	150-159	101	5.1	2	2.4	4	1.9	17	5.2	15	4.9	34	6.7	29	5.4	90	5.9	29	6.1	15	4.4
	160-169	79	4.0	1	1.2	4	1.9	13	4.0	23	7.5	25	4.9	13	2.4	71	4.7	18	3.8	7	2.0
	170-179	56	2.8	1	1.2	4	1.9	11	3.3	12	3.9	20	3.9	8	1.5	50	3.3	11	2.3	4	1.2
	180-189	34	1.7	2	2.4	1	0.5	4	1.2	9	2.9	12	2.4	6	1.1	30	2.0	10	2.1	3	0.9
	190-199	17	0.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	3	1.0	11	2.2	2	0.4	15	1.0	10	2.1	2	0.6
	200-209	9	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.6	3	1.0	1	0.2	2	0.4	8	0.5	2	0.4	0	0.0
	210-219	6	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	3	0.6	0	0.0	6	0.4	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	13	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.6	6	1.2	1	0.2	13	0.9	3	0.6	0	0.0

注)血清LDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第 35 表の 2 血清 LDL コレステロール値 (直接法) の平均値及び標準偏差-年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差-男性・女性, 20 歳以上 [コレステロールを下げる薬又は中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の使用を含む]

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	115.1	30.4	57	104.6	26.9	114	123.7	26.7	153	124.1	32.8	165	123.5	32.5	382	114.2	30.2	465	109.1	28.4	1,030	116.0	31.1	406	111.8	29.2	278	107.2	27.1
女性	1,981	120.4	31.9	85	106.4	29.4	208	106.3	29.2	329	118.7	30.4	307	131.8	32.7	510	128.1	33.5	542	115.4	27.9	1,524	124.2	31.9	477	122.5	32.1	344	113.0	26.3

注)血清LDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第35表の3 血清LDLコレステロール値(直接法)の分布-血清LDLコレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合-男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,122	100.0	57	100.0	112	100.0	144	100.0	139	100.0	307	100.0	363	100.0	845	100.0	309	100.0	224	100.0
	40mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	40-49	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	0.7	2	0.6	6	0.7	2	0.6	0	0.0
	50-59	12	1.1	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.3	7	1.9	9	1.1	5	1.6	5	2.2
	60-69	21	1.9	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	1.4	7	2.3	10	2.8	15	1.8	7	2.3	8	3.6
	70-79	74	6.6	9	15.8	3	2.7	8	5.6	5	3.6	24	7.8	25	6.9	52	6.2	25	8.1	17	7.6
	80-89	82	7.3	8	14.0	9	8.0	7	4.9	3	2.2	21	6.8	34	9.4	57	6.7	27	8.7	23	10.3
	90-99	131	11.7	8	14.0	8	7.1	17	11.8	11	7.9	37	12.1	50	13.8	99	11.7	35	11.3	33	14.7
	100-109	142	12.7	8	14.0	14	12.5	19	13.2	18	12.9	34	11.1	49	13.5	107	12.7	37	12.0	29	12.9
	110-119	172	15.3	11	19.3	22	19.6	19	13.2	19	13.7	40	13.0	61	16.8	116	13.7	40	12.9	41	18.3
	120-129	125	11.1	4	7.0	15	13.4	11	7.6	20	14.4	37	12.1	38	10.5	95	11.2	40	12.9	22	9.8
	130-139	109	9.7	3	5.3	14	12.5	17	11.8	19	13.7	26	8.5	30	8.3	85	10.1	29	9.4	16	7.1
	140-149	93	8.3	2	3.5	10	8.9	11	7.6	11	7.9	36	11.7	23	6.3	75	8.9	25	8.1	15	6.7
	150-159	53	4.7	1	1.8	6	5.4	12	8.3	10	7.2	12	3.9	12	3.3	46	5.4	14	4.5	3	1.3
	160-169	35	3.1	0	0.0	4	3.6	6	4.2	6	4.3	10	3.3	9	2.5	29	3.4	12	3.9	4	1.8
	170-179	26	2.3	0	0.0	3	2.7	6	4.2	4	2.9	6	2.0	7	1.9	20	2.4	4	1.3	5	2.2
	180-189	18	1.6	1	1.8	3	2.7	2	1.4	4	2.9	5	1.6	3	0.8	13	1.5	4	1.3	2	0.9
	190-199	10	0.9	1	1.8	0	0.0	1	0.7	3	2.2	3	1.0	2	0.6	9	1.1	2	0.6	1	0.4
	200-209	6	0.5	0	0.0	1	0.9	4	2.8	0	0.0	1	0.3	0	0.0	5	0.6	0	0.0	0	0.0
	210-219	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.3	0	0.0	3	0.4	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.3	1	0.3	3	0.4	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,624	100.0	85	100.0	208	100.0	316	100.0	278	100.0	378	100.0	359	100.0	1,224	100.0	321	100.0	233	100.0
	40mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	40-49	5	0.3	1	1.2	1	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.2	1	0.3	1	0.4
	50-59	17	1.0	2	2.4	6	2.9	2	0.6	0	0.0	2	0.5	5	1.4	5	0.4	1	0.3	5	2.1
	60-69	30	1.8	3	3.5	11	5.3	4	1.3	3	1.1	6	1.6	3	0.8	14	1.1	4	1.2	3	1.3
	70-79	62	3.8	4	4.7	17	8.2	18	5.7	1	0.4	5	1.3	17	4.7	36	2.9	13	4.0	8	3.4
	80-89	115	7.1	17	20.0	28	13.5	20	6.3	12	4.3	14	3.7	24	6.7	59	4.8	14	4.4	18	7.7
	90-99	176	10.8	17	20.0	32	15.4	42	13.3	19	6.8	28	7.4	38	10.6	113	9.2	25	7.8	27	11.6
	100-109	179	11.0	5	5.9	31	14.9	38	12.0	35	12.6	34	9.0	36	10.0	133	10.9	29	9.0	25	10.7
	110-119	198	12.2	13	15.3	16	7.7	45	14.2	36	12.9	34	9.0	54	15.0	152	12.4	34	10.6	40	17.2
	120-129	193	11.9	6	7.1	18	8.7	40	12.7	30	10.8	56	14.8	43	12.0	159	13.0	43	13.4	29	12.4
	130-139	196	12.1	7	8.2	21	10.1	36	11.4	42	15.1	45	11.9	45	12.5	152	12.4	42	13.1	31	13.3
	140-149	154	9.5	3	3.5	13	6.3	23	7.3	30	10.8	49	13.0	36	10.0	132	10.8	42	13.1	15	6.4
	150-159	95	5.8	2	2.4	4	1.9	16	5.1	14	5.0	31	8.2	28	7.8	84	6.9	27	8.4	15	6.4
	160-169	76	4.7	1	1.2	4	1.9	13	4.1	23	8.3	23	6.1	12	3.3	68	5.6	15	4.7	7	3.0
	170-179	53	3.3	1	1.2	4	1.9	10	3.2	11	4.0	20	5.3	7	1.9	47	3.8	10	3.1	4	1.7
	180-189	33	2.0	2	2.4	1	0.5	4	1.3	9	3.2	12	3.2	5	1.4	29	2.4	9	2.8	3	1.3
	190-199	15	0.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	3	1.1	9	2.4	2	0.6	13	1.1	8	2.5	2	0.9
	200-209	9	0.6	0	0.0	1	0.5	2	0.6	3	1.1	1	0.3	2	0.6	8	0.7	2	0.6	0	0.0
	210-219	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	0.8	0	0.0	5	0.4	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	12	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.8	5	1.3	1	0.3	12	1.0	2	0.6	0	0.0

注)血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第35表の4 血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差-年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差-男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,122	117.4	30.7	57	104.6	26.9	112	123.3	26.7	144	123.8	32.9	139	126.2	31.9	307	117.2	31.2	363	111.8	29.0	845	118.6	31.5	309	114.8	30.6	224	109.2	27.2
女性	1,624	122.8	32.7	85	106.4	29.4	208	106.3	29.2	316	118.6	30.1	278	133.1	33.4	378	133.5	33.6	359	120.7	29.1	1,224	127.6	32.3	321	129.0	31.8	233	117.4	28.0

注)血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第36表の1 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の分布－血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,291	100.0	53	100.0	106	100.0	150	100.0	156	100.0	369	100.0	457	100.0	999	100.0	394	100.0	273	100.0
総数	9	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	0.6	3	0.8	3	0.7	9	0.9	2	0.5	2	0.7
40mg/dL未満	8	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	6	1.3	7	0.7	6	1.5	2	0.7
40-49	24	1.9	2	3.8	0	0.0	1	0.7	3	1.9	7	1.9	11	2.4	16	1.6	8	2.0	7	2.6
50-59	49	3.8	6	11.3	1	0.9	6	4.0	3	1.9	11	3.0	22	4.8	33	3.3	11	2.8	17	6.2
60-69	105	8.1	10	18.9	6	5.7	8	5.3	5	3.2	34	9.2	42	9.2	78	7.8	39	9.9	25	9.2
70-79	140	10.8	9	17.0	10	9.4	17	11.3	14	9.0	41	11.1	49	10.7	109	10.9	44	11.2	26	9.5
80-89	191	14.8	2	3.8	19	17.9	20	13.3	16	10.3	54	14.6	80	17.5	148	14.8	66	16.8	50	18.3
90-99	183	14.2	10	18.9	9	8.5	18	12.0	26	16.7	53	14.4	67	14.7	139	13.9	48	12.2	45	16.5
100-109	158	12.2	6	11.3	18	17.0	18	12.0	24	15.4	42	11.4	50	10.9	123	12.3	50	12.7	27	9.9
110-119	143	11.1	5	9.4	13	12.3	15	10.0	20	12.8	44	11.9	46	10.1	109	10.9	48	12.2	26	9.5
120-129	90	7.0	0	0.0	13	12.3	12	8.0	11	7.1	26	7.0	28	6.1	68	6.8	20	5.1	19	7.0
130-139	66	5.1	1	1.9	9	8.5	7	4.7	8	5.1	18	4.9	23	5.0	52	5.2	21	5.3	11	4.0
140-149	59	4.6	0	0.0	3	2.8	12	8.0	10	6.4	20	5.4	14	3.1	54	5.4	19	4.8	6	2.2
150-159	25	1.9	1	1.9	3	2.8	3	2.0	5	3.2	6	1.6	7	1.5	19	1.9	6	1.5	4	1.5
160-169	20	1.5	1	1.9	2	1.9	3	2.0	5	3.2	4	1.1	5	1.1	15	1.5	3	0.8	4	1.5
170-179	12	0.9	0	0.0	0	0.0	5	3.3	3	1.9	2	0.5	2	0.4	11	1.1	1	0.3	2	0.7
180-189	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	1	0.2	3	0.3	1	0.3	0	0.0
190-199	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
200-209	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
210-219	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	1	0.2	3	0.3	1	0.3	0	0.0
220mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	1	0.2	3	0.3	1	0.3	0	0.0
女性	1,947	100.0	84	100.0	207	100.0	324	100.0	299	100.0	493	100.0	540	100.0	1,493	100.0	466	100.0	342	100.0
総数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40mg/dL未満	9	0.5	1	1.2	1	0.5	4	1.2	0	0.0	0	0.0	3	0.6	4	0.3	0	0.0	3	0.9
40-49	19	1.0	0	0.0	6	2.9	2	0.6	0	0.0	6	1.2	5	0.9	12	0.8	8	1.7	2	0.6
50-59	48	2.5	4	4.8	15	7.2	8	2.5	0	0.0	8	1.6	13	2.4	21	1.4	7	1.5	12	3.5
60-69	110	5.6	9	10.7	23	11.1	19	5.9	6	2.0	17	3.4	36	6.7	63	4.2	20	4.3	26	7.6
70-79	171	8.8	12	14.3	33	15.9	33	10.2	15	5.0	28	5.7	50	9.3	116	7.8	40	8.6	27	7.9
80-89	228	11.7	18	21.4	27	13.0	44	13.6	37	12.4	49	9.9	53	9.8	163	10.9	47	10.1	36	10.5
90-99	268	13.8	12	14.3	27	13.0	55	17.0	34	11.4	46	9.3	94	17.4	198	13.3	54	11.6	65	19.0
100-109	253	13.0	10	11.9	23	11.1	35	10.8	43	14.4	70	14.2	72	13.3	201	13.5	62	13.3	51	14.9
110-119	243	12.5	7	8.3	17	8.2	34	10.5	37	12.4	78	15.8	70	13.0	196	13.1	68	14.6	46	13.5
120-129	186	9.6	4	4.8	15	7.2	33	10.2	35	11.7	51	10.3	48	8.9	152	10.2	51	10.9	25	7.3
130-139	146	7.5	3	3.6	10	4.8	21	6.5	25	8.4	41	8.3	46	8.5	124	8.3	36	7.7	21	6.1
140-149	92	4.7	1	1.2	2	1.0	18	5.6	27	9.0	26	5.3	18	3.3	87	5.8	22	4.7	9	2.6
150-159	70	3.6	2	2.4	6	2.9	10	3.1	13	4.3	25	5.1	14	2.6	59	4.0	17	3.6	10	2.9
160-169	47	2.4	0	0.0	0	0.0	5	1.5	9	3.0	23	4.7	10	1.9	44	2.9	11	2.4	7	2.0
170-179	26	1.3	1	1.2	0	0.0	2	0.6	9	3.0	9	1.8	5	0.9	24	1.6	12	2.6	1	0.3
180-189	12	0.6	0	0.0	2	1.0	0	0.0	3	1.0	5	1.0	2	0.4	10	0.7	6	1.3	1	0.3
190-199	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	0	0.0	3	0.2	1	0.2	0	0.0
200-209	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	0	0.0	3	0.2	1	0.2	0	0.0
210-219	13	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	1.3	7	1.4	1	0.2	13	0.9	3	0.6	0	0.0
220mg/dL以上	13	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	1.3	7	1.4	1	0.2	13	0.9	3	0.6	0	0.0

(27年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL) - 中性脂肪(mg/dL) / 5 (中性脂肪(トリグリセライド)が400mg/dL未満の場合。)

第36表の2 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,291	109.2	29.8	53	95.9	25.5	106	115.1	25.0	150	115.9	33.8	156	117.3	30.4	369	108.4	29.3	457	105.0	28.8	999	110.1	30.4	394	106.7	28.5	273	103.6	27.9
女性	1,947	117.3	31.2	84	103.0	25.3	207	102.6	27.5	324	113.0	29.0	299	128.0	31.8	493	125.8	33.4	540	114.1	27.9	1,493	121.1	31.4	466	120.8	32.0	342	111.6	26.8

(27年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL) - 中性脂肪(mg/dL) / 5 (中性脂肪(トリグリセライド)が400mg/dL未満の場合。)

第36表の3 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の分布—血清LDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合—男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,085	100.0	53	100.0	104	100.0	142	100.0	132	100.0	297	100.0	357	100.0	822	100.0	301	100.0	219	100.0
総数	7	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.8	2	0.7	2	0.6	7	0.9	2	0.7	1	0.5
40mg/dL未満	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	5	1.4	7	0.9	6	2.0	1	0.5
40-49	18	1.7	2	3.8	0	0.0	1	0.7	1	0.8	7	2.4	7	2.0	12	1.5	6	2.0	5	2.3
50-59	40	3.7	6	11.3	1	1.0	6	4.2	3	2.3	8	2.7	16	4.5	26	3.2	10	3.3	11	5.0
60-69	75	6.9	10	18.9	6	5.8	8	5.6	2	1.5	23	7.7	26	7.3	51	6.2	23	7.6	18	8.2
70-79	104	9.6	9	17.0	10	9.6	16	11.3	11	8.3	25	8.4	33	9.2	78	9.5	25	8.3	20	9.1
80-89	149	13.7	2	3.8	19	18.3	19	13.4	12	9.1	40	13.5	57	16.0	111	13.5	46	15.3	37	16.9
90-99	158	14.6	10	18.9	9	8.7	15	10.6	21	15.9	44	14.8	59	16.5	116	14.1	37	12.3	41	18.7
100-109	137	12.6	6	11.3	18	17.3	17	12.0	23	17.4	33	11.1	40	11.2	104	12.7	39	13.0	22	10.0
110-119	127	11.7	5	9.4	12	11.5	15	10.6	18	13.6	40	13.5	37	10.4	97	11.8	40	13.3	22	10.0
120-129	84	7.7	0	0.0	13	12.5	12	8.5	10	7.6	24	8.1	25	7.0	63	7.7	18	6.0	16	7.3
130-139	60	5.5	1	1.9	8	7.7	7	4.9	7	5.3	17	5.7	20	5.6	48	5.8	20	6.6	9	4.1
140-149	55	5.1	0	0.0	3	2.9	11	7.7	9	6.8	18	6.1	14	3.9	50	6.1	17	5.6	6	2.7
150-159	24	2.2	1	1.9	3	2.9	3	2.1	4	3.0	6	2.0	7	2.0	18	2.2	6	2.0	4	1.8
160-169	20	1.8	1	1.9	2	1.9	3	2.1	5	3.8	4	1.3	5	1.4	15	1.8	3	1.0	4	1.8
170-179	11	1.0	0	0.0	0	0.0	4	2.8	3	2.3	2	0.7	2	0.6	10	1.2	1	0.3	2	0.9
180-189	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	1	0.3	3	0.4	1	0.3	0	0.0
190-199	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
200-209	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
210-219	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	1	0.3	3	0.4	1	0.3	0	0.0
220mg/dL以上	1,599	100.0	84	100.0	207	100.0	313	100.0	270	100.0	367	100.0	358	100.0	1,202	100.0	314	100.0	232	100.0
女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40mg/dL未満	9	0.6	1	1.2	1	0.5	4	1.3	0	0.0	0	0.0	3	0.8	4	0.3	0	0.0	3	1.3
40-49	13	0.8	0	0.0	6	2.9	2	0.6	0	0.0	3	0.8	2	0.6	6	0.5	2	0.6	2	0.9
50-59	37	2.3	4	4.8	15	7.2	7	2.2	0	0.0	3	0.8	8	2.2	12	1.0	2	0.6	8	3.4
60-69	78	4.9	9	10.7	23	11.1	17	5.4	6	2.2	6	1.6	17	4.7	37	3.1	8	2.5	13	5.6
70-79	130	8.1	12	14.3	33	15.9	31	9.9	11	4.1	19	5.2	24	6.7	81	6.7	24	7.6	11	4.7
80-89	177	11.1	18	21.4	27	13.0	43	13.7	33	12.2	28	7.6	28	7.8	121	10.1	22	7.0	21	9.1
90-99	204	12.8	12	14.3	27	13.0	53	16.9	31	11.5	29	7.9	52	14.5	148	12.3	27	8.6	39	16.8
100-109	207	12.9	10	11.9	23	11.1	35	11.2	36	13.3	52	14.2	51	14.2	160	13.3	42	13.4	39	16.8
110-119	191	11.9	7	8.3	17	8.2	33	10.5	30	11.1	53	14.4	51	14.2	152	12.6	49	15.6	32	13.8
120-129	163	10.2	4	4.8	15	7.2	32	10.2	33	12.2	45	12.3	34	9.5	136	11.3	42	13.4	16	6.9
130-139	138	8.6	3	3.6	10	4.8	20	6.4	24	8.9	38	10.4	43	12.0	116	9.7	33	10.5	20	8.6
140-149	86	5.4	1	1.2	2	1.0	18	5.8	26	9.6	23	6.3	16	4.5	81	6.7	20	6.4	9	3.9
150-159	67	4.2	2	2.4	6	2.9	10	3.2	13	4.8	23	6.3	13	3.6	56	4.7	14	4.5	10	4.3
160-169	46	2.9	0	0.0	0	0.0	5	1.6	9	3.3	23	6.3	9	2.5	43	3.6	10	3.2	7	3.0
170-179	23	1.4	1	1.2	0	0.0	2	0.6	9	3.3	7	1.9	4	1.1	21	1.7	9	2.9	1	0.4
180-189	12	0.8	0	0.0	2	1.0	0	0.0	3	1.1	5	1.4	2	0.6	10	0.8	6	1.9	1	0.4
190-199	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.5	0	0.0	3	0.2	1	0.3	0	0.0
200-209	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.5	0	0.0	3	0.2	1	0.3	0	0.0
210-219	12	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	1.5	6	1.6	1	0.3	12	1.0	2	0.6	0	0.0
220mg/dL以上	1,599	100.0	84	100.0	207	100.0	313	100.0	270	100.0	367	100.0	358	100.0	1,202	100.0	314	100.0	232	100.0

(27年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL) - 中性脂肪(mg/dL) / 5 (中性脂肪(トリグリセライド)が400mg/dL未満の場合。)

第36表の4 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の平均値及び標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,085	111.5	30.1	53	95.9	25.5	104	114.7	25.0	142	115.6	34.0	132	120.2	30.0	297	111.5	29.9	357	108.2	29.5	822	112.9	31.0	301	109.7	30.1	219	106.3	27.8
女性	1,599	119.7	31.9	84	103.0	25.3	207	102.6	27.5	313	113.5	28.9	270	129.5	32.5	367	131.6	33.0	358	119.4	28.9	1,202	124.6	31.6	314	127.5	31.1	232	116.1	28.6

(27年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL) - 中性脂肪(mg/dL) / 5 (中性脂肪(トリグリセライド)が400mg/dL未満の場合。)



第 37 表の 1 血清 non HDL コレステロール値の分布—血清 non HDL コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	1,030	100.0	406	100.0	278	100.0	
男性	70mg/dL未満	10	0.7	1	1.8	0	0.0	1	0.7	1	0.6	2	0.5	5	1.1	8	0.8	4	1.0	1	0.4
	70-80未満	7	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.5	4	0.9	6	0.6	2	0.5	3	1.1
	80-90未満	38	2.8	5	8.8	0	0.0	1	0.7	3	1.8	10	2.6	19	4.1	24	2.3	10	2.5	15	5.4
	90-100未満	66	4.9	9	15.8	2	1.8	10	6.5	3	1.8	16	4.2	26	5.6	45	4.4	20	4.9	19	6.8
	100-110未満	124	9.3	3	5.3	16	14.0	9	5.9	10	6.1	39	10.2	47	10.1	93	9.0	43	10.6	29	10.4
	110-120未満	135	10.1	12	21.1	5	4.4	19	12.4	11	6.7	30	7.9	58	12.5	99	9.6	42	10.3	36	12.9
	120-130未満	165	12.4	5	8.8	16	14.0	15	9.8	18	10.9	52	13.6	59	12.7	128	12.4	48	11.8	35	12.6
	130-140未満	165	12.4	7	12.3	12	10.5	14	9.2	28	17.0	46	12.0	58	12.5	129	12.5	51	12.6	33	11.9
	140-150未満	150	11.2	7	12.3	15	13.2	19	12.4	17	10.3	40	10.5	52	11.2	113	11.0	52	12.8	29	10.4
	150-160未満	113	8.5	2	3.5	11	9.6	12	7.8	14	8.5	34	8.9	40	8.6	86	8.3	32	7.9	27	9.7
	160-170未満	100	7.5	3	5.3	7	6.1	13	8.5	14	8.5	39	10.2	24	5.2	84	8.2	24	5.9	17	6.1
	170-180未満	78	5.8	0	0.0	8	7.0	6	3.9	15	9.1	21	5.5	28	6.0	65	6.3	31	7.6	8	2.9
	180-190未満	62	4.6	0	0.0	7	6.1	7	4.6	12	7.3	20	5.2	16	3.4	53	5.1	19	4.7	8	2.9
	190-200未満	56	4.2	1	1.8	7	6.1	13	8.5	7	4.2	12	3.1	16	3.4	46	4.5	14	3.4	11	4.0
	200-210未満	24	1.8	1	1.8	3	2.6	4	2.6	5	3.0	6	1.6	5	1.1	17	1.7	7	1.7	3	1.1
	210-220未満	19	1.4	0	0.0	2	1.8	3	2.0	2	1.2	6	1.6	6	1.3	15	1.5	5	1.2	3	1.1
	220mg/dL以上	24	1.8	1	1.8	3	2.6	6	3.9	5	3.0	7	1.8	2	0.4	19	1.8	2	0.5	1	0.4
総数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	1,524	100.0	477	100.0	344	100.0	
女性	70mg/dL未満	9	0.5	2	2.4	4	1.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	1	0.2	1	0.3
	70-80未満	28	1.4	2	2.4	11	5.3	6	1.8	0	0.0	4	0.8	5	0.9	12	0.8	5	1.0	4	1.2
	80-90未満	52	2.6	7	8.2	19	9.1	9	2.7	2	0.7	6	1.2	9	1.7	21	1.4	6	1.3	7	2.0
	90-100未満	86	4.3	10	11.8	17	8.2	19	5.8	5	1.6	10	2.0	25	4.6	51	3.3	17	3.6	15	4.4
	100-110未満	174	8.8	17	20.0	37	17.8	36	10.9	17	5.5	24	4.7	43	7.9	113	7.4	29	6.1	27	7.8
	110-120未満	182	9.2	10	11.8	29	13.9	41	12.5	22	7.2	32	6.3	48	8.9	123	8.1	33	6.9	33	9.6
	120-130未満	231	11.7	9	10.6	20	9.6	44	13.4	33	10.7	49	9.6	76	14.0	177	11.6	51	10.7	51	14.8
	130-140未満	229	11.6	11	12.9	16	7.7	34	10.3	43	14.0	59	11.6	66	12.2	180	11.8	52	10.9	48	14.0
	140-150未満	225	11.4	5	5.9	14	6.7	38	11.6	29	9.4	75	14.7	64	11.8	177	11.6	61	12.8	44	12.8
	150-160未満	213	10.8	3	3.5	17	8.2	36	10.9	36	11.7	55	10.8	66	12.2	176	11.5	54	11.3	43	12.5
	160-170未満	153	7.7	1	1.2	8	3.8	23	7.0	35	11.4	47	9.2	39	7.2	135	8.9	40	8.4	22	6.4
	170-180未満	142	7.2	3	3.5	8	3.8	15	4.6	29	9.4	45	8.8	42	7.7	124	8.1	47	9.9	19	5.5
	180-190未満	81	4.1	2	2.4	4	1.9	11	3.3	13	4.2	32	6.3	19	3.5	70	4.6	27	5.7	9	2.6
	190-200未満	62	3.1	1	1.2	0	0.0	5	1.5	14	4.6	24	4.7	18	3.3	61	4.0	17	3.6	10	2.9
	200-210未満	37	1.9	1	1.2	2	1.0	3	0.9	6	2.0	16	3.1	9	1.7	31	2.0	13	2.7	5	1.5
	210-220未満	26	1.3	1	1.2	0	0.0	2	0.6	9	2.9	11	2.2	3	0.6	23	1.5	11	2.3	2	0.6
	220mg/dL以上	51	2.6	0	0.0	2	1.0	6	1.8	14	4.6	21	4.1	8	1.5	48	3.1	13	2.7	4	1.2

注)血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

$$\text{non HDL コレステロール (mg/dL)} = \text{総コレステロール (mg/dL)} - \text{HDL コレステロール (mg/dL)}$$

第 37 表の 2 血清 non HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性,  
20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	140.7	33.9	57	123.5	31.0	114	147.8	34.1	153	146.8	36.6	165	149.4	33.9	382	141.5	33.2	465	135.4	32.2	1,030	142.0	33.8	406	139.0	32.1	278	133.3	31.4
女性	1,981	142.4	35.6	85	119.8	31.0	208	120.4	31.1	329	135.2	32.4	307	153.9	37.2	510	153.8	35.9	542	141.4	31.6	1,524	147.3	35.3	477	149.3	35.3	344	138.9	29.7

注)血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第37表の3 血清 non HDL コレステロール値の分布—血清 non HDL コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	1,122	100.0	57	100.0	112	100.0	144	100.0	139	100.0	307	100.0	363	100.0	845	100.0	309	100.0	224	100.0
70mg/dL未満	6	0.5	1	1.8	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.3	2	0.6	5	0.6	2	0.6	0	0.0
70-80未満	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.7	3	0.8	5	0.6	2	0.6	2	0.9
80-90未満	34	3.0	5	8.8	0	0.0	1	0.7	2	1.4	10	3.3	16	4.4	20	2.4	9	2.9	13	5.8
90-100未満	53	4.7	9	15.8	2	1.8	10	6.9	3	2.2	9	2.9	20	5.5	34	4.0	13	4.2	15	6.7
100-110未満	98	8.7	3	5.3	16	14.3	9	6.3	8	5.8	29	9.4	33	9.1	72	8.5	31	10.0	21	9.4
110-120未満	107	9.5	12	21.1	5	4.5	19	13.2	7	5.0	23	7.5	41	11.3	76	9.0	27	8.7	28	12.5
120-130未満	133	11.9	5	8.8	16	14.3	13	9.0	15	10.8	41	13.4	43	11.8	99	11.7	35	11.3	26	11.6
130-140未満	138	12.3	7	12.3	11	9.8	13	9.0	24	17.3	35	11.4	48	13.2	107	12.7	38	12.3	28	12.5
140-150未満	120	10.7	7	12.3	15	13.4	17	11.8	12	8.6	29	9.4	40	11.0	85	10.1	39	12.6	23	10.3
150-160未満	102	9.1	2	3.5	11	9.8	11	7.6	13	9.4	30	9.8	35	9.6	77	9.1	27	8.7	25	11.2
160-170未満	87	7.8	3	5.3	6	5.4	13	9.0	12	8.6	32	10.4	21	5.8	72	8.5	19	6.1	14	6.3
170-180未満	64	5.7	0	0.0	8	7.1	6	4.2	13	9.4	16	5.2	21	5.8	52	6.2	23	7.4	6	2.7
180-190未満	57	5.1	0	0.0	7	6.3	5	3.5	12	8.6	19	6.2	14	3.9	48	5.7	16	5.2	8	3.6
190-200未満	53	4.7	1	1.8	7	6.3	13	9.0	5	3.6	12	3.9	15	4.1	43	5.1	14	4.5	10	4.5
200-210未満	23	2.0	1	1.8	3	2.7	4	2.8	5	3.6	6	2.0	4	1.1	17	2.0	7	2.3	2	0.9
210-220未満	17	1.5	0	0.0	2	1.8	2	1.4	2	1.4	6	2.0	5	1.4	14	1.7	5	1.6	2	0.9
220mg/dL以上	24	2.1	1	1.8	3	2.7	6	4.2	5	3.6	7	2.3	2	0.6	19	2.2	2	0.6	1	0.4
女性	1,624	100.0	85	100.0	208	100.0	316	100.0	278	100.0	378	100.0	359	100.0	1,224	100.0	321	100.0	233	100.0
70mg/dL未満	8	0.5	2	2.4	4	1.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.4
70-80未満	24	1.5	2	2.4	11	5.3	5	1.6	0	0.0	2	0.5	4	1.1	8	0.7	2	0.6	4	1.7
80-90未満	43	2.6	7	8.2	19	9.1	9	2.8	2	0.7	3	0.8	3	0.8	14	1.1	1	0.3	3	1.3
90-100未満	72	4.4	10	11.8	17	8.2	19	6.0	5	1.8	5	1.3	16	4.5	40	3.3	12	3.7	8	3.4
100-110未満	134	8.3	17	20.0	37	17.8	35	11.1	14	5.0	16	4.2	15	4.2	77	6.3	12	3.7	10	4.3
110-120未満	149	9.2	10	11.8	29	13.9	40	12.7	18	6.5	21	5.6	31	8.6	98	8.0	19	5.9	22	9.4
120-130未満	181	11.1	9	10.6	20	9.6	42	13.3	32	11.5	28	7.4	50	13.9	135	11.0	30	9.3	35	15.0
130-140未満	164	10.1	11	12.9	16	7.7	32	10.1	35	12.6	36	9.5	34	9.5	126	10.3	25	7.8	29	12.4
140-150未満	182	11.2	5	5.9	14	6.7	37	11.7	27	9.7	56	14.8	43	12.0	144	11.8	43	13.4	31	13.3
150-160未満	175	10.8	3	3.5	17	8.2	35	11.1	32	11.5	41	10.8	47	13.1	145	11.8	40	12.5	29	12.4
160-170未満	127	7.8	1	1.2	8	3.8	22	7.0	33	11.9	34	9.0	29	8.1	112	9.2	27	8.4	16	6.9
170-180未満	124	7.6	3	3.5	8	3.8	15	4.7	27	9.7	38	10.1	33	9.2	107	8.7	38	11.8	15	6.4
180-190未満	76	4.7	2	2.4	4	1.9	9	2.8	11	4.0	32	8.5	18	5.0	65	5.3	26	8.1	9	3.9
190-200未満	58	3.6	1	1.2	0	0.0	5	1.6	14	5.0	21	5.6	17	4.7	57	4.7	14	4.4	10	4.3
200-210未満	34	2.1	1	1.2	2	1.0	3	0.9	5	1.8	16	4.2	7	1.9	28	2.3	11	3.4	5	2.1
210-220未満	26	1.6	1	1.2	0	0.0	2	0.6	9	3.2	11	2.9	3	0.8	23	1.9	11	3.4	2	0.9
220mg/dL以上	47	2.9	0	0.0	2	1.0	5	1.6	14	5.0	18	4.8	8	2.2	44	3.6	10	3.1	4	1.7

注)血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬 (27年) および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

$$\text{non HDL コレステロール (mg/dL)} = \text{総コレステロール (mg/dL)} - \text{HDL コレステロール (mg/dL)}$$

第37表の4 血清 non HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差
男性	1,122	142.5: 34.5	57	123.5: 31.0	112	147.7: 34.3	144	146.2: 37.0	139	151.5: 34.7	307	144.2: 34.1	363	137.5: 32.8	845	144.2: 34.5	309	141.7: 33.3	224	134.9: 31.6
女性	1,624	144.0: 36.8	85	119.8: 31.0	208	120.4: 31.1	316	134.8: 31.7	278	155.2: 38.0	378	159.1: 36.0	359	146.9: 33.1	1,224	150.1: 36.0	321	155.8: 34.8	233	143.6: 31.6

注)血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬 (27年) および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第 38 表の 1 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布—血清中性脂肪（トリグリセライド）値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男 性	総 数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	278	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	39	2.9	4	7.0	5	4.4	5	3.3	3	1.8	9	2.4	13	2.8	10	2.5	6	2.2
	50-79	213	15.9	15	26.3	21	18.4	26	17.0	24	14.5	43	11.3	84	18.1	55	13.5	50	18.0
	80-109	229	17.1	7	12.3	18	15.8	27	17.6	30	18.2	77	20.2	70	15.1	74	18.2	46	16.5
	110-139	208	15.6	6	10.5	15	13.2	25	16.3	26	15.8	59	15.4	77	16.6	58	14.3	52	18.7
	140-169	177	13.2	10	17.5	18	15.8	12	7.8	17	10.3	51	13.4	69	14.8	55	13.5	42	15.1
	170-199	119	8.9	5	8.8	7	6.1	17	11.1	18	10.9	35	9.2	37	8.0	41	10.1	18	6.5
	200mg/dL以上	351	26.3	10	17.5	30	26.3	41	26.8	47	28.5	108	28.3	115	24.7	113	27.8	64	23.0
	150以上(再掲)	583	43.6	21	36.8	48	42.1	65	42.5	78	47.3	174	45.5	197	42.4	188	46.3	110	39.6
女 性	総 数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	477	100.0	344	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	160	8.1	20	23.5	37	17.8	43	13.1	25	8.1	14	2.7	21	3.9	15	3.1	12	3.5
	50-79	464	23.4	31	36.5	78	37.5	94	28.6	69	22.5	92	18.0	100	18.5	77	16.1	63	18.3
	80-109	425	21.5	15	17.6	47	22.6	75	22.8	69	22.5	113	22.2	106	19.6	102	21.4	69	20.1
	110-139	323	16.3	9	10.6	16	7.7	47	14.3	56	18.2	88	17.3	107	19.7	92	19.3	67	19.5
	140-169	193	9.7	2	2.4	17	8.2	20	6.1	20	6.5	66	12.9	68	12.5	51	10.7	51	14.8
	170-199	125	6.3	3	3.5	5	2.4	15	4.6	14	4.6	38	7.5	50	9.2	43	9.0	28	8.1
	200mg/dL以上	291	14.7	5	5.9	8	3.8	35	10.6	54	17.6	99	19.4	90	16.6	97	20.3	54	15.7
	150以上(再掲)	538	27.2	9	10.6	23	11.1	60	18.2	82	26.7	181	35.5	183	33.8	175	36.7	114	33.1

注)血清中性脂肪(トリグリセライド)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第 38 表の 2 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	164.0	112.0	57	153.0	134.3	114	169.4	130.3	153	160.3	105.7	165	180.3	143.2	382	171.5	115.1	465	153.4	87.8	406	167.8	109.8	278	149.4	86.0
女性	1,981	127.9	89.6	85	88.9	67.3	208	88.5	53.0	329	111.5	79.2	307	133.6	103.4	510	148.4	107.8	542	136.7	73.2	477	148.9	104.9	344	136.8	75.2

注)血清中性脂肪(トリグリセライド)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)



第38表の3 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布—血清中性脂肪（トリグリセライド）値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,122	100.0	57	100.0	112	100.0	144	100.0	139	100.0	307	100.0	363	100.0	309	100.0	224	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	36	3.2	4	7.0	5	4.5	5	3.5	3	2.2	9	2.9	10	2.8	7	2.3	6	2.7
	50-79	186	16.6	15	26.3	20	17.9	26	18.1	22	15.8	34	11.1	69	19.0	41	13.3	43	19.2
	80-109	202	18.0	7	12.3	17	15.2	27	18.8	25	18.0	64	20.8	62	17.1	62	20.1	41	18.3
	110-139	172	15.3	6	10.5	15	13.4	23	16.0	23	16.5	47	15.3	58	16.0	45	14.6	38	17.0
	140-169	150	13.4	10	17.5	18	16.1	11	7.6	15	10.8	42	13.7	54	14.9	40	12.9	36	16.1
	170-199	94	8.4	5	8.8	7	6.3	15	10.4	14	10.1	25	8.1	28	7.7	28	9.1	14	6.3
	200mg/dL以上	282	25.1	10	17.5	30	26.8	37	25.7	37	26.6	86	28.0	82	22.6	86	27.8	46	20.5
	150以上(再掲)	472	42.1	21	36.8	48	42.9	58	40.3	62	44.6	136	44.3	147	40.5	139	45.0	85	37.9
女性	総数	1,624	100.0	85	100.0	208	100.0	316	100.0	278	100.0	378	100.0	359	100.0	321	100.0	233	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	150	9.2	20	23.5	37	17.8	43	13.6	24	8.6	14	3.7	12	3.3	10	3.1	8	3.4
	50-79	405	24.9	31	36.5	78	37.5	92	29.1	64	23.0	69	18.3	71	19.8	55	17.1	42	18.0
	80-109	356	21.9	15	17.6	47	22.6	74	23.4	65	23.4	88	23.3	67	18.7	72	22.4	47	20.2
	110-139	252	15.5	9	10.6	16	7.7	46	14.6	47	16.9	65	17.2	69	19.2	62	19.3	44	18.9
	140-169	151	9.3	2	2.4	17	8.2	19	6.0	19	6.8	47	12.4	47	13.1	32	10.0	36	15.5
	170-199	99	6.1	3	3.5	5	2.4	13	4.1	13	4.7	29	7.7	36	10.0	30	9.3	22	9.4
	200mg/dL以上	211	13.0	5	5.9	8	3.8	29	9.2	46	16.5	66	17.5	57	15.9	60	18.7	34	14.6
	150以上(再掲)	405	24.9	9	10.6	23	11.1	52	16.5	73	26.3	127	33.6	121	33.7	112	34.9	78	33.5

注)血清中性脂肪(トリグリセライド)値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第38表の4 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,122	160.7	111.4	57	153.0	134.3	112	170.9	130.9	144	156.1	104.1	139	173.2	134.8	307	169.7	117.1	363	148.3	85.2	309	166.2	111.1	224	144.8	86.4
女性	1,624	123.5	89.8	85	88.9	67.3	208	88.5	53.0	316	107.0	73.2	278	132.7	106.2	378	145.2	112.3	359	136.7	71.8	321	147.7	113.8	233	136.3	70.8

注)血清中性脂肪(トリグリセライド)値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第 39 表の 1 血清クレアチニン値の分布—血清クレアチニン値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20 歳以上

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総 数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	278	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	0.50-0.59	18	1.3	1	1.8	4	3.5	1	0.7	2	1.2	4	1.0	6	1.3	3	0.7	4	1.4
	0.60-0.69	129	9.7	5	8.8	11	9.6	18	11.8	14	8.5	38	9.9	43	9.2	37	9.1	29	10.4
	0.70-0.79	334	25.0	16	28.1	39	34.2	41	26.8	45	27.3	101	26.4	92	19.8	96	23.6	52	18.7
	0.80-0.89	383	28.7	20	35.1	38	33.3	62	40.5	57	34.5	103	27.0	103	22.2	109	26.8	57	20.5
	0.90-0.99	240	18.0	9	15.8	14	12.3	19	12.4	28	17.0	78	20.4	92	19.8	85	20.9	50	18.0
	1.00-1.19	164	12.3	6	10.5	7	6.1	11	7.2	14	8.5	40	10.5	86	18.5	50	12.3	55	19.8
	1.20-1.39	38	2.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.2	12	3.1	23	4.9	16	3.9	17	6.1
	1.40-1.59	13	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	4	1.0	7	1.5	7	1.7	3	1.1
	1.60-1.79	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	0.9	2	0.5	3	1.1
	1.80-1.99	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	3	0.6	0	0.0	3	1.1
	2.00mg/dL以上	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.1	1	0.2	4	1.4
女性	総 数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	477	100.0	344	100.0
	0.40mg/dL未満	10	0.5	3	3.5	1	0.5	1	0.3	1	0.3	3	0.6	1	0.2	1	0.2	1	0.3
	0.40-0.49	139	7.0	4	4.7	28	13.5	19	5.8	17	5.5	30	5.9	41	7.6	42	8.8	16	4.7
	0.50-0.59	648	32.7	43	50.6	94	45.2	141	42.9	92	30.0	164	32.2	114	21.0	129	27.0	66	19.2
	0.60-0.69	677	34.2	27	31.8	64	30.8	107	32.5	130	42.3	184	36.1	165	30.4	168	35.2	103	29.9
	0.70-0.79	323	16.3	7	8.2	14	6.7	46	14.0	51	16.6	89	17.5	116	21.4	90	18.9	75	21.8
	0.80-0.89	106	5.4	1	1.2	7	3.4	11	3.3	10	3.3	27	5.3	50	9.2	29	6.1	37	10.8
	0.90-0.99	39	2.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	3	1.0	8	1.6	25	4.6	11	2.3	19	5.5
	1.00-1.19	29	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	5	1.0	21	3.9	5	1.0	20	5.8
	1.20-1.39	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.9	1	0.2	4	1.2
	1.40-1.59	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.3
	1.60-1.79	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3

注)血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第 39 表の 2 血清クレアチニン値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—  
男性・女性, 20 歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	0.9	0.2	57	0.8	0.1	114	0.8	0.1	153	0.8	0.1	165	0.8	0.2	382	0.9	0.2	465	0.9	0.3	406	0.9	0.2	278	0.9	0.3
女性	1,981	0.6	0.2	85	0.6	0.1	208	0.6	0.1	329	0.6	0.1	307	0.6	0.1	510	0.6	0.1	542	0.7	0.3	477	0.6	0.1	344	0.7	0.3

注)血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第40表の1 推算GFRの分布—推算GFRの区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	278	100.0
	15ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	15-30未満	8	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	7	1.5	1	0.2	6	2.2
	30-60未満	240	18.0	0	0.0	2	1.8	4	2.6	10	6.1	66	17.3	158	34.0	94	23.2	104	37.4
	60-90未満	878	65.7	20	35.1	60	52.6	107	69.9	132	80.0	283	74.1	276	59.4	286	70.4	152	54.7
	90ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上	209	15.6	37	64.9	52	45.6	42	27.5	23	13.9	32	8.4	23	4.9	25	6.2	15	5.4
女性	総数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	477	100.0	344	100.0
	15ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	15-30未満	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	4	0.7	2	0.4	2	0.6
	30-60未満	276	13.9	0	0.0	0	0.0	8	2.4	15	4.9	68	13.3	185	34.1	88	18.4	139	40.4
	60-90未満	1,217	61.4	14	16.5	75	36.1	205	62.3	237	77.2	375	73.5	311	57.4	327	68.6	189	54.9
	90ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上	482	24.3	71	83.5	133	63.9	116	35.3	54	17.6	67	13.1	41	7.6	60	12.6	13	3.8

注) 血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

$$\begin{aligned} \text{推算GFR (ml/min/1.73m}^2\text{)} &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dL)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \text{ (男性)} \\ &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dL)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \times 0.739 \text{ (女性)} \end{aligned}$$

注) CKDガイドライン 2009年版の推算式。

第40表の2 推算GFRの平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	74.1	17.2	57	96.9	16.1	114	90.8	15.8	153	82.9	12.2	165	77.2	14.6	382	71.8	13.7	465	65.0	15.2	406	69.0	13.6	278	63.7	16.1
女性	1,981	78.0	18.8	85	107.4	20.1	208	95.7	15.6	329	85.4	14.0	307	77.8	13.3	510	73.9	13.8	542	66.2	17.4	477	72.1	14.5	344	63.1	17.6

注) 血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

$$\begin{aligned} \text{推算GFR (ml/min/1.73m}^2\text{)} &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dL)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \text{ (男性)} \\ &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dL)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \times 0.739 \text{ (女性)} \end{aligned}$$

注) CKDガイドライン 2009年版の推算式。

第 41 表の 1 血清鉄の分布—血清鉄の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20 歳以上  
[貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	278	100.0
	40 $\mu$ g/dL未満	28	2.1	1	1.8	2	1.8	1	0.7	2	1.2	9	2.4	13	2.8	9	2.2	8	2.9
	40-59	178	13.3	4	7.0	11	9.6	18	11.8	22	13.3	39	10.2	84	18.1	53	13.1	55	19.8
	60-79	290	21.7	15	26.3	23	20.2	35	22.9	20	12.1	77	20.2	120	25.8	84	20.7	78	28.1
	80-99	330	24.7	11	19.3	25	21.9	36	23.5	49	29.7	96	25.1	113	24.3	96	23.6	71	25.5
	100-119	254	19.0	15	26.3	25	21.9	31	20.3	38	23.0	74	19.4	71	15.3	85	20.9	32	11.5
	120-139	134	10.0	4	7.0	15	13.2	19	12.4	18	10.9	41	10.7	37	8.0	37	9.1	24	8.6
	140-159	66	4.9	5	8.8	10	8.8	8	5.2	9	5.5	18	4.7	16	3.4	21	5.2	5	1.8
	160-179	27	2.0	1	1.8	2	1.8	2	1.3	3	1.8	12	3.1	7	1.5	11	2.7	4	1.4
	180-199	14	1.0	1	1.8	1	0.9	1	0.7	2	1.2	7	1.8	2	0.4	4	1.0	1	0.4
	200 $\mu$ g/dL以上	15	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.2	9	2.4	2	0.4	6	1.5	0	0.0
女性	総数	1,979	100.0	85	100.0	207	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	541	100.0	477	100.0	343	100.0
	40 $\mu$ g/dL未満	199	10.1	16	18.8	40	19.3	69	21.0	17	5.5	18	3.5	39	7.2	25	5.2	25	7.3
	40-59	376	19.0	14	16.5	35	16.9	62	18.8	45	14.7	94	18.4	126	23.3	101	21.2	80	23.3
	60-79	619	31.3	27	31.8	53	25.6	73	22.2	100	32.6	182	35.7	184	34.0	163	34.2	117	34.1
	80-99	440	22.2	10	11.8	39	18.8	55	16.7	81	26.4	129	25.3	126	23.3	119	24.9	78	22.7
	100-119	188	9.5	11	12.9	23	11.1	39	11.9	25	8.1	53	10.4	37	6.8	41	8.6	23	6.7
	120-139	104	5.3	4	4.7	9	4.3	14	4.3	28	9.1	28	5.5	21	3.9	23	4.8	14	4.1
	140-159	31	1.6	1	1.2	6	2.9	10	3.0	6	2.0	4	0.8	4	0.7	3	0.6	3	0.9
	160-179	14	0.7	2	2.4	2	1.0	2	0.6	4	1.3	2	0.4	2	0.4	2	0.4	1	0.3
	180-199	5	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.9	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	200 $\mu$ g/dL以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3

注)血清鉄の測定を行った 20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第 41 表の 2 血清鉄の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

( $\mu$  g/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	93.8	35.0	57	96.2	32.3	114	98.7	31.4	153	95.6	34.4	165	97.5	33.2	382	99.2	39.8	465	86.0	31.2	406	95.0	35.9	278	83.0	28.6
女性	1,979	75.0	29.9	85	71.7	33.5	207	70.5	34.7	329	71.9	37.9	307	81.2	29.6	510	78.0	24.2	541	72.7	25.9	477	75.4	24.2	343	72.7	27.0

注)血清鉄の測定を行った 20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第41表の3 血清鉄の分布—血清鉄の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,321	100.0	57	100.0	113	100.0	153	100.0	164	100.0	379	100.0	455	100.0	401	100.0	272	100.0
	40 $\mu$ g/dL未満	27	2.0	1	1.8	2	1.8	1	0.7	2	1.2	8	2.1	13	2.9	8	2.0	8	2.9
	40-59	176	13.3	4	7.0	11	9.7	18	11.8	22	13.4	39	10.3	82	18.0	52	13.0	54	19.9
	60-79	285	21.6	15	26.3	22	19.5	35	22.9	20	12.2	76	20.1	117	25.7	83	20.7	76	27.9
	80-99	328	24.8	11	19.3	25	22.1	36	23.5	49	29.9	96	25.3	111	24.4	96	23.9	69	25.4
	100-119	252	19.1	15	26.3	25	22.1	31	20.3	37	22.6	73	19.3	71	15.6	85	21.2	32	11.8
	120-139	133	10.1	4	7.0	15	13.3	19	12.4	18	11.0	41	10.8	36	7.9	37	9.2	23	8.5
	140-159	65	4.9	5	8.8	10	8.8	8	5.2	9	5.5	18	4.7	15	3.3	20	5.0	5	1.8
	160-179	26	2.0	1	1.8	2	1.8	2	1.3	3	1.8	12	3.2	6	1.3	10	2.5	4	1.5
	180-199	14	1.1	1	1.8	1	0.9	1	0.7	2	1.2	7	1.8	2	0.4	4	1.0	1	0.4
	200 $\mu$ g/dL以上	15	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.2	9	2.4	2	0.4	6	1.5	0	0.0
女性	総数	1,944	100.0	85	100.0	203	100.0	314	100.0	304	100.0	509	100.0	529	100.0	473	100.0	334	100.0
	40 $\mu$ g/dL未満	192	9.9	16	18.8	39	19.2	64	20.4	17	5.6	18	3.5	38	7.2	25	5.3	24	7.2
	40-59	366	18.8	14	16.5	33	16.3	57	18.2	44	14.5	94	18.5	124	23.4	100	21.1	79	23.7
	60-79	613	31.5	27	31.8	53	26.1	71	22.6	99	32.6	182	35.8	181	34.2	162	34.2	115	34.4
	80-99	435	22.4	10	11.8	39	19.2	54	17.2	81	26.6	128	25.1	123	23.3	118	24.9	75	22.5
	100-119	185	9.5	11	12.9	22	10.8	39	12.4	24	7.9	53	10.4	36	6.8	40	8.5	23	6.9
	120-139	103	5.3	4	4.7	9	4.4	14	4.5	28	9.2	28	5.5	20	3.8	23	4.9	13	3.9
	140-159	29	1.5	1	1.2	6	3.0	8	2.5	6	2.0	4	0.8	4	0.8	3	0.6	3	0.9
	160-179	14	0.7	2	2.4	2	1.0	2	0.6	4	1.3	2	0.4	2	0.4	2	0.4	1	0.3
	180-199	4	0.2	0	0.0	0	0.0	3	1.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 $\mu$ g/dL以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3

注)血清鉄の測定を行い, 身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第41表の4 血清鉄の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,321	93.9	35.0	57	96.2	32.3	113	99.0	31.5	153	95.6	34.4	164	97.4	33.3	379	99.3	39.8	455	85.9	31.1	401	95.0	35.6	272	82.9	28.7
女性	1,944	75.1	29.7	85	71.7	33.5	203	70.8	34.5	314	72.5	37.8	304	81.3	29.7	509	78.0	24.2	529	72.4	25.4	473	75.4	24.2	334	72.2	26.2

注)血清鉄の測定を行い, 身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第 42 表の 1 総鉄結合能 (TIBC) の分布—総鉄結合能の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	278	100.0
	200 $\mu$ g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	200-249	31	2.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.2	6	1.6	22	4.7	8	2.0	18	6.5
	250-299	349	26.1	11	19.3	22	19.3	19	12.4	35	21.2	97	25.4	165	35.5	128	31.5	100	36.0
	300-349	590	44.2	34	59.6	51	44.7	76	49.7	66	40.0	189	49.5	174	37.4	175	43.1	102	36.7
	350-399	304	22.8	10	17.5	38	33.3	52	34.0	51	30.9	73	19.1	80	17.2	74	18.2	44	15.8
	400-449	49	3.7	2	3.5	1	0.9	5	3.3	8	4.8	12	3.1	21	4.5	15	3.7	12	4.3
	450-499	11	0.8	0	0.0	1	0.9	1	0.7	2	1.2	5	1.3	2	0.4	6	1.5	1	0.4
	500 $\mu$ g/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	1,979	100.0	85	100.0	207	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	541	100.0	477	100.0	343	100.0
	200 $\mu$ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	26	1.3	0	0.0	2	1.0	3	0.9	0	0.0	7	1.4	14	2.6	8	1.7	10	2.9
	250-299	387	19.6	7	8.2	19	9.2	39	11.9	54	17.6	127	24.9	141	26.1	129	27.0	91	26.5
	300-349	870	44.0	33	38.8	74	35.7	111	33.7	148	48.2	253	49.6	251	46.4	232	48.6	152	44.3
	350-399	455	23.0	23	27.1	73	35.3	89	27.1	75	24.4	97	19.0	98	18.1	78	16.4	65	19.0
	400-449	174	8.8	17	20.0	29	14.0	59	17.9	24	7.8	20	3.9	25	4.6	19	4.0	19	5.5
	450-499	59	3.0	4	4.7	7	3.4	26	7.9	4	1.3	6	1.2	12	2.2	11	2.3	6	1.7
	500 $\mu$ g/dL以上	8	0.4	1	1.2	3	1.4	2	0.6	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 総鉄結合能(TIBC)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第 42 表の 2 総鉄結合能 (TIBC) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

( $\mu$  g/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	325.0	42.5	57	324.7	34.3	114	332.2	38.9	153	339.1	35.9	165	337.4	43.9	382	324.6	40.8	465	314.6	44.4	406	321.2	42.4	278	311.6	45.4
女性	1,979	339.4	50.1	85	361.6	53.1	207	360.4	52.5	329	363.3	57.1	307	337.9	46.0	510	326.2	40.2	541	326.6	45.4	477	325.2	44.1	343	326.6	45.8

注) 総鉄結合能(TIBC)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第42表の3 総鉄結合能（TIBC）の分布—総鉄結合能の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔貧血治療のための薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,321	100.0	57	100.0	113	100.0	153	100.0	164	100.0	379	100.0	455	100.0	401	100.0	272	100.0
	200 $\mu$ g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	200-249	30	2.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.2	6	1.6	21	4.6	7	1.7	18	6.6
	250-299	346	26.2	11	19.3	21	18.6	19	12.4	35	21.3	97	25.6	163	35.8	127	31.7	99	36.4
	300-349	586	44.4	34	59.6	51	45.1	76	49.7	66	40.2	187	49.3	172	37.8	174	43.4	100	36.8
	350-399	298	22.6	10	17.5	38	33.6	52	34.0	50	30.5	72	19.0	76	16.7	73	18.2	41	15.1
	400-449	48	3.6	2	3.5	1	0.9	5	3.3	8	4.9	12	3.2	20	4.4	14	3.5	12	4.4
	450-499	11	0.8	0	0.0	1	0.9	1	0.7	2	1.2	5	1.3	2	0.4	6	1.5	1	0.4
	500 $\mu$ g/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	1,944	100.0	85	100.0	203	100.0	314	100.0	304	100.0	509	100.0	529	100.0	473	100.0	334	100.0
	200 $\mu$ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	24	1.2	0	0.0	2	1.0	2	0.6	0	0.0	7	1.4	13	2.5	8	1.7	9	2.7
	250-299	381	19.6	7	8.2	18	8.9	38	12.1	54	17.8	127	25.0	137	25.9	128	27.1	88	26.3
	300-349	857	44.1	33	38.8	73	36.0	106	33.8	146	48.0	253	49.7	246	46.5	230	48.6	149	44.6
	350-399	447	23.0	23	27.1	72	35.5	83	26.4	74	24.3	97	19.1	98	18.5	78	16.5	65	19.5
	400-449	169	8.7	17	20.0	28	13.8	58	18.5	24	7.9	19	3.7	23	4.3	18	3.8	17	5.1
	450-499	59	3.0	4	4.7	7	3.4	26	8.3	4	1.3	6	1.2	12	2.3	11	2.3	6	1.8
	500 $\mu$ g/dL以上	7	0.4	1	1.2	3	1.5	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 総鉄結合能(TIBC)の測定を行い，身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)

第42表の4 総鉄結合能（TIBC）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔貧血治療のための薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,321	324.9	42.4	57	324.7	34.3	113	332.8	38.6	153	339.1	35.9	164	337.2	44.0	379	324.5	40.9	455	314.1	43.9	401	321.2	42.0	272	310.8	45.3
女性	1,944	339.3	49.9	85	361.6	53.1	203	360.7	52.2	314	363.6	56.9	304	337.9	46.2	509	326.0	40.1	529	326.6	45.3	473	325.1	44.1	334	326.6	45.4

注) 総鉄結合能(TIBC)の測定を行い，身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(27年)



第43表の1 AST (GOT) の分布—AST (GOT) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	278	100.0
女性	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	336	25.1	24	42.1	33	28.9	49	32.0	48	29.1	96	25.1	86	18.5	90	22.2	53	19.1
	20-29	694	51.9	23	40.4	66	57.9	67	43.8	76	46.1	192	50.3	270	58.1	219	53.9	155	55.8
	30-39	227	17.0	7	12.3	12	10.5	25	16.3	34	20.6	70	18.3	79	17.0	69	17.0	54	19.4
	40-49	36	2.7	2	3.5	1	0.9	2	1.3	3	1.8	10	2.6	18	3.9	13	3.2	10	3.6
50IU/L以上	43	3.2	1	1.8	2	1.8	10	6.5	4	2.4	14	3.7	12	2.6	15	3.7	6	2.2	
女性	総数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	477	100.0	344	100.0
男性	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	735	37.1	64	75.3	155	74.5	199	60.5	101	32.9	121	23.7	95	17.5	103	21.6	55	16.0
	20-29	1,043	52.7	19	22.4	47	22.6	111	33.7	175	57.0	329	64.5	362	66.8	311	65.2	228	66.3
	30-39	142	7.2	2	2.4	4	1.9	13	4.0	18	5.9	39	7.6	66	12.2	43	9.0	48	14.0
	40-49	38	1.9	0	0.0	0	0.0	3	0.9	7	2.3	13	2.5	15	2.8	12	2.5	11	3.2
50IU/L以上	23	1.2	0	0.0	2	1.0	3	0.9	6	2.0	8	1.6	4	0.7	8	1.7	2	0.6	

注) AST(GOT)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第43表の2 AST (GOT) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

(IU/L)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	26.2	14.1	57	23.0	8.3	114	23.5	7.6	153	27.3	19.6	165	26.1	19.0	382	26.7	15.1	465	26.4	10.4	406	26.8	12.9	278	26.1	8.4
女性	1,981	22.6	8.7	85	17.8	4.9	208	18.1	5.9	329	20.3	9.0	307	23.2	9.6	510	24.1	9.3	542	24.7	7.3	477	24.4	9.9	344	25.0	6.7

注) AST(GOT)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第44表の1 ALT (GPT) の分布—ALT (GPT) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	278	100.0
女性	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	23	1.7	2	3.5	2	1.8	1	0.7	3	1.8	1	0.3	14	3.0	6	1.5	8	2.9
	10-19	555	41.5	22	38.6	40	35.1	47	30.7	64	38.8	155	40.6	227	48.8	170	41.9	146	52.5
	20-29	429	32.1	11	19.3	34	29.8	49	32.0	48	29.1	135	35.3	152	32.7	145	35.7	83	29.9
	30-39	162	12.1	9	15.8	16	14.0	25	16.3	21	12.7	47	12.3	44	9.5	49	12.1	24	8.6
	40-49	71	5.3	4	7.0	8	7.0	10	6.5	16	9.7	20	5.2	13	2.8	15	3.7	8	2.9
50IU/L以上	96	7.2	9	15.8	14	12.3	21	13.7	13	7.9	24	6.3	15	3.2	21	5.2	9	3.2	
女性	総数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	477	100.0	344	100.0
男性	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	135	6.8	25	29.4	43	20.7	24	7.3	9	2.9	12	2.4	22	4.1	15	3.1	14	4.1
	10-19	1,215	61.3	46	54.1	142	68.3	218	66.3	186	60.6	286	56.1	337	62.2	267	56.0	226	65.7
	20-29	448	22.6	10	11.8	15	7.2	59	17.9	65	21.2	151	29.6	148	27.3	150	31.4	83	24.1
	30-39	98	4.9	1	1.2	4	1.9	15	4.6	27	8.8	33	6.5	18	3.3	24	5.0	11	3.2
	40-49	44	2.2	2	2.4	3	1.4	7	2.1	11	3.6	12	2.4	9	1.7	6	1.3	6	1.7
50IU/L以上	41	2.1	1	1.2	1	0.5	6	1.8	9	2.9	16	3.1	8	1.5	15	3.1	4	1.2	

注) ALT(GPT)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第44表の2 ALT (GPT) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

(IU/L)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	25.9	17.7	57	31.6	22.4	114	29.5	20.6	153	33.4	28.1	165	27.4	18.3	382	25.3	13.7	465	21.8	12.5	406	24.3	13.6	278	21.4	12.3
女性	1,981	18.9	12.2	85	14.4	8.7	208	14.1	7.5	329	18.2	14.5	307	21.4	16.9	510	20.7	12.0	542	18.6	8.4	477	20.5	11.9	344	17.9	7.5

注) ALT(GPT)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第45表の1  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) の分布— $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	278	100.0
	10IU/L未満	5	0.4	2	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	3	1.1
	10-19	306	22.9	19	33.3	28	24.6	28	18.3	27	16.4	78	20.4	126	27.1	89	21.9	82	29.5
	20-29	337	25.2	14	24.6	30	26.3	42	27.5	33	20.0	88	23.0	130	28.0	97	23.9	83	29.9
	30-39	217	16.2	8	14.0	14	12.3	21	13.7	30	18.2	61	16.0	83	17.8	73	18.0	49	17.6
	40-49	118	8.8	3	5.3	11	9.6	12	7.8	24	14.5	38	9.9	30	6.5	34	8.4	17	6.1
	50-59	90	6.7	5	8.8	10	8.8	15	9.8	13	7.9	20	5.2	27	5.8	21	5.2	15	5.4
	60-69	51	3.8	2	3.5	6	5.3	5	3.3	10	6.1	18	4.7	10	2.2	17	4.2	5	1.8
	70-79	38	2.8	1	1.8	4	3.5	5	3.3	6	3.6	13	3.4	9	1.9	13	3.2	4	1.4
	80IU/L以上	174	13.0	3	5.3	11	9.6	25	16.3	22	13.3	66	17.3	47	10.1	62	15.3	20	7.2
女性	総数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	477	100.0	344	100.0
	10IU/L未満	70	3.5	11	12.9	23	11.1	8	2.4	12	3.9	6	1.2	10	1.8	7	1.5	5	1.5
	10-19	1,123	56.7	63	74.1	152	73.1	198	60.2	142	46.3	260	51.0	308	56.8	237	49.7	213	61.9
	20-29	401	20.2	7	8.2	18	8.7	64	19.5	77	25.1	114	22.4	121	22.3	111	23.3	71	20.6
	30-39	159	8.0	4	4.7	7	3.4	26	7.9	29	9.4	51	10.0	42	7.7	45	9.4	23	6.7
	40-49	77	3.9	0	0.0	2	1.0	12	3.6	14	4.6	28	5.5	21	3.9	27	5.7	11	3.2
	50-59	56	2.8	0	0.0	1	0.5	8	2.4	16	5.2	14	2.7	17	3.1	18	3.8	9	2.6
	60-69	22	1.1	0	0.0	2	1.0	3	0.9	1	0.3	8	1.6	8	1.5	8	1.7	4	1.2
	70-79	19	1.0	0	0.0	2	1.0	1	0.3	4	1.3	5	1.0	7	1.3	8	1.7	3	0.9
	80IU/L以上	54	2.7	0	0.0	1	0.5	9	2.7	12	3.9	24	4.7	8	1.5	16	3.4	5	1.5

注)  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第45表の2  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—  
男性・女性, 20歳以上

(IU/L)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	48.5	66.5	57	30.8	21.2	114	38.4	25.0	153	52.2	60.8	165	58.1	89.2	382	55.9	72.4	465	42.4	63.4	406	52.9	75.0	278	34.6	32.7
女性	1,981	24.3	26.9	85	14.3	6.0	208	17.7	24.9	329	22.9	21.0	307	27.4	28.7	510	28.7	36.5	542	23.4	19.3	477	27.8	35.3	344	22.7	20.8

注)  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第 46 表の 1 血清尿酸値の分布—血清尿酸値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男 性	総 数	1,336	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	165	100.0	382	100.0	465	100.0	406	100.0	278	100.0
	2.0mg/dL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	2.0-2.9	10	0.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.6	2	0.5	6	1.3	3	0.7	4	1.4
	3.0-3.9	76	5.7	0	0.0	5	4.4	8	5.2	8	4.8	23	6.0	32	6.9	22	5.4	24	8.6
	4.0-4.9	217	16.2	11	19.3	15	13.2	19	12.4	27	16.4	71	18.6	74	15.9	70	17.2	49	17.6
	5.0-5.9	401	30.0	19	33.3	27	23.7	50	32.7	54	32.7	105	27.5	146	31.4	119	29.3	84	30.2
	6.0-6.9	381	28.5	15	26.3	37	32.5	46	30.1	40	24.2	110	28.8	133	28.6	118	29.1	75	27.0
	7.0-7.9	171	12.8	10	17.5	19	16.7	16	10.5	26	15.8	52	13.6	48	10.3	53	13.1	26	9.4
	8.0-8.9	59	4.4	1	1.8	7	6.1	13	8.5	6	3.6	13	3.4	19	4.1	15	3.7	13	4.7
	9.0-9.9	12	0.9	0	0.0	3	2.6	1	0.7	2	1.2	2	0.5	4	0.9	3	0.7	1	0.4
	10mg/dL以上	7	0.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	3	0.6	2	0.5	2	0.7
女 性	総 数	1,981	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	307	100.0	510	100.0	542	100.0	477	100.0	344	100.0
	2.0mg/dL未満	5	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.3	1	0.3	0	0.0	2	0.4	0	0.0	2	0.6
	2.0-2.9	89	4.5	5	5.9	21	10.1	22	6.7	14	4.6	16	3.1	11	2.0	14	2.9	6	1.7
	3.0-3.9	516	26.0	24	28.2	85	40.9	127	38.6	73	23.8	100	19.6	107	19.7	88	18.4	69	20.1
	4.0-4.9	748	37.8	36	42.4	73	35.1	115	35.0	125	40.7	209	41.0	190	35.1	183	38.4	119	34.6
	5.0-5.9	434	21.9	17	20.0	25	12.0	55	16.7	62	20.2	130	25.5	145	26.8	130	27.3	88	25.6
	6.0-6.9	137	6.9	3	3.5	3	1.4	8	2.4	22	7.2	42	8.2	59	10.9	43	9.0	42	12.2
	7.0-7.9	44	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	7	2.3	11	2.2	25	4.6	18	3.8	15	4.4
	8.0-8.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.4	1	0.2	2	0.6
	9.0-9.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注)血清尿酸値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第 46 表の 2 血清尿酸値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,336	5.9	1.3	57	6.1	1.2	114	6.1	1.3	153	6.0	1.3	165	5.9	1.3	382	5.9	1.3	465	5.8	1.3	406	5.9	1.3	278	5.7	1.4
女性	1,981	4.5	1.1	85	4.3	0.8	208	4.0	0.9	329	4.2	0.9	307	4.6	1.1	510	4.7	1.0	542	4.9	1.2	477	4.8	1.1	344	4.9	1.2

注)血清尿酸値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(27年)

第47表 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況-メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑い、年齢階級別、人数、割合-総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	3,268	100.0	136	100.0	308	100.0	475	100.0	470	100.0	887	100.0	992	100.0	2,213	100.0	876	100.0	611	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	588	18.0	3	2.2	9	2.9	28	5.9	75	16.0	194	21.9	279	28.1	397	17.9	235	26.8	179	29.3
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	443	13.6	11	8.1	26	8.4	65	13.7	65	13.8	138	15.6	138	13.9	323	14.6	126	14.4	83	13.6
上記以外	2,237	68.5	122	89.7	273	88.6	382	80.4	330	70.2	555	62.6	575	58.0	1,493	67.5	515	58.8	349	57.1
総数	1,319	100.0	56	100.0	111	100.0	149	100.0	164	100.0	379	100.0	460	100.0	878	100.0	403	100.0	274	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	382	29.0	3	5.4	9	8.1	16	10.7	45	27.4	134	35.4	175	38.0	259	29.5	156	38.7	111	40.5
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	291	22.1	8	14.3	24	21.6	42	28.2	40	24.4	94	24.8	83	18.0	215	24.5	86	21.3	44	16.1
上記以外	646	49.0	45	80.4	78	70.3	91	61.1	79	48.2	151	39.8	202	43.9	404	46.0	161	40.0	119	43.4
総数	1,949	100.0	80	100.0	197	100.0	326	100.0	306	100.0	508	100.0	532	100.0	1,335	100.0	473	100.0	337	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	206	10.6	0	0.0	0	0.0	12	3.7	30	9.8	60	11.8	104	19.5	138	10.3	79	16.7	68	20.2
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	152	7.8	3	3.8	2	1.0	23	7.1	25	8.2	44	8.7	55	10.3	108	8.1	40	8.5	39	11.6
上記以外	1,591	81.6	77	96.3	195	99.0	291	89.3	251	82.0	404	79.5	373	70.1	1,089	81.6	354	74.8	230	68.2

注1) 血圧、腹囲、ヘモグロビンA1c、血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬、インスリン注射または血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬の服用状況にすべて回答した20歳以上の者を集計対象とした。なお、女性には妊婦3名(20-29歳の1名と30-39歳の2名)を除外した。

注2) 判定基準はp.16参照。

(27年)

第48表の1 腹囲区分別，血中脂質，血圧，血糖のいずれかのリスクを有する者の割合－年齢階級，腹囲の区分，血中脂質・血圧・血糖のリスク保有数別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除外〕

	腹囲(cm)	総数		リスク保有数								
		人数	%	0		1つ		2つ		3つ		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	<85cm(男)/90cm(女)	2,077	100.0	865	41.6	759	36.5	340	16.4	113	5.4	
	≥85cm(男)/90cm(女)	1,191	100.0	160	13.4	443	37.2	373	31.3	215	18.1	
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	107	100.0	102	95.3	5	4.7	0	0.0	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	29	100.0	15	51.7	11	37.9	3	10.3	0	0.0
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	240	100.0	198	82.5	42	17.5	0	0.0	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	68	100.0	33	48.5	26	38.2	7	10.3	2	2.9
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	343	100.0	235	68.5	91	26.5	16	4.7	1	0.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	132	100.0	39	29.5	65	49.2	21	15.9	7	5.3
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	303	100.0	125	41.3	145	47.9	29	9.6	4	1.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	167	100.0	27	16.2	65	38.9	59	35.3	16	9.6
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	530	100.0	138	26.0	227	42.8	129	24.3	36	6.8
		≥85cm(男)/90cm(女)	357	100.0	25	7.0	138	38.7	119	33.3	75	21.0
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	554	100.0	67	12.1	249	44.9	166	30.0	72	13.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	438	100.0	21	4.8	138	31.5	164	37.4	115	26.3
	(再掲)40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,394	100.0	529	37.9	551	39.5	241	17.3	73	5.2
	≥85cm(男)/90cm(女)	819	100.0	99	12.1	323	39.4	254	31.0	143	17.5	
(再掲)65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	497	100.0	95	19.1	203	40.8	138	27.8	61	12.3	
	≥85cm(男)/90cm(女)	379	100.0	18	4.7	126	33.2	137	36.1	98	25.9	
(再掲)75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	336	100.0	36	10.7	161	47.9	99	29.5	40	11.9	
	≥85cm(男)/90cm(女)	275	100.0	13	4.7	83	30.2	109	39.6	70	25.5	
男性	<85cm	549	100.0	181	33.0	232	42.3	104	18.9	32	5.8	
	≥85cm	770	100.0	97	12.6	291	37.8	244	31.7	138	17.9	
	20-29歳	<85cm	31	100.0	28	90.3	3	9.7	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	25	100.0	14	56.0	8	32.0	3	12.0	0	0.0
	30-39歳	<85cm	57	100.0	41	71.9	16	28.1	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	54	100.0	21	38.9	24	44.4	7	13.0	2	3.7
	40-49歳	<85cm	69	100.0	40	58.0	28	40.6	1	1.4	0	0.0
		≥85cm	80	100.0	22	27.5	42	52.5	10	12.5	6	7.5
	50-59歳	<85cm	62	100.0	18	29.0	35	56.5	7	11.3	2	3.2
		≥85cm	102	100.0	17	16.7	40	39.2	34	33.3	11	10.8
	60-69歳	<85cm	139	100.0	28	20.1	63	45.3	42	30.2	6	4.3
		≥85cm	240	100.0	12	5.0	94	39.2	87	36.3	47	19.6
	70歳以上	<85cm	191	100.0	26	13.6	87	45.5	54	28.3	24	12.6
		≥85cm	269	100.0	11	4.1	83	30.9	103	38.3	72	26.8
	(再掲)40-74歳	<85cm	348	100.0	97	27.9	158	45.4	75	21.6	18	5.2
	≥85cm	530	100.0	56	10.6	215	40.6	166	31.3	93	17.5	
(再掲)65-74歳	<85cm	151	100.0	26	17.2	61	40.4	51	33.8	13	8.6	
	≥85cm	252	100.0	10	4.0	86	34.1	95	37.7	61	24.2	
(再掲)75歳以上	<85cm	113	100.0	15	13.3	55	48.7	29	25.7	14	12.4	
	≥85cm	161	100.0	6	3.7	44	27.3	68	42.2	43	26.7	
女性	<90cm	1,528	100.0	684	44.8	527	34.5	236	15.4	81	5.3	
	≥90cm	421	100.0	63	15.0	152	36.1	129	30.6	77	18.3	
	20-29歳	<90cm	76	100.0	74	97.4	2	2.6	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	4	100.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	<90cm	183	100.0	157	85.8	26	14.2	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	14	100.0	12	85.7	2	14.3	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	<90cm	274	100.0	195	71.2	63	23.0	15	5.5	1	0.4
		≥90cm	52	100.0	17	32.7	23	44.2	11	21.2	1	1.9
	50-59歳	<90cm	241	100.0	107	44.4	110	45.6	22	9.1	2	0.8
		≥90cm	65	100.0	10	15.4	25	38.5	25	38.5	5	7.7
	60-69歳	<90cm	391	100.0	110	28.1	164	41.9	87	22.3	30	7.7
		≥90cm	117	100.0	13	11.1	44	37.6	32	27.4	28	23.9
	70歳以上	<90cm	363	100.0	41	11.3	162	44.6	112	30.9	48	13.2
		≥90cm	169	100.0	10	5.9	55	32.5	61	36.1	43	25.4
	(再掲)40-74歳	<90cm	1,046	100.0	432	41.3	393	37.6	166	15.9	55	5.3
	≥90cm	289	100.0	43	14.9	108	37.4	88	30.4	50	17.3	
(再掲)65-74歳	<90cm	346	100.0	69	19.9	142	41.0	87	25.1	48	13.9	
	≥90cm	127	100.0	8	6.3	40	31.5	42	33.1	37	29.1	
(再掲)75歳以上	<90cm	223	100.0	21	9.4	106	47.5	70	31.4	26	11.7	
	≥90cm	114	100.0	7	6.1	39	34.2	41	36.0	27	23.7	

注1)血圧，腹囲，ヘモグロビンA1c，血清HDLコレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診において血圧を下げる薬，(27年)  
 インスリン注射または血糖を下げる薬，コレステロールを下げる薬，中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況

にすべて回答した20歳以上の者を集計対象とした。なお，女性は妊婦3名(20-29歳の1名と30-39歳の2名)を除外した。

注2)リスクの項目の基準はp.16参照。

第48表の2 腹囲区別, 血中脂質, 血圧, 血糖のリスクの保有状況〔すべての組み合わせ(①血中脂質②血圧③血糖)一年齢階級, 腹囲の区分, 血中脂質・血圧・血糖のリスク保有組合せ別, 人数, 割合-全国, 総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	腹囲(cm)	総数		リスク保有組み合わせ																
				①有②有③有		①有②有③無		①無②有③有		①有②無③有		①有②無③無		①無②有③無		①無②無③有		①無②無③無		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	<85cm(男)/90cm(女)	2,077	100.0	113	5.4	134	6.5	172	8.3	34	1.6	60	2.9	605	29.1	94	4.5	865	41.6	
	≥85cm(男)/90cm(女)	1,191	100.0	215	18.1	137	11.5	214	18.0	22	1.8	25	2.1	376	31.6	42	3.5	160	13.4	
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	107	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.7	0	0.0	102	95.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	29	100.0	0	0.0	2	6.9	1	3.4	0	0.0	2	6.9	8	27.6	1	3.4	15	51.7
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	240	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.1	30	12.5	7	2.9	198	82.5
		≥85cm(男)/90cm(女)	68	100.0	2	2.9	6	8.8	1	1.5	0	0.0	5	7.4	20	29.4	1	1.5	33	48.5
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	343	100.0	1	0.3	6	1.7	7	2.0	3	0.9	5	1.5	70	20.4	16	4.7	235	68.5
		≥85cm(男)/90cm(女)	132	100.0	7	5.3	7	5.3	13	9.8	1	0.8	4	3.0	57	43.2	4	3.0	39	29.5
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	303	100.0	4	1.3	11	3.6	12	4.0	6	2.0	8	2.6	118	38.9	19	6.3	125	41.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	167	100.0	16	9.6	19	11.4	37	22.2	3	1.8	2	1.2	53	31.7	10	6.0	27	16.2
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	530	100.0	36	6.8	47	8.9	70	13.2	12	2.3	22	4.2	178	33.6	27	5.1	138	26.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	357	100.0	75	21.0	43	12.0	67	18.8	9	2.5	7	2.0	118	33.1	13	3.6	25	7.0
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	554	100.0	72	13.0	70	12.6	83	15.0	13	2.3	20	3.6	204	36.8	25	4.5	67	12.1
		≥85cm(男)/90cm(女)	438	100.0	115	26.3	60	13.7	95	21.7	9	2.1	5	1.1	120	27.4	13	3.0	21	4.8
(再掲) 40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,394	100.0	73	5.2	90	6.5	126	9.0	25	1.8	44	3.2	435	31.2	72	5.2	529	37.9	
	≥85cm(男)/90cm(女)	819	100.0	143	17.5	92	11.2	144	17.6	18	2.2	15	1.8	277	33.8	31	3.8	99	12.1	
(再掲) 65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	497	100.0	61	12.3	54	10.9	73	14.7	11	2.2	18	3.6	157	31.6	28	5.6	95	19.1	
	≥85cm(男)/90cm(女)	379	100.0	98	25.9	51	13.5	76	20.1	10	2.6	7	1.8	109	28.8	10	2.6	18	4.7	
(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	336	100.0	40	11.9	44	13.1	46	13.7	9	2.7	11	3.3	135	40.2	15	4.5	36	10.7	
	≥85cm(男)/90cm(女)	275	100.0	70	25.5	37	13.5	68	24.7	4	1.5	3	1.1	71	25.8	9	3.3	13	4.7	
男性	総数	<85cm	549	100.0	32	5.8	28	5.1	65	11.8	11	2.0	13	2.4	199	36.2	20	3.6	181	33.0
		≥85cm	770	100.0	138	17.9	86	11.2	139	18.1	19	2.5	18	2.3	255	33.1	18	2.3	97	12.6
	20-29歳	<85cm	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.7	0	0.0	28	90.3
		≥85cm	25	100.0	0	0.0	2	8.0	1	4.0	0	0.0	2	8.0	5	20.0	1	4.0	14	56.0
	30-39歳	<85cm	57	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.3	13	22.8	0	0.0	41	71.9
		≥85cm	54	100.0	2	3.7	6	11.1	1	1.9	0	0.0	5	9.3	19	35.2	0	0.0	21	38.9
	40-49歳	<85cm	69	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	2	2.9	24	34.8	2	2.9	40	58.0
		≥85cm	80	100.0	6	7.5	3	3.8	6	7.5	1	1.3	2	2.5	39	48.8	1	1.3	22	27.5
	50-59歳	<85cm	62	100.0	2	3.2	3	4.8	2	3.2	2	3.2	3	4.8	31	50.0	1	1.6	18	29.0
		≥85cm	102	100.0	11	10.8	11	10.8	21	20.6	2	2.0	1	1.0	33	32.4	6	5.9	17	16.7
	60-69歳	<85cm	139	100.0	6	4.3	9	6.5	31	22.3	2	1.4	2	1.4	53	38.1	8	5.8	28	20.1
		≥85cm	240	100.0	47	19.6	32	13.3	47	19.6	8	3.3	5	2.1	84	35.0	5	2.1	12	5.0
	70歳以上	<85cm	191	100.0	24	12.6	16	8.4	31	16.2	7	3.7	3	1.6	75	39.3	9	4.7	26	13.6
		≥85cm	269	100.0	72	26.8	32	11.9	63	23.4	8	3.0	3	1.1	75	27.9	5	1.9	11	4.1
(再掲) 40-74歳	<85cm	348	100.0	18	5.2	18	5.2	50	14.4	7	2.0	7	2.0	137	39.4	14	4.0	97	27.9	
	≥85cm	530	100.0	93	17.5	58	10.9	92	17.4	16	3.0	10	1.9	191	36.0	14	2.6	56	10.6	
(再掲) 65-74歳	<85cm	151	100.0	13	8.6	12	7.9	34	22.5	5	3.3	2	1.3	53	35.1	6	4.0	26	17.2	
	≥85cm	252	100.0	61	24.2	32	12.7	53	21.0	10	4.0	5	2.0	78	31.0	3	1.2	10	4.0	
(再掲) 75歳以上	<85cm	113	100.0	14	12.4	10	8.8	15	13.3	4	3.5	3	2.7	46	40.7	6	5.3	15	13.3	
	≥85cm	161	100.0	43	26.7	20	12.4	45	28.0	3	1.9	1	0.6	40	24.8	3	1.9	6	3.7	
女性	総数	<90cm	1,528	100.0	81	5.3	106	6.9	107	7.0	23	1.5	47	3.1	406	26.6	74	4.8	684	44.8
		≥90cm	421	100.0	77	18.3	51	12.1	75	17.8	3	0.7	7	1.7	121	28.7	24	5.7	63	15.0
	20-29歳	<90cm	76	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	74	97.4
		≥90cm	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	1	25.0
	30-39歳	<90cm	183	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	17	9.3	7	3.8	157	85.8
		≥90cm	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	7.1	12	85.7
	40-49歳	<90cm	274	100.0	1	0.4	6	2.2	6	2.2	3	1.1	3	1.1	46	16.8	14	5.1	195	71.2
		≥90cm	52	100.0	1	1.9	4	7.7	7	13.5	0	0.0	2	3.8	18	34.6	3	5.8	17	32.7
	50-59歳	<90cm	241	100.0	2	0.8	8	3.3	10	4.1	4	1.7	5	2.1	87	36.1	18	7.5	107	44.4
		≥90cm	65	100.0	5	7.7	8	12.3	16	24.6	1	1.5	1	1.5	20	30.8	4	6.2	10	15.4
	60-69歳	<90cm	391	100.0	30	7.7	38	9.7	39	10.0	10	2.6	20	5.1	125	32.0	19	4.9	110	28.1
		≥90cm	117	100.0	28	23.9	11	9.4	20	17.1	1	0.9	2	1.7	34	29.1	8	6.8	13	11.1
	70歳以上	<90cm	363	100.0	48	13.2	54	14.9	52	14.3	6	1.7	17	4.7	129	35.5	16	4.4	41	11.3
		≥90cm	169	100.0	43	25.4	28	16.6	32	18.9	1	0.6	2	1.2	45	26.6	8	4.7	10	5.9
(再掲) 40-74歳	<90cm	1,046	100.0	55	5.3	72	6.9	76	7.3	18	1.7	37	3.5	298	28.5	58	5.5	432	41.3	
	≥90cm	289	100.0	50	17.3	34	11.8	52	18.0	2	0.7	5	1.7	86	29.8	17	5.9	43	14.9	
(再掲) 65-74歳	<90cm	346	100.0	48	13.9	42	12.1	39	11.3	6	1.7	16	4.6	104	30.1	22	6.4	69	19.9	
	≥90cm	127	100.0	37	29.1	19	15.0	23	18.1	0	0.0	2	1.6	31	24.4	7	5.5	8	6.3	
(再掲) 75歳以上	<90cm	223	100.0	26	11.7	34	15.2	31	13.9	5	2.2	8	3.6	89	39.9	9	4.0	21	9.4	
	≥90cm	114	100.0	27	23.7	17	14.9	23	20.2	1	0.9	2	1.8	31	27.2	6	5.3	7	6.1	

注1) 血圧, 腹囲, ヘモグロビンA1c, 血清HDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の間診において血圧を下げる薬, インスリン注射または血糖を下げる薬, コレステロールを下げる薬, 中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況にすべて回答した20歳以上の者を集計対象とした。なお, 女性は妊婦3名(20-29歳の1名と30-39歳の2名)を除外した。(27年)

注2) リスクの項目の基準はp.16参照。



第49表 糖尿病の指摘の状況－糖尿病の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,298	100.0	140	100.0	320	100.0	477	100.0	473	100.0	890	100.0	998	100.0	2,222	100.0	879	100.0	616	100.0
あり	501	15.2	4	2.9	13	4.1	29	6.1	50	10.6	191	21.5	214	21.4	363	16.3	219	24.9	121	19.6
なし	2,797	84.8	136	97.1	307	95.9	448	93.9	423	89.4	699	78.5	784	78.6	1,859	83.7	660	75.1	495	80.4
総数	1,325	100.0	56	100.0	112	100.0	150	100.0	165	100.0	380	100.0	462	100.0	882	100.0	405	100.0	275	100.0
あり	290	21.9	4	7.1	5	4.5	15	10.0	29	17.6	116	30.5	121	26.2	210	23.8	128	31.6	71	25.8
なし	1,035	78.1	52	92.9	107	95.5	135	90.0	136	82.4	264	69.5	341	73.8	672	76.2	277	68.4	204	74.2
総数	1,973	100.0	84	100.0	208	100.0	327	100.0	308	100.0	510	100.0	536	100.0	1,340	100.0	474	100.0	341	100.0
あり	211	10.7	0	0.0	8	3.8	14	4.3	21	6.8	75	14.7	93	17.4	153	11.4	91	19.2	50	14.7
なし	1,762	89.3	84	100.0	200	96.2	313	95.7	287	93.2	435	85.3	443	82.6	1,187	88.6	383	80.8	291	85.3

注)ヘモグロビンA1c値を測定し，身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」，「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」，「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況」のすべてに回答をしている者を集計対象とした。

第50表 糖尿病を指摘されたことがある者における，治療の状況－治療の状況，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	501	100.0	4	100.0	13	100.0	29	100.0	50	100.0	191	100.0	214	100.0	363	100.0	219	100.0	121	100.0
あり	325	64.9	1	25.0	3	23.1	15	51.7	26	52.0	109	57.1	171	79.9	224	61.7	152	69.4	97	80.2
なし	176	35.1	3	75.0	10	76.9	14	48.3	24	48.0	82	42.9	43	20.1	139	38.3	67	30.6	24	19.8
総数	290	100.0	4	100.0	5	100.0	15	100.0	29	100.0	116	100.0	121	100.0	210	100.0	128	100.0	71	100.0
あり	192	66.2	1	25.0	1	20.0	8	53.3	16	55.2	66	56.9	100	82.6	131	62.4	88	68.8	59	83.1
なし	98	33.8	3	75.0	4	80.0	7	46.7	13	44.8	50	43.1	21	17.4	79	37.6	40	31.3	12	16.9
総数	211	100.0	0	0.0	8	100.0	14	100.0	21	100.0	75	100.0	93	100.0	153	100.0	91	100.0	50	100.0
あり	133	63.0	0	0.0	2	25.0	7	50.0	10	47.6	43	57.3	71	76.3	93	60.8	64	70.3	38	76.0
なし	78	37.0	0	0.0	6	75.0	7	50.0	11	52.4	32	42.7	22	23.7	60	39.2	27	29.7	12	24.0

注1)ヘモグロビンA1c値を測定し，身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」，「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」，「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況」のすべてに回答をした者のうち，「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。

注2)身体状況調査票の「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無」，「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」のいずれかに「有」と回答した者を糖尿病の治療ありとした。



第51表 「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況－糖尿病が疑われる人の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,298	100.0	140	100.0	320	100.0	477	100.0	473	100.0	890	100.0	998	100.0	2,222	100.0	879	100.0	616	100.0
糖尿病が強く疑われる人	439	13.3	1	0.7	4	1.3	20	4.2	51	10.8	145	16.3	218	21.8	301	13.5	188	21.4	133	21.6
(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち、服薬者*	238	54.2	1	100.0	0	0.0	8	40.0	19	37.3	77	53.1	133	61.0	157	52.2	109	58.0	80	60.2
糖尿病の可能性が否定できない人	489	14.8	1	0.7	8	2.5	35	7.3	60	12.7	170	19.1	215	21.5	348	15.7	186	21.2	132	21.4
上記以外	2,370	71.9	138	98.6	308	96.3	422	88.5	362	76.5	575	64.6	565	56.6	1,573	70.8	505	57.5	351	57.0
総数	1,325	100.0	56	100.0	112	100.0	150	100.0	165	100.0	380	100.0	462	100.0	882	100.0	405	100.0	275	100.0
糖尿病が強く疑われる人	258	19.5	1	1.8	2	1.8	11	7.3	31	18.8	87	22.9	126	27.3	177	20.1	109	26.9	78	28.4
(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち、服薬者*	144	55.8	1	100.0	0	0.0	4	36.4	13	41.9	49	56.3	77	61.1	94	53.1	64	58.7	49	62.8
糖尿病の可能性が否定できない人	195	14.7	1	1.8	1	0.9	8	5.3	18	10.9	71	18.7	96	20.8	137	15.5	80	19.8	56	20.4
上記以外	872	65.8	54	96.4	109	97.3	131	87.3	116	70.3	222	58.4	240	51.9	568	64.4	216	53.3	141	51.3
総数	1,973	100.0	84	100.0	208	100.0	327	100.0	308	100.0	510	100.0	536	100.0	1,340	100.0	474	100.0	341	100.0
糖尿病が強く疑われる人	181	9.2	0	0.0	2	1.0	9	2.8	20	6.5	58	11.4	92	17.2	124	9.3	79	16.7	55	16.1
(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち、服薬者*	94	51.9	0	0.0	0	0.0	4	44.4	6	30.0	28	48.3	56	60.9	63	50.8	45	57.0	31	56.4
糖尿病の可能性が否定できない人	294	14.9	0	0.0	7	3.4	27	8.3	42	13.6	99	19.4	119	22.2	211	15.7	106	22.4	76	22.3
上記以外	1,498	75.9	84	100.0	199	95.7	291	89.0	246	79.9	353	69.2	325	60.6	1,005	75.0	289	61.0	210	61.6

注1) 身体状況調査においてヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在、糖尿病治療の有無」に「1有」と回答した者(27年)の有無]、「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況」のすべてに回答した者を集計対象とした。

注2) 判定基準はp.16参照。

\*「服薬者」とは、身体状況調査票の問診(6)(c)「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無」に「有」と回答した者。

「糖尿病が強く疑われる人」の判定  
 ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)の値が6.5%以上、または、身体状況調査票の(7)「現在、糖尿病治療の有無」に「1有」と回答した者  
 「糖尿病の可能性を否定できない人」の判定  
 ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)の値が6.0%以上、6.5%未満で、「糖尿病が強く疑われる人」以外の人

第52表 「糖尿病が強く疑われる者」における治療の有無一糖尿病の治療の有無、年齢階級別、人数、割合一総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	439	100.0	1	100.0	4	100.0	20	100.0	51	100.0	145	100.0	218	100.0	301	100.0	188	100.0	133	100.0
あり	325	74.0	1	100.0	3	75.0	15	75.0	26	51.0	109	75.2	171	78.4	224	74.4	152	80.9	97	72.9
なし	114	26.0	0	0.0	1	25.0	5	25.0	25	49.0	36	24.8	47	21.6	77	25.6	36	19.1	36	27.1
総数	258	100.0	1	100.0	2	100.0	11	100.0	31	100.0	87	100.0	126	100.0	177	100.0	109	100.0	78	100.0
あり	192	74.4	1	100.0	1	50.0	8	72.7	16	51.6	66	75.9	100	79.4	131	74.0	88	80.7	59	75.6
なし	66	25.6	0	0.0	1	50.0	3	27.3	15	48.4	21	24.1	26	20.6	46	26.0	21	19.3	19	24.4
総数	181	100.0	0	0.0	2	100.0	9	100.0	20	100.0	58	100.0	92	100.0	124	100.0	79	100.0	55	100.0
あり	133	73.5	0	0.0	2	100.0	7	77.8	10	50.0	43	74.1	71	77.2	93	75.0	64	81.0	38	69.1
なし	48	26.5	0	0.0	0	0.0	2	22.2	10	50.0	15	25.9	21	22.8	31	25.0	15	19.0	17	30.9

注1) 身体状況調査においてヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の、問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」、「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況」のすべてに回答した者を集計対象とした。

注2) 「糖尿病が強く疑われる人」の判定基準はD.I6参照。

\* 身体状況調査票の問診(7-1)「現在糖尿病の治療の有無(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)」に「有」と回答した者を治療ありとした。

(27年)

第53表 高血圧症有病者の状況－高血圧症有病者の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,539	100.0	157	100.0	335	100.0	510	100.0	507	100.0	942	100.0	1,088	100.0	2,380	100.0	958	100.0	667	100.0
高血圧症有病者	1,659	46.9	6	3.8	29	8.7	113	22.2	203	40.0	530	56.3	778	71.5	1,129	47.4	605	63.2	495	74.2
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	986	59.4	0	0.0	1	3.4	31	27.4	92	45.3	282	53.2	580	74.6	611	54.1	388	64.1	374	75.6
正常高値血圧者	481	13.6	11	7.0	36	10.7	69	13.5	87	17.2	152	16.1	126	11.6	367	15.4	144	15.0	67	10.0
上記以外	1,399	39.5	140	89.2	270	80.6	328	64.3	217	42.8	260	27.6	184	16.9	884	37.1	209	21.8	105	15.7
総数	1,432	100.0	62	100.0	119	100.0	165	100.0	178	100.0	401	100.0	507	100.0	948	100.0	437	100.0	303	100.0
高血圧症有病者	815	56.9	3	4.8	23	19.3	59	35.8	94	52.8	270	67.3	366	72.2	562	59.3	301	68.9	227	74.9
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	473	58.0	0	0.0	0	0.0	17	28.8	49	52.1	141	52.2	266	72.7	308	54.8	190	63.1	165	72.7
正常高値血圧者	213	14.9	9	14.5	22	18.5	30	18.2	31	17.4	58	14.5	63	12.4	149	15.7	62	14.2	33	10.9
上記以外	404	28.2	50	80.6	74	62.2	76	46.1	53	29.8	73	18.2	78	15.4	237	25.0	74	16.9	43	14.2
総数	2,107	100.0	95	100.0	216	100.0	345	100.0	329	100.0	541	100.0	581	100.0	1,432	100.0	521	100.0	364	100.0
高血圧症有病者	844	40.1	3	3.2	6	2.8	54	15.7	109	33.1	260	48.1	412	70.9	567	39.6	304	58.3	268	73.6
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	513	60.8	0	0.0	1	16.7	14	25.9	43	39.4	141	54.2	314	76.2	303	53.4	198	65.1	209	78.0
正常高値血圧者	268	12.7	2	2.1	14	6.5	39	11.3	56	17.0	94	17.4	63	10.8	218	15.2	82	15.7	34	9.3
上記以外	995	47.2	90	94.7	196	90.7	252	73.0	164	49.8	187	34.6	106	18.2	647	45.2	135	25.9	62	17.0

注1)血圧を測定し、身体状況調査の問診において「(6)(a)血圧を下げる薬」に回答をしている者を集計対象とした。

注2)判定の基準はp.16参照。

\*「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6)(a)血圧を下げる薬」に「有」と回答した者。

(27年)

「高血圧症有病者」の判定  
収縮期血圧 140mmHg以上、または拡張期血圧 90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者

第54表 「脂質異常症が疑われる者」の状況－脂質異常症が疑われる人の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,311	100.0	142	100.0	322	100.0	482	100.0	470	100.0	892	100.0	1,003	100.0	2,228	100.0	882	100.0	619	100.0
脂質異常症が疑われる人	745	22.5	4	2.8	18	5.6	34	7.1	69	14.7	252	28.3	368	36.7	503	22.6	312	35.4	220	35.5
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	565	75.8	0	0.0	2	11.1	22	64.7	53	76.8	207	82.1	281	76.4	401	79.7	252	80.8	162	73.6
上記以外	2,566	77.5	138	97.2	304	94.4	448	92.9	401	85.3	640	71.7	635	63.3	1,725	77.4	570	64.6	399	64.5
男性	1,333	100.0	57	100.0	114	100.0	153	100.0	164	100.0	382	100.0	463	100.0	885	100.0	405	100.0	277	100.0
脂質異常症が疑われる人	346	26.0	4	7.0	16	14.0	14	9.2	35	21.3	111	29.1	166	35.9	227	25.6	140	34.6	99	35.7
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	211	61.0	0	0.0	2	12.5	9	64.3	25	71.4	75	67.6	100	60.2	156	68.7	96	68.6	53	53.5
上記以外	987	74.0	53	93.0	98	86.0	139	90.8	129	78.7	271	70.9	297	64.1	658	74.4	265	65.4	178	64.3
女性	1,978	100.0	85	100.0	208	100.0	329	100.0	306	100.0	510	100.0	540	100.0	1,343	100.0	477	100.0	342	100.0
脂質異常症が疑われる人	399	20.2	0	0.0	2	1.0	20	6.1	34	11.1	141	27.6	202	37.4	276	20.6	172	36.1	121	35.4
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	354	88.7	0	0.0	0	0.0	13	65.0	28	82.4	132	93.6	181	89.6	245	88.8	156	90.7	109	90.1
上記以外	1,579	79.8	85	100.0	206	99.0	309	93.9	272	88.9	369	72.4	338	62.6	1,067	79.4	305	63.9	221	64.6

注)HDLコレステロールを測定し、身体状況調査の問診において「(6)(d)コレステロールを下げる薬」、「(6)(e)中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用状況に回答した者を集

計対象とした。

\*「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6)(d)コレステロールを下げる薬」、「(6)(e)中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」のいずれか、または両方に使用「有」と回答した者。

「脂質異常症が疑われる人」の判定

国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記の通りとした。

HDLコレステロールが40mg/dL未満、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬を服用している者。

第55表 運動禁止の有無—運動禁止の有無, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	3,982	100.0	203	100.0	386	100.0	595	100.0	597	100.0	1,017	100.0	1,184	100.0	2,227	100.0	1,755	100.0	1,021	100.0	734	100.0
	運動禁止の有	79	2.0	0	0.0	3	0.8	3	0.5	14	2.3	16	1.6	43	3.6	28	1.3	51	2.9	20	2.0	31	4.2
	運動禁止の無	3,903	98.0	203	100.0	383	99.2	592	99.5	583	97.7	1,001	98.4	1,141	96.4	2,199	98.7	1,704	97.1	1,001	98.0	703	95.8
男性	総数	1,663	100.0	82	100.0	146	100.0	213	100.0	235	100.0	444	100.0	543	100.0	873	100.0	790	100.0	468	100.0	322	100.0
	運動禁止の有	31	1.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0	8	3.4	9	2.0	13	2.4	14	1.6	17	2.2	7	1.5	10	3.1
	運動禁止の無	1,632	98.1	82	100.0	145	99.3	213	100.0	227	96.6	435	98.0	530	97.6	859	98.4	773	97.8	461	98.5	312	96.9
女性	総数	2,319	100.0	121	100.0	240	100.0	382	100.0	362	100.0	573	100.0	641	100.0	1,354	100.0	965	100.0	553	100.0	412	100.0
	運動禁止の有	48	2.1	0	0.0	2	0.8	3	0.8	6	1.7	7	1.2	30	4.7	14	1.0	34	3.5	13	2.4	21	5.1
	運動禁止の無	2,271	97.9	121	100.0	238	99.2	379	99.2	356	98.3	566	98.8	611	95.3	1,340	99.0	931	96.5	540	97.6	391	94.9

注)身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に回答した者を集計対象とした。

(27年)

第56表 1週間の運動日数—1週間の運動日数, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	3,879	100.0	203	100.0	380	100.0	585	100.0	579	100.0	996	100.0	1,136	100.0	2,182	100.0	1,697	100.0	995	100.0	702	100.0
	運動無し	1,861	48.0	138	68.0	245	64.5	368	62.9	343	59.2	395	39.7	372	32.7	1,286	58.9	575	33.9	319	32.1	256	36.5
	1日/週	341	8.8	24	11.8	31	8.2	53	9.1	54	9.3	92	9.2	87	7.7	198	9.1	143	8.4	84	8.4	59	8.4
	2日/週	296	7.6	13	6.4	31	8.2	56	9.6	41	7.1	73	7.3	82	7.2	178	8.2	118	7.0	69	6.9	49	7.0
	3日/週	289	7.5	6	3.0	16	4.2	27	4.6	30	5.2	98	9.8	112	9.9	118	5.4	171	10.1	110	11.1	61	8.7
	4日/週	174	4.5	7	3.4	11	2.9	13	2.2	25	4.3	57	5.7	61	5.4	75	3.4	99	5.8	65	6.5	34	4.8
	5日/週	206	5.3	3	1.5	19	5.0	26	4.4	23	4.0	60	6.0	75	6.6	102	4.7	104	6.1	64	6.4	40	5.7
	6日/週	90	2.3	5	2.5	7	1.8	9	1.5	12	2.1	25	2.5	32	2.8	40	1.8	50	2.9	35	3.5	15	2.1
	7日/週	622	16.0	7	3.4	20	5.3	33	5.6	51	8.8	196	19.7	315	27.7	185	8.5	437	25.8	249	25.0	188	26.8
男性	総数	1,620	100.0	82	100.0	143	100.0	211	100.0	223	100.0	433	100.0	528	100.0	850	100.0	770	100.0	458	100.0	312	100.0
	運動無し	714	44.1	50	61.0	76	53.1	127	60.2	130	58.3	176	40.6	155	29.4	473	55.6	241	31.3	141	30.8	100	32.1
	1日/週	147	9.1	14	17.1	17	11.9	27	12.8	21	9.4	39	9.0	29	5.5	94	11.1	53	6.9	33	7.2	20	6.4
	2日/週	123	7.6	5	6.1	16	11.2	17	8.1	19	8.5	25	5.8	41	7.8	68	8.0	55	7.1	32	7.0	23	7.4
	3日/週	122	7.5	3	3.7	8	5.6	12	5.7	10	4.5	34	7.9	55	10.4	44	5.2	78	10.1	46	10.0	32	10.3
	4日/週	78	4.8	5	6.1	6	4.2	3	1.4	10	4.5	29	6.7	25	4.7	33	3.9	45	5.8	32	7.0	13	4.2
	5日/週	87	5.4	1	1.2	9	6.3	11	5.2	8	3.6	26	6.0	32	6.1	41	4.8	46	6.0	30	6.6	16	5.1
	6日/週	50	3.1	2	2.4	3	2.1	4	1.9	8	3.6	14	3.2	19	3.6	22	2.6	28	3.6	19	4.1	9	2.9
	7日/週	299	18.5	2	2.4	8	5.6	10	4.7	17	7.6	90	20.8	172	32.6	75	8.8	224	29.1	125	27.3	99	31.7
女性	総数	2,259	100.0	121	100.0	237	100.0	374	100.0	356	100.0	563	100.0	608	100.0	1,332	100.0	927	100.0	537	100.0	390	100.0
	運動無し	1,147	50.8	88	72.7	169	71.3	241	64.4	213	59.8	219	38.9	217	35.7	813	61.0	334	36.0	178	33.1	156	40.0
	1日/週	194	8.6	10	8.3	14	5.9	26	7.0	33	9.3	53	9.4	58	9.5	104	7.8	90	9.7	51	9.5	39	10.0
	2日/週	173	7.7	8	6.6	15	6.3	39	10.4	22	6.2	48	8.5	41	6.7	110	8.3	63	6.8	37	6.9	26	6.7
	3日/週	167	7.4	3	2.5	8	3.4	15	4.0	20	5.6	64	11.4	57	9.4	74	5.6	93	10.0	64	11.9	29	7.4
	4日/週	96	4.2	2	1.7	5	2.1	10	2.7	15	4.2	28	5.0	36	5.9	42	3.2	54	5.8	33	6.1	21	5.4
	5日/週	119	5.3	2	1.7	10	4.2	15	4.0	15	4.2	34	6.0	43	7.1	61	4.6	58	6.3	34	6.3	24	6.2
	6日/週	40	1.8	3	2.5	4	1.7	5	1.3	4	1.1	11	2.0	13	2.1	18	1.4	22	2.4	16	3.0	6	1.5
	7日/週	323	14.3	5	4.1	12	5.1	23	6.1	34	9.6	106	18.8	143	23.5	110	8.3	213	23.0	124	23.1	89	22.8

注)身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し,(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。

(27年)

第57表 運動を行う日の平均運動時間—運動を行う日の平均運動時間の区分，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	2,018	100.0	65	100.0	135	100.0	217	100.0	236	100.0	601	100.0	764	100.0	896	100.0	1,122	100.0	676	100.0	446	100.0	
総数	30分未満	249	12.3	9	13.8	18	13.3	24	11.1	25	10.6	71	11.8	102	13.4	106	11.8	143	12.7	72	10.7	71	15.9
	30分以上60分未満	617	30.6	15	23.1	38	28.1	62	28.6	69	29.2	202	33.6	231	30.2	269	30.0	348	31.0	216	32.0	132	29.6
	60分以上120分未満	712	35.3	20	30.8	44	32.6	79	36.4	90	38.1	202	33.6	277	36.3	313	34.9	399	35.6	243	35.9	156	35.0
	120分以上180分未満	268	13.3	13	20.0	24	17.8	36	16.6	30	12.7	70	11.6	95	12.4	129	14.4	139	12.4	85	12.6	54	12.1
	180分以上	172	8.5	8	12.3	11	8.1	16	7.4	22	9.3	56	9.3	59	7.7	79	8.8	93	8.3	60	8.9	33	7.4
男性	906	100.0	32	100.0	67	100.0	84	100.0	93	100.0	257	100.0	373	100.0	377	100.0	529	100.0	317	100.0	212	100.0	
男性	30分未満	80	8.8	2	6.3	9	13.4	7	8.3	5	5.4	26	10.1	31	8.3	37	9.8	43	8.1	19	6.0	24	11.3
	30分以上60分未満	233	25.7	8	25.0	15	22.4	18	21.4	25	26.9	67	26.1	100	26.8	92	24.4	141	26.7	86	27.1	55	25.9
	60分以上120分未満	341	37.6	7	21.9	21	31.3	36	42.9	38	40.9	97	37.7	142	38.1	146	38.7	195	36.9	119	37.5	76	35.8
	120分以上180分未満	146	16.1	9	28.1	14	20.9	15	17.9	13	14.0	36	14.0	59	15.8	59	15.6	87	16.4	52	16.4	35	16.5
	180分以上	106	11.7	6	18.8	8	11.9	8	9.5	12	12.9	31	12.1	41	11.0	43	11.4	63	11.9	41	12.9	22	10.4
女性	1,112	100.0	33	100.0	68	100.0	133	100.0	143	100.0	344	100.0	391	100.0	519	100.0	593	100.0	359	100.0	234	100.0	
女性	30分未満	169	15.2	7	21.2	9	13.2	17	12.8	20	14.0	45	13.1	71	18.2	69	13.3	100	16.9	53	14.8	47	20.1
	30分以上60分未満	384	34.5	7	21.2	23	33.8	44	33.1	44	30.8	135	39.2	131	33.5	177	34.1	207	34.9	130	36.2	77	32.9
	60分以上120分未満	371	33.4	13	39.4	23	33.8	43	32.3	52	36.4	105	30.5	135	34.5	167	32.2	204	34.4	124	34.5	80	34.2
	120分以上180分未満	122	11.0	4	12.1	10	14.7	21	15.8	17	11.9	34	9.9	36	9.2	70	13.5	52	8.8	33	9.2	19	8.1
	180分以上	66	5.9	2	6.1	3	4.4	8	6.0	10	7.0	25	7.3	18	4.6	36	6.9	30	5.1	19	5.3	11	4.7

注)身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し，(9)のすべての質問に回答した者のうち，(27年)  
(9)(a)「1週間の運動日数」が1日以上と回答した者を集計対象とした。

第58表 運動習慣の有無—運動習慣の有無，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	3,879	100.0	203	100.0	380	100.0	585	100.0	579	100.0	996	100.0	1,136	100.0	2,182	100.0	1,697	100.0	995	100.0	702	100.0	
総数	運動の習慣有	1,229	31.7	24	11.8	61	16.1	111	19.0	138	23.8	371	37.2	524	46.1	473	21.7	756	44.5	464	46.6	292	41.6
	運動の習慣無	2,650	68.3	179	88.2	319	83.9	474	81.0	441	76.2	625	62.8	612	53.9	1,709	78.3	941	55.5	531	53.4	410	58.4
男性	1,620	100.0	82	100.0	143	100.0	211	100.0	223	100.0	433	100.0	528	100.0	850	100.0	770	100.0	458	100.0	312	100.0	
男性	運動の習慣有	613	37.8	14	17.1	27	18.9	45	21.3	62	27.8	169	39.0	296	56.1	209	24.6	404	52.5	242	52.8	162	51.9
	運動の習慣無	1,007	62.2	68	82.9	116	81.1	166	78.7	161	72.2	264	61.0	232	43.9	641	75.4	366	47.5	216	47.2	150	48.1
女性	2,259	100.0	121	100.0	237	100.0	374	100.0	356	100.0	563	100.0	608	100.0	1,332	100.0	927	100.0	537	100.0	390	100.0	
女性	運動の習慣有	616	27.3	10	8.3	34	14.3	66	17.6	76	21.3	202	35.9	228	37.5	264	19.8	352	38.0	222	41.3	130	33.3
	運動の習慣無	1,643	72.7	111	91.7	203	85.7	308	82.4	280	78.7	361	64.1	380	62.5	1,068	80.2	575	62.0	315	58.7	260	66.7

注)身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し，(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。(27年)

※「運動の習慣有」とは，身体状況調査の問診(9)で1回30分以上の運動を週2回以上実施し，1年以上継続していると回答した者。

第59表 歩数の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—総数・男性・女性，20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 20-64歳			(再掲) 65歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
総数	5,858	6,670	4,219	465	8,017	4,645	652	7,418	3,983	1,006	7,272	3,989	929	7,501	4,300	1,328	6,823	4,138	1,478	4,847	3,758	3,670	7,436	4,212	2,188	5,385	3,907	1,263	6,389	3,932	925	4,015	3,428
男性	2,684	7,194	4,639	219	8,801	5,183	307	7,810	4,194	437	7,793	4,584	421	8,071	4,677	615	7,157	4,741	685	5,518	4,056	1,669	7,970	4,667	1,015	5,919	4,299	603	6,791	4,436	412	4,642	3,744
女性	3,174	6,227	3,772	246	7,319	3,990	345	7,070	3,758	569	6,873	3,415	508	7,028	3,903	713	6,536	3,514	793	4,267	3,377	2,001	6,991	3,733	1,173	4,924	3,469	660	6,022	3,369	513	3,510	3,063

注)栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動数(歩数)」および「歩数計の装着状況」の両方に回答した者を集計対象とした。(27年)  
なお，歩数が100歩未満，50,000歩以上の者を除外した。