

第3部 身体状況調査の結果

第20表 身長・体重の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

年齢(歳)	男 性						女 性					
	身 長 (cm)			体 重 (kg)			身 長 (cm)			体 重 (kg)		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
1	36	80.7	4.6	36	10.9	1.1	44	78.2	4.6	44	10.1	1.1
2	33	89.4	5.0	33	12.5	1.3	29	87.9	4.3	29	12.0	1.4
3	40	96.1	3.7	40	14.6	1.7	41	97.1	4.5	41	14.3	1.8
4	46	105.1	5.2	46	16.9	2.0	54	103.5	5.9	54	16.8	2.7
5	42	109.8	4.2	42	18.7	2.9	38	109.7	5.0	39	18.7	2.9
6	51	117.2	4.3	51	21.2	3.3	47	115.6	5.1	47	20.7	3.5
7	38	121.4	5.1	38	24.5	4.1	42	122.6	5.9	42	23.9	3.5
8	47	126.7	6.4	47	27.6	5.7	55	128.0	6.1	55	26.0	4.9
9	44	132.9	6.9	44	29.3	5.8	34	134.1	5.3	34	31.8	6.5
10	49	139.5	6.5	50	35.8	8.4	39	139.0	6.3	38	33.6	5.9
11	45	145.1	6.4	44	38.9	7.7	48	145.8	7.3	48	36.9	7.3
12	35	152.0	6.7	35	43.3	9.0	46	152.7	5.7	46	43.5	7.0
13	39	159.8	6.7	39	46.8	6.6	39	155.5	6.2	39	45.9	6.1
14	40	165.0	7.2	40	51.6	7.9	33	157.3	3.9	33	49.7	7.5
15	41	166.8	5.5	41	54.8	8.2	38	156.8	5.0	38	50.6	6.1
16	49	169.8	6.5	49	61.8	11.3	32	156.8	4.0	32	51.2	6.3
17	39	170.8	6.0	39	60.8	8.6	34	156.7	6.5	34	52.1	10.0
18	27	170.7	4.8	27	61.7	9.6	34	156.7	5.9	34	51.3	8.9
19	30	171.9	4.0	30	66.5	12.4	26	161.3	5.9	26	52.1	6.3
20	29	170.7	7.5	29	65.8	10.8	27	156.5	5.9	26	54.2	11.5
21	30	171.4	4.9	30	64.6	14.1	40	158.9	5.7	38	51.1	6.6
22	29	172.4	6.1	29	65.8	9.1	29	157.7	4.6	29	50.2	5.8
23	25	171.3	4.8	25	63.8	9.1	27	157.9	6.9	26	50.7	6.1
24	28	170.9	6.0	28	62.6	9.8	30	158.4	6.2	29	51.7	8.0
25	15	170.1	3.7	15	62.0	9.3	37	157.2	5.5	37	52.1	7.8
26 29	119	171.9	6.9	119	67.4	10.7	143	158.4	6.1	138	51.7	7.9
30 39	459	171.4	5.8	460	70.5	12.0	591	158.6	5.4	563	54.1	9.2
40 49	416	170.2	5.7	416	69.7	10.1	500	157.0	5.3	500	54.7	8.3
50 59	586	167.3	6.1	585	66.6	9.9	712	154.5	5.1	712	55.0	8.3
60 69	537	164.0	6.1	537	64.2	9.0	674	151.4	5.6	674	53.6	8.3
70歳以上	636	160.5	6.6	637	59.3	8.6	811	146.8	6.5	810	49.8	8.3
(再掲)												
20歳以上	2909	166.7	7.4	2910	65.5	10.7	3621	153.6	7.1	3582	53.1	8.6
20 29歳	275	171.5	6.3	275	65.7	10.7	333	158.1	5.9	323	51.7	7.8
60 64	268	164.8	6.2	268	64.5	8.7	320	152.0	5.4	320	53.5	7.9
65 69	269	163.2	6.0	269	63.9	9.2	354	151.0	5.6	354	53.7	8.6
70 74	277	161.7	6.4	277	61.5	8.2	303	149.3	5.9	302	52.0	8.7
75 79	210	160.5	5.8	209	59.2	7.9	273	146.8	5.8	273	50.1	7.6
80歳以上	149	158.4	7.5	151	55.5	9.1	235	143.7	6.8	235	46.6	7.8

注) 体重は妊婦除外

第21表 BMIの平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

年齢(歳)	男性			女性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	3093	23.39	3.27	3745	22.47	3.48
15-19歳	186	21.02	3.19	164	20.74	2.95
20-29	275	22.32	3.52	323	20.67	2.95
30-39	459	23.97	3.68	563	21.53	3.60
40-49	416	24.04	3.16	500	22.20	3.33
50-59	585	23.77	3.08	712	23.05	3.27
60-69	537	23.84	2.95	674	23.39	3.40
70歳以上	635	22.98	2.87	809	23.09	3.48
(再掲)						
20歳以上	2907	23.54	3.22	3581	22.55	3.48
20-69歳	2272	23.70	3.29	2772	22.39	3.47
40-69	1538	23.87	3.06	1886	22.94	3.36
65-69	269	23.94	3.05	354	23.55	3.50
70-74	277	23.50	2.89	302	23.36	3.66
75-79	209	22.94	2.58	273	23.23	3.27
80-84	107	22.30	3.02	136	22.99	3.55
80歳以上	149	22.09	3.03	234	22.57	3.44
85歳以上	42	21.55	3.02	98	22.00	3.22

注) 妊婦除外

第22表 BMIの分布(15歳以上)

	総数		男性		女性	
	人数	%	人数	%	人数	%
総数	6838	100	3093	100	3745	100
<15	6	0.1	4	0.1	2	0.1
15-15.9	21	0.3	11	0.4	10	0.3
16-16.9	91	1.3	25	0.8	66	1.8
17-17.9	230	3.4	68	2.2	162	4.3
18-18.9	428	6.3	149	4.8	279	7.4
19-19.9	611	8.9	185	6.0	426	11.4
20-20.9	741	10.8	286	9.2	455	12.1
21-21.9	857	12.5	325	10.5	532	14.2
22-22.9	767	11.2	389	12.6	378	10.1
23-23.9	773	11.3	407	13.2	366	9.8
24-24.9	656	9.6	362	11.7	294	7.9
25-25.9	518	7.6	295	9.5	223	6.0
26-26.9	381	5.6	220	7.1	161	4.3
27-27.9	252	3.7	127	4.1	125	3.3
28-28.9	166	2.4	80	2.6	86	2.3
29-29.9	113	1.7	56	1.8	57	1.5
30-30.9	83	1.2	42	1.4	41	1.1
31-31.9	52	0.8	22	0.7	30	0.8
32-32.9	38	0.6	17	0.5	21	0.6
33-33.9	19	0.3	9	0.3	10	0.3
34-34.9	16	0.2	7	0.2	9	0.2
35	19	0.3	7	0.2	12	0.3

注) 妊婦除外

第23表 BMIの状況(性・年齢階級別)

		総数		肥満度(BMI)					
				やせ		普通		肥満	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別	総数	3093	100.0	174	5.6	2037	65.9	882	28.5
男性	15-19歳	186	100.0	36	19.4	132	71.0	18	9.7
	20-29歳	275	100.0	26	9.5	195	70.9	54	19.6
	30-39歳	459	100.0	17	3.7	286	62.3	156	34.0
	40-49歳	416	100.0	10	2.4	266	63.9	140	33.7
	50-59歳	585	100.0	23	3.9	372	63.6	190	32.5
	60-69歳	537	100.0	20	3.7	340	63.3	177	33.0
	70歳以上	635	100.0	42	6.6	446	70.2	147	23.1
	(再掲)20歳以上	2907	100.0	138	4.7	1905	65.5	864	29.7
	(再掲)20-69歳	2272	100.0	96	4.2	1459	64.2	717	31.6
	(再掲)40-69歳	1538	100.0	53	3.4	978	63.6	507	33.0
	(再掲)65-69歳	269	100.0	7	2.6	173	64.3	89	33.1
	(再掲)70-74歳	277	100.0	16	5.8	177	63.9	84	30.3
	(再掲)75-79歳	209	100.0	9	4.3	159	76.1	41	19.6
	(再掲)80-84歳	107	100.0	10	9.3	80	74.8	17	15.9
(再掲)85歳以上	42	100.0	7	16.7	30	71.4	5	11.9	
女性	総数	3745	100.0	355	9.5	2615	69.8	775	20.7
	15-19歳	164	100.0	30	18.3	125	76.2	9	5.5
	20-29歳	323	100.0	70	21.7	228	70.6	25	7.7
	30-39歳	563	100.0	75	13.3	417	74.1	71	12.6
	40-49歳	500	100.0	40	8.0	378	75.6	82	16.4
	50-59歳	712	100.0	31	4.4	498	69.9	183	25.7
	60-69歳	674	100.0	41	6.1	443	65.7	190	28.2
	70歳以上	809	100.0	68	8.4	526	65.0	215	26.6
	(再掲)20歳以上	3581	100.0	325	9.1	2490	69.5	766	21.4
	(再掲)20-69歳	2772	100.0	257	9.3	1964	70.9	551	19.9
	(再掲)40-69歳	1886	100.0	112	5.9	1319	69.9	455	24.1
	(再掲)65-69歳	354	100.0	21	5.9	230	65.0	103	29.1
	(再掲)70-74歳	302	100.0	24	7.9	188	62.3	90	29.8
	(再掲)75-79歳	273	100.0	17	6.2	176	64.5	80	29.3
	(再掲)80-84歳	136	100.0	11	8.1	94	69.1	31	22.8
(再掲)85歳以上	98	100.0	16	16.3	68	69.4	14	14.3	

注) 妊婦除外 BMIによる肥満の判定はp.18参照

第24表 日比式肥満区分(6-14歳, 性・年齢階級別)

	肥満度(日比式)	年 齢(歳)							
		総 数		6-8歳		9-11歳		12-14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	-30%未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	-30%以上 ~ -20%未満	12	3.1	0	0	2	1.5	10	8.8
	-20%以上 ~ -10%未満	73	18.9	17	12.5	23	16.8	33	28.9
	-10%以上 ~ 0%未満	129	33.3	47	34.6	44	32.1	38	33.3
	0%以上 ~ +10%未満	96	24.8	43	31.6	29	21.2	24	21.1
	+10%以上 ~ +20%未満	40	10.3	16	11.8	20	14.6	4	3.5
	+20%以上 ~ +30%未満	17	4.4	5	3.7	8	5.8	4	3.5
	+30%以上 ~ +40%未満	8	2.1	2	1.5	6	4.4	0	0
	+40%以上	12	3.1	6	4.4	5	3.6	1	0.9
	総 数	387	100	136	100	137	100	114	100
女 性	-30%未満	1	0.3	1	0.7	0	0	0	0
	-30%以上 ~ -20%未満	10	2.6	0	0	5	4.2	5	4.2
	-20%以上 ~ -10%未満	68	17.8	17	11.8	21	17.5	30	25.4
	-10%以上 ~ 0%未満	122	31.9	48	33.3	38	31.7	36	30.5
	0%以上 ~ +10%未満	109	28.5	52	36.1	34	28.3	23	19.5
	+10%以上 ~ +20%未満	46	12.0	20	13.9	11	9.2	15	12.7
	+20%以上 ~ +30%未満	13	3.4	3	2.1	5	4.2	5	4.2
	+30%以上 ~ +40%未満	6	1.6	2	1.4	2	1.7	2	1.7
	+40%以上	7	1.8	1	0.7	4	3.3	2	1.7
	総 数	382	100	144	100	120	100	118	100
総 数	-30%未満	1	0.1	1	0.4	0	0	0	0
	-30%以上 ~ -20%未満	22	2.9	0	0	7	2.7	15	6.5
	-20%以上 ~ -10%未満	141	18.3	34	12.1	44	17.1	63	27.2
	-10%以上 ~ 0%未満	251	32.6	95	33.9	82	31.9	74	31.9
	0%以上 ~ +10%未満	205	26.7	95	33.9	63	24.5	47	20.3
	+10%以上 ~ +20%未満	86	11.2	36	12.9	31	12.1	19	8.2
	+20%以上 ~ +30%未満	30	3.9	8	2.9	13	5.1	9	3.9
	+30%以上 ~ +40%未満	14	1.8	4	1.4	8	3.1	2	0.9
	+40%以上	19	2.5	7	2.5	9	3.5	3	1.3
	総 数	769	100	280	100	257	100	232	100

注) 日比式による区分は p.18 参照

第25表 学校保健統計調査方式による肥満区分(6-14歳, 性・年齢階級別)

	肥満度(学校保健統計調査方式)	年 齢(歳)							
		総 数		6-8歳		9-11歳		12-14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	-30%以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	-30%未満 ~ -20%以下	9	2.3	1	0.7	4	2.9	4	3.5
	-20%未満 ~ -10%以上	74	19.1	16	11.8	33	24.1	25	21.9
	-10%未満 ~ 0%未満	135	34.9	55	40.4	36	26.3	44	38.6
	0%以上 ~ +10%未満	98	25.3	35	25.7	34	24.8	29	25.4
	+10%以上 ~ +20%未満	38	9.8	17	12.5	14	10.2	7	6.1
	+20%以上 ~ +30%未満	15	3.9	3	2.2	8	5.8	4	3.5
	+30%以上 ~ +40%未満	8	2.1	3	2.2	5	3.6	0	0
	+40%以上 ~ +50%未満	4	1.0	3	2.2	1	0.7	0	0
	+50%以上	6	1.6	3	2.2	2	1.5	1	0.9
総 数	387	100	136	100	137	100	114	100	
女 性	-30%以下	1	0.3	1	0.7	0	0	0	0
	-30%未満 ~ -20%以下	9	2.4	2	1.4	4	3.3	3	2.5
	-20%未満 ~ -10%以上	80	20.9	19	13.2	27	22.5	34	28.8
	-10%未満 ~ 0%未満	146	38.2	69	47.9	36	30.0	41	34.7
	0%以上 ~ +10%未満	89	23.3	36	25.0	33	27.5	20	16.9
	+10%以上 ~ +20%未満	35	9.2	11	7.6	10	8.3	14	11.9
	+20%以上 ~ +30%未満	8	2.1	3	2.1	3	2.5	2	1.7
	+30%以上 ~ +40%未満	9	2.4	2	1.4	4	3.3	3	2.5
	+40%以上 ~ +50%未満	1	0.3	0	0	0	0	1	0.8
	+50%以上	4	1.0	1	0.7	3	2.5	0	0
総 数	382	100	144	100	120	100	118	100	
総 数	-30%以下	1	0.1	1	0.4	0	0	0	0
	-30%未満 ~ -20%以下	18	2.3	3	1.1	8	3.1	7	3.0
	-20%未満 ~ -10%以上	154	20.0	35	12.5	60	23.3	59	25.4
	-10%未満 ~ 0%未満	281	36.5	124	44.3	72	28.0	85	36.6
	0%以上 ~ +10%未満	187	24.3	71	25.4	67	26.1	49	21.1
	+10%以上 ~ +20%未満	73	9.5	28	10.0	24	9.3	21	9.1
	+20%以上 ~ +30%未満	23	3.0	6	2.1	11	4.3	6	2.6
	+30%以上 ~ +40%未満	17	2.2	5	1.8	9	3.5	3	1.3
	+40%以上 ~ +50%未満	5	0.7	3	1.1	1	0.4	1	0.4
	+50%以上	10	1.3	4	1.4	5	1.9	1	0.4
総 数	769	100	280	100	257	100	232	100	

注) 学校保健統計調査方式による区分は p.19 参照

第 27 表 腹囲の区分（性・年齢階級別）

		年 齢 階 級												(再掲) 40~74歳			
		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳以上					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
性 別	腹囲の区分 <85cm(男) / <90cm(女)	1335	49.2	190	76.9	240	56.9	176	45.4	252	45.2	213	42.3	264	44.4	742	43.3
	85cm(男) / 90cm(女)	1378	50.8	57	23.1	182	43.1	212	54.6	306	54.8	290	57.7	331	55.6	970	56.7
	総 数	2713	100	247	100	422	100	388	100	558	100	503	100	595	100	1712	100
女 性	腹囲の区分 <85cm(男) / <90cm(女)	2785	82.1	279	96.5	508	93.7	441	91.9	545	80.5	481	74.0	531	70.3	1667	79.5
	85cm(男) / 90cm(女)	608	17.9	10	3.5	34	6.3	39	8.1	132	19.5	169	26.0	224	29.7	431	20.5
	総 数	3393	100	289	100	542	100	480	100	677	100	650	100	755	100	2098	100
総 数	腹囲の区分 <85cm(男) / <90cm(女)	4120	67.5	489	87.5	748	77.6	617	71.1	797	64.5	694	60.2	795	58.9	2409	63.2
	85cm(男) / 90cm(女)	1986	32.5	67	12.5	216	22.4	251	28.9	438	35.5	459	39.8	555	41.1	1401	36.8
	総 数	6106	100	536	100	964	100	868	100	1235	100	1153	100	1350	100	3810	100

注) 妊婦除外

第 28 表 BMI・腹囲の区分（性・年齢階級別）

		年 齢 階 級												(再掲) 40~74歳			
		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳以上					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
性 別	BMI・腹囲の区分 BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	1259	46.4	182	73.7	221	52.4	163	42.0	239	42.8	193	38.4	261	43.9	694	40.5
	BMI 25, 腹囲 < 85/90cm	76	2.8	8	3.2	19	4.5	13	3.4	13	2.3	20	4.0	3	0.5	48	2.8
女 性	BMI < 25, 腹囲 85/90cm	644	23.7	16	6.5	64	15.2	95	24.5	136	24.4	142	28.2	191	32.1	455	26.6
	BMI 25, 腹囲 85/90cm	734	27.1	41	16.6	118	28.0	117	30.2	170	30.5	148	29.4	140	23.5	515	30.1
	総 数	2713	100	247	100	422	100	388	100	558	100	503	100	595	100	1712	100
女 性	BMI・腹囲の区分 BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	2503	73.8	264	91.3	466	86.0	394	82.1	487	71.9	424	65.2	488	62.0	1480	70.5
	BMI 25, 腹囲 < 85/90cm	282	8.3	15	5.2	42	7.7	47	9.8	58	8.6	57	8.8	63	8.3	187	8.9
総 数	BMI < 25, 腹囲 85/90cm	168	5.0	1	0.3	8	1.5	8	1.7	18	2.7	50	7.7	83	11.0	104	5.0
	BMI 25, 腹囲 85/90cm	440	13.0	9	3.1	26	4.8	31	6.5	114	16.8	119	18.3	141	18.7	327	15.6
	総 数	3393	100	289	100	542	100	480	100	677	100	650	100	755	100	2098	100
総 数	BMI・腹囲の区分 BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	3762	61.6	446	83.2	687	71.3	557	64.2	726	58.8	617	53.5	729	54.0	2174	57.1
	BMI 25, 腹囲 < 85/90cm	358	5.9	23	4.3	61	6.3	60	6.9	71	5.7	77	6.7	66	4.9	235	6.2
女 性	BMI < 25, 腹囲 85/90cm	812	13.3	17	3.2	72	7.5	103	11.9	154	12.5	192	16.7	274	20.3	559	14.7
	BMI 25, 腹囲 85/90cm	1174	19.2	50	9.3	144	14.9	148	17.1	284	23.0	267	23.2	281	20.8	842	22.1
	総 数	6106	100	536	100	964	100	868	100	1235	100	1153	100	1350	100	3810	100

注) 妊婦除外

第 29 表の 1 血圧を下げる薬の服用状況
(性・年齢階級別)

		総数		服用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	年齢(歳)						
	20 29歳	151	100.0	2	1.3	149	98.7
	30 39歳	285	100.0	7	2.5	278	97.5
	40 49歳	249	100.0	13	5.2	236	94.8
	50 59歳	409	100.0	85	20.8	324	79.2
	60 69歳	436	100.0	137	31.4	299	68.6
	70歳	522	100.0	243	46.6	279	53.4
	総数	2052	100.0	487	23.7	1565	76.3
女性	年齢(歳)						
	20 29歳	205	100.0	0	0	205	100.0
	30 39歳	436	100.0	3	0.7	433	99.3
	40 49歳	401	100.0	9	2.2	392	97.8
	50 59歳	574	100.0	83	14.5	491	85.5
	60 69歳	580	100.0	172	29.7	408	70.3
	70歳	666	100.0	320	48.0	346	52.0
	総数	2862	100.0	587	20.5	2275	79.5
総数	年齢(歳)						
	20 29歳	356	100.0	2	0.6	354	99.4
	30 39歳	721	100.0	10	1.4	711	98.6
	40 49歳	650	100.0	22	3.4	628	96.6
	50 59歳	983	100.0	168	17.1	815	82.9
	60 69歳	1016	100.0	309	30.4	707	69.6
	70歳	1188	100.0	563	47.4	625	52.6
	総数	4914	100.0	1074	21.9	3840	78.1

注) 妊婦除外

第 29 表の 2 脈の乱れを治す薬の服用状況
(性・年齢階級別)

		総数		服用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	年齢(歳)						
	20 29歳	151	100.0	1	0.7	150	99.3
	30 39歳	286	100.0	1	0.3	285	99.7
	40 49歳	250	100.0	1	0.4	249	99.6
	50 59歳	409	100.0	12	2.9	397	97.1
	60 69歳	436	100.0	21	4.8	415	95.2
	70歳	523	100.0	59	11.3	464	88.7
	総数	2055	100.0	95	4.6	1960	95.4
女性	年齢(歳)						
	20 29歳	205	100.0	0	0	205	100.0
	30 39歳	436	100.0	2	0.5	434	99.5
	40 49歳	401	100.0	1	0.2	400	99.8
	50 59歳	574	100.0	12	2.1	562	97.9
	60 69歳	580	100.0	26	4.5	554	95.5
	70歳	667	100.0	56	8.4	611	91.6
	総数	2863	100.0	97	3.4	2766	96.6
総数	年齢(歳)						
	20 29歳	356	100.0	1	0.3	355	99.7
	30 39歳	722	100.0	3	0.4	719	99.6
	40 49歳	651	100.0	2	0.3	649	99.7
	50 59歳	983	100.0	24	2.4	959	97.6
	60 69歳	1016	100.0	47	4.6	969	95.4
	70歳	1190	100.0	115	9.7	1075	90.3
	総数	4918	100.0	192	3.9	4726	96.1

注) 妊婦除外

第 29 表の 3 コレステロールを下げる薬の服用状況
(性・年齢階級別)

		総数		服用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	年齢(歳)						
	20 29歳	151	100.0	0	0	151	100.0
	30 39歳	285	100.0	6	2.1	279	97.9
	40 49歳	250	100.0	8	3.2	242	96.8
	50 59歳	409	100.0	38	9.3	371	90.7
	60 69歳	436	100.0	43	9.9	393	90.1
	70歳	523	100.0	55	10.5	468	89.5
	総数	2054	100.0	150	7.3	1904	92.7
女性	年齢(歳)						
	20 29歳	205	100.0	0	0	205	100.0
	30 39歳	436	100.0	2	0.5	434	99.5
	40 49歳	401	100.0	11	2.7	390	97.3
	50 59歳	574	100.0	73	12.7	501	87.3
	60 69歳	580	100.0	111	19.1	469	80.9
	70歳	665	100.0	158	23.8	507	76.2
	総数	2861	100.0	355	12.4	2506	87.6
総数	年齢(歳)						
	20 29歳	356	100.0	0	0	356	100.0
	30 39歳	721	100.0	8	1.1	713	98.9
	40 49歳	651	100.0	19	2.9	632	97.1
	50 59歳	983	100.0	111	11.3	872	88.7
	60 69歳	1016	100.0	154	15.2	862	84.8
	70歳	1188	100.0	213	17.9	975	82.1
	総数	4915	100.0	505	10.3	4410	89.7

注) 妊婦除外

第 29 表の 4 インスリン注射又は血糖を下げる薬の服用状況
(性・年齢階級別)

		総数		薬使用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	年齢(歳)						
	20 29歳	151	100.0	0	0	151	100.0
	30 39歳	286	100.0	3	1.0	283	99.0
	40 49歳	250	100.0	4	1.6	246	98.4
	50 59歳	409	100.0	22	5.4	387	94.6
	60 69歳	436	100.0	35	8.0	401	92.0
	70歳	523	100.0	62	11.9	461	88.1
	総数	2055	100.0	126	6.1	1929	93.9
女性	年齢(歳)						
	20 29歳	205	100.0	0	0	205	100.0
	30 39歳	436	100.0	2	0.5	434	99.5
	40 49歳	401	100.0	0	0	401	100.0
	50 59歳	574	100.0	15	2.6	559	97.4
	60 69歳	580	100.0	39	6.7	541	93.3
	70歳	667	100.0	64	9.6	603	90.4
	総数	2863	100.0	120	4.2	2743	95.8
総数	年齢(歳)						
	20 29歳	356	100.0	0	0	356	100.0
	30 39歳	722	100.0	5	0.7	717	99.3
	40 49歳	651	100.0	4	0.6	647	99.4
	50 59歳	983	100.0	37	3.8	946	96.2
	60 69歳	1016	100.0	74	7.3	942	92.7
	70歳	1190	100.0	126	10.6	1064	89.4
	総数	4918	100.0	246	5.0	4672	95.0

注) 妊婦除外

第30表の1 血圧の状況(性・年齢階級別)

性別	総数	総数		高血圧学会(2回測定値の平均値)												(再掲)	
		人数	%	至適血圧		正常血圧		正常高値		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧		収縮期高血圧	
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別	総数	1924	100.0	373	19.4	329	17.1	382	19.9	581	30.2	206	10.7	53	2.8	386	20.1
男性	15 19歳	71	100.0	55	77.5	6	8.5	5	7.0	4	5.6	0	0	1	1.4	3	4.2
	20 29歳	123	100.0	56	45.5	41	33.3	18	14.6	8	6.5	0	0	0	0	3	2.4
	30 39歳	223	100.0	74	33.2	60	26.9	48	21.5	28	12.6	10	4.5	3	1.3	6	2.7
	40 49歳	219	100.0	54	24.7	47	21.5	47	21.5	52	23.7	13	5.9	6	2.7	11	5.0
	50 59歳	366	100.0	46	12.6	49	13.4	80	21.9	129	35.2	50	13.7	12	3.3	60	16.4
	60 69歳	412	100.0	37	9.0	59	14.3	80	19.4	166	40.3	54	13.1	16	3.9	101	24.5
	70歳以上	510	100.0	51	10.0	67	13.1	104	20.4	194	38.0	79	15.5	15	2.9	202	39.6
	(再掲)65 74歳	444	100.0	41	9.2	61	13.7	84	18.9	175	39.4	65	14.6	18	4.1	134	30.2
	(再掲)75歳以上	289	100.0	27	9.3	36	12.5	60	20.8	117	40.5	44	15.2	5	1.7	129	44.6
女性	総数	2795	100.0	921	33.0	506	18.1	501	17.9	608	21.8	219	7.8	40	1.4	483	17.3
	15 19歳	77	100.0	67	87.0	8	10.4	0	0	2	2.6	0	0	0	0	1	1.3
	20 29歳	180	100.0	137	76.1	38	21.1	3	1.7	1	0.6	1	0.6	0	0	0	0
	30 39歳	413	100.0	297	71.9	74	17.9	26	6.3	14	3.4	2	0.5	0	0	1	0.2
	40 49歳	382	100.0	166	43.5	92	24.1	69	18.1	43	11.3	11	2.9	1	0.3	16	4.2
	50 59歳	544	100.0	130	23.9	107	19.7	116	21.3	135	24.8	52	9.6	4	0.7	77	14.2
	60 69歳	564	100.0	79	14.0	94	16.7	137	24.3	174	30.9	67	11.9	13	2.3	135	23.9
	70歳以上	635	100.0	45	7.1	93	14.6	150	23.6	239	37.6	86	13.5	22	3.5	253	39.8
	(再掲)65 74歳	544	100.0	57	10.5	88	16.2	133	24.4	189	34.7	59	10.8	18	3.3	165	30.3
(再掲)75歳以上	387	100.0	25	6.5	51	13.2	89	23.0	156	40.3	53	13.7	13	3.4	170	43.9	
総数	総数	4719	100.0	1294	27.4	835	17.7	883	18.7	1189	25.2	425	9.0	93	2.0	869	18.4
	15 19歳	148	100.0	122	82.4	14	9.5	5	3.4	6	4.1	0	0	1	0.7	4	2.7
	20 29歳	303	100.0	193	63.7	79	26.1	21	6.9	9	3.0	1	0.3	0	0	3	1.0
	30 39歳	636	100.0	371	58.3	134	21.1	74	11.6	42	6.6	12	1.9	3	0.5	7	1.1
	40 49歳	601	100.0	220	36.6	139	23.1	116	19.3	95	15.8	24	4.0	7	1.2	27	4.5
	50 59歳	910	100.0	176	19.3	156	17.1	196	21.5	264	29.0	102	11.2	16	1.8	137	15.1
	60 69歳	976	100.0	116	11.9	153	15.7	217	22.2	340	34.8	121	12.4	29	3.0	236	24.2
	70歳以上	1145	100.0	96	8.4	160	14.0	254	22.2	433	37.8	165	14.4	37	3.2	455	39.7
	(再掲)65 74歳	988	100.0	98	9.9	149	15.1	217	22.0	364	36.8	124	12.6	36	3.6	299	30.3
	(再掲)75歳以上	676	100.0	52	7.7	87	12.9	149	22.0	273	40.4	97	14.3	18	2.7	299	44.2

注) 日本高血圧学会による血圧の分類は p. 17 参照
総数に対する割合

第 30 表の 2 血圧の状況（性・年齢階級別）

性別	総数	総数		高血圧学会（2回測定値の平均値）												（再掲）	
				至適血圧		正常血圧		正常高値		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧		収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別	総数	1924	100.0	373	19.4	329	17.1	382	19.9	581	30.2	206	10.7	53	2.8	386	20.1
男性	15 19歳	71	100.0	55	77.5	6	8.5	5	7.0	4	5.6	0	0	1	1.4	3	4.2
	20 29歳	123	100.0	56	45.5	41	33.3	18	14.6	8	6.5	0	0	0	0	3	2.4
	30 39歳	223	100.0	74	33.2	60	26.9	48	21.5	28	12.6	10	4.5	3	1.3	6	2.7
	40 49歳	219	100.0	54	24.7	47	21.5	47	21.5	52	23.7	13	5.9	6	2.7	11	5.0
	50 59歳	366	100.0	46	12.6	49	13.4	80	21.9	129	35.2	50	13.7	12	3.3	60	16.4
	60 69歳	412	100.0	37	9.0	59	14.3	80	19.4	166	40.3	54	13.1	16	3.9	101	24.5
	70歳以上	510	100.0	51	10.0	67	13.1	104	20.4	194	38.0	79	15.5	15	2.9	202	39.6
	（再掲）65 74歳	444	100.0	41	9.2	61	13.7	84	18.9	175	39.4	65	14.6	18	4.1	134	30.2
	（再掲）75歳以上	289	100.0	27	9.3	36	12.5	60	20.8	117	40.5	44	15.2	5	1.7	129	44.6
女性	総数	2775	100.0	902	32.5	505	18.2	501	18.1	608	21.9	219	7.9	40	1.4	483	17.4
女性	15 19歳	77	100.0	67	87.0	8	10.4	0	0	2	2.6	0	0	0	0	1	1.3
	20 29歳	176	100.0	133	75.6	38	21.6	3	1.7	1	0.6	1	0.6	0	0	0	0
	30 39歳	397	100.0	282	71.0	73	18.4	26	6.5	14	3.5	2	0.5	0	0	1	0.3
	40 49歳	382	100.0	166	43.5	92	24.1	69	18.1	43	11.3	11	2.9	1	0.3	16	4.2
	50 59歳	544	100.0	130	23.9	107	19.7	116	21.3	135	24.8	52	9.6	4	0.7	77	14.2
	60 69歳	564	100.0	79	14.0	94	16.7	137	24.3	174	30.9	67	11.9	13	2.3	135	23.9
	70歳以上	635	100.0	45	7.1	93	14.6	150	23.6	239	37.6	86	13.5	22	3.5	253	39.8
	（再掲）65 74歳	544	100.0	57	10.5	88	16.2	133	24.4	189	34.7	59	10.8	18	3.3	165	30.3
	（再掲）75歳以上	387	100.0	25	6.5	51	13.2	89	23.0	156	40.3	53	13.7	13	3.4	170	43.9
総数	総数	4699	100.0	1275	27.1	834	17.7	883	18.8	1189	25.3	425	9.0	93	2.0	869	18.5
総数	15 19歳	148	100.0	122	82.4	14	9.5	5	3.4	6	4.1	0	0	1	0.7	4	2.7
	20 29歳	299	100.0	189	63.2	79	26.4	21	7.0	9	3.0	1	0.3	0	0	3	1.0
	30 39歳	620	100.0	356	57.4	133	21.5	74	11.9	42	6.8	12	1.9	3	0.5	7	1.1
	40 49歳	601	100.0	220	36.6	139	23.1	116	19.3	95	15.8	24	4.0	7	1.2	27	4.5
	50 59歳	910	100.0	176	19.3	156	17.1	196	21.5	264	29.0	102	11.2	16	1.8	137	15.1
	60 69歳	976	100.0	116	11.9	153	15.7	217	22.2	340	34.8	121	12.4	29	3.0	236	24.2
	70歳以上	1145	100.0	96	8.4	160	14.0	254	22.2	433	37.8	165	14.4	37	3.2	455	39.7
	（再掲）65 74歳	988	100.0	98	9.9	149	15.1	217	22.0	364	36.8	124	12.6	36	3.6	299	30.3
	（再掲）75歳以上	676	100.0	52	7.7	87	12.9	149	22.0	273	40.4	97	14.3	18	2.7	299	44.2

注) 妊婦除外
総数に対する割合

第30表の3 血圧の状況(性・年齢階級別)

性別	総数	総数		高血圧学会(2回測定値の平均値)												(再掲)	
				至適血圧		正常血圧		正常高値		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別	総数	1467	100.0	356	24.3	288	19.6	297	20.2	364	24.8	126	8.6	36	2.5	211	14.4
男性	15-19歳	71	100.0	55	77.5	6	8.5	5	7.0	4	5.6	0	0	1	1.4	3	4.2
	20-29歳	121	100.0	55	45.5	41	33.9	18	14.9	7	5.8	0	0	0	0	3	2.5
	30-39歳	219	100.0	73	33.3	60	27.4	48	21.9	27	12.3	9	4.1	2	0.9	5	2.3
	40-49歳	206	100.0	54	26.2	47	22.8	42	20.4	45	21.8	12	5.8	6	2.9	9	4.4
	50-59歳	290	100.0	44	15.2	45	15.5	61	21.0	98	33.8	33	11.4	9	3.1	41	14.1
	60-69歳	282	100.0	33	11.7	48	17.0	57	20.2	101	35.8	34	12.1	9	3.2	62	22.0
	70歳以上	278	100.0	42	15.1	41	14.7	66	23.7	82	29.5	38	13.7	9	3.2	88	31.7
	(再掲)65-74歳	277	100.0	38	13.7	44	15.9	59	21.3	88	31.8	39	14.1	9	3.2	67	24.2
	(再掲)75歳以上	150	100.0	19	12.7	23	15.3	35	23.3	51	34.0	17	11.3	5	3.3	54	36.0
女性	総数	2210	100.0	881	39.9	442	20.0	376	17.0	378	17.1	114	5.2	19	0.9	271	12.2
	15-19歳	77	100.0	67	87.0	8	10.4	0	0	2	2.6	0	0	0	0	1	1.3
	20-29歳	176	100.0	133	75.6	38	21.6	3	1.7	1	0.6	1	0.6	0	0	0	0
	30-39歳	394	100.0	282	71.6	71	18.0	26	6.6	13	3.3	2	0.5	0	0	1	0.2
	40-49歳	373	100.0	166	44.5	92	24.7	69	18.5	36	9.7	10	2.7	0	0	13	3.5
	50-59歳	466	100.0	128	27.5	99	21.2	104	22.3	102	21.9	31	6.7	2	0.4	56	12.0
	60-69歳	394	100.0	72	18.3	72	18.3	97	24.6	110	27.9	35	8.9	8	2.0	89	22.6
	70歳以上	330	100.0	33	10.0	62	18.8	77	23.3	114	34.5	35	10.6	9	2.7	111	33.6
	(再掲)65-74歳	344	100.0	49	14.2	65	18.9	90	26.2	109	31.7	23	6.7	8	2.3	92	26.7
(再掲)75歳以上	187	100.0	15	8.0	32	17.1	39	20.9	72	38.5	24	12.8	5	2.7	75	40.1	
総数	総数	3677	100.0	1237	33.6	730	19.9	673	18.3	742	20.2	240	6.5	55	1.5	482	13.0
総数	15-19歳	148	100.0	122	82.4	14	9.5	5	3.4	6	4.1	0	0	1	0.7	4	2.7
	20-29歳	297	100.0	188	63.3	79	26.6	21	7.1	8	2.7	1	0.3	0	0	3	1.0
	30-39歳	613	100.0	355	57.9	131	21.4	74	12.1	40	6.5	11	1.8	2	0.3	6	1.0
	40-49歳	579	100.0	220	38.0	139	24.0	111	19.2	81	14.0	22	3.8	6	1.0	22	3.8
	50-59歳	756	100.0	172	22.8	144	19.0	165	21.8	200	26.5	64	8.5	11	1.5	97	12.8
	60-69歳	676	100.0	105	15.5	120	17.8	154	22.8	211	31.2	69	10.2	17	2.5	151	22.3
	70歳以上	608	100.0	75	12.3	103	16.9	143	23.5	196	32.2	73	12.0	18	3.0	199	32.7
	(再掲)65-74歳	621	100.0	87	14.0	109	17.6	149	24.0	197	31.7	62	10.0	17	2.7	159	25.6
	(再掲)75歳以上	337	100.0	34	10.1	55	16.3	74	22.0	123	36.5	41	12.2	10	3.0	129	38.3

注) 妊婦・血圧を下げる薬服用者除外
総数に対する割合

第 31 表の 1 - 1 最低血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	2回の平均値(mmHg)																
	39	8	0.4	2	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.0	2	0.4
	40 49	8	0.4	2	2.8	2	1.6	1	0.4	2	0.9	0	0	1	0.2	0	0
	50 59	50	2.6	12	16.9	7	5.7	6	2.7	4	1.8	1	0.3	4	1.0	16	3.1
	60 69	221	11.5	29	40.8	39	31.7	28	12.6	15	6.8	19	5.2	27	6.6	64	12.5
	70 79	575	29.9	21	29.6	44	35.8	85	38.1	66	30.1	83	22.7	106	25.7	170	33.3
	80 89	608	31.6	3	4.2	26	21.1	68	30.5	72	32.9	132	36.1	135	32.8	172	33.7
	90 99	339	17.6	1	1.4	5	4.1	23	10.3	43	19.6	96	26.2	110	26.7	61	12.0
	100 109	89	4.6	0	0	0	0	9	4.0	11	5.0	28	7.7	21	5.1	20	3.9
	110 119	23	1.2	1	1.4	0	0	3	1.3	5	2.3	6	1.6	3	0.7	5	1.0
	120 129	3	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.5	1	0.3	1	0.2	0	0
総数		1924	100	71	100	123	100	223	100	219	100	366	100	412	100	510	100
女性	2回の平均値(mmHg)																
	39	8	0.3	0	0	1	0.6	1	0.2	1	0.3	1	0.2	1	0.2	3	0.5
	40 49	12	0.4	2	2.6	1	0.6	2	0.5	1	0.3	0	0	1	0.2	5	0.8
	50 59	128	4.6	21	27.3	31	17.2	33	8.0	11	2.9	11	2.0	4	0.7	17	2.7
	60 69	558	20.0	35	45.5	67	37.2	158	38.3	77	20.2	58	10.7	63	11.2	100	15.7
	70 79	946	33.8	16	20.8	59	32.8	156	37.8	149	39.0	165	30.3	177	31.4	224	35.3
	80 89	759	27.2	2	2.6	19	10.6	48	11.6	104	27.2	195	35.8	199	35.3	192	30.2
	90 99	299	10.7	1	1.3	2	1.1	13	3.1	29	7.6	84	15.4	92	16.3	78	12.3
	100 109	78	2.8	0	0	0	0	2	0.5	9	2.4	29	5.3	22	3.9	16	2.5
	110 119	4	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	2	0.4	0	0
	120 129	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0
130 139	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	
総数		2795	100	77	100	180	100	413	100	382	100	544	100	564	100	635	100

第 31 表の 1 - 1 最低血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別 男性	最低血圧(mmHg)	81.0	12.2	65.5	12.0	72.2	9.5	79.5	10.9	83.3	12.2	85.8	10.8	83.6	11.9	79.5	11.4
	平均	77.0	11.5	64.1	8.4	67.6	9.0	70.6	9.4	76.9	10.5	81.2	10.8	81.5	11.0	77.9	11.0
性別 女性	最低血圧(mmHg)	81.0	12.2	65.5	12.0	72.2	9.5	79.5	10.9	83.3	12.2	85.8	10.8	83.6	11.9	79.5	11.4
	平均	77.0	11.5	64.1	8.4	67.6	9.0	70.6	9.4	76.9	10.5	81.2	10.8	81.5	11.0	77.9	11.0

注) 2回測定値の平均値

第 31 表の 1 - 2 最高血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	2回の平均値(mmHg)																
	89	13	0.7	0	0	1	0.8	1	0.4	2	0.9	1	0.3	5	1.2	3	0.6
	90 99	31	1.6	7	9.9	4	3.3	5	2.2	5	2.3	3	0.8	4	1.0	3	0.6
	100 109	113	5.9	23	32.4	20	16.3	22	9.9	18	8.2	7	1.9	8	1.9	15	2.9
	110 119	270	14.0	26	36.6	38	30.9	62	27.8	39	17.8	40	10.9	30	7.3	35	6.9
	120 129	364	18.9	5	7.0	39	31.7	63	28.3	60	27.4	70	19.1	59	14.3	68	13.3
	130 139	374	19.4	6	8.5	14	11.4	46	20.6	39	17.8	83	22.7	85	20.6	101	19.8
	140 149	344	17.9	2	2.8	2	1.6	20	9.0	28	12.8	84	23.0	98	23.8	110	21.6
	150 159	212	11.0	1	1.4	5	4.1	2	0.9	19	8.7	36	9.8	60	14.6	89	17.5
	160 169	118	6.1	1	1.4	0	0	2	0.9	3	1.4	18	4.9	36	8.7	58	11.4
	170 179	52	2.7	0	0	0	0	0	0	4	1.8	17	4.6	14	3.4	17	3.3
180	33	1.7	0	0	0	0	0	0	2	0.9	7	1.9	13	3.2	11	2.2	
総数		1924	100	71	100	123	100	223	100	219	100	366	100	412	100	510	100
女性	2回の平均値(mmHg)																
	89	26	0.9	2	2.6	5	2.8	8	1.9	2	0.5	4	0.7	3	0.5	2	0.3
	90 99	145	5.2	20	26.0	24	13.3	54	13.1	22	5.8	15	2.8	5	0.9	5	0.8
	100 109	382	13.7	31	40.3	66	36.7	145	35.1	67	17.5	37	6.8	23	4.1	13	2.0
	110 119	445	15.9	14	18.2	51	28.3	105	25.4	91	23.8	93	17.1	60	10.6	31	4.9
	120 129	528	18.9	8	10.4	30	16.7	75	18.2	99	25.9	113	20.8	99	17.6	104	16.4
	130 139	480	17.2	1	1.3	3	1.7	21	5.1	58	15.2	110	20.2	140	24.8	147	23.1
	140 149	342	12.2	1	1.3	0	0	4	1.0	26	6.8	82	15.1	90	16.0	139	21.9
	150 159	231	8.3	0	0	0	0	1	0.2	11	2.9	51	9.4	76	13.5	92	14.5
	160 169	122	4.4	0	0	1	0.6	0	0	4	1.0	29	5.3	33	5.9	55	8.7
	170 179	55	2.0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	7	1.3	22	3.9	25	3.9
180	39	1.4	0	0	0	0	0	0	1	0.3	3	0.6	13	2.3	22	3.5	
総数		2795	100	77	100	180	100	413	100	382	100	544	100	564	100	635	100

第 31 表の 1 - 2 最高血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別 男性	最高血圧(mmHg)	134.7	19.8	113.6	13.1	119.4	12.6	123.6	12.8	128.8	18.1	138.2	18.0	140.6	20.6	141.6	19.0
	平均	128.4	21.0	106.1	11.2	109.2	11.8	110.9	12.2	121.3	16.1	131.2	18.3	137.7	20.0	141.6	18.3
性別 女性	最高血圧(mmHg)	134.7	19.8	113.6	13.1	119.4	12.6	123.6	12.8	128.8	18.1	138.2	18.0	140.6	20.6	141.6	19.0
	平均	128.4	21.0	106.1	11.2	109.2	11.8	110.9	12.2	121.3	16.1	131.2	18.3	137.7	20.0	141.6	18.3

注) 2回測定値の平均値

第31表の2-1 最低血圧の分布(性・年齢階級別)

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	2回の平均値(mmHg)																
	39	8	0.4	2	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.0	2	0.4
	40 49	8	0.4	2	2.8	2	1.6	1	0.4	2	0.9	0	0	1	0.2	0	0
	50 59	50	2.6	12	16.9	7	5.7	6	2.7	4	1.8	1	0.3	4	1.0	16	3.1
	60 69	221	11.5	29	40.8	39	31.7	28	12.6	15	6.8	19	5.2	27	6.6	64	12.5
	70 79	575	29.9	21	29.6	44	35.8	85	38.1	66	30.1	83	22.7	106	25.7	170	33.3
	80 89	608	31.6	3	4.2	26	21.1	68	30.5	72	32.9	132	36.1	135	32.8	172	33.7
	90 99	339	17.6	1	1.4	5	4.1	23	10.3	43	19.6	96	26.2	110	26.7	61	12.0
	100 109	89	4.6	0	0	0	0	9	4.0	11	5.0	28	7.7	21	5.1	20	3.9
	110 119	23	1.2	1	1.4	0	0	3	1.3	5	2.3	6	1.6	3	0.7	5	1.0
	120 129	3	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.5	1	0.3	1	0.2	0	0
総数	1924	100	71	100	123	100	223	100	219	100	366	100	412	100	510	100	
女性	2回の平均値(mmHg)																
	39	8	0.3	0	0	1	0.6	1	0.3	1	0.3	1	0.2	1	0.2	3	0.5
	40 49	12	0.4	2	2.6	1	0.6	2	0.5	1	0.3	0	0	1	0.2	5	0.8
	50 59	120	4.3	21	27.3	28	15.9	28	7.1	11	2.9	11	2.0	4	0.7	17	2.7
	60 69	548	19.7	35	45.5	66	37.5	149	37.5	77	20.2	58	10.7	63	11.2	100	15.7
	70 79	944	34.0	16	20.8	59	33.5	154	38.8	149	39.0	165	30.3	177	31.4	224	35.3
	80 89	759	27.4	2	2.6	19	10.8	48	12.1	104	27.2	195	35.8	199	35.3	192	30.2
	90 99	299	10.8	1	1.3	2	1.1	13	3.3	29	7.6	84	15.4	92	16.3	78	12.3
	100 109	78	2.8	0	0	0	0	2	0.5	9	2.4	29	5.3	22	3.9	16	2.5
	110 119	4	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	2	0.4	0	0
	120 129	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0
130 139	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	
総数	2775	100	77	100	176	100	397	100	382	100	544	100	564	100	635	100	

注) 妊婦除外

第31表の2-1 最低血圧の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別 男性	最低血圧(mmHg)	81.0	12.2	65.5	12.0	72.2	9.5	79.5	10.9	83.3	12.2	85.8	10.8	83.6	11.9	79.5	11.4
	標準偏差	77.1	11.5	64.1	8.4	67.9	8.9	71.0	9.4	76.9	10.5	81.2	10.8	81.5	11.0	77.9	11.0
女性	最低血圧(mmHg)	81.0	12.2	65.5	12.0	72.2	9.5	79.5	10.9	83.3	12.2	85.8	10.8	83.6	11.9	79.5	11.4
	標準偏差	77.1	11.5	64.1	8.4	67.9	8.9	71.0	9.4	76.9	10.5	81.2	10.8	81.5	11.0	77.9	11.0

注) 妊婦除外 2回測定値の平均値

第31表の2-2 最高血圧の分布(性・年齢階級別)

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	2回の平均値(mmHg)																
	89	13	0.7	0	0	1	0.8	1	0.4	2	0.9	1	0.3	5	1.2	3	0.6
	90 99	31	1.6	7	9.9	4	3.3	5	2.2	5	2.3	3	0.8	4	1.0	3	0.6
	100 109	113	5.9	23	32.4	20	16.3	22	9.9	18	8.2	7	1.9	8	1.9	15	2.9
	110 119	270	14.0	26	36.6	38	30.9	62	27.8	39	17.8	40	10.9	30	7.3	35	6.9
	120 129	364	18.9	5	7.0	39	31.7	63	28.3	60	27.4	70	19.1	59	14.3	68	13.3
	130 139	374	19.4	6	8.5	14	11.4	46	20.6	39	17.8	83	22.7	85	20.6	101	19.8
	140 149	344	17.9	2	2.8	2	1.6	20	9.0	28	12.8	84	23.0	98	23.8	110	21.6
	150 159	212	11.0	1	1.4	5	4.1	2	0.9	19	8.7	36	9.8	60	14.6	89	17.5
	160 169	118	6.1	1	1.4	0	0	2	0.9	3	1.4	18	4.9	36	8.7	58	11.4
	170 179	52	2.7	0	0	0	0	0	0	4	1.8	17	4.6	14	3.4	17	3.3
180	33	1.7	0	0	0	0	0	0	2	0.9	7	1.9	13	3.2	11	2.2	
総数	1924	100	71	100	123	100	223	100	219	100	366	100	412	100	510	100	
女性	2回の平均値(mmHg)																
	89	24	0.9	2	2.6	5	2.8	6	1.5	2	0.5	4	0.7	3	0.5	2	0.3
	90 99	139	5.0	20	26.0	23	13.1	49	12.3	22	5.8	15	2.8	5	0.9	5	0.8
	100 109	373	13.4	31	40.3	63	35.8	139	35.0	67	17.5	37	6.8	23	4.1	13	2.0
	110 119	443	16.0	14	18.2	51	29.0	103	25.9	91	23.8	93	17.1	60	10.6	31	4.9
	120 129	527	19.0	8	10.4	30	17.0	74	18.6	99	25.9	113	20.8	99	17.6	104	16.4
	130 139	480	17.3	1	1.3	3	1.7	21	5.3	58	15.2	110	20.2	140	24.8	147	23.1
	140 149	342	12.3	1	1.3	0	0	4	1.0	26	6.8	82	15.1	90	16.0	139	21.9
	150 159	231	8.3	0	0	0	0	1	0.3	11	2.9	51	9.4	76	13.5	92	14.5
	160 169	122	4.4	0	0	1	0.6	0	0	4	1.0	29	5.3	33	5.9	55	8.7
	170 179	55	2.0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	7	1.3	22	3.9	25	3.9
180	39	1.4	0	0	0	0	0	0	1	0.3	3	0.6	13	2.3	22	3.5	
総数	2775	100	77	100	176	100	397	100	382	100	544	100	564	100	635	100	

注) 妊婦除外

第31表の2-2 最高血圧の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別 男性	最高血圧(mmHg)	134.7	19.8	113.6	13.1	119.4	12.6	123.6	12.8	128.8	18.1	138.2	18.0	140.6	20.6	141.6	19.0
	標準偏差	128.6	20.9	106.1	11.2	109.4	11.8	111.3	12.0	121.3	16.1	131.2	18.3	137.7	20.0	141.6	18.3
女性	最高血圧(mmHg)	134.7	19.8	113.6	13.1	119.4	12.6	123.6	12.8	128.8	18.1	138.2	18.0	140.6	20.6	141.6	19.0
	標準偏差	128.6	20.9	106.1	11.2	109.4	11.8	111.3	12.0	121.3	16.1	131.2	18.3	137.7	20.0	141.6	18.3

注) 妊婦除外 2回測定値の平均値

第 31 表の 3 - 1 最低血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	2回の平均値(mmHg)																
	39	8	0.5	2	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.4	2	0.7
	40 49	8	0.5	2	2.8	2	1.7	1	0.5	2	1.0	0	0	1	0.4	0	0
	50 59	42	2.9	12	16.9	7	5.8	6	2.7	4	1.9	1	0.3	2	0.7	10	3.6
	60 69	186	12.7	29	40.8	39	32.2	28	12.8	15	7.3	15	5.2	24	8.5	36	12.9
	70 79	458	31.2	21	29.6	43	35.5	84	38.4	65	31.6	69	23.8	80	28.4	96	34.5
	80 89	450	30.7	3	4.2	26	21.5	67	30.6	66	32.0	106	36.6	89	31.6	93	33.5
	90 99	227	15.5	1	1.4	4	3.3	23	10.5	37	18.0	72	24.8	63	22.3	27	9.7
	100 109	69	4.7	0	0	0	0	8	3.7	11	5.3	21	7.2	18	6.4	11	4.0
	110 119	18	1.2	1	1.4	0	0	2	0.9	5	2.4	6	2.1	1	0.4	3	1.1
	120 129	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
総数		1467	100	71	100	121	100	219	100	206	100	290	100	282	100	278	100
女性	2回の平均値(mmHg)																
	39	6	0.3	0	0	1	0.6	1	0.3	1	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.3
	40 49	11	0.5	2	2.6	1	0.6	2	0.5	1	0.3	0	0	1	0.3	4	1.2
	50 59	112	5.1	21	27.3	28	15.9	28	7.1	11	2.9	10	2.1	4	1.0	10	3.0
	60 69	482	21.8	35	45.5	66	37.5	149	37.8	77	20.6	57	12.2	49	12.4	49	14.8
	70 79	787	35.6	16	20.8	59	33.5	153	38.8	148	39.7	156	33.5	129	32.7	126	38.2
	80 89	572	25.9	2	2.6	19	10.8	47	11.9	102	27.3	163	35.0	146	37.1	93	28.2
	90 99	188	8.5	1	1.3	2	1.1	12	3.0	25	6.7	61	13.1	51	12.9	36	10.9
	100 109	49	2.2	0	0	0	0	2	0.5	8	2.1	17	3.6	11	2.8	11	3.3
	110 119	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0
	120 129	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	0	0
総数		2210	100	77	100	176	100	394	100	373	100	466	100	394	100	330	100

注) 妊婦・血圧を下げる薬服用者除外

第 31 表の 3 - 1 最低血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別 男性	最低血圧(mmHg)	80.2	12.4	65.5	12.0	71.9	9.3	79.2	10.7	82.8	12.4	85.4	11.0	82.3	12.3	78.9	11.7
	2回の平均値(mmHg)	75.9	11.1	64.1	8.4	67.9	8.9	70.9	9.4	76.5	10.2	79.9	10.4	80.2	10.4	77.7	11.2
女性	最低血圧(mmHg)	80.2	12.4	65.5	12.0	71.9	9.3	79.2	10.7	82.8	12.4	85.4	11.0	82.3	12.3	78.9	11.7
	2回の平均値(mmHg)	75.9	11.1	64.1	8.4	67.9	8.9	70.9	9.4	76.5	10.2	79.9	10.4	80.2	10.4	77.7	11.2

注) 妊婦・血圧を下げる薬服用者除外 2回測定値の平均値

第 31 表の 3 - 2 最高血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	2回の平均値(mmHg)																
	89	12	0.8	0	0	1	0.8	1	0.5	2	1.0	1	0.3	5	1.8	2	0.7
	90 99	31	2.1	7	9.9	4	3.3	5	2.3	5	2.4	3	1.0	4	1.4	3	1.1
	100 109	108	7.4	23	32.4	19	15.7	22	10.0	18	8.7	7	2.4	6	2.1	13	4.7
	110 119	253	17.2	26	36.6	38	31.4	61	27.9	38	18.4	38	13.1	26	9.2	26	9.4
	120 129	320	21.8	5	7.0	39	32.2	63	28.8	59	28.6	63	21.7	48	17.0	43	15.5
	130 139	283	19.3	6	8.5	14	11.6	46	21.0	34	16.5	62	21.4	57	20.2	64	23.0
	140 149	222	15.1	2	2.8	2	1.7	17	7.8	26	12.6	63	21.7	58	20.6	54	19.4
	150 159	118	8.0	1	1.4	4	3.3	2	0.9	16	7.8	25	8.6	41	14.5	29	10.4
	160 169	70	4.8	1	1.4	0	0	2	0.9	2	1.0	12	4.1	22	7.8	31	11.2
	170 179	30	2.0	0	0	0	0	0	0	4	1.9	12	4.1	7	2.5	7	2.5
180	20	1.4	0	0	0	0	0	0	2	1.0	4	1.4	8	2.8	6	2.2	
総数		1467	100	71	100	121	100	219	100	206	100	290	100	282	100	278	100
女性	2回の平均値(mmHg)																
	89	22	1.0	2	2.6	5	2.8	6	1.5	2	0.5	4	0.9	2	0.5	1	0.3
	90 99	139	6.3	20	26.0	23	13.1	49	12.4	22	5.9	15	3.2	5	1.3	5	1.5
	100 109	369	16.7	31	40.3	63	35.8	139	35.3	67	18.0	36	7.7	21	5.3	12	3.6
	110 119	421	19.0	14	18.2	51	29.0	103	26.1	91	24.4	90	19.3	53	13.5	19	5.8
	120 129	455	20.6	8	10.4	30	17.0	71	18.0	99	26.5	106	22.7	75	19.0	66	20.0
	130 139	350	15.8	1	1.3	3	1.7	21	5.3	58	15.5	96	20.6	95	24.1	76	23.0
	140 149	216	9.8	1	1.3	0	0	4	1.0	21	5.6	63	13.5	60	15.2	67	20.3
	150 159	134	6.1	0	0	0	0	1	0.3	8	2.1	33	7.1	46	11.7	46	13.9
	160 169	63	2.9	0	0	1	0.6	0	0	4	1.1	18	3.9	19	4.8	21	6.4
	170 179	23	1.0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	4	0.9	10	2.5	8	2.4
180	18	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	8	2.0	9	2.7	
総数		2210	100	77	100	176	100	394	100	373	100	466	100	394	100	330	100

注) 妊婦・血圧を下げる薬服用者除外

第 31 表の 3 - 2 最高血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別 男性	最高血圧(mmHg)	131.4	19.4	113.6	13.1	119.2	12.3	123.3	12.7	128.0	18.1	136.1	17.9	138.1	21.6	138.3	19.8
	2回の平均値(mmHg)	124.4	19.2	106.1	11.2	109.4	11.8	111.2	12.0	120.5	15.2	128.7	17.3	134.8	18.8	138.2	18.2
女性	最高血圧(mmHg)	131.4	19.4	113.6	13.1	119.2	12.3	123.3	12.7	128.0	18.1	136.1	17.9	138.1	21.6	138.3	19.8
	2回の平均値(mmHg)	124.4	19.2	106.1	11.2	109.4	11.8	111.2	12.0	120.5	15.2	128.7	17.3	134.8	18.8	138.2	18.2

注) 妊婦・血圧を下げる薬服用者除外 2回測定値の平均値

第32表 血色素量の分布(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	血色素量(g/dl)																								
	<10	16	0.9	1	0.9	0	0	1	0.5	2	0.6	2	0.5	10	2.1	0	0	4	1.9	2	1.3	3	3.7	1	3.7
	10-<11	13	0.7	0	0	0	0	0	0	1	0.3	3	0.8	9	1.9	2	1.0	4	1.9	1	0.6	3	3.7	1	3.7
	11-<12	34	2.0	0	0	0	0	0	0	3	0.9	7	1.8	24	5.1	3	1.4	6	2.9	9	5.8	7	8.5	2	7.4
	12-<13	123	7.1	0	0	2	0.9	2	1.0	15	4.3	28	7.2	76	16.1	16	7.7	22	10.6	29	18.6	17	20.7	8	29.6
	13-<14	324	18.6	10	8.8	18	8.5	19	9.2	57	16.3	86	22.2	134	28.4	49	23.7	53	25.6	46	29.5	27	32.9	8	29.6
	14-<15	526	30.2	29	25.4	68	32.2	74	35.7	118	33.8	122	31.4	115	24.4	62	30.0	57	27.5	36	23.1	19	23.2	3	11.1
	15-<16	455	26.1	42	36.8	80	37.9	69	33.3	101	28.9	91	23.5	72	15.3	46	22.2	41	19.8	23	14.7	5	6.1	3	11.1
	16-<17	199	11.4	26	22.8	31	14.7	34	16.4	43	12.3	37	9.5	28	5.9	20	9.7	18	8.7	8	5.1	1	1.2	1	3.7
	17-<18	43	2.5	6	5.3	9	4.3	6	2.9	8	2.3	11	2.8	3	0.6	9	4.3	2	1.0	1	0.6	0	0	0	0
18-	8	0.5	0	0	3	1.4	2	1.0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	0	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0	
総数		1741	100	114	100	211	100	207	100	349	100	388	100	472	100	207	100	207	100	156	100	82	100	27	100
性別 女性	血色素量(g/dl)																								
	<10	58	2.3	3	1.8	15	3.8	20	5.5	8	1.5	1	0.2	11	1.9	1	0.4	1	0.4	2	1.0	4	4.8	4	7.3
	10-<11	91	3.6	3	1.8	18	4.6	24	6.6	9	1.7	5	1.0	32	5.5	2	0.7	8	3.4	9	4.3	5	6.0	10	18.2
	11-<12	343	13.4	25	15.1	52	13.2	48	13.2	43	8.2	62	11.9	113	19.5	40	14.8	37	15.8	46	22.2	22	26.2	8	14.5
	12-<13	804	31.5	62	37.3	124	31.4	114	31.4	157	30.0	158	30.2	189	32.6	75	27.8	80	34.2	69	33.3	23	27.4	17	30.9
	13-<14	885	34.7	58	34.9	145	36.7	112	30.9	199	38.0	203	38.8	168	29.0	106	39.3	79	33.8	58	28.0	21	25.0	10	18.2
	14-<15	320	12.5	14	8.4	38	9.6	40	11.0	92	17.6	80	15.3	56	9.7	38	14.1	26	11.1	19	9.2	7	8.3	4	7.3
	15-<16	48	1.9	1	0.6	2	0.5	5	1.4	16	3.1	13	2.5	11	1.9	7	2.6	3	1.3	4	1.9	2	2.4	2	3.6
16-<17	2	0.1	0	0	1	0.3	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数		2551	100	166	100	395	100	363	100	524	100	523	100	580	100	270	100	234	100	207	100	84	100	55	100

第32表 血色素量の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)	
性別		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性		14.6	1.4	15.3	1.1	15.2	1.0	15.1	1.1	14.7	1.3	14.5	1.3	13.8	1.5	14.5	1.3	14.1	1.5	13.8	1.4	13.2	1.5	13.0	1.8
女性		12.8	1.2	12.7	1.0	12.7	1.3	12.5	1.5	13.1	1.1	13.1	1.0	12.6	1.2	13.0	1.0	12.8	1.1	12.6	1.1	12.4	1.3	12.1	1.6

第33表 赤血球数の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	赤血球数(万個/mm ³)																								
	<<400	116	6.7	0	0	0	0	0	0	10	2.9	25	6.4	81	17.2	13	6.3	20	9.7	30	19.2	19	23.2	12	44.4
	400-<450	447	25.7	5	4.4	22	10.4	24	11.6	98	28.1	123	31.7	175	37.1	64	30.9	72	34.8	54	34.6	40	48.8	9	33.3
	450-<500	726	41.7	44	38.6	91	43.1	107	51.7	154	44.1	169	43.6	161	34.1	89	43.0	80	38.6	56	35.9	21	25.6	4	14.8
	500-<550	389	22.3	52	45.6	87	41.2	62	30.0	78	22.3	60	15.5	50	10.6	34	16.4	31	15.0	15	9.6	2	2.4	2	7.4
	550-<600	59	3.4	13	11.4	11	5.2	11	5.3	8	2.3	11	2.8	5	1.1	7	3.4	4	1.9	1	0.6	0	0	0	0
	600-<650	3	0.2	0	0	0	0	3	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	650-	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(再掲)<410	172	9.9	2	1.8	0	0	2	1.0	20	5.7	39	10.1	109	23.1	19	9.2	30	14.5	40	25.6	26	31.7	13	48.1
	(再掲)530	145	8.3	31	27.2	33	15.6	28	13.5	21	6.0	21	5.4	11	2.3	14	6.8	9	4.3	2	1.3	0	0	0	0
総数	1741	100	114	100	211	100	207	100	349	100	388	100	472	100	207	100	207	100	156	100	82	100	27	100	
性別 女性	赤血球数(万個/mm ³)																								
	<<400	428	16.8	11	6.6	41	10.4	47	12.9	64	12.2	84	16.1	181	31.2	47	17.4	48	20.5	70	33.8	32	38.1	31	56.4
	400-<450	1346	52.8	93	56.0	216	54.7	205	56.5	268	51.1	278	53.2	286	49.3	145	53.7	133	56.8	96	46.4	40	47.6	17	30.9
	450-<500	695	27.2	56	33.7	125	31.6	103	28.4	162	30.9	144	27.5	105	18.1	73	27.0	49	20.9	38	18.4	12	14.3	6	10.9
	500-<550	77	3.0	6	3.6	13	3.3	7	1.9	27	5.2	16	3.1	8	1.4	4	1.5	4	1.7	3	1.4	0	0	1	1.8
	550-<600	4	0.2	0	0	0	0	1	0.3	2	0.4	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	600-<650	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(再掲)<380	167	6.5	2	1.2	9	2.3	17	4.7	15	2.9	25	4.8	99	17.1	19	7.0	28	12.0	40	19.3	17	20.2	14	25.5
	(再掲)480	222	8.7	12	7.2	30	7.6	26	7.2	75	14.3	50	9.6	29	5.0	20	7.4	13	5.6	10	4.8	4	4.8	2	3.6
	総数	2551	100	166	100	395	100	363	100	524	100	523	100	580	100	270	100	234	100	207	100	84	100	55	100

第33表 赤血球数の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		赤血球数 (万個/mm ³)		赤血球数 (万個/mm ³)		赤血球数 (万個/mm ³)		赤血球数 (万個/mm ³)		赤血球数 (万個/mm ³)		赤血球数 (万個/mm ³)		赤血球数 (万個/mm ³)		赤血球数 (万個/mm ³)		赤血球数 (万個/mm ³)		赤血球数 (万個/mm ³)		赤血球数 (万個/mm ³)			
性別		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性		468.8	47.4	508.5	34.3	495.1	34.7	492.1	36.7	471.5	41.2	462.1	43.0	440.8	48.7	463.3	44.0	452.9	48.0	439.3	45.2	421.0	48.0	417.7	49.3
女性		432.4	36.1	441.4	27.9	437.9	32.2	434.4	32.9	441.0	36.8	433.1	34.6	416.4	38.4	430.9	34.6	423.8	35.6	414.5	39.2	411.3	36.3	399.5	43.1

第34表 ヘマトクリット値の分布(性・年齢階級別)

性別	ヘマトクリット(%)	年齢(歳)																											
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	-<25	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1.2	0	0		
	25-<30	4	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	3	0.6	0	0	1	0.5	1	0.6	0	0	1	3.7	1	3.7		
	30-<35	20	1.1	1	0.9	0	0	1	0.5	1	0.3	4	1.0	13	2.8	1	0.5	5	2.4	2	1.3	5	6.1	1	3.7	1	3.7		
	35-<40	119	6.8	0	0	2	0.9	1	0.5	14	4.0	28	7.2	74	15.7	16	7.7	22	10.6	26	16.7	18	22.0	8	29.6	8	29.6		
	40-<45	652	37.4	23	20.2	55	26.1	62	30.0	137	39.3	151	38.9	224	47.5	80	38.6	90	43.5	77	49.4	45	54.9	12	44.4	12	44.4		
	45-<50	791	45.4	75	65.8	126	59.7	119	57.5	167	47.9	170	43.8	134	28.4	87	42.0	78	37.7	41	26.3	12	14.6	3	11.1	3	11.1		
	50-<55	148	8.5	15	13.2	26	12.3	23	11.1	28	8.0	34	8.8	22	4.7	23	11.1	11	5.3	8	5.1	1	1.2	2	7.4	2	7.4		
	55-	6	0.3	0	0	2	0.9	1	0.5	1	0.3	1	0.3	1	0.2	0	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	(再掲)<39.8	135	7.8	1	0.9	1	0.5	2	1.0	14	4.0	29	7.5	88	18.6	14	6.8	27	13.0	27	17.3	24	29.3	10	37.0	10	37.0		
	(再掲)51.9	59	3.4	4	3.5	15	7.1	12	5.8	10	2.9	10	2.6	8	1.7	6	2.9	5	2.4	3	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	1741	100	114	100	211	100	207	100	349	100	388	100	472	100	207	100	207	100	156	100	82	100	27	100	27	100			
女性	-<25	2	0.1	0	0	0	0	2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25-<30	12	0.5	0	0	3	0.8	6	1.7	1	0.2	0	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	1	1.2	1	1.8	1	1.8		
	30-<35	101	4.0	6	3.6	23	5.8	17	4.7	10	1.9	4	0.8	41	7.1	2	0.7	9	3.8	15	7.2	5	6.0	12	21.8	12	21.8		
	35-<40	891	34.9	69	41.6	140	35.4	145	39.9	151	28.8	155	29.6	231	39.8	86	31.9	83	35.5	87	42.0	41	48.8	20	36.4	20	36.4		
	40-<45	1309	51.3	85	51.2	203	51.4	172	47.4	294	56.1	303	57.9	252	43.4	150	55.6	118	50.4	88	42.5	29	34.5	17	30.9	17	30.9		
	45-<50	231	9.1	6	3.6	25	6.3	21	5.8	68	13.0	58	11.1	53	9.1	31	11.5	24	10.3	17	8.2	8	9.5	4	7.3	4	7.3		
	50-<55	5	0.2	0	0	1	0.3	0	0	0	0	3	0.6	1	0.2	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8		
	(再掲)<33.4	61	2.4	2	1.2	13	3.3	17	4.7	7	1.3	2	0.4	20	3.4	1	0.4	6	2.6	6	2.9	2	2.4	6	10.9	6	10.9		
	(再掲)45.0	236	9.3	6	3.6	26	6.6	21	5.8	68	13.0	61	11.7	54	9.3	32	11.9	24	10.3	17	8.2	8	9.5	5	9.1	5	9.1		
	総数	2551	100	166	100	395	100	363	100	524	100	523	100	580	100	270	100	234	100	207	100	84	100	55	100	55	100		

第34表 ヘマトクリット値の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	45.1	3.9	46.8	3.0	46.9	3.0	46.5	3.0	45.5	3.5	45.0	3.6	43.2	4.4	45.1	3.7	44.1	4.2	43.2	4.2	41.4	4.4	41.0	5.3
女性	40.7	3.3	40.4	2.8	40.3	3.3	40.0	3.7	41.4	3.0	41.4	3.0	40.1	3.5	41.3	3.1	40.7	3.3	40.2	3.3	39.6	3.6	38.8	4.6

第 35 表 平均赤血球容積 (MCV) の分布 (性・年齢階級別)

		年齢 (歳)																									
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	MCV (fl)																										
	<70	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-<75	6	0.3	0	0	0	0	2	1.0	1	0.3	1	0.3	2	0.4	0	0	0	0	0	0	1	1.2	1	3.7		
	75-<80	6	0.3	0	0	0	0	2	1.0	1	0.3	0	0	3	0.6	0	0	2	1.0	1	0.6	0	0	0	0		
	80-<85	17	1.0	6	5.3	1	0.5	0	0	4	1.1	3	0.8	3	0.6	2	1.0	2	1.0	1	0.6	0	0	0	0		
	85-<90	116	6.7	28	24.6	23	10.9	18	8.7	21	6.0	17	4.4	9	1.9	10	4.8	6	2.9	3	1.9	0	0	0	0		
	90-<95	520	29.9	54	47.4	95	45.0	93	44.9	99	28.4	84	21.6	95	20.1	44	21.3	47	22.7	24	15.4	18	22.0	6	22.2		
	95-<100	651	37.4	23	20.2	65	30.8	65	31.4	126	36.1	162	41.8	210	44.5	81	39.1	94	45.4	76	48.7	30	36.6	10	37.0		
	100-<105	328	18.8	3	2.6	24	11.4	20	9.7	74	21.2	94	24.2	113	23.9	56	27.1	41	19.8	39	25.0	27	32.9	6	22.2		
	105-<110	75	4.3	0	0	3	1.4	6	2.9	16	4.6	20	5.2	30	6.4	11	5.3	13	6.3	7	4.5	6	7.3	4	14.8		
	110-<115	16	0.9	0	0	0	0	1	0.5	5	1.4	4	1.0	6	1.3	1	0.5	2	1.0	4	2.6	0	0	0	0		
115-<120	4	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.5	1	0.2	1	0.5	0	0	1	0.6	0	0	0	0			
総 数		1741	100	114	100	211	100	207	100	349	100	388	100	472	100	207	100	207	100	156	100	82	100	27	100		
女 性	MCV (fl)																										
	<70	18	0.7	0	0	4	1.0	8	2.2	4	0.8	1	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0	0	0	0	0	1	1.8		
	70-<75	13	0.5	0	0	3	0.8	5	1.4	2	0.4	1	0.2	2	0.3	0	0	1	0.4	1	0.5	0	0	0	0		
	75-<80	37	1.5	4	2.4	13	3.3	12	3.3	4	0.8	0	0	4	0.7	0	0	0	0	0	0	2	2.4	2	3.6		
	80-<85	66	2.6	12	7.2	17	4.3	24	6.6	8	1.5	2	0.4	3	0.5	2	0.7	2	0.9	1	0.5	0	0	0	0		
	85-<90	293	11.5	43	25.9	66	16.7	53	14.6	61	11.6	36	6.9	34	5.9	14	5.2	17	7.3	13	6.3	4	4.8	0	0		
	90-<95	907	35.6	69	41.6	168	42.5	125	34.4	209	39.9	193	36.9	143	24.7	102	37.8	75	32.1	41	19.8	19	22.6	8	14.5		
	95-<100	877	34.4	32	19.3	96	24.3	94	25.9	178	34.0	211	40.3	266	45.9	106	39.3	94	40.2	104	50.2	44	52.4	24	43.6		
	100-<105	288	11.3	4	2.4	24	6.1	35	9.6	51	9.7	66	12.6	108	18.6	36	13.3	41	17.5	35	16.9	15	17.9	17	30.9		
	105-<110	47	1.8	2	1.2	4	1.0	7	1.9	5	1.0	13	2.5	16	2.8	9	3.3	4	1.7	9	4.3	0	0	3	5.5		
	110-<115	5	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	3	0.5	0	0	0	0	3	1.4	0	0	0	0		
総 数		2551	100	166	100	395	100	363	100	524	100	523	100	580	100	270	100	234	100	207	100	84	100	55	100		

第 35 表 平均赤血球容積 (MCV) の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

		年齢 (歳)																							
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		MCV (fl)		MCV (fl)		MCV (fl)		MCV (fl)		MCV (fl)		MCV (fl)		MCV (fl)		MCV (fl)		MCV (fl)		MCV (fl)		MCV (fl)		MCV (fl)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性 別																									
男 性		96.6	5.5	92.1	4.1	94.9	4.2	94.7	5.1	96.8	5.6	97.6	5.4	98.1	5.4	97.7	5.5	97.6	5.3	98.5	5.0	98.7	5.5	98.3	6.8
女 性		94.3	5.9	91.6	5.2	92.3	6.3	92.2	7.6	94.2	5.5	95.7	4.4	96.6	5.0	95.9	4.5	96.1	4.6	97.1	4.9	96.3	4.9	97.4	7.0

第 36 表 平均赤血球血色素量 (MCH) の分布 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	MCH (pg)																										
	<20	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-<25	20	1.1	1	0.9	0	0	3	1.4	4	1.1	5	1.3	7	1.5	2	1.0	4	1.9	1	0.6	1	1.2	1	3.7		
	25-<27	7	0.4	0	0	0	0	1	0.5	2	0.6	2	0.5	2	0.4	2	1.0	1	0.5	1	0.6	0	0	0	0		
	27-<29	118	6.8	22	19.3	22	10.4	14	6.8	16	4.6	23	5.9	21	4.4	14	6.8	12	5.8	4	2.6	4	4.9	1	3.7		
	29-<31	646	37.1	61	53.5	101	47.9	105	50.7	117	33.5	113	29.1	149	31.6	60	29.0	60	29.0	52	33.3	27	32.9	10	37.0		
	31-<33	736	42.3	28	24.6	79	37.4	68	32.9	156	44.7	181	46.6	224	47.5	98	47.3	105	50.7	77	49.4	32	39.0	10	37.0		
	33-<35	188	10.8	2	1.8	8	3.8	16	7.7	44	12.6	57	14.7	61	12.9	29	14.0	24	11.6	17	10.9	16	19.5	4	14.8		
	35-<40	25	1.4	0	0	1	0.5	0	0	9	2.6	7	1.8	8	1.7	2	1.0	1	0.5	4	2.6	2	2.4	1	3.7		
	総数	1741	100	114	100	211	100	207	100	349	100	388	100	472	100	207	100	207	100	156	100	82	100	27	100		
性別 女性	MCH (pg)																										
	<20	20	0.8	0	0	4	1.0	10	2.8	4	0.8	0	0	2	0.3	0	0	0	0	1	0.5	0	0	1	1.8		
	20-<25	90	3.5	6	3.6	28	7.1	32	8.8	11	2.1	4	0.8	9	1.6	3	1.1	3	1.3	1	0.5	3	3.6	2	3.6		
	25-<27	94	3.7	20	12.0	21	5.3	30	8.3	11	2.1	3	0.6	9	1.6	0	0	4	1.7	3	1.4	2	2.4	0	0		
	27-<29	431	16.9	50	30.1	97	24.6	60	16.5	87	16.6	73	14.0	64	11.0	36	13.3	24	10.3	29	14.0	7	8.3	4	7.3		
	29-<31	1315	51.5	73	44.0	194	49.1	151	41.6	314	59.9	292	55.8	291	50.2	144	53.3	135	57.7	89	43.0	43	51.2	24	43.6		
	31-<33	542	21.2	15	9.0	47	11.9	67	18.5	90	17.2	138	26.4	185	31.9	81	30.0	64	27.4	74	35.7	26	31.0	21	38.2		
	33-<35	56	2.2	2	1.2	3	0.8	13	3.6	6	1.1	13	2.5	19	3.3	6	2.2	4	1.7	9	4.3	3	3.6	3	5.5		
	35-<40	3	0.1	0	0	1	0.3	0	0	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0		
	総数	2551	100	166	100	395	100	363	100	524	100	523	100	580	100	270	100	234	100	207	100	84	100	55	100		

第 36 表 平均赤血球血色素量 (MCH) の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		MCH (pg)		MCH (pg)		MCH (pg)		MCH (pg)		MCH (pg)		MCH (pg)		MCH (pg)		MCH (pg)		MCH (pg)		MCH (pg)		MCH (pg)		MCH (pg)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別																									
男性		31.1	1.9	30.1	1.4	30.7	1.4	30.7	1.7	31.3	2.0	31.4	1.9	31.4	1.9	31.4	1.9	31.3	1.8	31.5	1.7	31.4	2.1	31.2	2.8
女性		29.7	2.2	28.9	2.0	29.0	2.5	28.9	3.2	29.8	1.9	30.3	1.4	30.3	1.8	30.3	1.5	30.2	1.6	30.5	1.7	30.2	2.1	30.3	2.7

第 37 表 平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の分布 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	MCHC(%)																								
	26-<28	3	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.6	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.7
	28-<30	39	2.2	1	0.9	4	1.9	1	0.5	7	2.0	8	2.1	18	3.8	5	2.4	9	4.3	4	2.6	4	4.9	1	3.7
	30-<32	575	33.0	17	14.9	60	28.4	57	27.5	93	26.6	140	36.1	208	44.1	79	38.2	87	42.0	68	43.6	42	51.2	11	40.7
	32-<34	1085	62.3	91	79.8	139	65.9	143	69.1	238	68.2	234	60.3	240	50.8	119	57.5	107	51.7	83	53.2	36	43.9	14	51.9
	34-	39	2.2	5	4.4	8	3.8	6	2.9	9	2.6	6	1.5	5	1.1	4	1.9	4	1.9	1	0.6	0	0	0	0
総数		1741	100	114	100	211	100	207	100	349	100	388	100	472	100	207	100	207	100	156	100	82	100	27	100
性別 女性	MCHC(%)																								
	22-<24	1	0.0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-<26	5	0.2	0	0	0	0	4	1.1	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	26-<28	29	1.1	1	0.6	9	2.3	11	3.0	5	1.0	0	0	3	0.5	0	0	0	0	1	0.5	1	1.2	1	1.8
	28-<30	186	7.3	13	7.8	39	9.9	40	11.0	36	6.9	22	4.2	36	6.2	13	4.8	12	5.1	11	5.3	6	7.1	7	12.7
	30-<32	1483	58.1	91	54.8	211	53.4	177	48.8	280	53.4	334	63.9	390	67.2	174	64.4	160	68.4	139	67.1	58	69.0	33	60.0
	32-<34	843	33.0	61	36.7	135	34.2	131	36.1	200	38.2	166	31.7	150	25.9	82	30.4	61	26.1	56	27.1	19	22.6	14	25.5
	34-	4	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0	0
総数		2551	100	166	100	395	100	363	100	524	100	523	100	580	100	270	100	234	100	207	100	84	100	55	100

第 37 表 平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別																									
男性		32.2	1.0	32.7	0.8	32.4	1.0	32.4	0.9	32.4	1.0	32.2	1.0	32.0	1.0	32.1	0.9	32.0	1.1	32.0	0.9	31.8	1.0	31.7	1.3
女性		31.5	1.1	31.6	1.1	31.4	1.3	31.3	1.4	31.6	1.1	31.6	0.9	31.4	0.9	31.6	0.8	31.5	0.9	31.5	0.9	31.3	1.1	31.1	1.2

第38表 フェリチンの分布(性・年齢階級別)

性別	フェリチン(ng/ml)	年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1.1-<5	6	0.3	1	0.9	0	0	1	0.5	2	0.6	1	0.3	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.6
	5-<10	30	1.7	0	0	0	0	2	1.0	6	1.7	11	2.8	11	2.3	6	2.9	5	2.4	3	1.9	3	3.7	0	0
	10-<15	24	1.4	3	2.6	0	0	1	0.5	3	0.9	8	2.1	9	1.9	6	2.9	4	1.9	3	1.9	1	1.2	1	3.6
	15-<20	39	2.2	2	1.7	0	0	2	1.0	6	1.7	10	2.6	19	4.0	6	2.9	9	4.3	5	3.2	3	3.7	2	7.1
	20-<25	38	2.2	0	0	5	2.4	0	0	7	2.0	12	3.1	14	2.9	9	4.3	0	0	10	6.4	3	3.7	1	3.6
	25-<30	39	2.2	0	0	5	2.4	4	1.9	3	0.9	10	2.6	17	3.6	8	3.8	4	1.9	10	6.4	3	3.7	0	0
	30-<35	37	2.1	3	2.6	0	0	2	1.0	6	1.7	8	2.1	18	3.8	6	2.9	8	3.8	5	3.2	5	6.1	0	0
	35-<40	51	2.9	2	1.7	4	1.9	4	1.9	14	4.0	8	2.1	19	4.0	3	1.4	7	3.3	7	4.5	3	3.7	2	7.1
	40-<45	42	2.4	2	1.7	3	1.4	5	2.4	9	2.6	10	2.6	13	2.7	6	2.9	6	2.8	3	1.9	4	4.9	0	0
	45-<50	48	2.7	4	3.5	4	1.9	6	2.9	10	2.8	13	3.3	11	2.3	7	3.4	5	2.4	4	2.6	2	2.4	0	0
	50-<60	108	6.2	10	8.7	11	5.2	12	5.8	16	4.6	30	7.7	29	6.1	17	8.2	12	5.7	6	3.8	8	9.8	3	10.7
	60-<70	104	5.9	5	4.3	16	7.5	10	4.8	17	4.8	23	5.9	33	6.9	15	7.2	11	5.2	13	8.3	7	8.5	2	7.1
	70-<80	114	6.5	9	7.8	14	6.6	16	7.7	17	4.8	26	6.7	32	6.7	10	4.8	16	7.6	10	6.4	4	4.9	2	7.1
	80-<90	94	5.4	4	3.5	16	7.5	10	4.8	18	5.1	18	4.6	28	5.9	6	2.9	15	7.1	9	5.8	2	2.4	2	7.1
	90-<100	98	5.6	12	10.4	10	4.7	14	6.7	21	6.0	18	4.6	23	4.8	6	2.9	13	6.2	7	4.5	3	3.7	0	0
	100-<150	409	23.3	31	27.0	67	31.6	51	24.5	91	25.9	77	19.7	92	19.3	36	17.3	38	18.0	30	19.2	18	22.0	6	21.4
	150-<200	217	12.4	23	20.0	24	11.3	33	15.9	48	13.7	41	10.5	48	10.1	23	11.1	26	12.3	13	8.3	7	8.5	2	7.1
	200-	255	14.5	4	3.5	33	15.6	35	16.8	57	16.2	66	16.9	60	12.6	38	18.3	32	15.2	18	11.5	6	7.3	4	14.3
	(再掲)<27	150	8.6	6	5.2	8	3.8	8	3.8	27	7.7	44	11.3	57	11.9	28	13.5	19	9.0	23	14.7	10	12.2	5	17.9
	(再掲)320	81	4.6	0	0	7	3.3	12	5.8	20	5.7	24	6.2	18	3.8	13	6.3	8	3.8	7	4.5	2	2.4	1	3.6
総数	1753	100	115	100	212	100	208	100	351	100	390	100	477	100	208	100	211	100	156	100	82	100	28	100	
女性	<<1.1	2	0.1	0	0	2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1-<5	179	7.0	28	16.6	55	13.9	67	18.5	21	4.0	1	0.2	7	1.2	0	0	3	1.3	1	0.5	1	1.2	2	3.6
	5-<10	195	7.6	24	14.2	54	13.7	62	17.1	22	4.2	8	1.5	25	4.3	6	2.2	11	4.7	9	4.3	3	3.5	2	3.6
	10-<15	181	7.1	23	13.6	59	14.9	35	9.6	19	3.6	15	2.8	30	5.1	11	4.0	10	4.3	11	5.3	4	4.7	5	9.1
	15-<20	144	5.6	15	8.9	31	7.8	32	8.8	18	3.4	14	2.7	34	5.8	7	2.6	12	5.1	13	6.3	7	8.1	2	3.6
	20-<25	165	6.4	12	7.1	42	10.6	35	9.6	19	3.6	21	4.0	36	6.2	11	4.0	12	5.1	16	7.7	4	4.7	4	7.3
	25-<30	144	5.6	14	8.3	26	6.6	28	7.7	23	4.4	26	4.9	27	4.6	15	5.5	8	3.4	11	5.3	5	5.8	3	5.5
	30-<35	129	5.0	12	7.1	22	5.6	14	3.9	24	4.6	21	4.0	36	6.2	9	3.3	16	6.8	10	4.8	9	10.5	1	1.8
	35-<40	140	5.5	12	7.1	22	5.6	21	5.8	32	6.1	21	4.0	32	5.5	10	3.7	14	6.0	14	6.8	0	0	4	7.3
	40-<45	113	4.4	11	6.5	19	4.8	11	3.0	29	5.5	23	4.4	20	3.4	11	4.0	7	3.0	5	2.4	4	4.7	4	7.3
	45-<50	92	3.6	7	4.1	10	2.5	7	1.9	22	4.2	20	3.8	26	4.5	13	4.8	14	6.0	8	3.9	2	2.3	2	3.6
	50-<60	221	8.6	6	3.6	23	5.8	14	3.9	63	12.0	65	12.3	50	8.6	34	12.5	15	6.4	20	9.7	12	14.0	3	5.5
	60-<70	157	6.1	3	1.8	12	3.0	10	2.8	44	8.4	42	8.0	46	7.9	18	6.6	24	10.2	13	6.3	5	5.8	4	7.3
	70-<80	145	5.7	1	0.6	7	1.8	11	3.0	37	7.0	50	9.5	39	6.7	23	8.5	21	8.9	12	5.8	0	0	6	10.9
	80-<90	97	3.8	0	0	2	0.5	4	1.1	30	5.7	34	6.5	27	4.6	17	6.3	12	5.1	7	3.4	5	5.8	3	5.5
	90-<100	102	4.0	1	0.6	5	1.3	5	1.4	29	5.5	31	5.9	31	5.3	16	5.9	12	5.1	13	6.3	4	4.7	2	3.6
	100-<150	231	9.0	0	0	2	0.5	7	1.9	68	12.9	88	12.9	66	11.3	43	15.8	27	11.5	24	11.6	12	14.0	3	5.5
	150-<200	81	3.2	0	0	1	0.3	0	0	20	3.8	32	6.1	28	4.8	20	7.4	12	5.1	11	5.3	2	2.3	3	5.5
	200-	45	1.8	0	0	1	0.3	0	0	6	1.1	15	2.8	23	3.9	8	2.9	5	2.1	9	4.3	7	8.1	2	3.6
	(再掲)<3.4	88	3.4	12	7.1	33	8.4	34	9.4	5	1.0	1	0.2	3	0.5	0	0	2	0.9	0	0	0	0	1	1.8
(再掲)89	466	18.2	1	0.6	9	2.3	12	3.3	127	24.1	168	31.9	149	25.6	88	32.4	56	23.8	57	27.5	26	30.2	10	18.2	
総数	2563	100	169	100	395	100	363	100	526	100	527	100	583	100	272	100	235	100	207	100	86	100	55	100	

第38表 フェリチンの平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																								
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上		
	フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		フェリチン(ng/ml)		
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均
男性	125.8	125.1	107.2	55.3	130.4	94.9	136.1	97.8	137.3	134.7	127.2	133.7	114.1	142.9	128.9	150.6	117.5	97.5	107.8	112.7	121.6	261.5	101.9	85.4	
女性	53.8	51.8	22.4	17.3	25.5	23.9	24.7	24.4	64.4	48.5	77.5	54.4	69.0	62.9	77.6	60.0	66.7	52.6	71.4	70.9	71.8	64.1	65.7	70.5	

第 39 表 総たんぱく質値の分布（性・年齢階級別）

性別	総たんぱく質(g/dl)	年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	<6.0	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.6	0	0	1	0.5	1	0.6	1	1.2	0	0
	6.0-<6.5	19	1.1	0	0	2	0.9	0	0	1	0.3	4	1.0	12	2.5	1	0.5	3	1.4	2	1.3	5	6.1	2	7.1		
	6.5-<7.0	241	13.7	4	3.5	18	8.5	21	10.1	51	14.5	58	14.9	89	18.7	30	14.4	40	19.0	25	16.0	20	24.4	4	14.3		
	7.0-<7.5	702	40.0	39	33.9	89	42.0	99	47.6	129	36.8	164	42.1	182	38.2	97	46.6	83	39.3	60	38.5	32	39.0	7	25.0		
	7.5-<8.0	614	35.0	52	45.2	77	36.3	74	35.6	132	37.6	128	32.8	151	31.7	60	28.8	65	30.8	54	34.6	19	23.2	13	46.4		
	8.0-<8.5	152	8.7	19	16.5	24	11.3	10	4.8	35	10.0	30	7.7	34	7.1	15	7.2	19	9.0	10	6.4	3	3.7	2	7.1		
	8.5-	22	1.3	1	0.9	2	0.9	4	1.9	3	0.9	6	1.5	6	1.3	5	2.4	0	0	4	2.6	2	2.4	0	0		
	総数	1753	100	115	100	212	100	208	100	351	100	390	100	477	100	208	100	211	100	156	100	82	100	28	100		
女性	<6.0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.0-<6.5	26	1.0	2	1.2	6	1.5	5	1.4	1	0.2	3	0.6	9	1.5	2	0.7	2	0.9	4	1.9	0	0	3	5.5		
	6.5-<7.0	297	11.6	12	7.1	40	10.1	53	14.6	39	7.4	70	13.3	83	14.2	33	12.1	32	13.6	25	12.1	18	20.9	8	14.5		
	7.0-<7.5	1066	41.6	62	36.7	170	43.0	157	43.3	201	38.2	213	40.4	263	45.1	105	38.6	116	49.4	86	41.5	34	39.5	27	49.1		
	7.5-<8.0	890	34.7	67	39.6	148	37.5	113	31.1	216	41.1	180	34.2	166	28.5	100	36.8	64	27.2	62	30.0	25	29.1	15	27.3		
	8.0-<8.5	252	9.8	22	13.0	28	7.1	30	8.3	64	12.2	54	10.2	54	9.3	29	10.7	19	8.1	26	12.6	7	8.1	2	3.6		
	8.5-	31	1.2	4	2.4	3	0.8	5	1.4	4	0.8	7	1.3	8	1.4	3	1.1	2	0.9	4	1.9	2	2.3	0	0		
	総数	2563	100	169	100	395	100	363	100	526	100	527	100	583	100	272	100	235	100	207	100	86	100	55	100		

第 39 表 総たんぱく質値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	7.4	0.4	7.6	0.4	7.4	0.4	7.4	0.4	7.4	0.4	7.4	0.4	7.3	0.5	7.4	0.4	7.3	0.5	7.4	0.5	7.2	0.5	7.3	0.5
女性	7.4	0.4	7.5	0.4	7.4	0.4	7.4	0.4	7.5	0.4	7.4	0.4	7.4	0.5	7.4	0.4	7.4	0.4	7.4	0.5	7.3	0.5	7.2	0.4

第40表 アルブミン値の分布(性・年齢階級別)

性別	アルブミン(g/dl)	年齢(歳)																											
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
男性	<3.0	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0		
	3.0-3.2	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	0	0	1	0.6	1	1.2	0	0		
	3.2-3.4	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.4-3.6	5	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	3	0.6	0	0	0	0	1	0.6	1	1.2	1	3.6		
	3.6-3.8	20	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.0	16	3.4	3	1.4	7	3.3	1	0.6	5	6.1	3	10.7		
	3.8-4.0	36	2.1	0	0	0	0	1	0.5	1	0.3	7	1.8	27	5.7	4	1.9	9	4.3	8	5.1	7	8.5	3	10.7				
	4.0-4.2	135	7.7	0	0	0	0	3	1.4	11	3.1	34	8.7	87	18.2	21	10.1	34	16.1	28	17.9	22	26.8	3	10.7				
	4.2-4.4	301	17.2	0	0	9	4.2	16	7.7	53	15.1	82	21.0	141	29.6	47	22.6	51	24.2	50	32.1	28	34.1	12	42.9				
	4.4-4.6	435	24.8	7	6.1	36	17.0	47	22.6	105	29.9	122	31.3	118	24.7	71	34.1	67	31.8	34	21.8	12	14.6	5	17.9				
	4.6-4.8	455	26.0	36	31.3	69	32.5	75	36.1	109	31.1	105	26.9	61	12.8	45	21.6	29	13.7	26	16.7	5	6.1	1	3.6				
	4.8-5.0	237	13.5	41	35.7	60	28.3	45	21.6	47	13.4	28	7.2	16	3.4	13	6.3	10	4.7	5	3.2	1	1.2	0	0				
	5.0-5.2	107	6.1	25	21.7	35	16.5	15	7.2	22	6.3	6	1.5	4	0.8	3	1.4	2	0.9	2	1.3	0	0	0	0				
	5.2- (再掲) 3.5	18	1.0	6	5.2	3	1.4	6	2.9	1	0.3	1	0.3	1	0.2	1	0.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	0.5	0	0	0	0	0	0	2	0.6	1	0.3	6	1.3	0	0	1	0.5	2	1.3	2	2.4	1	3.6					
	総数	1753	100	115	100	212	100	208	100	351	100	390	100	477	100	208	100	211	100	156	100	82	100	28	100				
女性	<3.0	2	0.1	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.4-3.6	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	2	2.3	0	0				
	3.6-3.8	18	0.7	1	0.6	4	1.0	0	0	0	0	0	0	13	2.2	0	0	1	0.4	5	2.4	4	4.7	3	5.5				
	3.8-4.0	45	1.8	1	0.6	6	1.5	5	1.4	2	0.4	7	1.3	24	4.1	6	2.2	7	3.0	9	4.3	4	4.7	4	7.3				
	4.0-4.2	200	7.8	8	4.7	11	2.8	23	6.3	19	3.6	44	8.3	95	16.3	27	9.9	26	11.1	34	16.4	18	20.9	17	30.9				
	4.2-4.4	518	20.2	9	5.3	65	16.5	73	20.1	87	16.5	121	23.0	163	28.0	60	22.1	72	30.6	53	25.6	22	25.6	16	29.1				
	4.4-4.6	811	31.6	41	24.3	130	32.9	125	34.4	167	31.7	183	34.7	165	28.3	93	34.2	70	29.8	63	30.4	22	25.6	10	18.2				
	4.6-4.8	650	25.4	59	34.9	116	29.4	100	27.5	158	30.0	123	23.3	94	16.1	59	21.7	42	17.9	37	17.9	11	12.8	4	7.3				
	4.8-5.0	258	10.1	39	23.1	57	14.4	31	8.5	70	13.3	38	7.2	23	3.9	23	8.5	17	7.2	5	2.4	0	0	1	1.8				
	5.0-5.2	51	2.0	9	5.3	4	1.0	5	1.4	20	3.8	10	1.9	3	0.5	3	1.1	0	0	1	0.5	2	2.3	0	0				
	5.2- (再掲) 3.5	8	0.3	2	1.2	2	0.5	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0	0	0	0	0	1	1.2	0	0		
		4	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.3	0	0		
		総数	2563	100	169	100	395	100	363	100	526	100	527	100	583	100	272	100	235	100	207	100	86	100	55	100			

第40表 アルブミン値の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)		アルブミン(g/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	4.5	0.3	4.8	0.2	4.7	0.2	4.7	0.2	4.6	0.3	4.4	0.3	4.3	0.3	4.4	0.3	4.3	0.3	4.3	0.3	4.2	0.3	4.1	0.3
女性	4.5	0.3	4.6	0.3	4.5	0.2	4.5	0.2	4.5	0.3	4.4	0.2	4.3	0.3	4.4	0.2	4.4	0.2	4.3	0.3	4.3	0.3	4.2	0.3

第41表の2 ヘモグロビンA_{1c}の分布(性・年齢階級別)

性別	ヘモグロビンA _{1c} (%)	年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	-3.9	3	0.2	0	0	0	0	2	1.0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	4	0.2	2	1.8	2	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4-4.5	44	2.7	16	14.0	13	6.2	3	1.5	8	2.4	2	0.6	2	0.5	1	0.5	0	0	2	1.4	0	0	0	0
	4.6-4.7	133	8.1	24	21.1	33	15.6	24	11.8	19	5.7	15	4.2	18	4.3	6	3.1	13	7.3	4	2.9	1	1.4	0	0
	4.8-4.9	271	16.6	29	25.4	66	31.3	46	22.7	43	13.0	34	9.4	53	12.8	16	8.3	24	13.6	20	14.5	6	8.1	3	11.5
	5.0-5.1	335	20.5	30	26.3	48	22.7	45	22.2	64	19.3	76	21.1	72	17.3	37	19.2	27	15.3	27	19.6	15	20.3	3	11.5
	5.2	185	11.3	7	6.1	16	7.6	20	9.9	43	13.0	50	13.9	49	11.8	31	16.1	17	9.6	19	13.8	10	13.5	3	11.5
	5.3	154	9.4	3	2.6	14	6.6	18	8.9	31	9.4	45	12.5	43	10.4	26	13.5	16	9.0	13	9.4	9	12.2	5	19.2
	5.4	132	8.1	2	1.8	13	6.2	17	8.4	31	9.4	29	8.1	40	9.6	16	8.3	18	10.2	10	7.2	8	10.8	4	15.4
	5.5	76	4.7	0	0	2	0.9	4	2.0	19	5.7	24	6.7	27	6.5	12	6.2	12	6.8	7	5.1	6	8.1	2	7.7
	5.6	72	4.4	0	0	2	0.9	6	3.0	20	6.0	21	5.8	23	5.5	11	5.7	10	5.6	10	7.2	1	1.4	2	7.7
	5.7	43	2.6	0	0	1	0.5	5	2.5	10	3.0	14	3.9	13	3.1	11	5.7	7	4.0	3	2.2	2	2.7	1	3.8
	5.8	39	2.4	0	0	0	0	7	3.4	7	2.1	11	3.1	14	3.4	8	4.1	6	3.4	3	2.2	4	5.4	1	3.8
	5.9	31	1.9	1	0.9	1	0.5	1	0.5	8	2.4	6	1.7	14	3.4	2	1.0	3	1.7	8	5.8	2	2.7	1	3.8
	6.0	12	0.7	0	0	0	0	0	0	3	0.9	4	1.1	5	1.2	1	0.5	3	1.7	0	0	2	2.7	0	0
	6.1	8	0.5	0	0	0	0	1	0.5	3	0.9	2	0.6	2	0.5	2	1.0	0	0	1	0.7	0	0	1	3.8
	6.2-6.3	23	1.4	0	0	0	0	1	0.5	3	0.9	7	1.9	12	2.9	4	2.1	4	2.3	5	3.6	3	4.1	0	0
	6.4-6.5	12	0.7	0	0	0	0	0	0	2	0.6	2	0.6	8	1.9	0	0	6	3.4	2	1.4	0	0	0	0
	6.6-6.7	8	0.5	0	0	0	0	0	0	2	0.6	1	0.3	5	1.2	0	0	3	1.7	1	0.7	1	1.4	0	0
	6.8-6.9	9	0.6	0	0	0	0	0	0	3	0.9	2	0.6	4	1.0	2	1.0	2	1.1	1	0.7	1	1.4	0	0
	7.0-7.1	5	0.3	0	0	0	0	1	0.5	2	0.6	1	0.3	1	0.2	1	0.5	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	7.2-7.3	8	0.5	0	0	0	0	0	0	2	0.6	5	1.4	1	0.2	2	1.0	0	0	0	0	1	1.4	0	0
	7.4-7.5	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1.4	0	0
	7.6-7.7	3	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	7.8-7.9	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.0-8.1	3	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	1	0.5	0	0	1	0.7	0	0	0	0
	8.4-8.5	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.6-8.7	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0
	9.0-	15	0.9	0	0	0	0	2	1.0	4	1.2	5	1.4	4	1.0	2	1.0	3	1.7	0	0	1	1.4	0	0
	総数	1634	100	114	100	211	100	203	100	331	100	360	100	415	100	193	100	177	100	138	100	74	100	26	100

注) インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

		年齢(歳)																													
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
女性	ヘモグロビンA1c(%)																														
	-3.9	5	0.2	0	0	2	0.5	1	0.3	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.0-4.1	4	0.2	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	0	0	2	0.4	0	0	0	0	2	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	7	0.3	1	0.6	2	0.5	3	0.8	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1.3	0	0	1	1.3	0	0	0	0
	4.4-4.5	41	1.7	11	6.6	12	3.1	12	3.3	2	0.4	1	0.2	3	0.6	1	0.4	2	0.9	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.6-4.7	189	7.7	35	21.1	62	15.8	31	8.5	22	4.3	27	5.6	12	2.3	18	7.2	5	2.4	3	1.6	3	3.9	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0
	4.8-4.9	360	14.7	47	28.3	94	23.9	61	16.8	66	12.9	49	10.1	43	8.1	23	9.2	12	5.7	20	10.5	8	10.4	3	10.4	3	5.9	3	5.9		
	5.0-5.1	520	21.2	34	20.5	94	23.9	92	25.3	124	24.2	90	18.5	86	16.2	42	16.8	32	15.2	37	19.4	6	7.8	11	14.3	11	21.6	11	21.6		
	5.2	255	10.4	16	9.6	44	11.2	41	11.3	64	12.5	38	7.8	52	9.8	17	6.8	21	10.0	15	7.9	11	14.3	5	14.3	5	9.8	5	9.8		
	5.3	244	10.0	10	6.0	30	7.6	27	7.4	52	10.1	59	12.1	66	12.5	32	12.8	26	12.3	25	13.1	11	14.3	4	14.3	4	7.8	4	7.8		
	5.4	224	9.1	5	3.0	21	5.3	28	7.7	48	9.4	60	12.3	62	11.7	32	12.8	25	11.8	20	10.5	12	15.6	5	15.6	5	9.8	5	9.8		
	5.5	176	7.2	5	3.0	13	3.3	19	5.2	36	7.0	47	9.7	56	10.6	21	8.4	29	13.7	18	9.4	3	3.9	6	3.9	6	11.8	6	11.8		
	5.6	117	4.8	2	1.2	9	2.3	16	4.4	26	5.1	27	5.6	37	7.0	13	5.2	18	8.5	14	7.3	3	3.9	3	3.9	2	3.9	2	3.9		
	5.7	93	3.8	0	0	4	1.0	16	4.4	20	3.9	24	4.9	29	5.5	15	6.0	9	4.3	11	5.8	4	5.2	5	5.2	5	9.8	5	9.8		
	5.8	51	2.1	0	0	3	0.8	3	0.8	8	1.6	17	3.5	20	3.8	10	4.0	9	4.3	5	2.6	4	5.2	2	5.2	2	3.9	2	3.9		
	5.9	29	1.2	0	0	0	0	2	0.6	5	1.0	8	1.6	14	2.6	5	2.0	7	3.3	4	2.1	3	3.9	0	3.9	0	3.9	0	3.9		
	6.0	36	1.5	0	0	2	0.5	3	0.8	9	1.8	8	1.6	14	2.6	3	1.2	4	1.9	4	2.1	5	6.5	1	6.5	1	2.0	1	2.0		
	6.1	19	0.8	0	0	0	0	1	0.3	4	0.8	5	1.0	9	1.7	3	1.2	4	1.9	4	2.1	1	1.3	0	1.3	0	1.3	0	1.3		
	6.2-6.3	23	0.9	0	0	0	0	2	0.6	5	1.0	8	1.6	8	1.5	5	2.0	3	1.4	3	1.6	0	1.6	0	1.6	2	3.9	2	3.9		
	6.4-6.5	13	0.5	0	0	0	0	0	0	2	0.4	5	1.0	6	1.1	3	1.2	3	1.4	2	1.0	0	1.0	0	1.0	1	2.0	1	2.0		
	6.6-6.7	8	0.3	0	0	0	0	1	0.3	4	0.8	1	0.2	2	0.4	0	0	1	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	1	2.0		
	6.8-6.9	8	0.3	0	0	0	0	0	0	3	0.6	2	0.4	3	0.6	0	0	0	0	2	1.0	1	1.3	0	1.3	0	1.3	0	1.3		
	7.0-7.1	4	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.2	2	0.4	1	0.2	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.0	1	2.0		
	7.2-7.3	3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.6	0	0	2	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.4-7.5	4	0.2	0	0	0	0	1	0.3	2	0.4	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.6-7.7	3	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.0	1	2.0		
	8.0-8.1	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.2-8.3	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5			
8.4-8.5	2	0.1	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.3	0	1.3	0	1.3			
8.6-8.7	3	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0	1	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5			
8.8-8.9	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.0-	6	0.2	0	0	1	0.3	1	0.3	4	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	総数	2451	100	166	100	393	100	363	100	513	100	486	100	530	100	250	100	211	100	191	100	77	100	51	100	51	100				

注) インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

		年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	ヘモグロビンA _{1c} (%)																										
	-3.9	8	0.2	0	0	2	0.3	3	0.5	2	0.2	0	0	1	0.1	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	5	0.1	0	0	0	0	1	0.2	1	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0	2	0.6	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	11	0.3	3	1.1	4	0.7	3	0.5	0	0	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0
	4.4-4.5	85	2.1	27	9.6	25	4.1	15	2.7	10	1.2	3	0.4	5	0.5	2	0.5	2	0.5	3	0.9	0	0	0	0	0	0
	4.6-4.7	322	7.9	59	21.1	95	15.7	55	9.7	41	4.9	42	5.0	30	3.2	24	5.4	18	4.6	7	2.1	4	2.6	1	1.3	1	1.3
	4.8-4.9	631	15.4	76	27.1	160	26.5	107	18.9	109	12.9	83	9.8	96	10.2	39	8.8	36	9.3	40	12.2	14	9.3	6	7.8	6	7.8
	5.0-5.1	855	20.9	64	22.9	142	23.5	137	24.2	188	22.3	166	19.6	158	16.7	79	17.8	59	15.2	64	19.5	21	13.9	14	18.2	14	18.2
	5.2	440	10.8	23	8.2	60	9.9	61	10.8	107	12.7	88	10.4	101	10.7	48	10.8	38	9.8	34	10.3	21	13.9	8	10.4	8	10.4
	5.3	398	9.7	13	4.6	44	7.3	45	8.0	83	9.8	104	12.3	109	11.5	58	13.1	42	10.8	38	11.6	20	13.2	9	11.7	9	11.7
	5.4	356	8.7	7	2.5	34	5.6	45	8.0	79	9.4	89	10.5	102	10.8	48	10.8	43	11.1	30	9.1	20	13.2	9	11.7	9	11.7
	5.5	252	6.2	5	1.8	15	2.5	23	4.1	55	6.5	71	8.4	83	8.8	33	7.4	41	10.6	25	7.6	9	6.0	8	10.4	8	10.4
	5.6	189	4.6	2	0.7	11	1.8	22	3.9	46	5.5	48	5.7	60	6.3	24	5.4	28	7.2	24	7.3	4	2.6	4	5.2	4	5.2
	5.7	136	3.3	0	0	5	0.8	21	3.7	30	3.6	38	4.5	42	4.4	26	5.9	16	4.1	14	4.3	6	4.0	6	7.8	6	7.8
	5.8	90	2.2	0	0	3	0.5	10	1.8	15	1.8	28	3.3	34	3.6	18	4.1	15	3.9	8	2.4	8	5.3	3	3.9	3	3.9
	5.9	60	1.5	1	0.4	1	0.2	3	0.5	13	1.5	14	1.7	28	3.0	7	1.6	10	2.6	12	3.6	5	3.3	1	1.3	1	1.3
	6.0	48	1.2	0	0	2	0.3	3	0.5	12	1.4	12	1.4	19	2.0	4	0.9	7	1.8	4	1.2	7	4.6	1	1.3	1	1.3
	6.1	27	0.7	0	0	0	0	2	0.4	7	0.8	7	0.8	11	1.2	5	1.1	4	1.0	5	1.5	1	0.7	1	1.3	1	1.3
	6.2-6.3	46	1.1	0	0	0	0	3	0.5	8	0.9	15	1.8	20	2.1	9	2.0	7	1.8	8	2.4	3	2.0	2	2.6	2	2.6
	6.4-6.5	25	0.6	0	0	0	0	0	0	4	0.5	7	0.8	14	1.5	3	0.7	9	2.3	4	1.2	0	0	1	1.3	1	1.3
	6.6-6.7	16	0.4	0	0	0	0	1	0.2	6	0.7	2	0.2	7	0.7	0	0	4	1.0	1	0.3	1	0.7	1	1.3	1	1.3
	6.8-6.9	17	0.4	0	0	0	0	0	0	6	0.7	4	0.5	7	0.7	2	0.5	2	0.5	3	0.9	2	1.3	0	0	0	0
	7.0-7.1	9	0.2	0	0	0	0	1	0.2	3	0.4	3	0.4	2	0.2	2	0.5	1	0.3	0	0	0	0	0	0	1	1.3
	7.2-7.3	11	0.3	0	0	0	0	0	0	2	0.2	8	0.9	1	0.1	4	0.9	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0
	7.4-7.5	5	0.1	0	0	0	0	1	0.2	2	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0
	7.6-7.7	6	0.1	0	0	0	0	0	0	2	0.2	2	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0	0	0	1	1.3	1	1.3
	7.8-7.9	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0-8.1	4	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	2	0.5	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	
8.2-8.3	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.4-8.5	4	0.1	0	0	0	0	1	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0	
8.6-8.7	4	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0	2	0.6	0	0	0	0	0	0	
8.8-8.9	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.0-	21	0.5	0	0	1	0.2	3	0.5	8	0.9	5	0.6	4	0.4	2	0.5	3	0.8	0	0	1	0.7	0	0	0	0	
	総数	4085	100	280	100	604	100	566	100	844	100	846	100	945	100	443	100	388	100	329	100	151	100	77	100	77	100

注) インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

第41表の2 ヘモグロビンA_{1c}の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)		ヘモグロビンA _{1c} (%)			
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別																											
男性		5.3	0.7	4.8	0.3	5.0	0.3	5.1	0.6	5.4	0.8	5.4	0.7	5.4	0.7	5.4	0.7	5.4	0.8	5.4	0.6	5.5	0.8	5.4	0.3	5.4	0.3
女性		5.3	0.6	4.9	0.3	5.0	0.5	5.2	0.5	5.3	0.7	5.4	0.5	5.4	0.5	5.4	0.5	5.4	0.4	5.4	0.5	5.4	0.5	5.5	0.6	5.5	0.6
総数		5.3	0.6	4.9	0.3	5.0	0.4	5.2	0.5	5.3	0.7	5.4	0.6	5.4	0.6	5.4	0.6	5.4	0.6	5.4	0.5	5.4	0.7	5.4	0.3	5.4	0.3

注) インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

第 42 表の 1 血糖値の分布（食後 3 時間以上，性・年齢階級別）

性別	血糖値 (mg/dl)	年齢 (歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	40-<60	4	0.3	0	0	0	0	1	0.5	1	0.3	1	0.3	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	60-<80	68	4.4	7	7.9	11	5.9	9	4.9	14	4.4	10	2.9	17	4.0	5	2.8	6	3.2	6	4.2	5	7.0	0	0
	80-<100	719	46.4	64	71.9	130	69.9	117	63.6	155	48.7	135	39.2	118	27.6	72	39.8	67	35.3	36	25.2	10	14.1	5	20.8
	100-<120	462	29.8	16	18.0	39	21.0	40	21.7	94	29.6	116	33.7	157	36.7	60	33.1	66	34.7	59	41.3	23	32.4	9	37.5
	120-<140	139	9.0	2	2.2	4	2.2	8	4.3	23	7.2	40	11.6	62	14.5	23	12.7	20	10.5	21	14.7	14	19.7	7	29.2
	140-<160	62	4.0	0	0	1	0.5	4	2.2	13	4.1	15	4.4	29	6.8	7	3.9	9	4.7	10	7.0	8	11.3	2	8.3
	160-<180	23	1.5	0	0	0	0	2	1.1	4	1.3	4	1.2	13	3.0	3	1.7	11	5.8	2	1.4	0	0	0	0
	180-<200	21	1.4	0	0	1	0.5	0	0	5	1.6	7	2.0	8	1.9	5	2.8	2	1.1	2	1.4	4	5.6	0	0
	200-<220	14	0.9	0	0	0	0	2	1.1	3	0.9	4	1.2	5	1.2	2	1.1	1	0.5	3	2.1	1	1.4	0	0
	220-<240	11	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.9	8	1.9	1	0.6	4	2.1	1	0.7	3	4.2	0	0
	240-<260	4	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.6	1	0.2	1	0.6	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	260- (再掲) 110	22	1.4	0	0	0	0	1	0.5	5	1.6	7	2.0	9	2.1	2	1.1	2	1.1	3	2.1	3	4.2	1	4.2
	総数	442	28.5	5	5.6	13	7.0	27	14.7	79	24.8	122	35.5	196	45.8	65	35.9	78	41.1	62	43.4	45	63.4	11	45.8
女性	60-<80	65	2.9	11	8.2	21	6.4	15	4.7	10	2.2	4	0.9	4	0.8	2	0.8	1	0.5	1	0.5	1	1.3	1	1.9
	80-<100	1060	48.0	99	73.9	233	70.6	200	63.3	222	48.9	160	34.8	146	28.3	83	33.7	67	32.8	55	29.7	17	22.7	7	13.5
	100-<120	732	33.1	20	14.9	65	19.7	92	29.1	165	36.3	204	44.3	186	36.0	106	43.1	72	35.3	63	34.1	30	40.0	21	40.4
	120-<140	203	9.2	4	3.0	8	2.4	5	1.6	37	8.1	49	10.7	100	19.4	29	11.8	38	18.6	38	20.5	14	18.7	10	19.2
	140-<160	70	3.2	0	0	1	0.3	1	0.3	5	1.1	21	4.6	42	8.1	14	5.7	15	7.4	14	7.6	8	10.7	5	9.6
	160-<180	25	1.1	0	0	0	0	0	0	7	1.5	4	0.9	14	2.7	1	0.4	4	2.0	4	2.2	1	1.3	5	9.6
	180-<200	21	1.0	0	0	1	0.3	1	0.3	3	0.7	6	1.3	10	1.9	4	1.6	3	1.5	5	2.7	0	0	2	3.8
	200-<220	10	0.5	0	0	0	0	1	0.3	2	0.4	5	1.1	2	0.4	3	1.2	0	0	0	0	1	1.3	1	1.9
	220-<240	4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	3	0.6	1	0.4	1	0.5	2	1.1	0	0	0	0
	240-<260	3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	1	0.2	1	0.4	0	0	0	0	1	1.3	0	0
	260- (再掲) 110	17	0.8	0	0	1	0.3	1	0.3	3	0.7	4	0.9	8	1.6	2	0.8	3	1.5	3	1.6	2	2.7	0	0
	総数	611	27.6	11	8.2	30	9.1	35	11.1	106	23.3	164	35.7	265	51.4	93	37.8	102	50.0	89	48.1	39	52.0	35	67.3

第 42 表の 1 血糖値の平均値及び標準偏差（食後 3 時間以上，性・年齢階級別）

性別	年齢 (歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	108.9	37.2	91.9	10.5	94.8	12.3	100.5	28.4	107.3	33.6	113.8	41.3	119.3	45.4	112.6	34.3	116.1	44.3	116.6	36.2	133.5	62.8	119.0	36.3
女性	106.2	30.9	92.2	10.8	94.9	15.6	97.3	18.7	104.9	33.8	111.6	34.2	118.7	36.0	112.0	29.2	116.5	34.8	117.8	36.1	122.4	42.5	124.8	29.5

第 42 表の 2 血糖値の分布（食後 3 時間以上，性・年齢階級別）

性別	血糖値 (mg/dl)	年齢 (歳)																							
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	40-<60	4	0.3	0	0	0	0	1	0.6	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	60-<80	64	4.4	7	7.9	11	5.9	9	5.0	14	4.7	9	2.8	14	3.7	4	2.4	5	3.1	4	3.1	5	7.6	0	0
	80-<100	709	48.8	64	71.9	130	70.3	117	64.6	154	51.3	132	41.4	112	29.6	71	41.8	61	37.4	36	28.3	10	15.2	5	21.7
	100-<120	447	30.8	16	18.0	39	21.1	40	22.1	89	29.7	108	33.9	155	40.9	58	34.1	65	39.9	58	45.7	23	34.8	9	39.1
	120-<140	128	8.8	2	2.2	4	2.2	7	3.9	20	6.7	40	12.5	55	14.5	23	13.5	16	9.8	18	14.2	14	21.2	7	30.4
	140-<160	48	3.3	0	0	1	0.5	2	1.1	10	3.3	11	3.4	24	6.3	5	2.9	8	4.9	7	5.5	7	10.6	2	8.7
	160-<180	13	0.9	0	0	0	0	2	1.1	4	1.3	3	0.9	4	1.1	2	1.2	3	1.8	1	0.8	0	0	0	0
	180-<200	12	0.8	0	0	0	0	0	0	3	1.0	3	0.9	6	1.6	2	1.2	2	1.2	2	1.6	2	3.0	0	0
	200-<220	9	0.6	0	0	0	0	2	1.1	2	0.7	4	1.3	1	0.3	2	1.2	0	0	0	0	1	1.5	0	0
	220-<240	6	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	5	1.3	0	0	2	1.2	0	0	3	4.5	0	0
	240-<260	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	260-	12	0.8	0	0	0	0	1	0.6	3	1.0	6	1.9	2	0.5	2	1.2	0	0	1	0.8	1	1.5	0	0
	(再掲) 110	368	25.3	5	5.6	12	6.5	24	13.3	65	21.7	104	32.6	158	41.7	58	34.1	59	36.2	49	38.6	40	60.6	10	43.5
	総 数	1453	100	89	100	185	100	181	100	300	100	319	100	379	100	170	100	163	100	127	100	66	100	23	100
女性	60-<80	64	3.0	11	8.2	21	6.4	15	4.7	10	2.2	4	0.9	3	0.6	2	0.9	1	0.5	1	0.6	1	1.4	0	0
	80-<100	1051	49.3	99	73.9	232	70.7	200	63.3	221	49.7	157	36.5	142	29.8	81	35.4	64	34.6	54	31.2	17	24.3	7	14.3
	100-<120	717	33.7	20	14.9	64	19.5	92	29.1	163	36.6	195	45.3	183	38.4	100	43.7	70	37.8	62	35.8	30	42.9	21	42.9
	120-<140	190	8.9	4	3.0	8	2.4	5	1.6	35	7.9	46	10.7	92	19.3	27	11.8	34	18.4	36	20.8	12	17.1	10	20.4
	140-<160	59	2.8	0	0	1	0.3	1	0.3	5	1.1	18	4.2	34	7.1	12	5.2	10	5.4	12	6.9	7	10.0	5	10.2
	160-<180	21	1.0	0	0	0	0	0	0	6	1.3	2	0.5	13	2.7	1	0.4	3	1.6	4	2.3	1	1.4	5	10.2
	180-<200	11	0.5	0	0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	4	0.9	4	0.8	4	1.7	1	0.5	2	1.2	0	0	1	2.0
	200-<220	4	0.2	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0	0	0	1	1.4	0	0
	220-<240	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	1	0.5	1	0.6	0	0	0	0
	240-<260	3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	1	0.2	1	0.4	0	0	0	1	1.4	0	0	
	260-	8	0.4	0	0	1	0.3	1	0.3	3	0.7	1	0.2	2	0.4	0	0	1	0.5	1	0.6	0	0	0	0
	(再掲) 110	548	25.7	11	8.2	30	9.1	35	11.1	98	22.0	142	33.0	232	48.6	81	35.4	86	46.5	79	45.7	34	48.6	33	67.3
	総 数	2130	100	134	100	328	100	316	100	445	100	430	100	477	100	229	100	185	100	173	100	70	100	49	100

注) インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

第 42 表の 2 血糖値の平均値及び標準偏差（食後 3 時間以上，性・年齢階級別）

性別	年齢 (歳)																							
	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	105.1	29.5	91.9	10.5	94.3	10.2	99.8	28.1	104.1	28.1	110.7	36.7	112.1	30.6	110.2	31.6	108.2	24.4	110.5	26.1	124.7	48.0	112.7	18.8
女性	104.1	26.8	92.2	10.8	94.9	15.7	97.3	18.7	104.0	33.2	108.1	27.4	114.7	28.7	109.0	22.7	112.6	27.6	114.0	30.8	116.3	28.1	122.6	24.9

注) インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

第 43 表の 1 総コレステロール値の分布（性・年齢階級別）

性別	総コレステロール(mg/dl)	年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	<120	11	0.6	2	1.7	0	0	0	0	2	0.6	3	0.8	4	0.8	1	0.5	2	0.9	1	0.6	1	1.2	0	0
	120-<140	56	3.2	7	6.1	3	1.4	5	2.4	5	1.4	10	2.6	26	5.5	8	3.8	9	4.3	7	4.5	8	9.8	2	7.1
	140-<160	152	8.7	16	13.9	21	9.9	9	4.3	21	6.0	32	8.2	53	11.1	21	10.1	20	9.5	14	9.0	12	14.6	7	25.0
	160-<180	308	17.6	33	28.7	39	18.4	32	15.4	47	13.4	59	15.1	98	20.5	34	16.3	48	22.7	26	16.7	19	23.2	5	17.9
	180-<200	417	23.8	29	25.2	56	26.4	38	18.3	84	23.9	91	23.3	119	24.9	48	23.1	49	23.2	44	28.2	20	24.4	6	21.4
	200-<220	357	20.4	15	13.0	39	18.4	54	26.0	82	23.4	83	21.3	84	17.6	43	20.7	39	18.5	30	19.2	11	13.4	4	14.3
	220-<240	246	14.0	12	10.4	30	14.2	30	14.4	59	16.8	51	13.1	64	13.4	23	11.1	33	15.6	25	16.0	4	4.9	2	7.1
	240-<260	129	7.4	1	0.9	16	7.5	20	9.6	34	9.7	39	10.0	19	4.0	17	8.2	8	3.8	7	4.5	3	3.7	1	3.6
	260-<280	53	3.0	0	0	5	2.4	13	6.3	10	2.8	15	3.8	10	2.1	10	4.8	3	1.4	2	1.3	4	4.9	1	3.6
	280-<300	18	1.0	0	0	3	1.4	6	2.9	4	1.1	5	1.3	0	0	3	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	300-	6	0.3	0	0	0	0	1	0.5	3	0.9	2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	1753	100	115	100	212	100	208	100	351	100	390	100	477	100	208	100	211	100	156	100	82	100	28	100
女性	<120	6	0.2	1	0.6	1	0.3	0	0	1	0.2	0	0	3	0.5	0	0	0	0	2	1.0	1	1.2	0	0
	120-<140	36	1.4	8	4.7	10	2.5	3	0.8	2	0.4	7	1.3	6	1.0	5	1.8	1	0.4	4	1.9	1	1.2	0	0
	140-<160	181	7.1	37	21.9	64	16.2	24	6.6	18	3.4	9	1.7	29	5.0	5	1.8	10	4.3	11	5.3	5	5.8	3	5.5
	160-<180	357	13.9	44	26.0	103	26.1	71	19.6	42	8.0	34	6.5	63	10.8	19	7.0	18	7.7	25	12.1	12	14.0	8	14.5
	180-<200	566	22.1	32	18.9	102	25.8	90	24.8	84	16.0	97	18.4	161	27.6	55	20.2	62	26.4	56	27.1	26	30.2	17	30.9
	200-<220	569	22.2	27	16.0	70	17.7	80	22.0	112	21.3	139	26.4	141	24.2	70	25.7	56	23.8	54	26.1	16	18.6	15	27.3
	220-<240	414	16.2	13	7.7	31	7.8	54	14.9	108	20.5	115	21.8	93	16.0	53	19.5	40	17.0	33	15.9	14	16.3	6	10.9
	240-<260	249	9.7	6	3.6	8	2.0	26	7.2	84	16.0	67	12.7	58	9.9	34	12.5	30	12.8	14	6.8	8	9.3	6	10.9
	260-<280	114	4.4	1	0.6	5	1.3	10	2.8	49	9.3	35	6.6	14	2.4	21	7.7	10	4.3	2	1.0	2	2.3	0	0
	280-<300	47	1.8	0	0	1	0.3	5	1.4	14	2.7	16	3.0	11	1.9	7	2.6	5	2.1	6	2.9	0	0	0	0
	300-	24	0.9	0	0	0	0	0	0	12	2.3	8	1.5	4	0.7	3	1.1	3	1.3	0	0	1	1.2	0	0
	総数	2563	100	169	100	395	100	363	100	526	100	527	100	583	100	272	100	235	100	207	100	86	100	55	100

第 43 表の 1 総コレステロール値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	197.9	34.6	180.1	28.6	198.2	32.8	208.5	35.4	205.0	34.4	201.1	35.8	189.5	32.1	197.7	35.5	190.6	31.3	193.0	30.4	182.3	35.5	182.7	34.0
女性	206.3	35.6	181.3	30.3	185.6	28.1	201.0	31.1	221.8	37.7	218.4	33.1	206.1	32.7	216.6	33.6	212.0	33.1	202.5	32.5	202.4	33.5	200.1	27.4

第43表の2 総コレステロール値の分布(性・年齢階級別)

性別	総コレステロール(mg/dl)	年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	<120	9	0.6	2	1.7	0	0	0	0	2	0.6	2	0.6	3	0.7	1	0.5	2	1.0	0	0	1	1.3	0	0
	120-140	53	3.3	7	6.1	3	1.4	5	2.5	4	1.3	10	2.8	24	5.6	8	4.2	8	4.2	6	4.5	8	10.3	2	8.0
	140-160	147	9.0	16	13.9	21	10.0	9	4.5	21	6.6	31	8.8	49	11.4	21	11.0	19	9.9	12	9.0	12	15.4	6	24.0
	160-180	288	17.7	33	28.7	39	18.7	32	15.9	43	13.4	54	15.3	87	20.3	33	17.3	43	22.4	21	15.8	18	23.1	5	20.0
	180-200	381	23.4	29	25.2	56	26.8	37	18.4	76	23.8	77	21.9	106	24.8	41	21.5	45	23.4	36	27.1	20	25.6	5	20.0
	200-220	331	20.4	15	13.0	38	18.2	53	26.4	74	23.1	76	21.6	75	17.5	40	20.9	33	17.2	28	21.1	11	14.1	3	12.0
	220-240	230	14.2	12	10.4	30	14.4	29	14.4	54	16.9	46	13.1	59	13.8	21	11.0	31	16.1	23	17.3	3	3.8	2	8.0
	240-260	117	7.2	1	0.9	15	7.2	19	9.5	29	9.1	36	10.2	17	4.0	15	7.9	8	4.2	5	3.8	3	3.8	1	4.0
	260-280	45	2.8	0	0	4	1.9	10	5.0	10	3.1	13	3.7	8	1.9	8	4.2	3	1.6	2	1.5	2	2.6	1	4.0
	280-300	18	1.1	0	0	3	1.4	6	3.0	4	1.3	5	1.4	0	0	3	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	300-	6	0.4	0	0	0	0	1	0.5	3	0.9	2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	1625	100	115	100	209	100	201	100	320	100	352	100	428	100	191	100	192	100	133	100	78	100	25	100
女性	<120	5	0.2	1	0.6	1	0.3	0	0	1	0.2	0	0	2	0.5	0	0	0	0	1	0.6	1	1.6	0	0
	120-140	35	1.6	8	4.7	10	2.5	3	0.9	2	0.4	7	1.6	5	1.1	5	2.3	0	0	4	2.5	1	1.6	0	0
	140-160	173	7.7	37	21.9	64	16.3	24	6.8	17	3.7	8	1.9	23	5.2	4	1.9	8	4.5	10	6.3	3	4.8	2	4.4
	160-180	322	14.4	44	26.0	103	26.2	70	19.9	36	7.9	18	4.2	51	11.5	10	4.7	15	8.5	21	13.1	8	12.9	7	15.6
	180-200	478	21.3	32	18.9	101	25.7	88	25.0	66	14.4	78	18.3	113	25.5	41	19.2	43	24.4	41	25.6	17	27.4	12	26.7
	200-220	475	21.2	27	16.0	69	17.6	77	21.9	97	21.2	107	25.1	98	22.1	50	23.4	38	21.6	36	22.5	11	17.7	13	28.9
	220-240	364	16.2	13	7.7	31	7.9	52	14.8	92	20.1	97	22.8	79	17.8	47	22.0	34	19.3	29	18.1	11	17.7	5	11.1
	240-260	223	10.0	6	3.6	8	2.0	23	6.5	78	17.0	60	14.1	48	10.8	31	14.5	24	13.6	11	6.9	7	11.3	6	13.3
	260-280	99	4.4	1	0.6	5	1.3	10	2.8	43	9.4	28	6.6	12	2.7	17	7.9	8	4.5	2	1.3	2	3.2	0	0
	280-300	45	2.0	0	0	1	0.3	5	1.4	14	3.1	16	3.8	9	2.0	7	3.3	4	2.3	5	3.1	0	0	0	0
	300-	22	1.0	0	0	0	0	0	0	12	2.6	7	1.6	3	0.7	2	0.9	2	1.1	0	0	1	1.6	0	0
	総数	2241	100	169	100	393	100	352	100	458	100	426	100	443	100	214	100	176	100	160	100	62	100	45	100

注) コレステロールを下げる薬服用者除外

第43表の2 総コレステロール値の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	197.7	34.7	180.1	28.6	197.6	32.4	207.4	35.2	205.1	35.0	201.2	36.2	189.5	32.0	196.6	35.5	190.8	31.9	194.5	29.4	180.0	33.5	183.0	35.4
女性	206.1	36.5	181.3	30.3	185.5	28.2	200.6	31.1	223.0	38.9	220.4	33.7	207.0	33.6	219.3	34.1	213.2	32.9	202.2	33.9	205.5	35.9	202.2	28.7

注) コレステロールを下げる薬服用者除外

第 44 表の 1 トリグリセリド値の分布（性・年齢階級別）

性別	トリグリセリド(mg/dl)	年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	20-<50	48	2.7	12	10.4	6	2.8	2	1.0	5	1.4	7	1.8	16	3.4	4	1.9	7	3.3	4	2.6	4	4.9	1	3.6
	50-<80	276	15.7	24	20.9	34	16.0	29	13.9	36	10.3	59	15.1	94	19.7	27	13.0	38	18.0	32	20.5	18	22.0	6	21.4
	80-<110	367	20.9	29	25.2	51	24.1	42	20.2	64	18.2	77	19.7	104	21.8	43	20.7	42	19.9	28	17.9	23	28.0	11	39.3
	110-<140	330	18.8	12	10.4	36	17.0	42	20.2	64	18.2	77	19.7	99	20.8	45	21.6	48	22.7	31	19.9	15	18.3	5	17.9
	140-<170	213	12.2	14	12.2	20	9.4	19	9.1	61	17.4	48	12.3	51	10.7	23	11.1	17	8.1	22	14.1	10	12.2	2	7.1
	170-<200	147	8.4	7	6.1	22	10.4	20	9.6	33	9.4	31	7.9	34	7.1	11	5.3	18	8.5	9	5.8	6	7.3	1	3.6
	200-	372	21.2	17	14.8	43	20.3	54	26.0	88	25.1	91	23.3	79	16.6	55	26.4	41	19.4	30	19.2	6	7.3	2	7.1
	(再掲) 150	646	36.9	29	25.2	78	36.8	87	41.8	164	46.7	148	37.9	140	29.4	77	37.0	67	31.8	51	32.7	18	22.0	4	14.3
	総数	1753	100	115	100	212	100	208	100	351	100	390	100	477	100	208	100	211	100	156	100	82	100	28	100
女性	20-<50	151	5.9	30	17.8	53	13.4	27	7.4	17	3.2	10	1.9	14	2.4	6	2.2	5	2.1	6	2.9	1	1.2	2	3.6
	50-<80	606	23.6	68	40.2	134	33.9	119	32.8	102	19.4	81	15.4	102	17.5	35	12.9	42	17.9	41	19.8	8	9.3	11	20.0
	80-<110	623	24.3	36	21.3	105	26.6	90	24.8	149	28.3	121	23.0	122	20.9	58	21.3	47	20.0	38	18.4	23	26.7	14	25.5
	110-<140	427	16.7	11	6.5	47	11.9	56	15.4	85	16.2	94	17.8	134	23.0	50	18.4	53	22.6	53	25.6	23	26.7	5	9.1
	140-<170	281	11.0	11	6.5	17	4.3	31	8.5	68	12.9	72	13.7	82	14.1	39	14.3	35	14.9	27	13.0	13	15.1	7	12.7
	170-<200	160	6.2	6	3.6	20	5.1	12	3.3	31	5.9	44	8.3	47	8.1	24	8.8	17	7.2	19	9.2	4	4.7	7	12.7
	200-	315	12.3	7	4.1	19	4.8	28	7.7	74	14.1	105	19.9	82	14.1	60	22.1	36	15.3	23	11.1	14	16.3	9	16.4
	(再掲) 150	647	25.2	22	13.0	48	12.2	58	16.0	146	27.8	187	35.5	186	31.9	103	37.9	72	30.6	60	29.0	31	36.0	23	41.8
	総数	2563	100	169	100	395	100	363	100	526	100	527	100	583	100	272	100	235	100	207	100	86	100	55	100

第 44 表の 1 トリグリセリド値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	152.0	101.0	131.4	97.4	148.6	90.8	169.3	141.3	168.3	106.4	152.4	89.1	138.6	86.5	157.0	96.5	148.0	93.9	141.4	90.0	118.7	61.7	110.4	49.9
女性	123.2	73.4	86.8	47.2	94.6	52.0	104.7	56.1	132.1	80.7	147.2	86.7	135.1	68.7	150.1	83.1	136.3	65.2	131.7	74.9	138.7	60.2	136.9	72.3

第44表の2 トリグリセリド値の分布(性・年齢階級別)

性別	トリグリセリド(mg/dl)	年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	20-<50	46	2.8	12	10.4	6	2.9	2	1.0	5	1.6	6	1.7	15	3.5	4	2.1	6	3.1	4	3.0	4	5.1	1	4.0
	50-<80	264	16.2	24	20.9	34	16.3	29	14.4	34	10.6	55	15.6	88	20.6	25	13.1	37	19.3	27	20.3	18	23.1	6	24.0
	80-<110	345	21.2	29	25.2	51	24.4	42	20.9	59	18.4	70	19.9	94	22.0	41	21.5	39	20.3	24	18.0	21	26.9	10	40.0
	110-<140	310	19.1	12	10.4	35	16.7	41	20.4	62	19.4	73	20.7	87	20.3	42	22.0	40	20.8	27	20.3	15	19.2	5	20.0
	140-<170	197	12.1	14	12.2	20	9.6	19	9.5	53	16.6	45	12.8	46	10.7	22	11.5	16	8.3	20	15.0	9	11.5	1	4.0
	170-<200	133	8.2	7	6.1	22	10.5	20	10.0	28	8.8	29	8.2	27	6.3	10	5.2	16	8.3	5	3.8	5	6.4	1	4.0
	200-(再掲)150	330	20.3	17	14.8	41	19.6	48	23.9	79	24.7	74	21.0	71	16.6	47	24.6	38	19.8	26	19.5	6	7.7	1	4.0
	総数	581	35.8	29	25.2	76	36.4	81	40.3	146	45.6	127	36.1	122	28.5	68	35.6	61	31.8	42	31.6	17	21.8	2	8.0
女性	20-<50	145	6.5	30	17.8	53	13.5	26	7.4	15	3.3	8	1.9	13	2.9	5	2.3	4	2.3	6	3.8	1	1.6	2	4.4
	50-<80	568	25.3	68	40.2	134	34.1	119	33.8	96	21.0	70	16.4	81	18.3	28	13.1	33	18.8	32	20.0	7	11.3	9	20.0
	80-<110	545	24.3	36	21.3	105	26.7	87	24.7	129	28.2	94	22.1	94	21.2	42	19.6	38	21.6	27	16.9	18	29.0	11	24.4
	110-<140	354	15.8	11	6.5	46	11.7	56	15.9	71	15.5	74	17.4	96	21.7	39	18.2	36	20.5	39	24.4	17	27.4	4	8.9
	140-<170	235	10.5	11	6.5	17	4.3	29	8.2	57	12.4	57	13.4	64	14.4	31	14.5	30	17.0	20	12.5	8	12.9	6	13.3
	170-<200	134	6.0	6	3.6	19	4.8	11	3.1	29	6.3	34	8.0	35	7.9	19	8.9	10	5.7	17	10.6	2	3.2	6	13.3
	200-(再掲)150	260	11.6	7	4.1	19	4.8	24	6.8	61	13.3	89	20.9	60	13.5	50	23.4	25	14.2	19	11.9	9	14.5	7	15.6
	総数	539	24.1	22	13.0	47	12.0	53	15.1	124	27.1	156	36.6	137	30.9	86	40.2	51	29.0	48	30.0	19	30.6	19	42.2

注) コレステロールを下げる薬服用者除外

第44表の2 トリグリセリド値の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	149.9	100.5	131.4	97.4	147.4	90.6	165.2	141.1	167.0	107.5	149.1	87.9	136.7	83.7	154.3	95.6	147.2	94.1	139.0	81.9	118.2	62.7	102.6	39.5
女性	120.2	72.5	86.8	47.2	94.2	51.8	102.2	51.7	130.4	81.1	147.4	86.9	133.7	70.2	151.8	82.7	133.7	64.9	133.7	79.0	133.4	63.1	134.3	68.1

注) コレステロールを下げる薬服用者除外

第 45 表の 1 HDL-コレステロール値の分布 (性・年齢階級別)

性別	HDLコレステロール(mg/dl)	年齢(歳)																											
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	<30	16	0.9	0	0	0	0	1	0.5	3	0.9	6	1.5	6	1.3	5	2.4	2	0.9	1	0.6	2	2.4	1	3.6				
	30-<40	167	9.5	6	5.2	14	6.6	18	8.7	35	10.0	39	10.0	55	11.5	29	13.9	26	12.3	18	11.5	10	12.2	1	3.6				
	40-<50	424	24.2	25	21.7	57	26.9	41	19.7	80	22.8	89	22.8	132	27.7	48	23.1	52	24.6	43	27.6	27	32.9	10	35.7				
	50-<60	455	26.0	36	31.3	42	19.8	59	28.4	84	23.9	105	26.9	129	27.0	51	24.5	69	32.7	41	26.3	13	15.9	6	21.4				
	60-<70	375	21.4	29	25.2	54	25.5	48	23.1	89	25.4	73	18.7	82	17.2	39	18.8	36	17.1	27	17.3	15	18.3	4	14.3				
	70-<80	179	10.2	11	9.6	19	9.0	27	13.0	37	10.5	40	10.3	45	9.4	15	7.2	20	9.5	10	6.4	10	12.2	5	17.9				
	80-<90	76	4.3	5	4.3	17	8.0	9	4.3	12	3.4	19	4.9	14	2.9	11	5.3	1	0.5	8	5.1	4	4.9	1	3.6				
	90-<100	37	2.1	2	1.7	5	2.4	4	1.9	7	2.0	12	3.1	7	1.5	4	1.9	3	1.4	4	2.6	0	0	0	0				
	100-	24	1.4	1	0.9	4	1.9	1	0.5	4	1.1	7	1.8	7	1.5	6	2.9	2	0.9	4	2.6	1	1.2	0	0				
		総数	1753	100	115	100	212	100	208	100	351	100	390	100	477	100	208	100	211	100	156	100	82	100	28	100			
女性	<30	7	0.3	1	0.6	0	0	1	0.3	2	0.4	0	0	3	0.5	0	0	0	0	2	1.0	0	0	1	1.8				
	30-<40	72	2.8	0	0	4	1.0	2	0.6	11	2.1	26	4.9	29	5.0	14	5.1	12	5.1	9	4.3	4	4.7	4	7.3				
	40-<50	291	11.4	10	5.9	25	6.3	25	6.9	51	9.7	69	13.1	111	19.0	37	13.6	39	16.6	42	20.3	25	29.1	5	9.1				
	50-<60	537	21.0	25	14.8	62	15.7	64	17.6	101	19.2	142	26.9	143	24.5	76	27.9	49	20.9	57	27.5	25	29.1	12	21.8				
	60-<70	654	25.5	47	27.8	103	26.1	93	25.6	142	27.0	129	24.5	140	24.0	64	23.5	59	25.1	45	21.7	18	20.9	18	32.7				
	70-<80	499	19.5	45	26.6	97	24.6	84	23.1	99	18.8	81	15.4	93	16.0	42	15.4	41	17.4	35	16.9	6	7.0	11	20.0				
	80-<90	289	11.3	27	16.0	73	18.5	56	15.4	55	10.5	38	7.2	40	6.9	18	6.6	21	8.9	10	4.8	7	8.1	2	3.6				
	90-<100	132	5.2	9	5.3	26	6.6	23	6.3	39	7.4	22	4.2	13	2.2	11	4.0	7	3.0	5	2.4	0	0	1	1.8				
	100-	82	3.2	5	3.0	5	1.3	15	4.1	26	4.9	20	3.8	11	1.9	10	3.7	7	3.0	2	1.0	1	1.2	1	1.8				
		総数	2563	100	169	100	395	100	363	100	526	100	527	100	583	100	272	100	235	100	207	100	86	100	55	100			

第 45 表の 1 HDL-コレステロール値の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																									
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上			
	HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)			
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	56.9	15.2	58.2	13.4	59.1	15.6	58.0	13.8	57.2	15.3	57.1	16.2	54.8	14.9	55.8	17.3	54.1	13.8	55.9	15.9	54.5	15.9	54.5	14.7		
女性	66.4	16.1	70.3	13.9	70.0	14.0	70.7	16.0	68.1	17.2	63.7	16.4	61.0	15.0	63.1	16.5	63.1	15.7	59.9	14.6	57.7	13.9	61.4	14.5		

第45表の2 HDL-コレステロール値の分布(性・年齢階級別)

性別	HDLコレステロール(mg/dl)	年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	<30	14	0.9	0	0	0	0	1	0.5	3	0.9	4	1.1	6	1.4	3	1.6	2	1.0	1	0.8	2	2.6	1	4.0		
	30-<40	154	9.5	6	5.2	13	6.2	17	8.5	32	10.0	37	10.5	49	11.4	28	14.7	25	13.0	15	11.3	9	11.5	0	0		
	40-<50	390	24.0	25	21.7	56	26.8	37	18.4	73	22.8	77	21.9	122	28.5	44	23.0	48	25.0	38	28.6	27	34.6	9	36.0		
	50-<60	419	25.8	36	31.3	41	19.6	58	28.9	74	23.1	96	27.3	114	26.6	48	25.1	61	31.8	35	26.3	13	16.7	5	20.0		
	60-<70	350	21.5	29	25.2	54	25.8	47	23.4	81	25.3	67	19.0	72	16.8	36	18.8	32	16.7	22	16.5	14	17.9	4	16.0		
	70-<80	167	10.3	11	9.6	19	9.1	27	13.4	36	11.3	36	10.2	38	8.9	13	6.8	18	9.4	6	4.5	9	11.5	5	20.0		
	80-<90	73	4.5	5	4.3	17	8.1	9	4.5	12	3.8	17	4.8	13	3.0	10	5.2	1	0.5	8	6.0	3	3.8	1	4.0		
	90-<100	36	2.2	2	1.7	5	2.4	4	2.0	6	1.9	12	3.4	7	1.6	4	2.1	3	1.6	4	3.0	0	0	0	0		
	100-	22	1.4	1	0.9	4	1.9	1	0.5	3	0.9	6	1.7	7	1.6	5	2.6	2	1.0	4	3.0	1	1.3	0	0		
		総数	1625	100	115	100	209	100	201	100	320	100	352	100	428	100	191	100	192	100	133	100	78	100	25	100	
女性	<30	6	0.3	1	0.6	0	0	1	0.3	2	0.4	0	0	2	0.5	0	0	0	0	2	1.3	0	0	0	0		
	30-<40	57	2.5	0	0	4	1.0	2	0.6	9	2.0	19	4.5	23	5.2	10	4.7	11	6.3	7	4.4	3	4.8	2	4.4		
	40-<50	245	10.9	10	5.9	24	6.1	24	6.8	40	8.7	60	14.1	87	19.6	32	15.0	32	18.2	35	21.9	15	24.2	5	11.1		
	50-<60	462	20.6	25	14.8	62	15.8	62	17.6	88	19.2	117	27.5	108	24.4	64	29.9	34	19.3	45	28.1	19	30.6	10	22.2		
	60-<70	577	25.7	47	27.8	102	26.0	89	25.3	129	28.2	102	23.9	108	24.4	48	22.4	45	25.6	33	20.6	13	21.0	17	37.8		
	70-<80	445	19.9	45	26.6	97	24.7	81	23.0	86	18.8	66	15.5	70	15.8	33	15.4	29	16.5	27	16.9	4	6.5	10	22.2		
	80-<90	266	11.9	27	16.0	73	18.6	56	15.9	46	10.0	32	7.5	32	7.2	14	6.5	18	10.2	6	3.8	7	11.3	1	2.2		
	90-<100	118	5.3	9	5.3	26	6.6	23	6.5	36	7.9	17	4.0	7	1.6	8	3.7	3	1.7	4	2.5	0	0	0	0		
	100-	65	2.9	5	3.0	5	1.3	14	4.0	22	4.8	13	3.1	6	1.4	5	2.3	4	2.3	1	0.6	1	1.6	0	0		
		総数	2241	100	169	100	393	100	352	100	458	100	426	100	443	100	214	100	176	100	160	100	62	100	45	100	

注) コレステロールを下げる薬服用者除外

第45表の2 HDL-コレステロール値の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																									
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上			
	HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)			
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	57.1	15.2	58.2	13.4	59.3	15.6	58.3	13.8	57.2	15.1	57.4	16.3	54.7	15.1	55.8	17.1	54.0	14.1	55.9	16.4	54.1	15.5	55.9	14.8		
女性	66.6	15.8	70.3	13.9	70.1	13.9	70.8	15.7	68.2	16.7	63.2	15.9	60.5	14.6	61.9	15.6	62.3	15.4	59.0	14.3	58.9	14.8	61.1	11.4		

注) コレステロールを下げる薬服用者除外

第 46 表の 1 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	368	21.2	3	2.6	12	5.7	29	14.1	88	25.1	102	26.3	134	28.6	281	24.4	118	28.6	72	27.6
	腹囲異常+項目1つ以上該当	421	24.3	10	8.8	46	22.0	53	25.7	95	27.1	107	27.6	110	23.5	312	27.1	114	27.6	53	20.3
	上記以外	946	54.5	101	88.6	151	72.2	124	60.2	167	47.7	179	46.1	224	47.9	558	48.5	181	43.8	136	52.1
	総 数	1735	100	114	100	209	100	206	100	350	100	388	100	468	100	1151	100	413	100	261	100
女 性	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	266	10.5	0	0	2	0.5	11	3.1	45	8.6	85	16.3	123	21.3	198	12.1	108	21.4	66	19.2
	腹囲異常+項目1つ以上該当	179	7.1	2	1.2	9	2.4	8	2.2	59	11.3	51	9.8	50	8.7	135	8.2	42	8.3	33	9.6
	上記以外	2078	82.4	159	98.8	369	97.1	341	94.7	418	80.1	387	74.0	404	70.0	1306	79.7	354	70.2	244	71.1
	総 数	2523	100	161	100	380	100	360	100	522	100	523	100	577	100	1639	100	504	100	343	100
総 数	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	634	14.9	3	1.1	14	2.4	40	7.1	133	15.3	187	20.5	257	24.6	479	17.2	226	24.6	138	22.8
	腹囲異常+項目1つ以上該当	600	14.1	12	4.4	55	9.3	61	10.8	154	17.7	158	17.3	160	15.3	447	16.0	156	17.0	86	14.2
	上記以外	3024	71.0	260	94.5	520	88.3	465	82.2	585	67.1	566	62.1	628	60.1	1864	66.8	535	58.3	380	62.9
	総 数	4258	100	275	100	589	100	566	100	872	100	911	100	1045	100	2790	100	917	100	604	100

注) 妊婦除外, ヘモグロビン A1c 5.5% の場合 項目の基準は p. 78 参照

第 46 表の 2 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	335	19.3	3	2.6	11	5.3	27	13.1	80	22.9	87	22.4	127	27.1	250	21.7	105	25.4	71	27.2
	腹囲異常+項目1つ以上該当	448	25.8	10	8.8	46	22.0	55	26.7	103	29.4	121	31.2	113	24.1	341	29.6	125	30.3	51	19.5
	上記以外	952	54.9	101	88.6	152	72.7	124	60.2	167	47.7	180	46.4	228	48.7	560	48.7	183	44.3	139	53.3
	総 数	1735	100	114	100	209	100	206	100	350	100	388	100	468	100	1151	100	413	100	261	100
女 性	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	240	9.5	0	0	2	0.5	10	2.8	41	7.9	73	14.0	114	19.8	176	10.7	96	19.0	62	18.1
	腹囲異常+項目1つ以上該当	199	7.9	2	1.2	9	2.4	8	2.2	60	11.5	63	12.0	57	9.9	152	9.3	53	10.5	36	10.5
	上記以外	2084	82.6	159	98.8	369	97.1	342	95.0	421	80.7	387	74.0	406	70.4	1311	80.0	355	70.4	245	71.4
	総 数	2523	100	161	100	380	100	360	100	522	100	523	100	577	100	1639	100	504	100	343	100
総 数	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	575	13.5	3	1.1	13	2.2	37	6.5	121	13.9	160	17.6	241	23.1	426	15.3	201	21.9	133	22.0
	腹囲異常+項目1つ以上該当	647	15.2	12	4.4	55	9.3	63	11.1	163	18.7	184	20.2	170	16.3	493	17.7	178	19.4	87	14.4
	上記以外	3036	71.3	260	94.5	521	88.5	466	82.3	588	67.4	567	62.2	634	60.7	1871	67.1	538	58.7	384	63.6
	総 数	4258	100	275	100	589	100	566	100	872	100	911	100	1045	100	2790	100	917	100	604	100

注) 妊婦除外, ヘモグロビン A1c 5.6% の場合 項目の基準は p. 78 参照

第47表の1 腹囲区分別, 血中脂質, 血圧, 血糖のいずれかのリスクを有する割合(性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)	腹囲異常 <85 cm(男) / <90 cm(女) 85 cm(男) / 90 cm(女)	リスク保有数									
			総数		0		1		2		3	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	<85 cm(男) / <90 cm(女)	811	100.0	273	33.7	364	44.9	152	18.7	22	2.7
		85 cm(男) / 90 cm(女)	924	100.0	135	14.6	421	45.6	284	30.7	84	9.1
	20-29歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	85	100.0	70	82.4	14	16.5	1	1.2	0	0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	29	100.0	16	55.2	10	34.5	3	10.3	0	0
	30-39歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	112	100.0	76	67.9	34	30.4	2	1.8	0	0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	97	100.0	39	40.2	46	47.4	11	11.3	1	1.0
	40-49歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	92	100.0	42	45.7	42	45.7	7	7.6	1	1.1
		85 cm(男) / 90 cm(女)	114	100.0	32	28.1	53	46.5	27	23.7	2	1.8
	50-59歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	149	100.0	37	24.8	80	53.7	26	17.4	6	4.0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	201	100.0	18	9.0	95	47.3	66	32.8	22	10.9
	60-69歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	163	100.0	24	14.7	83	50.9	48	29.4	8	4.9
		85 cm(男) / 90 cm(女)	225	100.0	16	7.1	107	47.6	84	37.3	18	8.0
	70歳以上	<85 cm(男) / <90 cm(女)	210	100.0	24	11.4	111	52.9	68	32.4	7	3.3
		85 cm(男) / 90 cm(女)	258	100.0	14	5.4	110	42.6	93	36.0	41	15.9
(再掲) 40-74歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	484	100.0	110	22.7	247	51.0	109	22.5	18	3.7	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	667	100.0	74	11.1	312	46.8	222	33.3	59	8.8	
(再掲) 65-74歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	164	100.0	17	10.4	82	50.0	58	35.4	7	4.3	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	249	100.0	17	6.8	114	45.8	90	36.1	28	11.2	
(再掲) 75歳以上	<85 cm(男) / <90 cm(女)	130	100.0	17	13.1	69	53.1	40	30.8	4	3.1	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	131	100.0	6	4.6	53	40.5	48	36.6	24	18.3	
女性	総数	<85 cm(男) / <90 cm(女)	2018	100.0	882	43.7	710	35.2	351	17.4	75	3.7
		85 cm(男) / 90 cm(女)	505	100.0	60	11.9	179	35.4	194	38.4	72	14.3
	20-29歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	154	100.0	143	92.9	11	7.1	0	0	0	0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	7	100.0	5	71.4	2	28.6	0	0	0	0
	30-39歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	355	100.0	292	82.3	60	16.9	3	0.8	0	0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	25	100.0	14	56.0	9	36.0	1	4.0	1	4.0
	40-49歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	328	100.0	194	59.1	112	34.1	20	6.1	2	0.6
		85 cm(男) / 90 cm(女)	32	100.0	13	40.6	8	25.0	8	25.0	3	9.4
	50-59歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	405	100.0	140	34.6	178	44.0	74	18.3	13	3.2
		85 cm(男) / 90 cm(女)	117	100.0	13	11.1	59	50.4	33	28.2	12	10.3
	60-69歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	377	100.0	68	18.0	173	45.9	111	29.4	25	6.6
		85 cm(男) / 90 cm(女)	146	100.0	10	6.8	51	34.9	68	46.6	17	11.6
	70歳以上	<85 cm(男) / <90 cm(女)	399	100.0	45	11.3	176	44.1	143	35.8	35	8.8
		85 cm(男) / 90 cm(女)	178	100.0	5	2.8	50	28.1	84	47.2	39	21.9
(再掲) 40-74歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	1267	100.0	425	33.5	526	41.5	262	20.7	54	4.3	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	372	100.0	39	10.5	135	36.3	147	39.5	51	13.7	
(再掲) 65-74歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	344	100.0	52	15.1	144	41.9	122	35.5	26	7.6	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	160	100.0	10	6.3	42	26.3	81	50.6	27	16.9	
(再掲) 75歳以上	<85 cm(男) / <90 cm(女)	242	100.0	22	9.1	113	46.7	86	35.5	21	8.7	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	101	100.0	2	2.0	33	32.7	46	45.5	20	19.8	
総数	総数	<85 cm(男) / <90 cm(女)	2829	100.0	1155	40.8	1074	38.0	503	17.8	97	3.4
		85 cm(男) / 90 cm(女)	1429	100.0	195	13.6	600	42.0	478	33.4	156	10.9
	20-29歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	239	100.0	213	89.1	25	10.5	1	0.4	0	0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	36	100.0	21	58.3	12	33.3	3	8.3	0	0
	30-39歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	467	100.0	368	78.8	94	20.1	5	1.1	0	0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	122	100.0	53	43.4	55	45.1	12	9.8	2	1.6
	40-49歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	420	100.0	236	56.2	154	36.7	27	6.4	3	0.7
		85 cm(男) / 90 cm(女)	146	100.0	45	30.8	61	41.8	35	24.0	5	3.4
	50-59歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	554	100.0	177	31.9	258	46.6	100	18.1	19	3.4
		85 cm(男) / 90 cm(女)	318	100.0	31	9.7	154	48.4	99	31.1	34	10.7
	60-69歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	540	100.0	92	17.0	256	47.4	159	29.4	33	6.1
		85 cm(男) / 90 cm(女)	371	100.0	26	7.0	158	42.6	152	41.0	35	9.4
	70歳以上	<85 cm(男) / <90 cm(女)	609	100.0	69	11.3	287	47.1	211	34.6	42	6.9
		85 cm(男) / 90 cm(女)	436	100.0	19	4.4	160	36.7	177	40.6	80	18.3
(再掲) 40-74歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	1751	100.0	535	30.6	773	44.1	371	21.2	72	4.1	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	1039	100.0	113	10.9	447	43.0	369	35.5	110	10.6	
(再掲) 65-74歳	<85 cm(男) / <90 cm(女)	508	100.0	69	13.6	226	44.5	180	35.4	33	6.5	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	409	100.0	27	6.6	156	38.1	171	41.8	55	13.4	
(再掲) 75歳以上	<85 cm(男) / <90 cm(女)	372	100.0	39	10.5	182	48.9	126	33.9	25	6.7	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	232	100.0	8	3.4	86	37.1	94	40.5	44	19.0	

注) 妊婦除外, ヘモグロビン A1c 5.5%の場合 項目の基準は p.78 参照

第47表の2 腹囲区別，血中脂質，血圧，血糖のリスクの保有状況 [すべての組み合わせ 血中脂質 血圧 血糖] (性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)	腹囲異常 <85cm(男)/<90cm(女) 85cm(男)/90cm(女)	リスク保有組み合わせ																	
			総数		有有有		有有無		無有有		有無有		有無無		無有無		無無有		無無無	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	<85cm(男)/<90cm(女)	811	100.0	22	2.7	35	4.3	110	13.6	7	0.9	20	2.5	308	38.0	36	4.4	273	33.7
		85cm(男)/90cm(女)	924	100.0	84	9.1	95	10.3	181	19.6	8	0.9	23	2.5	365	39.5	33	3.6	135	14.6
	20-29歳	<85cm(男)/<90cm(女)	85	100.0	0	0	1	1.2	0	0	0	0	1	1.2	13	15.3	0	0	70	82.4
		85cm(男)/90cm(女)	29	100.0	0	0	2	6.9	1	3.4	0	0	2	6.9	8	27.6	0	0	16	55.2
	30-39歳	<85cm(男)/<90cm(女)	112	100.0	0	0	1	0.9	1	0.9	0	0	4	3.6	30	26.8	0	0	76	67.9
		85cm(男)/90cm(女)	97	100.0	1	1.0	7	7.2	4	4.1	0	0	3	3.1	42	43.3	1	1.0	39	40.2
	40-49歳	<85cm(男)/<90cm(女)	92	100.0	1	1.1	4	4.3	3	3.3	0	0	1	1.1	35	38.0	6	6.5	42	45.7
		85cm(男)/90cm(女)	114	100.0	2	1.8	13	11.4	14	12.3	0	0	4	3.5	43	37.7	6	5.3	32	28.1
	50-59歳	<85cm(男)/<90cm(女)	149	100.0	6	4.0	7	4.7	18	12.1	1	0.7	5	3.4	66	44.3	9	6.0	37	24.8
		85cm(男)/90cm(女)	201	100.0	22	10.9	17	8.5	46	22.9	3	1.5	5	2.5	84	41.8	6	3.0	18	9.0
	60-69歳	<85cm(男)/<90cm(女)	163	100.0	8	4.9	8	4.9	36	22.1	4	2.5	5	3.1	71	43.6	7	4.3	24	14.7
		85cm(男)/90cm(女)	225	100.0	18	8.0	26	11.6	54	24.0	4	1.8	6	2.7	95	42.2	6	2.7	16	7.1
	70歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	210	100.0	7	3.3	14	6.7	52	24.8	2	1.0	4	1.9	93	44.3	14	6.7	24	11.4
		85cm(男)/90cm(女)	258	100.0	41	15.9	30	11.6	62	24.0	1	0.4	3	1.2	93	36.0	14	5.4	14	5.4
	(再掲)40-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	484	100.0	18	3.7	25	5.2	77	15.9	7	1.4	13	2.7	207	42.8	27	5.6	110	22.7
		85cm(男)/90cm(女)	667	100.0	59	8.8	67	10.0	148	22.2	7	1.0	18	2.7	266	39.9	28	4.2	74	11.1
	(再掲)65-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	164	100.0	7	4.3	14	8.5	40	24.4	4	2.4	5	3.0	70	42.7	7	4.3	17	10.4
		85cm(男)/90cm(女)	249	100.0	28	11.2	24	9.6	64	25.7	2	0.8	8	3.2	94	37.8	12	4.8	17	6.8
	(再掲)75歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	130	100.0	4	3.1	8	6.2	32	24.6	0	0	2	1.5	58	44.6	9	6.9	17	13.1
		85cm(男)/90cm(女)	131	100.0	24	18.3	19	14.5	28	21.4	1	0.8	0	0	49	37.4	4	3.1	6	4.6
女性	総数	<85cm(男)/<90cm(女)	2018	100.0	75	3.7	104	5.2	224	11.1	23	1.1	44	2.2	544	27.0	122	6.0	882	43.7
		85cm(男)/90cm(女)	505	100.0	72	14.3	50	9.9	135	26.7	9	1.8	3	0.6	139	27.5	37	7.3	60	11.9
	20-29歳	<85cm(男)/<90cm(女)	154	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2.6	7	4.5	143	92.9
		85cm(男)/90cm(女)	7	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3	1	14.3	0	0	5	71.4
	30-39歳	<85cm(男)/<90cm(女)	355	100.0	0	0	0	0	3	0.8	0	0	5	1.4	31	8.7	24	6.8	292	82.3
		85cm(男)/90cm(女)	25	100.0	1	4.0	0	0	1	4.0	0	0	0	0	5	20.0	4	16.0	14	56.0
	40-49歳	<85cm(男)/<90cm(女)	328	100.0	2	0.6	5	1.5	15	4.6	0	0	3	0.9	76	23.2	33	10.1	194	59.1
		85cm(男)/90cm(女)	32	100.0	3	9.4	0	0	7	21.9	1	3.1	0	0	5	15.6	3	9.4	13	40.6
	50-59歳	<85cm(男)/<90cm(女)	405	100.0	13	3.2	25	6.2	42	10.4	7	1.7	13	3.2	141	34.8	24	5.9	140	34.6
		85cm(男)/90cm(女)	117	100.0	12	10.3	7	6.0	25	21.4	1	0.9	0	0	41	35.0	18	15.4	13	11.1
	60-69歳	<85cm(男)/<90cm(女)	377	100.0	25	6.6	31	8.2	72	19.1	8	2.1	13	3.4	141	37.4	19	5.0	68	18.0
		85cm(男)/90cm(女)	146	100.0	17	11.6	17	11.6	47	32.2	4	2.7	2	1.4	42	28.8	7	4.8	10	6.8
	70歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	399	100.0	35	8.8	43	10.8	92	23.1	8	2.0	10	2.5	151	37.8	15	3.8	45	11.3
		85cm(男)/90cm(女)	178	100.0	39	21.9	26	14.6	55	30.9	3	1.7	0	0	45	25.3	5	2.8	5	2.8
	(再掲)40-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	1267	100.0	54	4.3	77	6.1	164	12.9	21	1.7	32	2.5	412	32.5	82	6.5	425	33.5
		85cm(男)/90cm(女)	372	100.0	51	13.7	33	8.9	106	28.5	8	2.2	2	0.5	103	27.7	30	8.1	39	10.5
	(再掲)65-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	344	100.0	26	7.6	38	11.0	74	21.5	10	2.9	9	2.6	123	35.8	12	3.5	52	15.1
		85cm(男)/90cm(女)	160	100.0	27	16.9	19	11.9	57	35.6	5	3.1	1	0.6	36	22.5	5	3.1	10	6.3
	(再掲)75歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	242	100.0	21	8.7	27	11.2	57	23.6	2	0.8	7	2.9	97	40.1	9	3.7	22	9.1
		85cm(男)/90cm(女)	101	100.0	20	19.8	17	16.8	28	27.7	1	1.0	0	0	30	29.7	3	3.0	2	2.0
総数	総数	<85cm(男)/<90cm(女)	2829	100.0	97	3.4	139	4.9	334	11.8	30	1.1	64	2.3	852	30.1	158	5.6	1155	40.8
		85cm(男)/90cm(女)	1429	100.0	156	10.9	145	10.1	316	22.1	17	1.2	26	1.8	504	35.3	70	4.9	195	13.6
	20-29歳	<85cm(男)/<90cm(女)	239	100.0	0	0	1	0.4	0	0	0	0	1	0.4	17	7.1	7	2.9	213	89.1
		85cm(男)/90cm(女)	36	100.0	0	0	2	5.6	1	2.8	0	0	3	8.3	9	25.0	0	0	21	58.3
	30-39歳	<85cm(男)/<90cm(女)	467	100.0	0	0	1	0.2	4	0.9	0	0	9	1.9	61	13.1	24	5.1	368	78.8
		85cm(男)/90cm(女)	122	100.0	2	1.6	7	5.7	5	4.1	0	0	3	2.5	47	38.5	5	4.1	53	43.4
	40-49歳	<85cm(男)/<90cm(女)	420	100.0	3	0.7	9	2.1	18	4.3	0	0	4	1.0	111	26.4	39	9.3	236	56.2
		85cm(男)/90cm(女)	146	100.0	5	3.4	13	8.9	21	14.4	1	0.7	4	2.7	48	32.9	9	6.2	45	30.8
	50-59歳	<85cm(男)/<90cm(女)	554	100.0	19	3.4	32	5.8	60	10.8	8	1.4	18	3.2	207	37.4	33	6.0	177	31.9
		85cm(男)/90cm(女)	318	100.0	34	10.7	24	7.5	71	22.3	4	1.3	5	1.6	125	39.3	24	7.5	31	9.7
	60-69歳	<85cm(男)/<90cm(女)	540	100.0	33	6.1	39	7.2	108	20.0	12	2.2	18	3.3	212	39.3	26	4.8	92	17.0
		85cm(男)/90cm(女)	371	100.0	35	9.4	43	11.6	101	27.2	8	2.2	8	2.2	137	36.9	13	3.5	26	7.0
	70歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	609	100.0	42	6.9	57	9.4	144	23.6	10	1.6	14	2.3	244	40.1	29	4.8	69	11.3
		85cm(男)/90cm(女)	436	100.0	80	18.3	56	12.8	117	26.8	4	0.9	3	0.7	138	31.7	19	4.4	19	4.4
	(再掲)40-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	1751	100.0	72	4.1	102	5.8	241	13.8	28	1.6	45	2.6	619	35.4	109	6.2	535	30.6
		85cm(男)/90cm(女)	1039	100.0	110	10.6	100	9.6	254	24.4	15	1.4	20	1.9	369	35.5	58	5.6	113	10.9
	(再掲)65-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	508	100.0	33	6.5	52	10.2	114	22.4	14	2.8	14	2.8	193	38.0	19	3.7	69	13.6
		85cm(男)/90cm(女)	409	100.0	55	13.4	43	10.5	121	29.6	7	1.7	9	2.2	130	31.8	17	4.2	27	6.6
	(再掲)75歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	372	100.0	25	6.7	35	9.4	89	23.9	2	0.5	9	2.4	155	41.7	18	4.8	39	10.5
		85cm(男)/90cm(女)	232	100.0	44	19.0	36	15.5	56	24.1	2	0.9	0	0	79	34.1	7	3.0	8	3.4

注) 妊婦除外，ヘモグロビン A1c 5.5%の場合 リスクの項目の基準は p.78 参照

第48表の1-1 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況
(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	214	12.3	0	0	1	0.5	10	4.8	46	13.1	57	14.7	100	21.2	165	14.3	81	19.6	48	18.1
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	106	6.1	0	0	1	0.5	4	1.9	17	4.9	28	7.2	56	11.9	78	6.8	43	10.4	27	10.2
	糖尿病の可能性が否定できない人	193	11.1	1	0.9	4	1.9	19	9.2	46	13.1	56	14.4	67	14.2	148	12.8	60	14.5	40	15.1
	上記以外	1337	76.7	113	99.1	207	97.6	178	86.0	258	73.7	276	71.0	305	64.6	840	72.9	273	65.9	177	66.8
	総数	1744	100	114	100	212	100	207	100	350	100	389	100	472	100	1153	100	414	100	265	100
女性	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	209	8.2	0	0	2	0.5	8	2.2	43	8.2	67	12.8	89	15.3	155	9.4	75	14.9	52	15.0
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	98	3.8	0	0	1	0.3	0	0	12	2.3	36	6.9	49	8.4	71	4.3	43	8.5	26	7.5
	糖尿病の可能性が否定できない人	320	12.5	2	1.2	18	4.6	40	11.0	66	12.6	84	16.1	110	19.0	235	14.3	91	18.1	65	18.8
	上記以外	2023	79.3	164	98.8	375	94.9	315	86.8	416	79.2	372	71.1	381	65.7	1255	76.3	338	67.1	229	66.2
	総数	2552	100	166	100	395	100	363	100	525	100	523	100	580	100	1645	100	504	100	346	100
総数	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	423	9.8	0	0	3	0.5	18	3.2	89	10.2	124	13.6	189	18.0	320	11.4	156	17.0	100	16.4
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	204	4.7	0	0	2	0.3	4	0.7	29	3.3	64	7.0	105	10.0	149	5.3	86	9.4	53	8.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	513	11.9	3	1.1	22	3.6	59	10.4	112	12.8	140	15.4	177	16.8	383	13.7	151	16.4	105	17.2
	上記以外	3360	78.2	277	98.9	582	95.9	493	86.5	674	77.0	648	71.1	686	65.2	2095	74.9	611	66.6	406	66.4
	総数	4296	100	280	100	607	100	570	100	875	100	912	100	1052	100	2798	100	918	100	611	100

注) ヘモグロビン A_{1c} 5.6%の場合 判定の基準は p.72 参照
「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

第48表の1-2 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況
(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	214	12.3	0	0	1	0.5	10	4.8	46	13.1	57	14.7	100	21.2	165	14.3	81	19.6	48	18.1
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	106	6.1	0	0	1	0.5	4	1.9	17	4.9	28	7.2	56	11.9	78	6.8	43	10.4	27	10.2
	糖尿病の可能性が否定できない人	193	11.1	1	0.9	4	1.9	19	9.2	46	13.1	56	14.4	67	14.2	148	12.8	60	14.5	40	15.1
	上記以外	1337	76.7	113	99.1	207	97.6	178	86.0	258	73.7	276	71.0	305	64.6	840	72.9	273	65.9	177	66.8
	総数	1744	100	114	100	212	100	207	100	350	100	389	100	472	100	1153	100	414	100	265	100
女性	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	209	8.2	0	0	2	0.5	8	2.2	43	8.2	67	12.8	89	15.3	155	9.4	75	14.9	52	15.0
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	98	3.9	0	0	1	0.3	0	0	12	2.3	36	6.9	49	8.4	71	4.3	43	8.5	26	7.5
	糖尿病の可能性が否定できない人	320	12.6	2	1.2	18	4.7	40	11.0	66	12.6	84	16.1	110	19.0	235	14.3	91	18.1	65	18.8
	上記以外	2010	79.2	161	98.8	365	94.8	315	86.8	416	79.2	372	71.1	381	65.7	1255	76.3	338	67.1	229	66.2
	総数	2539	100	163	100	385	100	363	100	525	100	523	100	580	100	1645	100	504	100	346	100
総数	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	423	9.9	0	0	3	0.5	18	3.2	89	10.2	124	13.6	189	18.0	320	11.4	156	17.0	100	16.4
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	204	4.8	0	0	2	0.3	4	0.7	29	3.3	64	7.0	105	10.0	149	5.3	86	9.4	53	8.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	513	12.0	3	1.1	22	3.7	59	10.4	112	12.8	140	15.4	177	16.8	383	13.7	151	16.4	105	17.2
	上記以外	3347	78.1	274	98.9	572	95.8	493	86.5	674	77.0	648	71.1	686	65.2	2095	74.9	611	66.6	406	66.4
	総数	4283	100	277	100	597	100	570	100	875	100	912	100	1052	100	2798	100	918	100	611	100

注) 妊婦除外, ヘモグロビン A_{1c} 5.6%の場合
「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

第48表の2-1 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（性・年齢階級別）

性別	糖尿病状況	年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	214	12.3	0	0	1	0.5	10	4.8	46	13.1	57	14.7	100	21.2	165	14.3	81	19.6	48	18.1
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	106	6.1	0	0	1	0.5	4	1.9	17	4.9	28	7.2	56	11.9	78	6.8	43	10.4	27	10.2
	糖尿病の可能性が否定できない人	268	15.4	1	0.9	6	2.8	22	10.6	65	18.6	80	20.6	94	19.9	206	17.9	84	20.3	55	20.8
	上記以外	1262	72.4	113	99.1	205	96.7	175	84.5	239	68.3	252	64.8	278	58.9	782	67.8	249	60.1	162	61.1
	総数	1744	100	114	100	212	100	207	100	350	100	389	100	472	100	1153	100	414	100	265	100
女性	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	209	8.2	0	0	2	0.5	8	2.2	43	8.2	67	12.8	89	15.3	155	9.4	75	14.9	52	15.0
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	98	3.8	0	0	1	0.3	0	0	12	2.3	36	6.9	49	8.4	71	4.3	43	8.5	26	7.5
	糖尿病の可能性が否定できない人	495	19.4	7	4.2	31	7.8	59	16.3	101	19.2	131	25.0	166	28.6	365	22.2	141	28.0	92	26.6
	上記以外	1848	72.4	159	95.8	362	91.6	296	81.5	381	72.6	325	62.1	325	56.0	1125	68.4	288	57.1	202	58.4
	総数	2552	100	166	100	395	100	363	100	525	100	523	100	580	100	1645	100	504	100	346	100
総数	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	423	9.8	0	0	3	0.5	18	3.2	89	10.2	124	13.6	189	18.0	320	11.4	156	17.0	100	16.4
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	204	4.7	0	0	2	0.3	4	0.7	29	3.3	64	7.0	105	10.0	149	5.3	86	9.4	53	8.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	763	17.8	8	2.9	37	6.1	81	14.2	166	19.0	211	23.1	260	24.7	571	20.4	225	24.5	147	24.1
	上記以外	3110	72.4	272	97.1	567	93.4	471	82.6	620	70.9	577	63.3	603	57.3	1907	68.2	537	58.5	364	59.6
	総数	4296	100	280	100	607	100	570	100	875	100	912	100	1052	100	2798	100	918	100	611	100

注) ヘモグロビン A_{1c} 5.5%の場合
「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

第48表の2-2 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性が否定できない人」の状況（性・年齢階級別）

性別	糖尿病状況	年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	214	12.3	0	0	1	0.5	10	4.8	46	13.1	57	14.7	100	21.2	165	14.3	81	19.6	48	18.1
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	106	6.1	0	0	1	0.5	4	1.9	17	4.9	28	7.2	56	11.9	78	6.8	43	10.4	27	10.2
	糖尿病の可能性が否定できない人	268	15.4	1	0.9	6	2.8	22	10.6	65	18.6	80	20.6	94	19.9	206	17.9	84	20.3	55	20.8
	上記以外	1262	72.4	113	99.1	205	96.7	175	84.5	239	68.3	252	64.8	278	58.9	782	67.8	249	60.1	162	61.1
	総数	1744	100	114	100	212	100	207	100	350	100	389	100	472	100	1153	100	414	100	265	100
女性	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	209	8.2	0	0	2	0.5	8	2.2	43	8.2	67	12.8	89	15.3	155	9.4	75	14.9	52	15.0
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	98	3.9	0	0	1	0.3	0	0	12	2.3	36	6.9	49	8.4	71	4.3	43	8.5	26	7.5
	糖尿病の可能性が否定できない人	494	19.5	7	4.3	30	7.8	59	16.3	101	19.2	131	25.0	166	28.6	365	22.2	141	28.0	92	26.6
	上記以外	1836	72.3	156	95.7	353	91.7	296	81.5	381	72.6	325	62.1	325	56.0	1125	68.4	288	57.1	202	58.4
	総数	2539	100	163	100	385	100	363	100	525	100	523	100	580	100	1645	100	504	100	346	100
総数	糖尿病状況																				
	糖尿病が強く疑われる人	423	9.9	0	0	3	0.5	18	3.2	89	10.2	124	13.6	189	18.0	320	11.4	156	17.0	100	16.4
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	204	4.8	0	0	2	0.3	4	0.7	29	3.3	64	7.0	105	10.0	149	5.3	86	9.4	53	8.7
	糖尿病の可能性が否定できない人	762	17.8	8	2.9	36	6.0	81	14.2	166	19.0	211	23.1	260	24.7	571	20.4	225	24.5	147	24.1
	上記以外	3098	72.3	269	97.1	558	93.5	471	82.6	620	70.9	577	63.3	603	57.3	1907	68.2	537	58.5	364	59.6
	総数	4283	100	277	100	597	100	570	100	875	100	912	100	1052	100	2798	100	918	100	611	100

注) 妊婦除外、ヘモグロビン A_{1c} 5.5%の場合
「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

第49表の1 高血圧症有病者の状況(性・年齢階級別)

性別	高血圧症 高血圧症有病者 (再掲)高血圧症有病者のうち 服薬者 正常高値血圧者 上記以外 総数	年齢(歳)																																																																																																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上																																																																																	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%																																																																																
男性	高血圧症 高血圧症有病者 (再掲)高血圧症有病者のうち 服薬者 正常高値血圧者 上記以外 総数	975	53.2	8	6.6	42	19.1	76	35.5	215	59.2	274	66.7	360	71.4	714	59.1	303	68.6	211	74.3	457	24.9	2	1.6	4	1.8	13	6.1	76	20.9	130	31.6	232	46.0	312	25.8	167	37.8	139	48.9	288	15.7	18	14.8	47	21.4	42	19.6	61	16.8	57	13.9	63	12.5	191	15.8	59	13.3	32	11.3	571	31.1	96	78.7	131	59.5	96	44.9	87	24.0	80	19.5	81	16.1	303	25.1	80	18.1	41	14.4	1834	100	122	100	220	100	214	100	363	100	411	100	504	100	1208	100	442	100	284	100
女性	高血圧症 高血圧症有病者 (再掲)高血圧症有病者のうち 服薬者 正常高値血圧者 上記以外 総数	1071	39.6	2	1.1	18	4.4	54	14.2	213	39.2	323	57.6	461	73.1	752	43.4	340	62.7	299	78.1	565	20.9	0	0	3	0.7	9	2.4	78	14.3	170	30.3	305	48.3	362	20.9	200	36.9	200	52.2	375	13.9	3	1.7	26	6.3	69	18.2	104	19.1	97	17.3	76	12.0	308	17.8	90	16.6	38	9.9	1258	46.5	174	97.2	366	89.3	256	67.5	227	41.7	141	25.1	94	14.9	672	38.8	112	20.7	46	12.0	2704	100	179	100	410	100	379	100	544	100	561	100	631	100	1732	100	542	100	383	100
総数	高血圧症 高血圧症有病者 (再掲)高血圧症有病者のうち 服薬者 正常高値血圧者 上記以外 総数	2046	45.1	10	3.3	60	9.5	130	21.9	428	47.2	597	61.4	821	72.3	1466	49.9	643	65.3	510	76.5	1022	22.5	2	0.7	7	1.1	22	3.7	154	17.0	300	30.9	537	47.3	674	22.9	367	37.3	339	50.8	663	14.6	21	7.0	73	11.6	111	18.7	165	18.2	154	15.8	139	12.2	499	17.0	149	15.1	70	10.5	1829	40.3	270	89.7	497	78.9	352	59.4	314	34.6	221	22.7	175	15.4	975	33.2	192	19.5	87	13.0	4538	100	301	100	630	100	593	100	907	100	972	100	1135	100	2940	100	984	100	667	100

注) 判定の基準は p.74 参照

「服薬者」とは、質問票で「血圧を下げる薬」の使用有と回答した者

第49表の2 高血圧症有病者の状況(性・年齢階級別)

性別	高血圧症 高血圧症有病者 (再掲)高血圧症有病者のうち 服薬者 正常高値血圧者 上記以外 総数	年齢(歳)																																																																																																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上																																																																																	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%																																																																																
男性	高血圧症 高血圧症有病者 (再掲)高血圧症有病者のうち 服薬者 正常高値血圧者 上記以外 総数	975	53.2	8	6.6	42	19.1	76	35.5	215	59.2	274	66.7	360	71.4	714	59.1	303	68.6	211	74.3	457	24.9	2	1.6	4	1.8	13	6.1	76	20.9	130	31.6	232	46.0	312	25.8	167	37.8	139	48.9	288	15.7	18	14.8	47	21.4	42	19.6	61	16.8	57	13.9	63	12.5	191	15.8	59	13.3	32	11.3	571	31.1	96	78.7	131	59.5	96	44.9	87	24.0	80	19.5	81	16.1	303	25.1	80	18.1	41	14.4	1834	100	122	100	220	100	214	100	363	100	411	100	504	100	1208	100	442	100	284	100
女性	高血圧症 高血圧症有病者 (再掲)高血圧症有病者のうち 服薬者 正常高値血圧者 上記以外 総数	1071	39.9	2	1.1	18	4.6	54	14.2	213	39.2	323	57.6	461	73.1	752	43.4	340	62.7	299	78.1	565	21.1	0	0	3	0.8	9	2.4	78	14.3	170	30.3	305	48.3	362	20.9	200	36.9	200	52.2	375	14.0	3	1.7	26	6.6	69	18.2	104	19.1	97	17.3	76	12.0	308	17.8	90	16.6	38	9.9	1238	46.1	170	97.1	350	88.8	256	67.5	227	41.7	141	25.1	94	14.9	672	38.8	112	20.7	46	12.0	2684	100	175	100	394	100	379	100	544	100	561	100	631	100	1732	100	542	100	383	100
総数	高血圧症 高血圧症有病者 (再掲)高血圧症有病者のうち 服薬者 正常高値血圧者 上記以外 総数	2046	45.3	10	3.4	60	9.8	130	21.9	428	47.2	597	61.4	821	72.3	1466	49.9	643	65.3	510	76.5	1022	22.6	2	0.7	7	1.1	22	3.7	154	17.0	300	30.9	537	47.3	674	22.9	367	37.3	339	50.8	663	14.7	21	7.1	73	11.9	111	18.7	165	18.2	154	15.8	139	12.2	499	17.0	149	15.1	70	10.5	1809	40.0	266	89.6	481	78.3	352	59.4	314	34.6	221	22.7	175	15.4	975	33.2	192	19.5	87	13.0	4518	100	297	100	614	100	593	100	907	100	972	100	1135	100	2940	100	984	100	667	100

注) 妊婦除外

「服薬者」とは、質問票で「血圧を下げる薬」の使用有と回答した者

第 50 表の 1 - 1 「脂質異常症が疑われる人」の状況（採血時間によらず，性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性 別 男 性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	296	16.9	6	5.2	16	7.6	25	12.1	66	18.8	79	20.3	104	21.9	216	18.6	94	22.4	58	22.1
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	128	7.3	0	0	3	1.4	7	3.4	31	8.8	38	9.7	49	10.3	95	8.2	36	8.6	30	11.4
	上記以外	1451	83.1	109	94.8	194	92.4	182	87.9	285	81.2	311	79.7	370	78.1	943	81.4	325	77.6	205	77.9
	総 数	1747	100	115	100	210	100	207	100	351	100	390	100	474	100	1159	100	419	100	263	100
女 性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	384	15.0	1	0.6	6	1.5	14	3.9	78	14.9	120	22.8	165	28.4	282	17.1	138	27.2	95	27.4
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	322	12.6	0	0	2	0.5	11	3.0	68	13.0	101	19.2	140	24.1	239	14.5	117	23.1	81	23.3
	上記以外	2173	85.0	168	99.4	385	98.5	349	96.1	447	85.1	407	77.2	417	71.6	1368	82.9	369	72.8	252	72.6
	総 数	2557	100	169	100	391	100	363	100	525	100	527	100	582	100	1650	100	507	100	347	100
総 数	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	680	15.8	7	2.5	22	3.7	39	6.8	144	16.4	199	21.7	269	25.5	498	17.7	232	25.1	153	25.1
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	450	10.5	0	0	5	0.8	18	3.2	99	11.3	139	15.2	189	17.9	334	11.9	153	16.5	111	18.2
	上記以外	3624	84.2	277	97.5	579	96.3	531	93.2	732	83.6	718	78.3	787	74.5	2311	82.3	694	74.9	457	74.9
	総 数	4304	100	284	100	601	100	570	100	876	100	917	100	1056	100	2809	100	926	100	610	100

注) 判定の基準は p.75 参照
「服薬者」とは，質問票で「コレステロールを下げる薬」の使用有と回答した者

第 50 表の 1 - 2 「脂質異常症が疑われる人」の状況（採血時間によらず，性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性 別 男 性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	296	16.9	6	5.2	16	7.6	25	12.1	66	18.8	79	20.3	104	21.9	216	18.6	94	22.4	58	22.1
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	128	7.3	0	0	3	1.4	7	3.4	31	8.8	38	9.7	49	10.3	95	8.2	36	8.6	30	11.4
	上記以外	1451	83.1	109	94.8	194	92.4	182	87.9	285	81.2	311	79.7	370	78.1	943	81.4	325	77.6	205	77.9
	総 数	1747	100	115	100	210	100	207	100	351	100	390	100	474	100	1159	100	419	100	263	100
女 性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	384	15.1	1	0.6	6	1.6	14	3.9	78	14.9	120	22.8	165	28.4	282	17.1	138	27.2	95	27.4
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	322	12.7	0	0	2	0.5	11	3.0	68	13.0	101	19.2	140	24.1	239	14.5	117	23.1	81	23.3
	上記以外	2159	84.9	164	99.4	375	98.4	349	96.1	447	85.1	407	77.2	417	71.6	1368	82.9	369	72.8	252	72.6
	総 数	2543	100	165	100	381	100	363	100	525	100	527	100	582	100	1650	100	507	100	347	100
総 数	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	680	15.9	7	2.5	22	3.7	39	6.8	144	16.4	199	21.7	269	25.5	498	17.7	232	25.1	153	25.1
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	450	10.5	0	0	5	0.8	18	3.2	99	11.3	139	15.2	189	17.9	334	11.9	153	16.5	111	18.2
	上記以外	3610	84.1	273	97.5	569	96.3	531	93.2	732	83.6	718	78.3	787	74.5	2311	82.3	694	74.9	457	74.9
	総 数	4290	100	280	100	591	100	570	100	876	100	917	100	1056	100	2809	100	926	100	610	100

注) 妊婦除外
「服薬者」とは，質問票で「コレステロールを下げる薬」の使用有と回答した者

第50表の2-1 「脂質異常症が疑われる人」の状況（採血時間によらず、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版の基準、性・年齢階級別）

性別	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外	年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	809	47.7	30	27.0	91	44.2	105	52.8	190	56.7	201	52.6	192	41.4	584	52.0	194	47.4	104	40.3
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	70	4.0	0	0	3	1.4	6	2.9	17	4.8	22	5.6	22	4.6	51	4.4	15	3.6	16	6.1
	上記以外	888	52.3	81	73.0	115	55.8	94	47.2	145	43.3	181	47.4	272	58.6	538	48.0	215	52.6	154	59.7
	総数	1697	100	111	100	206	100	199	100	335	100	382	100	464	100	1122	100	409	100	258	100
女性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	978	38.6	29	17.2	66	16.9	94	25.9	255	49.3	268	52.0	266	45.9	728	44.7	257	51.2	155	44.9
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	135	5.3	0	0	1	0.3	6	1.7	31	5.9	38	7.2	59	10.1	99	6.0	46	9.1	35	10.1
	上記以外	1555	61.4	140	82.8	324	83.1	269	74.1	262	50.7	247	48.0	313	54.1	901	55.3	245	48.8	190	55.1
	総数	2533	100	169	100	390	100	363	100	517	100	515	100	579	100	1629	100	502	100	345	100
総数	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	1787	42.2	59	21.1	157	26.3	199	35.4	445	52.2	469	52.3	458	43.9	1312	47.7	451	49.5	259	43.0
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	205	4.8	0	0	4	0.7	12	2.1	48	5.5	60	6.5	81	7.7	150	5.3	61	6.6	51	8.4
	上記以外	2443	57.8	221	78.9	439	73.7	363	64.6	407	47.8	428	47.7	585	56.1	1439	52.3	460	50.5	344	57.0
	総数	4230	100	280	100	596	100	562	100	852	100	897	100	1043	100	2751	100	911	100	603	100

注) 判定の基準は p.75 参照

「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬」の使用有と回答した者

第50表の2-2 「脂質異常症が疑われる人」の状況（採血時間によらず、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版の基準、性・年齢階級別）

性別	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外	年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	809	47.7	30	27.0	91	44.2	105	52.8	190	56.7	201	52.6	192	41.4	584	52.0	194	47.4	104	40.3
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	70	4.0	0	0	3	1.4	6	2.9	17	4.8	22	5.6	22	4.6	51	4.4	15	3.6	16	6.1
	上記以外	888	52.3	81	73.0	115	55.8	94	47.2	145	43.3	181	47.4	272	58.6	538	48.0	215	52.6	154	59.7
	総数	1697	100	111	100	206	100	199	100	335	100	382	100	464	100	1122	100	409	100	258	100
女性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	973	38.6	26	15.8	64	16.8	94	25.9	255	49.3	268	52.0	266	45.9	728	44.7	257	51.2	155	44.9
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	135	5.3	0	0	1	0.3	6	1.7	31	5.9	38	7.2	59	10.1	99	6.0	46	9.1	35	10.1
	上記以外	1546	61.4	139	84.2	316	83.2	269	74.1	262	50.7	247	48.0	313	54.1	901	55.3	245	48.8	190	55.1
	総数	2519	100	165	100	380	100	363	100	517	100	515	100	579	100	1629	100	502	100	345	100
総数	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	1782	42.3	56	20.3	155	26.5	199	35.4	445	52.2	469	52.3	458	43.9	1312	47.7	451	49.5	259	43.0
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	205	4.8	0	0	4	0.7	12	2.1	48	5.5	60	6.5	81	7.7	150	5.3	61	6.6	51	8.4
	上記以外	2434	57.7	220	79.7	431	73.5	363	64.6	407	47.8	428	47.7	585	56.1	1439	52.3	460	50.5	344	57.0
	総数	4216	100	276	100	586	100	562	100	852	100	897	100	1043	100	2751	100	911	100	603	100

注) 妊婦除外

「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬」の使用有と回答した者

第 50 表の 3 - 1 「脂質異常症が疑われる人」の状況（食後 6 時間以上の者のみ，動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007 年版の基準，性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	355	48.4	9	17.0	48	39.7	49	46.7	122	62.6	71	51.8	56	45.9	275	54.2	63	48.5	23	44.2
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	52	3.0	0	0	2	1.0	2	1.0	19	5.4	13	3.3	16	3.4	44	3.8	13	3.1	6	2.3
	上記以外	378	51.6	44	83.0	73	60.3	56	53.3	73	37.4	66	48.2	66	54.1	232	45.8	67	51.5	29	55.8
	総 数	733	100	53	100	121	100	105	100	195	100	137	100	122	100	507	100	130	100	52	100
女 性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	358	39.3	7	8.8	26	16.4	45	25.1	120	56.3	89	62.2	71	51.4	285	48.1	76	58.9	40	50.0
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	80	3.1	0	0	0	0	5	1.4	25	4.8	21	4.0	29	5.0	64	3.9	26	5.1	16	4.6
	上記以外	554	60.7	73	91.3	133	83.6	134	74.9	93	43.7	54	37.8	67	48.6	308	51.9	53	41.1	40	50.0
	総 数	912	100	80	100	159	100	179	100	213	100	143	100	138	100	593	100	129	100	80	100
総 数	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	713	43.3	16	12.0	74	26.4	94	33.1	242	59.3	160	57.1	127	48.8	560	50.9	139	53.7	63	47.7
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	132	3.1	0	0	2	0.3	7	1.2	44	5.0	34	3.7	45	4.3	108	3.8	39	4.2	22	3.6
	上記以外	932	56.7	117	88.0	206	73.6	190	66.9	166	40.7	120	42.9	133	51.2	540	49.1	120	46.3	69	52.3
	総 数	1645	100	133	100	280	100	284	100	408	100	280	100	260	100	1100	100	259	100	132	100

「服薬者」とは，質問票で「コレステロールを下げる薬」の使用有と回答した者

第 50 表の 3 - 2 「脂質異常症が疑われる人」の状況（食後 6 時間以上の者のみ，動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007 年版の基準，性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	355	48.4	9	17.0	48	39.7	49	46.7	122	62.6	71	51.8	56	45.9	275	54.2	63	48.5	23	44.2
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	52	3.0	0	0	2	1.0	2	1.0	19	5.4	13	3.3	16	3.4	44	3.8	13	3.1	6	2.3
	上記以外	378	51.6	44	83.0	73	60.3	56	53.3	73	37.4	66	48.2	66	54.1	232	45.8	67	51.5	29	55.8
	総 数	733	100	53	100	121	100	105	100	195	100	137	100	122	100	507	100	130	100	52	100
女 性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	357	39.3	6	7.6	26	16.7	45	25.1	120	56.3	89	62.2	71	51.4	285	48.1	76	58.9	40	50.0
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	80	3.1	0	0	0	0	5	1.4	25	4.8	21	4.0	29	5.0	64	3.9	26	5.1	16	4.6
	上記以外	551	60.7	73	92.4	130	83.3	134	74.9	93	43.7	54	37.8	67	48.6	308	51.9	53	41.1	40	50.0
	総 数	908	100	79	100	156	100	179	100	213	100	143	100	138	100	593	100	129	100	80	100
総 数	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	712	43.4	15	11.4	74	26.7	94	33.1	242	59.3	160	57.1	127	48.8	560	50.9	139	53.7	63	47.7
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	132	3.1	0	0	2	0.3	7	1.2	44	5.0	34	3.7	45	4.3	108	3.8	39	4.2	22	3.6
	上記以外	929	56.6	117	88.6	203	73.3	190	66.9	166	40.7	120	42.9	133	51.2	540	49.1	120	46.3	69	52.3
	総 数	1641	100	132	100	277	100	284	100	408	100	280	100	260	100	1100	100	259	100	132	100

注) 妊婦除外

「服薬者」とは，質問票で「コレステロールを下げる薬」の使用有と回答した者

第51表 運動習慣の状況(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																	
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	運動習慣																		
	習慣無(健康上の理由)	111	5.4	1	0.7	3	1.1	8	3.2	18	4.4	19	4.3	62	11.8	26	5.6	47	15.9
	習慣無(その他)	1330	64.4	113	74.3	232	81.4	189	74.7	313	76.2	241	54.9	242	46.1	212	46.0	146	49.3
	運動の習慣有	624	30.2	38	25.0	50	17.5	56	22.1	80	19.5	179	40.8	221	42.1	223	48.4	103	34.8
	総数	2065	100	152	100	285	100	253	100	411	100	439	100	525	100	461	100	296	100
女性	運動習慣																		
	習慣無(健康上の理由)	254	8.7	4	1.9	14	3.0	13	3.2	31	5.4	52	8.9	140	21.0	70	12.4	104	25.6
	習慣無(その他)	1832	63.1	171	81.0	368	79.5	304	75.8	383	66.6	306	52.3	300	44.9	272	48.1	177	43.5
	運動の習慣有	817	28.1	36	17.1	81	17.5	84	20.9	161	28.0	227	38.8	228	34.1	224	39.6	126	31.0
	総数	2903	100	211	100	463	100	401	100	575	100	585	100	668	100	566	100	407	100
総数	運動習慣																		
	習慣無(健康上の理由)	365	7.3	5	1.4	17	2.3	21	3.2	49	5.0	71	6.9	202	16.9	96	9.3	151	21.5
	習慣無(その他)	3162	63.6	284	78.2	600	80.2	493	75.4	696	70.6	547	53.4	542	45.4	484	47.1	323	45.9
	運動の習慣有	1441	29.0	74	20.4	131	17.5	140	21.4	241	24.4	406	39.6	449	37.6	447	43.5	229	32.6
	総数	4968	100	363	100	748	100	654	100	986	100	1024	100	1193	100	1027	100	703	100

第52表 1週間の運動日数(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																	
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	運動日数																		
	運動無し	1441	69.8	114	75.0	235	82.5	197	77.9	331	80.5	260	59.2	304	57.9	238	51.6	193	65.2
	2日/週	113	5.5	15	9.9	19	6.7	18	7.1	18	4.4	21	4.8	22	4.2	24	5.2	9	3.0
	3日/週	95	4.6	6	3.9	6	2.1	11	4.3	8	1.9	30	6.8	34	6.5	35	7.6	18	6.1
	4日/週	52	2.5	3	2.0	6	2.1	7	2.8	5	1.2	13	3.0	18	3.4	20	4.3	6	2.0
	5日/週	85	4.1	6	3.9	12	4.2	7	2.8	13	3.2	23	5.2	24	4.6	29	6.3	11	3.7
	6日/週	42	2.0	3	2.0	2	0.7	1	0.4	7	1.7	12	2.7	17	3.2	17	3.7	7	2.4
	7日/週	237	11.5	5	3.3	5	1.8	12	4.7	29	7.1	80	18.2	106	20.2	98	21.3	52	17.6
		総数	2065	100	152	100	285	100	253	100	411	100	439	100	525	100	461	100	296
女性	運動日数																		
	運動無し	2086	71.9	175	82.9	382	82.5	317	79.1	414	72.0	358	61.2	440	65.9	342	60.4	281	69.0
	2日/週	182	6.3	10	4.7	22	4.8	32	8.0	44	7.7	37	6.3	37	5.5	35	6.2	18	4.4
	3日/週	146	5.0	8	3.8	19	4.1	16	4.0	24	4.2	45	7.7	34	5.1	37	6.5	21	5.2
	4日/週	70	2.4	2	0.9	6	1.3	6	1.5	14	2.4	22	3.8	20	3.0	19	3.4	12	2.9
	5日/週	117	4.0	7	3.3	15	3.2	8	2.0	24	4.2	33	5.6	30	4.5	35	6.2	16	3.9
	6日/週	45	1.6	2	0.9	6	1.3	5	1.2	7	1.2	12	2.1	13	1.9	12	2.1	6	1.5
	7日/週	257	8.9	7	3.3	13	2.8	17	4.2	48	8.3	78	13.3	94	14.1	86	15.2	53	13.0
		総数	2903	100	211	100	463	100	401	100	575	100	585	100	668	100	566	100	407
総数	運動日数																		
	運動無し	3527	71.0	289	79.6	617	82.5	514	78.6	745	75.6	618	60.4	744	62.4	580	56.5	474	67.4
	2日/週	295	5.9	25	6.9	41	5.5	50	7.6	62	6.3	58	5.7	59	4.9	59	5.7	27	3.8
	3日/週	241	4.9	14	3.9	25	3.3	27	4.1	32	3.2	75	7.3	68	5.7	72	7.0	39	5.5
	4日/週	122	2.5	5	1.4	12	1.6	13	2.0	19	1.9	35	3.4	38	3.2	39	3.8	18	2.6
	5日/週	202	4.1	13	3.6	27	3.6	15	2.3	37	3.8	56	5.5	54	4.5	64	6.2	27	3.8
	6日/週	87	1.8	5	1.4	8	1.1	6	0.9	14	1.4	24	2.3	30	2.5	29	2.8	13	1.8
	7日/週	494	9.9	12	3.3	18	2.4	29	4.4	77	7.8	158	15.4	200	16.8	184	17.9	105	14.9
		総数	4968	100	363	100	748	100	654	100	986	100	1024	100	1193	100	1027	100	703

第 53 表 運動を行う日の平均運動時間（性・年齢階級別）

		年齢（歳）																	
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲） 65-74歳		（再掲） 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	運動時間(分)																		
	運動無し	1441	69.8	114	75.0	235	82.5	197	77.9	331	80.5	260	59.2	304	57.9	238	51.6	193	65.2
	30-<60分/日	222	10.8	8	5.3	15	5.3	15	5.9	38	9.2	64	14.6	82	15.6	75	16.3	39	13.2
	60-<120分/日	254	12.3	23	15.1	21	7.4	22	8.7	29	7.1	67	15.3	92	17.5	89	19.3	43	14.5
	120-<180分/日	92	4.5	5	3.3	7	2.5	15	5.9	9	2.2	28	6.4	28	5.3	36	7.8	12	4.1
	180分以上/日	56	2.7	2	1.3	7	2.5	4	1.6	4	1.0	20	4.6	19	3.6	23	5.0	9	3.0
	総 数	2065	100	152	100	285	100	253	100	411	100	439	100	525	100	461	100	296	100
女 性	運動時間(分)																		
	運動無し	2086	71.9	175	82.9	382	82.5	317	79.1	414	72.0	358	61.2	440	65.9	342	60.4	281	69.0
	30-<60分/日	358	12.3	17	8.1	32	6.9	30	7.5	68	11.8	107	18.3	104	15.6	101	17.8	64	15.7
	60-<120分/日	297	10.2	14	6.6	28	6.0	32	8.0	66	11.5	79	13.5	78	11.7	82	14.5	39	9.6
	120-<180分/日	114	3.9	4	1.9	15	3.2	21	5.2	18	3.1	26	4.4	30	4.5	30	5.3	12	2.9
	180分以上/日	48	1.7	1	0.5	6	1.3	1	0.2	9	1.6	15	2.6	16	2.4	11	1.9	11	2.7
	総 数	2903	100	211	100	463	100	401	100	575	100	585	100	668	100	566	100	407	100
総 数	運動時間(分)																		
	運動無し	3527	71.0	289	79.6	617	82.5	514	78.6	745	75.6	618	60.4	744	62.4	580	56.5	474	67.4
	30-<60分/日	580	11.7	25	6.9	47	6.3	45	6.9	106	10.8	171	16.7	186	15.6	176	17.1	103	14.7
	60-<120分/日	551	11.1	37	10.2	49	6.6	54	8.3	95	9.6	146	14.3	170	14.2	171	16.7	82	11.7
	120-<180分/日	206	4.1	9	2.5	22	2.9	36	5.5	27	2.7	54	5.3	58	4.9	66	6.4	24	3.4
	180分以上/日	104	2.1	3	0.8	13	1.7	5	0.8	13	1.3	35	3.4	35	2.9	34	3.3	20	2.8
	総 数	4968	100	363	100	748	100	654	100	986	100	1024	100	1193	100	1027	100	703	100

第 54 表 運動強度の状況（性・年齢階級別）

		年齢（歳）																	
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲） 65-74歳		（再掲） 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	運動強度																		
	運動無し	1441	69.8	114	75.0	235	82.5	197	77.9	331	80.5	260	59.2	304	57.9	238	51.6	193	65.2
	高等度	58	2.8	11	7.2	13	4.6	15	5.9	6	1.5	10	2.3	3	0.6	6	1.3	1	0.3
	中等度	188	9.1	20	13.2	21	7.4	20	7.9	30	7.3	46	10.5	51	9.7	66	14.3	15	5.1
	低等度	378	18.3	7	4.6	16	5.6	21	8.3	44	10.7	123	28.0	167	31.8	151	32.8	87	29.4
	総 数	2065	100	152	100	285	100	253	100	411	100	439	100	525	100	461	100	296	100
女 性	運動強度																		
	運動無し	2086	71.9	175	82.9	382	82.5	317	79.1	414	72.0	358	61.2	440	65.9	342	60.4	281	69.0
	高等度	50	1.7	7	3.3	12	2.6	11	2.7	10	1.7	8	1.4	2	0.3	3	0.5	1	0.2
	中等度	254	8.7	15	7.1	30	6.5	41	10.2	60	10.4	67	11.5	41	6.1	61	10.8	17	4.2
	低等度	512	17.6	13	6.2	39	8.4	32	8.0	91	15.8	152	26.0	185	27.7	160	28.3	108	26.5
	運動有・ 強度不明	1	0.0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総 数	2903	100	211	100	463	100	401	100	575	100	585	100	668	100	566	100	407	100
総 数	運動強度																		
	運動無し	3527	71.0	289	79.6	617	82.5	514	78.6	745	75.6	618	60.4	744	62.4	580	56.5	474	67.4
	高等度	108	2.2	18	5.0	25	3.3	26	4.0	16	1.6	18	1.8	5	0.4	9	0.9	2	0.3
	中等度	442	8.9	35	9.6	51	6.8	61	9.3	90	9.1	113	11.0	92	7.7	127	12.4	32	4.6
	低等度	890	17.9	20	5.5	55	7.4	53	8.1	135	13.7	275	26.9	352	29.5	311	30.3	195	27.7
	運動有・ 強度不明	1	0.0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総 数	4968	100	363	100	748	100	654	100	986	100	1024	100	1193	100	1027	100	703	100

第55表 運動習慣別栄養素等摂取量

		総数		性別			
		運動習慣		男性		女性	
		習慣無(その他)	運動の習慣有	習慣無(その他)	運動の習慣有	習慣無(その他)	運動の習慣有
対象者数		3077	1410	1292	608	1785	802
エネルギー	kcal	1943	1927	2198	2146	1758	1761
たんぱく質	g	71.1	73.0	78.6	78.7	65.6	68.6
うち動物性	g	37.2	37.9	41.8	41.1	33.8	35.4
脂質	g	53.4	51.3	57.0	55.5	50.7	48.1
うち動物性	g	26.5	25.5	29.2	28.4	24.6	23.4
炭水化物	g	274.7	275.6	308.1	302.1	250.6	255.6
カリウム	mg	2414	2662	2543	2707	2322	2629
カルシウム	mg	527	593	536	588	520	597
マグネシウム	mg	260	282	280	294	246	273
リン	mg	1016	1060	1107	1125	951	1011
鉄	mg	8.4	9.0	8.8	9.2	8.1	8.8
亜鉛	mg	8.4	8.5	9.4	9.2	7.7	7.9
銅	mg	1.24	1.30	1.36	1.39	1.15	1.23
ビタミンA	μgRE	587	659	637	672	551	650
ビタミンD	μg	8.5	8.8	9.4	9.4	8.0	8.3
ビタミンE	mg	9.5	10.5	9.3	10.0	9.6	11.0
ビタミンK	μg	257	291	267	292	250	290
ビタミンB ₁	mg	1.63	2.00	1.98	2.00	1.37	2.00
ビタミンB ₂	mg	1.64	1.55	1.57	1.60	1.70	1.51
ナイアシン	mgNE	15.6	16.4	17.6	18.1	14.1	15.1
ビタミンB ₆	mg	1.99	2.17	2.30	2.20	1.77	2.14
ビタミンB ₁₂	μg	7.3	7.7	8.2	8.8	6.6	7.0
葉酸	μg	324	365	344	371	309	360
パントテン酸	mg	5.53	5.84	5.98	6.18	5.20	5.58
ビタミンC	mg	124	148	116	132	129	159
コレステロール	mg	329	311	362	332	306	294
食物繊維	g	15.5	17.5	15.9	17.4	15.3	17.5
うち水溶性	g	3.5	3.9	3.5	3.9	3.5	3.9
うち不溶性	g	11.4	12.8	11.6	12.8	11.2	12.8
食塩(ナトリウム×2.54/1000)	g	11.3	11.7	12.4	12.5	10.5	11.0
脂肪エネルギー比率	%	24.6	23.7	23.2	22.8	25.6	24.3
炭水化物エネルギー比率	%	60.6	61.0	62.3	62.4	59.3	60.0
動物性たんぱく質比率	%	50.7	50.3	51.7	50.6	49.9	50.2

注) 20歳以上 妊婦・「健康上の理由」により運動習慣の無い者除外

第 56 表 歩行数の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																			
	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)	
	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差
性別																				
男性	7486	4661	8614	4493	8500	5009	8181	4710	8298	4337	7939	4541	7426	4685	5117	3992	6814	4361	4102	3324
女性	6631	4070	7471	3683	7710	4027	7320	3727	7351	3517	7598	4517	6589	3732	4024	3471	5731	3748	3273	3116
総数	7024	4373	8077	4167	8060	4502	7712	4224	7789	3943	7757	4530	6970	4212	4515	3753	6236	4080	3622	3229

第 57 表 歩行数の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	歩行数(歩/日)																				
	1-1999	267	7.7	5	2.4	13	4.2	19	3.6	13	2.7	24	3.6	40	6.8	153	22.9	71	12.1	109	29.3
	2000-3999	568	16.4	27	12.8	42	13.5	82	15.4	70	14.4	91	13.7	101	17.2	155	23.2	90	15.3	105	28.2
	4000-5999	661	19.1	33	15.6	54	17.4	94	17.6	76	15.7	144	21.7	115	19.6	145	21.7	131	22.3	75	20.2
	6000-7999	602	17.4	44	20.9	59	19.0	101	18.9	95	19.6	124	18.6	98	16.7	81	12.1	87	14.8	40	10.8
	8000-9999	503	14.5	35	16.6	45	14.5	87	16.3	76	15.7	111	16.7	91	15.5	58	8.7	89	15.1	19	5.1
	10000-	858	24.8	67	31.8	98	31.5	150	28.1	155	32.0	171	25.7	141	24.1	76	11.4	120	20.4	24	6.5
総数	3459	100	211	100	311	100	533	100	485	100	665	100	586	100	668	100	588	100	372	100	
女性	歩行数(歩/日)																				
	1-1999	436	10.7	3	1.6	19	4.9	20	3.1	19	3.4	26	3.4	63	9.0	286	34.9	100	14.9	230	44.8
	2000-3999	684	16.8	29	15.5	51	13.0	109	17.1	68	12.0	103	13.5	126	18.0	198	24.2	145	21.5	121	23.6
	4000-5999	839	20.6	40	21.4	73	18.7	136	21.4	133	23.5	162	21.2	149	21.3	146	17.8	150	22.3	82	16.0
	6000-7999	810	19.9	43	23.0	87	22.3	131	20.6	127	22.5	183	24.0	146	20.8	93	11.4	132	19.6	45	8.8
	8000-9999	585	14.4	31	16.6	66	16.9	107	16.8	108	19.1	131	17.1	102	14.6	40	4.9	62	9.2	15	2.9
	10000-	709	17.5	41	21.9	95	24.3	133	20.9	110	19.5	159	20.8	115	16.4	56	6.8	84	12.5	20	3.9
総数	4063	100	187	100	391	100	636	100	565	100	764	100	701	100	819	100	673	100	513	100	
総数	歩行数(歩/日)																				
	1-1999	703	9.3	8	2.0	32	4.6	39	3.3	32	3.0	50	3.5	103	8.0	439	29.5	171	13.6	339	38.3
	2000-3999	1252	16.6	56	14.1	93	13.2	191	16.3	138	13.1	194	13.6	227	17.6	353	23.7	235	18.6	226	25.5
	4000-5999	1500	19.9	73	18.3	127	18.1	230	19.7	209	19.9	306	21.4	264	20.5	291	19.6	281	22.3	157	17.7
	6000-7999	1412	18.8	87	21.9	146	20.8	232	19.8	222	21.1	307	21.5	244	19.0	174	11.7	219	17.4	85	9.6
	8000-9999	1088	14.5	66	16.6	111	15.8	194	16.6	184	17.5	242	16.9	193	15.0	98	6.6	151	12.0	34	3.8
	10000-	1567	20.8	108	27.1	193	27.5	283	24.2	265	25.2	330	23.1	256	19.9	132	8.9	204	16.2	44	5.0
総数	7522	100	398	100	702	100	1169	100	1050	100	1429	100	1287	100	1487	100	1261	100	885	100	

第58表 開眼片足立ち実施状況(40歳以上, 性・年齢階級別)

		年齢(歳)															
		総数		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	実施状況																
	健康上出来ない	60	3.6	1	0.4	5	1.2	11	2.5	43	8.1	27	2.0	14	3.0	33	11.0
	上記以外で出来ない	168	10.2	41	16.0	55	13.2	38	8.6	34	6.4	148	11.0	27	5.8	20	6.6
	測定可能	1419	86.2	214	83.6	357	85.6	392	88.9	456	85.6	1171	87.0	422	91.1	248	82.4
	総数	1647	100	256	100	417	100	441	100	533	100	1346	100	463	100	301	100
女性	実施状況																
	健康上出来ない	132	5.9	6	1.5	6	1.0	21	3.6	99	14.8	51	2.8	34	6.0	81	19.8
	上記以外で出来ない	145	6.5	19	4.8	44	7.6	24	4.1	58	8.7	105	5.8	29	5.1	40	9.8
	測定可能	1955	87.6	374	93.7	532	91.4	536	92.3	513	76.6	1667	91.4	502	88.8	288	70.4
	総数	2232	100	399	100	582	100	581	100	670	100	1823	100	565	100	409	100
総数	実施状況																
	健康上出来ない	192	4.9	7	1.1	11	1.1	32	3.1	142	11.8	78	2.5	48	4.7	114	16.1
	上記以外で出来ない	313	8.1	60	9.2	99	9.9	62	6.1	92	7.6	253	8.0	56	5.4	60	8.5
	測定可能	3374	87.0	588	89.8	889	89.0	928	90.8	969	80.5	2838	89.6	924	89.9	536	75.5
	総数	3879	100	655	100	999	100	1022	100	1203	100	3169	100	1028	100	710	100

第59表 開眼片足立ちの分布(40歳以上, 性・年齢階級別)

		年齢(歳)															
		総数		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	時間(秒)																
	1~10秒未満	123	8.7	0	0	4	1.1	23	5.9	96	21.1	49	4.2	38	9.0	74	29.8
	10~20秒未満	96	6.8	1	0.5	5	1.4	17	4.3	73	16.0	47	4.0	37	8.8	49	19.8
	20~30秒未満	69	4.9	1	0.5	10	2.8	21	5.4	37	8.1	50	4.3	29	6.9	19	7.7
	30~40秒未満	49	3.5	3	1.4	4	1.1	14	3.6	28	6.1	34	2.9	23	5.5	15	6.0
	40~50秒未満	48	3.4	1	0.5	10	2.8	17	4.3	20	4.4	35	3.0	20	4.7	13	5.2
	50~60秒未満	35	2.5	1	0.5	6	1.7	12	3.1	16	3.5	30	2.6	17	4.0	5	2.0
	60秒	999	70.4	207	96.7	318	89.1	288	73.5	186	40.8	926	79.1	258	61.1	73	29.4
	(再掲)20~60秒未満	201	14.2	6	2.8	30	8.4	64	16.3	101	22.1	149	12.7	89	21.1	52	21.0
	総数	1419	100	214	100	357	100	392	100	456	100	1171	100	422	100	248	100
女性	時間(秒)																
	1~10秒未満	157	8.0	0	0	3	0.6	23	4.3	131	25.5	63	3.8	54	10.8	94	32.6
	10~20秒未満	157	8.0	0	0	16	3.0	49	9.1	92	17.9	91	5.5	60	12.0	66	22.9
	20~30秒未満	112	5.7	4	1.1	10	1.9	38	7.1	60	11.7	79	4.7	51	10.2	33	11.5
	30~40秒未満	55	2.8	6	1.6	9	1.7	16	3.0	24	4.7	39	2.3	16	3.2	16	5.6
	40~50秒未満	57	2.9	6	1.6	12	2.3	12	2.2	27	5.3	45	2.7	22	4.4	12	4.2
	50~60秒未満	51	2.6	5	1.3	10	1.9	14	2.6	22	4.3	41	2.5	19	3.8	10	3.5
	60秒	1366	69.9	353	94.4	472	88.7	384	71.6	157	30.6	1309	78.5	280	55.8	57	19.8
	(再掲)20~60秒未満	275	14.1	21	5.6	41	7.7	80	14.9	133	25.9	204	12.2	108	21.5	71	24.7
	総数	1955	100	374	100	532	100	536	100	513	100	1667	100	502	100	288	100
総数	時間(秒)																
	1~10秒未満	280	8.3	0	0	7	0.8	46	5.0	227	23.4	112	3.9	92	10.0	168	31.3
	10~20秒未満	253	7.5	1	0.2	21	2.4	66	7.1	165	17.0	138	4.9	97	10.5	115	21.5
	20~30秒未満	181	5.4	5	0.9	20	2.2	59	6.4	97	10.0	129	4.5	80	8.7	52	9.7
	30~40秒未満	104	3.1	9	1.5	13	1.5	30	3.2	52	5.4	73	2.6	39	4.2	31	5.8
	40~50秒未満	105	3.1	7	1.2	22	2.5	29	3.1	47	4.9	80	2.8	42	4.5	25	4.7
	50~60秒未満	86	2.5	6	1.0	16	1.8	26	2.8	38	3.9	71	2.5	36	3.9	15	2.8
	60秒	2365	70.1	560	95.2	790	88.9	672	72.4	343	35.4	2235	78.8	538	58.2	130	24.3
	(再掲)20~60秒未満	476	14.1	27	4.6	71	8.0	144	15.5	234	24.1	353	12.4	197	21.3	123	22.9
	総数	3374	100	588	100	889	100	928	100	969	100	2838	100	924	100	536	100

注) 開眼片足立ち時間: 2回測定し長い値を採用する。測定時間は60秒以内とし, 1回目で60秒であった場合は, 2回目の測定は行わない

