

第2部 身体状況調査の結果

第 18 表 身長・体重の平均値及び標準偏差—年齢階級，身長・体重別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，1歳以上〔体重は妊婦除外〕

	男 性						女 性					
	身 長(cm)			体 重(kg)			身 長(cm)			体 重(kg)		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	3,322	161.5	18.6	3,315	60.4	17.2	3,783	150.9	13.8	3,738	50.1	12.5
1 歳	34	78.1	4.9	35	10.4	1.4	24	77.7	4.9	24	9.7	1.2
2 歳	22	88.2	4.7	22	12.4	1.8	20	89.9	6.9	20	12.5	1.5
3 歳	24	95.4	4.7	24	14.0	1.8	21	94.1	5.2	21	13.6	1.4
4 歳	33	102.8	5.2	33	16.3	2.1	31	101.8	4.3	31	15.7	1.6
5 歳	36	110.0	6.4	36	18.7	3.3	32	109.3	5.6	32	18.5	3.5
6 歳	29	114.6	5.7	29	20.4	3.7	34	115.4	4.7	34	20.9	3.3
7 歳	38	121.0	6.0	39	23.3	3.8	35	120.8	5.5	35	23.2	4.1
8 歳	42	127.0	6.0	42	26.6	4.8	26	126.3	6.4	26	26.0	5.2
9 歳	28	132.6	7.0	28	29.6	6.2	31	132.9	5.6	31	30.7	6.6
10歳	29	137.9	6.3	29	32.4	5.9	25	137.0	6.6	25	31.2	6.7
11歳	31	145.5	7.2	31	38.2	9.2	40	146.2	6.3	38	37.2	7.4
12歳	41	150.8	9.2	41	41.2	10.3	36	150.9	5.7	36	42.8	7.0
13歳	34	160.2	8.0	34	49.9	8.8	28	153.2	4.8	27	43.0	6.7
14歳	30	164.0	7.8	30	55.1	10.6	34	155.9	5.5	34	48.5	6.9
15歳	23	168.8	6.0	23	58.0	11.6	27	157.9	4.7	27	48.6	6.2
16歳	26	169.1	5.0	26	58.3	8.3	24	157.6	4.1	22	52.6	5.9
17歳	36	169.8	5.7	35	59.5	9.0	20	158.0	5.0	20	51.4	7.2
18歳	18	171.2	3.7	18	62.0	9.5	23	158.1	6.0	23	50.4	5.2
19歳	20	169.6	3.6	20	60.2	12.2	29	158.9	4.8	28	52.7	7.1
20歳	25	171.6	6.8	24	67.7	13.5	29	158.1	5.8	27	51.2	8.0
21歳	22	172.5	5.1	22	63.6	8.9	21	155.5	6.1	20	50.9	8.8
22歳	28	171.3	4.7	28	65.0	10.7	29	158.6	5.3	25	50.7	7.3
23歳	23	168.3	6.1	22	62.1	11.4	13	154.9	6.2	13	50.1	9.7
24歳	37	171.7	5.4	37	65.1	11.7	23	158.1	6.5	22	53.7	7.4
25歳	26	171.4	6.5	26	64.7	10.5	27	159.8	4.7	26	54.3	11.4
26-29歳	99	170.5	5.7	98	68.3	13.2	109	158.0	5.0	100	52.7	8.7
30-39歳	327	170.8	6.1	327	68.3	12.3	403	158.3	5.6	392	53.7	10.0
40-49歳	404	170.9	5.7	401	70.3	10.8	502	157.8	5.2	493	54.6	9.2
50-59歳	398	169.5	5.7	396	68.7	11.0	459	155.9	5.2	457	55.2	10.0
60-69歳	601	165.9	6.1	599	65.0	9.5	732	153.1	5.5	731	53.1	8.5
70歳以上	758	162.2	6.1	760	61.4	9.2	896	148.2	6.5	898	50.4	8.8
(再掲)												
20歳以上	2,748	167.2	7.0	2,740	65.8	10.9	3,243	153.9	6.9	3,204	52.9	9.3
20-29歳	260	170.9	5.8	257	66.1	12.1	251	157.9	5.5	233	52.3	8.8
60-64歳	290	166.7	6.2	290	65.4	9.5	342	154.2	5.4	342	53.4	8.2
65-69歳	311	165.1	6.0	309	64.6	9.5	390	152.2	5.4	389	52.9	8.7
70-74歳	314	163.5	5.9	315	63.2	9.1	346	150.4	5.8	345	52.4	8.3
75-79歳	244	162.2	5.8	244	61.0	8.3	269	148.6	5.9	267	50.8	8.9
80歳以上	200	160.1	6.3	201	59.1	9.7	281	145.1	6.5	286	47.6	8.5

注)体重は妊婦除外。

(25年)

第19表 BMIの平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—
男性・女性，15歳以上〔妊婦除外〕

	男 性			女 性		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	2,860	23.39	3.36	3,319	22.29	3.69
15-19歳	122	20.65	3.16	120	20.44	2.46
20-29歳	257	22.65	4.01	233	20.93	3.27
30-39歳	327	23.40	3.87	392	21.39	3.71
40-49歳	401	24.04	3.33	493	21.91	3.63
50-59歳	396	23.85	3.32	457	22.74	4.00
60-69歳	599	23.58	2.90	731	22.64	3.37
70歳以上	758	23.33	3.03	893	22.96	3.76
(再掲)						
20歳以上	2,738	23.51	3.32	3,199	22.36	3.71
20-69歳	1,980	23.58	3.42	2,306	22.12	3.66
40-69歳	1,396	23.79	3.15	1,681	22.46	3.64
65-69歳	309	23.64	2.89	389	22.83	3.53
70-74歳	314	23.62	3.03	345	23.22	3.78
75-79歳	244	23.16	2.82	267	23.02	3.72
80-84歳	137	23.46	3.16	165	23.02	3.64
80歳以上	200	23.06	3.25	281	22.60	3.76
85歳以上	63	22.20	3.29	116	21.99	3.85

注)妊婦除外。

(25年)

第20表 BMIの状況—年齢階級, 肥満度(BMI)別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 15歳以上
〔妊婦除外〕

	総数	総数		やせ		普通		肥満		(再掲) 20以下		(再掲) 25以上30未満		(再掲) 30以上		
		人数	%	18.5未満		18.5以上25未満		25以上		人数	%	人数	%	人数	%	
				人数	%	人数	%	人数	%							
総数	総数	6,179	100.0	576	9.3	4,153	67.2	1,450	23.5	1,371	22.2	1,228	19.9	222	3.6	
	15-19歳	242	100.0	54	22.3	170	70.2	18	7.4	123	50.8	15	6.2	3	1.2	
	20-29歳	490	100.0	77	15.7	332	67.8	81	16.5	171	34.9	59	12.0	22	4.5	
	30-39歳	719	100.0	81	11.3	503	70.0	135	18.8	222	30.9	96	13.4	39	5.4	
	40-49歳	894	100.0	65	7.3	616	68.9	213	23.8	196	21.9	175	19.6	38	4.3	
	50-59歳	853	100.0	53	6.2	577	67.6	223	26.1	161	18.9	185	21.7	38	4.5	
	60-69歳	1,330	100.0	93	7.0	908	68.3	329	24.7	207	15.6	296	22.3	33	2.5	
	70歳以上	1,651	100.0	153	9.3	1,047	63.4	451	27.3	291	17.6	402	24.3	49	3.0	
	(再掲)															
	20歳以上	5,937	100.0	522	8.8	3,983	67.1	1,432	24.1	1,248	21.0	1,213	20.4	219	3.7	
	20-69歳	4,286	100.0	369	8.6	2,936	68.5	981	22.9	957	22.3	811	18.9	170	4.0	
	40-69歳	3,077	100.0	211	6.9	2,101	68.3	765	24.9	564	18.3	656	21.3	109	3.5	
	65-69歳	698	100.0	45	6.4	469	67.2	184	26.4	103	14.8	165	23.6	19	2.7	
	70-74歳	659	100.0	55	8.3	403	61.2	201	30.5	100	15.2	178	27.0	23	3.5	
	75-79歳	511	100.0	42	8.2	334	65.4	135	26.4	86	16.8	123	24.1	12	2.3	
	80-84歳	302	100.0	23	7.6	194	64.2	85	28.1	52	17.2	74	24.5	11	3.6	
	80歳以上	481	100.0	56	11.6	310	64.4	115	23.9	105	21.8	101	21.0	14	2.9	
85歳以上	179	100.0	33	18.4	116	64.8	30	16.8	53	29.6	27	15.1	3	1.7		
男性	総数	2,860	100.0	160	5.6	1,905	66.6	795	27.8	428	15.0	682	23.8	113	4.0	
	15-19歳	122	100.0	31	25.4	79	64.8	12	9.8	61	50.0	10	8.2	2	1.6	
	20-29歳	257	100.0	27	10.5	174	67.7	56	21.8	68	26.5	39	15.2	17	6.6	
	30-39歳	327	100.0	12	3.7	232	70.9	83	25.4	57	17.4	61	18.7	22	6.7	
	40-49歳	401	100.0	11	2.7	250	62.3	140	34.9	38	9.5	119	29.7	21	5.2	
	50-59歳	396	100.0	14	3.5	259	65.4	123	31.1	44	11.1	107	27.0	16	4.0	
	60-69歳	599	100.0	18	3.0	409	68.3	172	28.7	61	10.2	155	25.9	17	2.8	
	70歳以上	758	100.0	47	6.2	502	66.2	209	27.6	99	13.1	191	25.2	18	2.4	
	(再掲)															
	20歳以上	2,738	100.0	129	4.7	1,826	66.7	783	28.6	367	13.4	672	24.5	111	4.1	
	20-69歳	1,980	100.0	82	4.1	1,324	66.9	574	29.0	268	13.5	481	24.3	93	4.7	
	40-69歳	1,396	100.0	43	3.1	918	65.8	435	31.2	143	10.2	381	27.3	54	3.9	
	65-69歳	309	100.0	6	1.9	210	68.0	93	30.1	28	9.1	83	26.9	10	3.2	
	70-74歳	314	100.0	15	4.8	204	65.0	95	30.3	34	10.8	87	27.7	8	2.5	
	75-79歳	244	100.0	14	5.7	170	69.7	60	24.6	33	13.5	56	23.0	4	1.6	
	80-84歳	137	100.0	7	5.1	87	63.5	43	31.4	17	12.4	38	27.7	5	3.6	
	80歳以上	200	100.0	18	9.0	128	64.0	54	27.0	32	16.0	48	24.0	6	3.0	
85歳以上	63	100.0	11	17.5	41	65.1	11	17.5	15	23.8	10	15.9	1	1.6		
女性	総数	3,319	100.0	416	12.5	2,248	67.7	655	19.7	943	28.4	546	16.5	109	3.3	
	15-19歳	120	100.0	23	19.2	91	75.8	6	5.0	62	51.7	5	4.2	1	0.8	
	20-29歳	233	100.0	50	21.5	158	67.8	25	10.7	103	44.2	20	8.6	5	2.1	
	30-39歳	392	100.0	69	17.6	271	69.1	52	13.3	165	42.1	35	8.9	17	4.3	
	40-49歳	493	100.0	54	11.0	366	74.2	73	14.8	158	32.0	56	11.4	17	3.4	
	50-59歳	457	100.0	39	8.5	318	69.6	100	21.9	117	25.6	78	17.1	22	4.8	
	60-69歳	731	100.0	75	10.3	499	68.3	157	21.5	146	20.0	141	19.3	16	2.2	
	70歳以上	893	100.0	106	11.9	545	61.0	242	27.1	192	21.5	211	23.6	31	3.5	
	(再掲)															
	20歳以上	3,199	100.0	393	12.3	2,157	67.4	649	20.3	881	27.5	541	16.9	108	3.4	
	20-69歳	2,306	100.0	287	12.4	1,612	69.9	407	17.6	689	29.9	330	14.3	77	3.3	
	40-69歳	1,681	100.0	168	10.0	1,183	70.4	330	19.6	421	25.0	275	16.4	55	3.3	
	65-69歳	389	100.0	39	10.0	259	66.6	91	23.4	75	19.3	82	21.1	9	2.3	
	70-74歳	345	100.0	40	11.6	199	57.7	106	30.7	66	19.1	91	26.4	15	4.3	
	75-79歳	267	100.0	28	10.5	164	61.4	75	28.1	53	19.9	67	25.1	8	3.0	
	80-84歳	165	100.0	16	9.7	107	64.8	42	25.5	35	21.2	36	21.8	6	3.6	
	80歳以上	281	100.0	38	13.5	182	64.8	61	21.7	73	26.0	53	18.9	8	2.8	
85歳以上	116	100.0	22	19.0	75	64.7	19	16.4	38	32.8	17	14.7	2	1.7		

注) 妊婦除外。
BMIの判定はp.14参照。

(25年)

第21表 学校保健統計調査方式による肥満区分—学校保健統計調査方式による肥満区分, 年齢階級別, 人数, 割合—全国, 総数・男性・女性, 6-14歳

		総数		6-8歳		9-11歳		12-14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	588	100.0	204	100.0	182	100.0	202	100.0
	-30%以下	4	0.7	0	0.0	1	0.5	3	1.5
	-30%超～-20%以下	18	3.1	3	1.5	5	2.7	10	5.0
	-20%超～-10%以下	118	20.1	29	14.2	40	22.0	49	24.3
	-10%超～0%未満	203	34.5	84	41.2	65	35.7	54	26.7
	0%以上～+10%未満	135	23.0	46	22.5	41	22.5	48	23.8
	+10%以上～+20%未満	63	10.7	29	14.2	16	8.8	18	8.9
	+20%以上～+30%未満	30	5.1	6	2.9	11	6.0	13	6.4
	+30%以上～+40%未満	11	1.9	5	2.5	2	1.1	4	2.0
	+40%以上～+50%未満	4	0.7	2	1.0	0	0.0	2	1.0
	+50%以上	2	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.5
男性	総数	302	100.0	109	100.0	88	100.0	105	100.0
	-30%以下	3	1.0	0	0.0	1	1.1	2	1.9
	-30%超～-20%以下	9	3.0	1	0.9	4	4.5	4	3.8
	-20%超～-10%以下	54	17.9	14	12.8	19	21.6	21	20.0
	-10%超～0%未満	109	36.1	48	44.0	30	34.1	31	29.5
	0%以上～+10%未満	68	22.5	25	22.9	19	21.6	24	22.9
	+10%以上～+20%未満	33	10.9	15	13.8	7	8.0	11	10.5
	+20%以上～+30%未満	14	4.6	3	2.8	6	6.8	5	4.8
	+30%以上～+40%未満	9	3.0	3	2.8	2	2.3	4	3.8
	+40%以上～+50%未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.9
	+50%以上	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0
女性	総数	286	100.0	95	100.0	94	100.0	97	100.0
	-30%以下	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	-30%超～-20%以下	9	3.1	2	2.1	1	1.1	6	6.2
	-20%超～-10%以下	64	22.4	15	15.8	21	22.3	28	28.9
	-10%超～0%未満	94	32.9	36	37.9	35	37.2	23	23.7
	0%以上～+10%未満	67	23.4	21	22.1	22	23.4	24	24.7
	+10%以上～+20%未満	30	10.5	14	14.7	9	9.6	7	7.2
	+20%以上～+30%未満	16	5.6	3	3.2	5	5.3	8	8.2
	+30%以上～+40%未満	2	0.7	2	2.1	0	0.0	0	0.0
	+40%以上～+50%未満	2	0.7	2	2.1	0	0.0	0	0.0
	+50%以上	1	0.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0

注) 学校保健統計調査方式による区分は, p.14参照。

(25年)

第23表 腹囲の区分—腹囲の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	5,390	100.0	400	100.0	628	100.0	808	100.0	780	100.0	1,259	100.0	1,515	100.0	3,470	100.0
	<85cm(男)/<90cm(女)	3,558	66.0	342	85.5	487	77.5	587	72.6	509	65.3	788	62.6	845	55.8	2,212	63.7
	≥85cm(男)/≥90cm(女)	1,832	34.0	58	14.5	141	22.5	221	27.4	271	34.7	471	37.4	670	44.2	1,258	36.3
男性	総数	2,460	100.0	204	100.0	277	100.0	360	100.0	359	100.0	559	100.0	701	100.0	1,578	100.0
	<85cm	1,191	48.4	156	76.5	172	62.1	183	50.8	165	46.0	238	42.6	277	39.5	692	43.9
	≥85cm	1,269	51.6	48	23.5	105	37.9	177	49.2	194	54.0	321	57.4	424	60.5	886	56.1
女性	総数	2,930	100.0	196	100.0	351	100.0	448	100.0	421	100.0	700	100.0	814	100.0	1,892	100.0
	<90cm	2,367	80.8	186	94.9	315	89.7	404	90.2	344	81.7	550	78.6	568	69.8	1,520	80.3
	≥90cm	563	19.2	10	5.1	36	10.3	44	9.8	77	18.3	150	21.4	246	30.2	372	19.7

注) 妊婦除外。

(25年)

第24表 BMI・腹囲の区分—BMI・腹囲の区分, 人数, 年齢階級別, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	5,362	100.0	394	100.0	626	100.0	805	100.0	772	100.0	1,255	100.0	1,510	100.0	3,455	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm(男)/90cm(女)	3,266	60.9	314	79.7	467	74.6	531	66.0	465	60.2	723	57.6	766	50.7	2,011	58.2
	BMIのみ超(BMI≥25)	268	5.0	23	5.8	18	2.9	53	6.6	38	4.9	61	4.9	75	5.0	188	5.4
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm(男)/90cm(女))	778	14.5	15	3.8	43	6.9	80	9.9	104	13.5	223	17.8	313	20.7	540	15.6
	BMI≥25, 腹囲≥85cm(男)/90cm(女)	1,050	19.6	42	10.7	98	15.7	141	17.5	165	21.4	248	19.8	356	23.6	716	20.7
男性	総数	2,449	100.0	202	100.0	276	100.0	359	100.0	354	100.0	557	100.0	701	100.0	1,570	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	1,129	46.1	143	70.8	168	60.9	164	45.7	156	44.1	228	40.9	270	38.5	649	41.3
	BMIのみ超(BMI≥25)	53	2.2	12	5.9	3	1.1	18	5.0	5	1.4	8	1.4	7	1.0	36	2.3
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm)	605	24.7	11	5.4	39	14.1	68	18.9	88	24.9	168	30.2	231	33.0	429	27.3
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	662	27.0	36	17.8	66	23.9	109	30.4	105	29.7	153	27.5	193	27.5	456	29.0
女性	総数	2,913	100.0	192	100.0	350	100.0	446	100.0	418	100.0	698	100.0	809	100.0	1,885	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	2,137	73.4	171	89.1	299	85.4	367	82.3	309	73.9	495	70.9	496	61.3	1,362	72.3
	BMIのみ超(BMI≥25)	215	7.4	11	5.7	15	4.3	35	7.8	33	7.9	53	7.6	68	8.4	152	8.1
	腹囲のみ超(腹囲≥90cm)	173	5.9	4	2.1	4	1.1	12	2.7	16	3.8	55	7.9	82	10.1	111	5.9
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	388	13.3	6	3.1	32	9.1	32	7.2	60	14.4	95	13.6	163	20.1	260	13.8

注) 妊婦除外。

(25年)

(参考) 内臓脂肪型肥満の診断基準:

- BMI 25 以上で, 男性のウエスト周囲長 85cm 以上, 女性のウエスト周囲長 90cm 以上を上半身肥満の疑いとする。
- 上半身肥満の疑いと判定され, 腹部 CT 法による内臓脂肪面積 100cm² 以上 (男女とも) を内臓脂肪型肥満と診断する。
(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会, 2000 年)

※ 国民健康・栄養調査の「腹囲」は, 「立位のへその高さ」で計測したが, 計測位置は「ウエスト周囲径」と同じである。

第25表 薬の服用状況—薬の服用状況, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	4,075	100.0	274	100.0	433	100.0	563	100.0	561	100.0	994	100.0	1250	100.0
	使用なし	2,572	63.1	266	97.1	426	98.4	508	90.2	403	71.8	549	55.2	420	33.6
	使用あり(一つ以上)	1,503	36.9	8	2.9	7	1.6	55	9.8	158	28.2	445	44.8	830	66.4
	血压を下げる薬	1,155	28.3	2	0.7	4	0.9	32	5.7	105	18.7	326	32.8	686	54.9
	脈の乱れを治す薬	124	3.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	7	1.2	32	3.2	83	6.6
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	278	6.8	1	0.4	1	0.2	11	2.0	28	5.0	88	8.9	149	11.9
	コレステロールを下げる薬	582	14.3	1	0.4	0	0.0	11	2.0	60	10.7	187	18.8	323	25.8
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	166	4.1	0	0.0	0	0.0	4	0.7	13	2.3	61	6.1	88	7.0
	貧血治療のための薬(鉄剤)	41	1.0	5	1.8	2	0.5	10	1.8	4	0.7	6	0.6	14	1.1
男性	総数	1,759	100.0	131	100.0	168	100.0	211	100.0	235	100.0	432	100.0	582	100.0
	使用なし	1,068	60.7	129	98.5	164	97.6	182	86.3	156	66.4	227	52.5	210	36.1
	使用あり(一つ以上)	691	39.3	2	1.5	4	2.4	29	13.7	79	33.6	205	47.5	372	63.9
	血压を下げる薬	540	30.7	2	1.5	2	1.2	21	10.0	53	22.6	156	36.1	306	52.6
	脈の乱れを治す薬	75	4.3	0	0.0	0	0.0	2	0.9	4	1.7	15	3.5	54	9.3
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	155	8.8	0	0.0	1	0.6	8	3.8	17	7.2	50	11.6	79	13.6
	コレステロールを下げる薬	216	12.3	0	0.0	0	0.0	7	3.3	32	13.6	62	14.4	115	19.8
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	90	5.1	0	0.0	0	0.0	3	1.4	9	3.8	33	7.6	45	7.7
	貧血治療のための薬(鉄剤)	10	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	8	1.4
女性	総数	2,316	100.0	143	100.0	265	100.0	352	100.0	326	100.0	562	100.0	668	100.0
	使用なし	1,504	64.9	137	95.8	262	98.9	326	92.6	247	75.8	322	57.3	210	31.4
	使用あり(一つ以上)	812	35.1	6	4.2	3	1.1	26	7.4	79	24.2	240	42.7	458	68.6
	血压を下げる薬	615	26.6	0	0.0	2	0.8	11	3.1	52	16.0	170	30.2	380	56.9
	脈の乱れを治す薬	49	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	17	3.0	29	4.3
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	123	5.3	1	0.7	0	0.0	3	0.9	11	3.4	38	6.8	70	10.5
	コレステロールを下げる薬	366	15.8	1	0.7	0	0.0	4	1.1	28	8.6	125	22.2	208	31.1
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	76	3.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	1.2	28	5.0	43	6.4
	貧血治療のための薬(鉄剤)	31	1.3	5	3.5	1	0.4	10	2.8	4	1.2	5	0.9	6	0.9

注)複数回答。

(25年)

第26表の1 血圧の状況—年齢階級, 日本高血圧学会による血圧の分類別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*
総数	総数	3,563	100.0	841	23.6	685	19.2	688	19.3	975	27.4	294	8.3	80	2.2	709	19.9
	20-29歳	209	100.0	144	68.9	38	18.2	16	7.7	8	3.8	3	1.4	0	0.0	3	1.4
	30-39歳	344	100.0	208	60.5	61	17.7	43	12.5	29	8.4	2	0.6	1	0.3	2	0.6
	40-49歳	447	100.0	178	39.8	121	27.1	60	13.4	67	15.0	16	3.6	5	1.1	18	4.0
	50-59歳	487	100.0	117	24.0	104	21.4	96	19.7	120	24.6	38	7.8	12	2.5	53	10.9
	60-69歳	925	100.0	110	11.9	179	19.4	198	21.4	311	33.6	101	10.9	26	2.8	198	21.4
	70歳以上	1,151	100.0	84	7.3	182	15.8	275	23.9	440	38.2	134	11.6	36	3.1	435	37.8
	(再掲) 65-74歳	989	100.0	82	8.3	171	17.3	225	22.8	366	37.0	114	11.5	31	3.1	294	29.7
	(再掲) 75歳以上	660	100.0	47	7.1	109	16.5	157	23.8	247	37.4	79	12.0	21	3.2	267	40.5
男性	総数	1,487	100.0	233	15.7	267	18.0	322	21.7	482	32.4	146	9.8	37	2.5	326	21.9
	20-29歳	95	100.0	47	49.5	24	25.3	15	15.8	6	6.3	3	3.2	0	0.0	3	3.2
	30-39歳	113	100.0	43	38.1	26	23.0	26	23.0	16	14.2	1	0.9	1	0.9	0	0.0
	40-49歳	149	100.0	41	27.5	37	24.8	29	19.5	34	22.8	7	4.7	1	0.7	8	5.4
	50-59歳	195	100.0	23	11.8	37	19.0	43	22.1	66	33.8	15	7.7	11	5.6	24	12.3
	60-69歳	393	100.0	46	11.7	65	16.5	84	21.4	138	35.1	50	12.7	10	2.5	78	19.8
	70歳以上	542	100.0	33	6.1	78	14.4	125	23.1	222	41.0	70	12.9	14	2.6	213	39.3
	(再掲) 65-74歳	436	100.0	30	6.9	66	15.1	94	21.6	179	41.1	55	12.6	12	2.8	133	30.5
	(再掲) 75歳以上	310	100.0	22	7.1	52	16.8	74	23.9	117	37.7	39	12.6	6	1.9	126	40.6
女性	総数	2,076	100.0	608	29.3	418	20.1	366	17.6	493	23.7	148	7.1	43	2.1	383	18.4
	20-29歳	114	100.0	97	85.1	14	12.3	1	0.9	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	231	100.0	165	71.4	35	15.2	17	7.4	13	5.6	1	0.4	0	0.0	2	0.9
	40-49歳	298	100.0	137	46.0	84	28.2	31	10.4	33	11.1	9	3.0	4	1.3	10	3.4
	50-59歳	292	100.0	94	32.2	67	22.9	53	18.2	54	18.5	23	7.9	1	0.3	29	9.9
	60-69歳	532	100.0	64	12.0	114	21.4	114	21.4	173	32.5	51	9.6	16	3.0	120	22.6
	70歳以上	609	100.0	51	8.4	104	17.1	150	24.6	218	35.8	64	10.5	22	3.6	222	36.5
	(再掲) 65-74歳	553	100.0	52	9.4	105	19.0	131	23.7	187	33.8	59	10.7	19	3.4	161	29.1
	(再掲) 75歳以上	350	100.0	25	7.1	57	16.3	83	23.7	130	37.1	40	11.4	15	4.3	141	40.3

注) 日本高血圧学会による血圧の分類は p.15 を参照。

(25年)

数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお, 1回しか測定できなかった者については, その値を採用した。

* 総数に対する割合。

第 26 表の 2 血圧の状況—年齢階級, 日本高血圧学会による血圧の分類別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20 歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

	総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I 度高血圧		II 度高血圧		III 度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*	
総数	総数	2,503	100.0	788	31.5	523	20.9	442	17.7	533	21.3	163	6.5	54	2.2	319	12.7
	20-29歳	207	100.0	143	69.1	38	18.4	15	7.2	8	3.9	3	1.4	0	0.0	3	1.4
	30-39歳	337	100.0	205	60.8	61	18.1	41	12.2	27	8.0	2	0.6	1	0.3	2	0.6
	40-49歳	423	100.0	177	41.8	117	27.7	55	13.0	56	13.2	14	3.3	4	0.9	14	3.3
	50-59歳	396	100.0	110	27.8	94	23.7	71	17.9	83	21.0	27	6.8	11	2.8	34	8.6
	60-69歳	621	100.0	93	15.0	122	19.6	134	21.6	190	30.6	64	10.3	18	2.9	117	18.8
	70歳以上	519	100.0	60	11.6	91	17.5	126	24.3	169	32.6	53	10.2	20	3.9	149	28.7
	(再掲) 65-74歳	572	100.0	72	12.6	104	18.2	128	22.4	188	32.9	59	10.3	21	3.7	141	24.7
	(再掲) 75歳以上	254	100.0	27	10.6	47	18.5	64	25.2	77	30.3	29	11.4	10	3.9	79	31.1
男性	総数	994	100.0	210	21.1	193	19.4	213	21.4	273	27.5	81	8.1	24	2.4	147	14.8
	20-29歳	93	100.0	46	49.5	24	25.8	14	15.1	6	6.5	3	3.2	0	0.0	3	3.2
	30-39歳	110	100.0	42	38.2	26	23.6	24	21.8	16	14.5	1	0.9	1	0.9	0	0.0
	40-49歳	134	100.0	40	29.9	35	26.1	25	18.7	28	20.9	6	4.5	0	0.0	6	4.5
	50-59歳	151	100.0	21	13.9	31	20.5	33	21.9	45	29.8	11	7.3	10	6.6	14	9.3
	60-69歳	252	100.0	36	14.3	38	15.1	51	20.2	87	34.5	35	13.9	5	2.0	51	20.2
	70歳以上	254	100.0	25	9.8	39	15.4	66	26.0	91	35.8	25	9.8	8	3.1	73	28.7
	(再掲) 65-74歳	244	100.0	27	11.1	37	15.2	52	21.3	93	38.1	27	11.1	8	3.3	64	26.2
	(再掲) 75歳以上	129	100.0	15	11.6	23	17.8	35	27.1	40	31.0	14	10.9	2	1.6	38	29.5
女性	総数	1,509	100.0	578	38.3	330	21.9	229	15.2	260	17.2	82	5.4	30	2.0	172	11.4
	20-29歳	114	100.0	97	85.1	14	12.3	1	0.9	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	227	100.0	163	71.8	35	15.4	17	7.5	11	4.8	1	0.4	0	0.0	2	0.9
	40-49歳	289	100.0	137	47.4	82	28.4	30	10.4	28	9.7	8	2.8	4	1.4	8	2.8
	50-59歳	245	100.0	89	36.3	63	25.7	38	15.5	38	15.5	16	6.5	1	0.4	20	8.2
	60-69歳	369	100.0	57	15.4	84	22.8	83	22.5	103	27.9	29	7.9	13	3.5	66	17.9
	70歳以上	265	100.0	35	13.2	52	19.6	60	22.6	78	29.4	28	10.6	12	4.5	76	28.7
	(再掲) 65-74歳	328	100.0	45	13.7	67	20.4	76	23.2	95	29.0	32	9.8	13	4.0	77	23.5
	(再掲) 75歳以上	125	100.0	12	9.6	24	19.2	29	23.2	37	29.6	15	12.0	8	6.4	41	32.8

注) 血圧を下げる薬服用者除外。

(25年)

日本高血圧学会による血圧の分類は p.15 を参照。

数値は 2 回の測定値の平均値を用いた。なお、1 回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

* 総数に対する割合。

第27表の1 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布—収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の区分、年齢階級別、人数、割合—男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-89歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男	収縮期(最高)血圧	総数	1,487	100.0	95	100.0	113	100.0	149	100.0	195	100.0	393	100.0	542	100.0	1,273	100.0
		90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90-99	6	0.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.0	3	0.8	0	0.0	5	0.4
		100-109	84	5.6	23	24.2	20	17.7	13	8.7	6	3.1	16	4.1	6	1.1	41	3.2
		110-119	183	12.3	29	30.5	26	23.0	42	28.2	21	10.8	34	8.7	31	5.7	126	9.9
		120-129	313	21	25	26.3	38	33.6	42	28.2	47	24.1	77	19.6	84	15.5	250	19.6
		130-139	332	22.3	10	10.5	19	16.8	26	17.4	52	26.7	91	23.2	134	24.7	303	23.8
		140-149	278	18.7	6	6.3	6	5.3	17	11.4	34	17.4	78	19.8	137	25.3	265	20.8
		150-159	154	10.4	1	1.1	3	2.7	6	4.0	19	9.7	48	12.2	77	14.2	148	11.6
		160-169	73	4.9	1	1.1	0	0.0	1	0.7	4	2.1	26	6.6	41	7.6	71	5.6
170-179	43	2.9	0	0.0	0	0.0	2	1.3	6	3.1	15	3.8	20	3.7	43	3.4		
180mmHg以上	21	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.1	5	1.3	12	2.2	21	1.6		
女	拡張期(最低)血圧	総数	1,487	100.0	95	100.0	113	100.0	149	100.0	195	100.0	393	100.0	542	100.0	1,273	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1
		50-59	25	1.7	5	5.3	4	3.5	1	0.7	0	0.0	4	1.0	11	2.0	15	1.2
		60-69	179	12.0	28	29.5	19	16.8	12	8.1	11	5.6	30	7.6	79	14.6	131	10.3
		70-79	429	28.9	35	36.8	45	39.8	45	30.2	35	17.9	103	26.2	166	30.6	348	27.3
		80-89	514	34.6	21	22.1	27	23.9	57	38.3	81	41.5	136	34.6	192	35.4	464	36.4
		90-99	256	17.2	4	4.2	16	14.2	27	18.1	45	23.1	88	22.4	76	14.0	235	18.5
		100-109	59	4.0	2	2.1	1	0.9	6	4.0	12	6.2	24	6.1	14	2.6	56	4.4
		110-119	21	1.4	0	0.0	1	0.9	1	0.7	11	5.6	6	1.5	2	0.4	20	1.6
120-129	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	0.2		
130-139	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
男	収縮期(最高)血圧	総数	2,076	100.0	114	100.0	231	100.0	298	100.0	292	100.0	532	100.0	609	100.0	1,720	100.0
		90mmHg未満	9	0.4	0	0.0	7	3.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
		90-99	91	4.4	25	21.9	35	15.2	13	4.4	10	3.4	4	0.8	4	0.7	31	1.8
		100-109	240	11.6	45	39.5	61	26.4	74	24.8	33	11.3	19	3.6	8	1.3	134	7.8
		110-119	332	16	29	25.4	72	31.2	70	23.5	63	21.6	50	9.4	48	7.9	230	13.4
		120-129	433	20.9	13	11.4	38	16.5	86	28.9	67	22.9	123	23.1	106	17.4	380	22.1
		130-139	356	17.1	2	1.8	10	4.3	21	7.0	59	20.2	115	21.6	149	24.5	338	19.7
		140-149	294	14.2	0	0.0	6	2.6	19	6.4	34	11.6	104	19.5	131	21.5	287	16.7
		150-159	166	8	0	0.0	2	0.9	7	2.3	10	3.4	62	11.7	85	14.0	163	9.5
		160-169	83	4	0	0.0	0	0.0	5	1.7	13	4.5	29	5.5	36	5.9	83	4.8
170-179	39	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	13	2.4	24	3.9	39	2.3		
180mmHg以上	33	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	13	2.4	18	3.0	33	1.9		
女	拡張期(最低)血圧	総数	2,076	100.0	114	100.0	231	100.0	298	100.0	292	100.0	532	100.0	609	100.0	1,720	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	4	0.2	1	0.9	2	0.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
		50-59	93	4.5	22	19.3	24	10.4	10	3.4	6	2.1	7	1.3	24	3.9	46	2.7
		60-69	392	18.9	48	42.1	80	34.6	63	21.1	41	14.0	61	11.5	99	16.3	260	15.1
		70-79	710	34.2	34	29.8	84	36.4	121	40.6	102	34.9	166	31.2	203	33.3	590	34.3
		80-89	576	27.7	7	6.1	29	12.6	67	22.5	94	32.2	178	33.5	201	33.0	537	31.2
		90-99	222	10.7	2	1.8	11	4.8	26	8.7	33	11.3	91	17.1	59	9.7	208	12.1
		100-109	63	3	0	0.0	1	0.4	7	2.3	16	5.5	21	3.9	18	3.0	62	3.6
		110-119	13	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	6	1.1	5	0.8	13	0.8
120-129	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.1		
130-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140mmHg以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1		

注)数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

(25年)

第27表の2 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

(mmHg)

		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)40-89歳		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	収縮期(最高)血圧	1,487	135.3	17.8	95	119.9	12.8	113	121.7	12	149	126.1	14.3	195	134.9	16.7	393	138.1	17.6	542	141.5	16.8	1,273	137.6	17.4
	拡張期(最低)血圧	1,487	81.7	11.4	95	74.1	10.9	113	78.0	11	149	82.8	9.9	195	86.9	10.9	393	84.0	11.4	542	79.9	10.8	1,273	82.6	11.2
女性	収縮期(最高)血圧	2,076	129.5	20	114	108.2	9.9	231	111.6	12.9	298	119.1	15.3	292	126.5	16.9	532	137.1	18.6	609	140.1	17.6	1,720	133.3	19.2
	拡張期(最低)血圧	2,076	77.6	11.5	114	66.8	8.4	231	70.9	10.3	298	76.4	11.2	292	79.6	10.7	532	81.6	11.2	609	78.4	10.8	1,720	79.3	11.1

注)数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

(25年)

第27表の3 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の分布—収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の区分、年齢階級別、人数、割合—男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-89歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男	収縮期(最高)血圧	総数	994	100.0	93	100.0	110	100.0	134	100.0	151	100.0	252	100.0	254	100.0	787	100.0
		90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90-99	5	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.3	2	0.8	0	0.0	4	0.5
		100-109	80	8.0	23	24.7	20	18.2	13	9.7	5	3.3	13	5.2	6	2.4	37	4.7
		110-119	161	16.2	28	30.1	25	22.7	39	29.1	20	13.2	27	10.7	22	8.7	106	13.5
		120-129	228	22.9	24	25.8	38	34.5	41	30.6	40	26.5	43	17.1	42	16.5	166	21.1
		130-139	211	21.2	10	10.8	17	15.5	22	16.4	36	23.8	56	22.2	70	27.6	184	23.4
		140-149	156	15.7	6	6.5	6	5.5	13	9.7	25	16.6	52	20.6	54	21.3	143	18.2
		150-159	82	8.2	1	1.1	3	2.7	4	3.0	11	7.3	29	11.5	34	13.4	77	9.8
		160-169	41	4.1	1	1.1	0	0.0	1	0.7	4	2.6	19	7.5	16	6.3	40	5.1
170-179	18	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	2.6	9	3.6	4	1.6	18	2.3		
180mmHg以上	12	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.6	2	0.8	6	2.4	12	1.5		
女	拡張期(最低)血圧	総数	994	100.0	93	100.0	110	100.0	134	100.0	151	100.0	252	100.0	254	100.0	787	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1
		50-59	16	1.6	5	5.4	3	2.7	1	0.7	0	0.0	3	1.2	4	1.6	7	0.9
		60-69	122	12.3	28	30.1	19	17.3	27	9.0	9	6.0	17	6.7	37	14.6	75	9.5
		70-79	297	29.9	34	36.6	44	40.0	44	32.8	31	20.5	66	26.2	78	30.7	218	27.7
		80-89	327	32.9	20	21.5	26	23.6	49	36.6	59	39.1	90	35.7	83	32.7	279	35.5
		90-99	171	17.2	4	4.3	16	14.5	23	17.2	33	21.9	54	21.4	41	16.1	151	19.2
		100-109	41	4.1	2	2.2	1	0.9	5	3.7	9	6.0	17	6.7	7	2.8	38	4.8
		110-119	16	1.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0	10	6.6	3	1.2	2	0.8	15	1.9
120-129	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	2	0.3		
130-139	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
男	収縮期(最高)血圧	総数	1,509	100.0	114	100.0	227	100.0	289	100.0	245	100.0	369	100.0	265	100.0	1,165	100.0
		90mmHg未満	8	0.5	0	0.0	6	2.6	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
		90-99	90	6.0	25	21.9	35	15.4	13	4.5	10	4.1	4	1.1	3	1.1	30	2.6
		100-109	234	15.5	45	39.5	60	26.4	74	25.6	31	12.7	17	4.6	7	2.6	129	11.1
		110-119	301	19.9	29	25.4	72	31.7	70	24.2	59	24.1	44	11.9	27	10.2	200	17.2
		120-129	334	22.1	13	11.4	38	16.7	82	28.4	61	24.9	88	23.8	52	19.6	283	24.3
		130-139	220	14.6	2	1.8	9	4.0	19	6.6	43	17.6	85	23.0	62	23.4	206	17.7
		140-149	155	10.3	0	0.0	6	2.6	17	5.9	23	9.4	64	17.3	45	17.0	149	12.8
		150-159	81	5.4	0	0.0	1	0.4	6	2.1	7	2.9	32	8.7	35	13.2	80	6.9
		160-169	40	2.7	0	0.0	0	0.0	5	1.7	9	3.7	14	3.8	12	4.5	40	3.4
170-179	25	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	11	3.0	13	4.9	25	2.1		
180mmHg以上	21	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	10	2.7	9	3.4	21	1.8		
女	拡張期(最低)血圧	総数	1,509	100.0	114	100.0	227	100.0	289	100.0	245	100.0	369	100.0	265	100.0	1,165	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	4	0.3	1	0.9	2	0.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
		50-59	70	4.6	22	19.3	23	10.1	10	3.5	4	1.6	4	1.1	7	2.6	25	2.1
		60-69	320	21.2	48	42.1	79	34.8	63	21.8	37	15.1	49	13.3	44	16.6	193	16.6
		70-79	539	35.7	34	29.8	84	37.0	119	41.2	92	37.6	123	33.3	87	32.8	421	36.1
		80-89	376	24.9	7	6.1	29	12.8	64	22.1	77	31.4	114	30.9	85	32.1	338	29.0
		90-99	139	9.2	2	1.8	9	4.0	23	8.0	22	9.0	58	15.7	25	9.4	127	10.9
		100-109	48	3.2	0	0.0	1	0.4	6	2.1	13	5.3	15	4.1	13	4.9	47	4.0
		110-119	10	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	4	1.1	4	1.5	10	0.9
120-129	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.2		
130-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140mmHg以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1		

注) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。(25年)
血圧を下げる薬の使用者除外。

第27表の4 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の平均値及び標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-89歳		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	収縮期(最高)血圧	994	132.1	17.5	93	119.8	12.9	110	121.5	12.1	134	124.7	13.3	151	133.8	17.4	252	137.6	17.6	254	138.6	17.1	787	135.0	17.4
	拡張期(最低)血圧	994	81.7	11.7	93	74.0	10.9	110	78.2	11.1	134	82.0	9.7	151	86.8	11.5	252	84.1	11.6	254	80.6	11.5	787	83.2	11.5
女性	収縮期(最高)血圧	1,509	125.2	19.7	114	108.2	9.9	227	111.4	12.5	289	118.6	15.2	245	124.5	16.4	369	135.2	19.4	265	138.2	19.4	1,165	129.5	19.5
	拡張期(最低)血圧	1,509	76.9	11.7	114	66.8	8.4	227	70.7	10.1	289	76.0	11.1	245	78.9	10.4	369	81.2	11.5	265	79.4	11.2	1,165	79.0	11.3

注) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。(25年)
血圧を下げる薬の使用者除外。

第28表の1 血色素量の分布－血色素量の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上
[貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,380	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	494	100.0	403	100.0	279	100.0
	10.0g/dL未満	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	1	0.3	4	0.8	1	0.2	4	1.4
	10.0-10.9	11	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	2	0.5	9	1.8	5	1.2	6	2.2
	11.0-11.9	33	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	6	1.6	26	5.3	7	1.7	22	7.9
	12.0-12.9	94	6.8	0	0.0	1	0.9	2	1.4	2	1.1	18	4.9	71	14.4	29	7.2	51	18.3
	13.0-13.9	257	18.6	1	1.1	5	4.6	10	7.1	33	18.3	73	20	135	27.3	86	21.3	80	28.7
	14.0-14.9	394	28.6	26	28.6	37	33.9	39	27.7	45	25.0	119	32.6	128	25.9	134	33.3	65	23.3
	15.0-15.9	393	28.5	37	40.7	46	42.2	62	44	69	38.3	92	25.2	87	17.6	96	23.8	37	13.3
	16.0-16.9	155	11.2	23	25.3	15	13.8	23	16.3	23	12.8	45	12.3	26	5.3	38	9.4	10	3.6
	17.0-17.9	32	2.3	3	3.3	5	4.6	4	2.8	7	3.9	6	1.6	7	1.4	6	1.5	3	1.1
18.0g/dL以上	6	0.4	1	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0	3	0.8	1	0.2	1	0.2	1	0.4	
女性	総数	1,909	100.0	105	100.0	216	100.0	284	100.0	272	100.0	489	100.0	543	100.0	502	100.0	312	100.0
	10.0g/dL未満	37	1.9	2	1.9	2	0.9	21	7.4	3	1.1	3	0.6	6	1.1	3	0.6	6	1.9
	10.0-10.9	79	4.1	1	1.0	19	8.8	25	8.8	4	1.5	6	1.2	24	4.4	10	2	17	5.4
	11.0-11.9	210	11	15	14.3	25	11.6	40	14.1	17	6.3	36	7.4	77	14.2	46	9.2	50	16
	12.0-12.9	556	29.1	28	26.7	65	30.1	83	29.2	72	26.5	133	27.2	175	32.2	151	30.1	99	31.7
	13.0-13.9	687	36	44	41.9	76	35.2	74	26.1	114	41.9	204	41.7	175	32.2	196	39	92	29.5
	14.0-14.9	280	14.7	13	12.4	25	11.6	33	11.6	48	17.6	93	19.0	68	12.5	78	15.5	38	12.2
	15.0-15.9	55	2.9	2	1.9	4	1.9	8	2.8	12	4.4	12	2.5	17	3.1	15	3	10	3.2
	16.0-16.9	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0	2	0.7	2	0.4	1	0.2	3	0.6	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

(25年)

第28表の2 血色素量の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上
[貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,380	14.6	1.3	91	15.5	0.9	109	15.2	0.9	141	15.2	1.0	180	15.0	1.1	365	14.6	1.3	494	13.9	1.4	403	14.4	1.3	279	13.6	1.5
女性	1,909	12.9	1.2	105	13.0	1.0	216	12.7	1.2	284	12.5	1.5	272	13.2	1.1	489	13.2	1.0	543	12.9	1.2	502	13.1	1.0	312	12.7	1.2

(25年)

第 28 表の 3 血色素量の分布－血色素量の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総 数	1,369	100.0	91	100.0	108	100.0	141	100.0	180	100.0	363	100.0	486	100.0	397	100.0	276	100.0
	10.0g/dL未満	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	1	0.3	4	0.8	1	0.3	4	1.4
	10.0-10.9	9	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	2	0.6	7	1.4	4	1	5	1.8
	11.0-11.9	33	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	6	1.7	26	5.3	7	1.8	22	8.0
	12.0-12.9	94	6.9	0	0.0	1	0.9	2	1.4	2	1.1	18	5	71	14.6	29	7.3	51	18.5
	13.0-13.9	254	18.6	1	1.1	5	4.6	10	7.1	33	18.3	73	20.1	132	27.2	84	21.2	79	28.6
	14.0-14.9	390	28.5	26	28.6	36	33.3	39	27.7	45	25.0	118	32.5	126	25.9	133	33.5	64	23.2
	15.0-15.9	391	28.6	37	40.7	46	42.6	62	44	69	38.3	91	25.1	86	17.7	94	23.7	37	13.4
	16.0-16.9	155	11.3	23	25.3	15	13.9	23	16.3	23	12.8	45	12.4	26	5.3	38	9.6	10	3.6
	17.0-17.9	32	2.3	3	3.3	5	4.6	4	2.8	7	3.9	6	1.7	7	1.4	6	1.5	3	1.1
	18.0g/dL以上	6	0.4	1	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0	3	0.8	1	0.2	1	0.3	1	0.4
女性	総 数	1,884	100.0	101	100.0	214	100.0	275	100.0	270	100.0	486	100.0	538	100.0	500	100.0	307	100.0
	10.0g/dL未満	34	1.8	1	1.0	2	0.9	20	7.3	2	0.7	3	0.6	6	1.1	3	0.6	6	2.0
	10.0-10.9	75	4	1	1.0	18	8.4	22	8	4	1.5	6	1.2	24	4.5	10	2	17	5.5
	11.0-11.9	202	10.7	13	12.9	25	11.7	38	13.8	17	6.3	34	7	75	13.9	45	9	48	15.6
	12.0-12.9	552	29.3	28	27.7	65	30.4	80	29.1	72	26.7	133	27.4	174	32.3	151	30.2	98	31.9
	13.0-13.9	683	36.3	44	43.6	75	35	74	26.9	113	41.9	204	42	173	32.2	196	39.2	90	29.3
	14.0-14.9	279	14.8	13	12.9	25	11.7	33	12.0	48	17.8	92	18.9	68	12.6	77	15.4	38	12.4
	15.0-15.9	54	2.9	1	1.0	4	1.9	8	2.9	12	4.4	12	2.5	17	3.2	15	3	10	3.3
	16.0-16.9	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0	2	0.7	2	0.4	1	0.2	3	0.6	0	0.0
	17.0-17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 貧血治療のための薬の使用者除外。

(25年)

第 28 表の 4 血色素量の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,369	14.6	1.3	91	15.5	0.9	108	15.2	0.9	141	15.2	1.0	180	15.0	1.1	363	14.6	1.3	486	13.9	1.4	397	14.4	1.3	276	13.6	1.5
女性	1,884	12.9	1.2	101	13.0	1.0	214	12.7	1.2	275	12.5	1.5	270	13.3	1.0	486	13.2	1.0	538	12.9	1.2	500	13.1	1.0	307	12.8	1.3

注) 貧血治療のための薬の使用者除外。

(25年)

第29表の1 赤血球数の分布—赤血球数の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,380	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	494	100.0	403	100.0	279	100.0
	400万個/mm ³ 未満	82	5.9	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.6	12	3.3	67	13.6	23	5.7	52	18.6
	400-449	319	23.1	2	2.2	4	3.7	10	7.1	33	18.3	83	22.7	187	37.9	116	28.8	113	40.5
	450-499	572	41.4	26	28.6	46	42.2	56	39.7	87	48.3	182	49.9	175	35.4	176	43.7	89	31.9
	500-549	355	25.7	46	50.5	52	47.7	66	46.8	52	28.9	81	22.2	58	11.7	80	19.9	23	8.2
	550-599	50	3.6	16	17.6	7	6.4	7	5.0	7	3.9	7	1.9	6	1.2	8	2.0	1	0.4
	600-649	2	0.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	1,909	100.0	105	100.0	216	100.0	284	100.0	272	100.0	489	100.0	543	100.0	502	100.0	312	100.0
	400万個/mm ³ 未満	258	13.5	9	8.6	26	12.0	26	9.2	20	7.4	49	10.0	128	23.6	72	14.3	87	27.9
	400-449	930	48.7	40	38.1	109	50.5	161	56.7	120	44.1	240	49.1	260	47.9	242	48.2	143	45.8
	450-499	623	32.6	52	49.5	73	33.8	78	27.5	113	41.5	170	34.8	137	25.2	164	32.7	71	22.8
	500-549	92	4.8	3	2.9	8	3.7	16	5.6	19	7	29	5.9	17	3.1	23	4.6	10	3.2
	550-599	6	0.3	1	1.0	0	0.0	3	1.1	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.3
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(25年)

第29表の2 赤血球数の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

(万個/mm³未満)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,380	472.1	47.0	91	516.8	34.0	109	501.2	31.0	141	498.2	36.0	180	482.1	36.6	365	470.4	41.9	494	447.6	47.2	403	464.1	44.3	279	438.2	47.7
女性	1,909	439.0	37.2	105	449.2	34.8	216	440.6	32.3	284	441.5	36.8	272	447.8	34.5	489	441.9	36.1	543	427.9	39.4	502	437.4	37.4	312	424.8	41.8

(25年)

第30表の1 ヘマトクリット値の分布—ヘマトクリット値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—
男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,380	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	494	100.0	403	100.0	279	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	3	1.1
	30.0-34.9	16	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	11	2.2	8	2.0	8	2.9
	35.0-39.9	107	7.8	0	0.0	0	0.0	1	0.7	5	2.8	16	4.4	85	17.2	29	7.2	62	22.2
	40.0-44.9	567	41.1	23	25.3	34	31.2	41	29.1	70	38.9	160	43.8	239	48.4	185	45.9	135	48.4
	45.0-49.9	579	42.0	58	63.7	66	60.6	86	61.0	88	48.9	156	42.7	125	25.3	149	37.0	59	21.1
	50.0-54.9	104	7.5	10	11.0	9	8.3	12	8.5	17	9.4	27	7.4	29	5.9	31	7.7	11	3.9
	55.0%以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	2	0.4	1	0.2	1	0.4
	(再掲)39.8未満	115	8.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	2.2	17	4.7	93	18.8	34	8.4	68	24.4
	(再掲)51.9以上	33	2.4	2	2.2	2	1.8	3	2.1	4	2.2	9	2.5	13	2.6	13	3.2	3	1.1
女性	総数	1,909	100.0	105	100.0	216	100.0	284	100.0	272	100.0	489	100.0	543	100.0	502	100.0	312	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	9	0.5	0	0.0	1	0.5	5	1.8	0	0.0	1	0.2	2	0.4	1	0.2	2	0.6
	30.0-34.9	97	5.1	3	2.9	14	6.5	30	10.6	6	2.2	10	2.0	34	6.3	15	3.0	26	8.3
	35.0-39.9	641	33.6	35	33.3	92	42.6	121	42.6	77	28.3	127	26.0	189	34.8	134	26.7	116	37.2
	40.0-44.9	991	51.9	62	59.0	100	46.3	108	38.0	160	58.8	295	60.3	266	49.0	298	59.4	136	43.6
	45.0-49.9	165	8.6	5	4.8	8	3.7	20	7.0	28	10.3	54	11.0	50	9.2	51	10.2	31	9.9
	50.0-54.9	6	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	2	0.4	2	0.4	3	0.6	1	0.3
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	47	2.5	2	1.9	5	2.3	21	7.4	3	1.1	4	0.8	12	2.2	8	1.6	8	2.6
	(再掲)45.0以上	171	9.0	5	4.8	9	4.2	20	7.0	29	10.7	56	11.5	52	9.6	54	10.8	32	10.3

(25年)

第30表の2 ヘマトクリット値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性,
20歳以上

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,380	44.8	3.8	91	47.1	2.6	109	46.2	2.6	141	46.4	2.7	180	45.6	3.0	365	45.0	3.6	494	43.2	4.3	403	44.7	3.8	279	42.3	4.4
女性	1,909	40.7	3.4	105	40.6	3.0	216	40.0	3.3	284	39.4	3.9	272	41.4	3.1	489	41.4	3.0	543	40.5	3.5	502	41.2	3.2	312	40.2	3.8

(25年)

第31表の1 平均赤血球容積（MCV）の区分—平均赤血球容積の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,380	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	494	100.0	403	100.0	279	100.0
	70歳未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	70-75歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80歳未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.4
	80-85歳未満	23	1.7	6	6.6	2	1.8	2	1.4	1	0.6	6	1.6	6	1.2	3	0.7	5	1.8
	85-90歳未満	158	11.4	33	36.3	27	24.8	24	17.0	27	15.0	27	7.4	20	4.0	22	5.5	9	3.2
	90-95歳未満	506	36.7	35	38.5	55	50.5	70	49.6	66	36.7	134	36.7	146	29.6	127	31.5	87	31.2
	95-100歳未満	464	33.6	15	16.5	25	22.9	31	22.0	61	33.9	128	35.1	204	41.3	160	39.7	111	39.8
	100-105歳未満	173	12.5	2	2.2	0	0.0	13	9.2	22	12.2	48	13.2	88	17.8	69	17.1	48	17.2
	105-110歳未満	38	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	15	4.1	20	4.0	11	2.7	14	5.0
	110-115歳未満	11	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	6	1.2	8	2.0	2	0.7
	115-120歳未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	2	0.7
120歳以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	
女性	総数	1,909	100.0	105	100.0	216	100.0	284	100.0	272	100.0	489	100.0	543	100.0	502	100.0	312	100.0
	70歳未満	10	0.5	0	0.0	1	0.5	6	2.1	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75歳未満	29	1.5	1	1.0	4	1.9	20	7.0	2	0.7	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.3
	75-80歳未満	34	1.8	3	2.9	8	3.7	14	4.9	4	1.5	4	0.8	1	0.2	3	0.6	1	0.3
	80-85歳未満	62	3.2	9	8.6	11	5.1	20	7.0	6	2.2	6	1.2	10	1.8	6	1.2	5	1.6
	85-90歳未満	322	16.9	30	28.6	58	26.9	61	21.5	49	18.0	72	14.7	52	9.6	52	10.4	35	11.2
	90-95歳未満	780	40.9	48	45.7	83	38.4	90	31.7	117	43.0	214	43.8	228	42.0	222	44.2	127	40.7
	95-100歳未満	511	26.8	9	8.6	40	18.5	58	20.4	70	25.7	147	30.1	187	34.4	170	33.9	100	32.1
	100-105歳未満	133	7.0	4	3.8	11	5.1	12	4.2	19	7.0	32	6.5	55	10.1	40	8.0	36	11.5
	105-110歳未満	23	1.2	1	1.0	0	0.0	3	1.1	1	0.4	11	2.2	7	1.3	7	1.4	5	1.6
	110-115歳未満	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.2	2	0.4	0	0.0	2	0.6
	115-120歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120歳以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	

(25年)

第31表の2 平均赤血球容積（MCV）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上

(f1)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,380	95.2	5.3	91	91.3	4.1	109	92.3	3.5	141	93.3	4.7	180	94.7	4.9	365	95.9	5.6	494	96.8	5.2	403	96.5	5.4	279	96.7	5.4
女性	1,909	92.8	6.0	105	90.6	5.1	216	90.9	6.2	284	89.6	8.0	272	92.7	5.7	489	94.0	5.0	543	94.8	4.6	502	94.4	4.7	312	94.9	5.0

(25年)

第 32 表の 1 平均赤血球血色素量 (MCH) の区分—平均赤血球血色素量の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,380	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	494	100.0	403	100.0	279	100.0
	20pg未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	20-25未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.4
	25-27未満	20	1.4	0	0.0	2	1.8	2	1.4	1	0.6	5	1.4	10	2.0	3	0.7	8	2.9
	27-29未満	111	8.0	19	20.9	10	9.2	10	7.1	15	8.3	28	7.7	29	5.9	23	5.7	17	6.1
	29-31未満	569	41.2	52	57.1	68	62.4	74	52.5	70	38.9	138	37.8	167	33.8	154	38.2	89	31.9
	31-33未満	531	38.5	20	22.0	24	22.0	45	31.9	71	39.4	142	38.9	229	46.4	171	42.4	132	47.3
	33-35未満	118	8.6	0	0.0	5	4.6	8	5.7	23	12.8	40	11.0	42	8.5	37	9.2	22	7.9
	35-40未満	27	2.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	11	3.0	14	2.8	13	3.2	9	3.2
	40pg以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0	1	0.4
女性	総数	1,909	100.0	105	100.0	216	100.0	284	100.0	272	100.0	489	100.0	543	100.0	502	100.0	312	100.0
	20pg未満	13	0.7	0	0	1	0.5	7	2.5	3	1.1	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.3
	20-25未満	72	3.8	3	2.9	14	6.5	39	13.7	6	2.2	5	1.0	5	0.9	4	0.8	5	1.6
	25-27未満	79	4.1	7	6.7	18	8.3	29	10.2	7	2.6	5	1.0	13	2.4	8	1.6	7	2.2
	27-29未満	365	19.1	35	33.3	49	22.7	51	18.0	57	21.0	94	19.2	79	14.5	83	16.5	50	16.0
	29-31未満	971	50.9	48	45.7	98	45.4	106	37.3	144	52.9	265	54.2	310	57.1	286	57.0	166	53.2
	31-33未満	371	19.4	12	11.4	32	14.8	47	16.5	46	16.9	109	22.3	125	23.0	112	22.3	75	24.0
	33-35未満	33	1.7	0	0.0	4	1.9	4	1.4	8	2.9	9	1.8	8	1.5	7	1.4	6	1.9
	35-40未満	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.4	0	0	2	0.6
	40pg以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0

(25年)

第 32 表の 2 平均赤血球血色素量 (MCH) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上

(pg)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,380	31.0	1.8	91	30.0	1.2	109	30.4	1.3	141	30.7	1.5	180	31.1	1.6	365	31.2	2.0	494	31.2	1.8	403	31.2	1.9	279	31.2	2.0
女性	1,909	29.5	2.3	105	28.9	1.8	216	29.0	2.5	284	28.3	3.4	272	29.6	2.1	489	30.0	1.6	543	30.1	1.6	502	30.0	1.6	312	30.1	1.8

(25年)

第33表の1 平均赤血球血色素濃度（MCHC）の区分—平均赤血球血色素濃度の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,380	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	494	100.0	403	100.0	279	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	28-30未満	28	2.0	1	1.1	0	0.0	1	0.7	1	0.6	7	1.9	18	3.6	9	2.2	11	3.9
	30-32未満	340	24.6	15	16.5	13	11.9	20	14.2	25	13.9	97	26.6	170	34.4	122	30.3	98	35.1
	32-34未満	896	64.9	62	68.1	77	70.6	105	74.5	133	73.9	233	63.8	286	57.9	250	62.0	158	56.6
34%以上	115	8.3	13	14.3	19	17.4	15	10.6	21	11.7	27	7.4	20	4.0	21	5.2	12	4.3	
女性	総数	1,909	100.0	105	100.0	216	100.0	284	100.0	272	100.0	489	100.0	543	100.0	502	100.0	312	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	3	0.2	0	0.0	1	0.5	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	15	0.8	1	1.0	2	0.9	7	2.5	2	0.7	1	0.2	2	0.4	1	0.2	2	0.6
	28-30未満	95	5.0	1	1.0	15	6.9	30	10.6	8	2.9	16	3.3	25	4.6	20	4.0	16	5.1
	30-32未満	871	45.6	46	43.8	80	37.0	125	44.0	126	46.3	213	43.6	281	51.7	235	46.8	168	53.8
	32-34未満	897	47.0	56	53.3	113	52.3	113	39.8	132	48.5	254	51.9	229	42.2	241	48.0	123	39.4
34%以上	28	1.5	1	1.0	5	2.3	7	2.5	4	1.5	5	1.0	6	1.1	5	1.0	3	1.0	

(25年)

第33表の2 平均赤血球血色素濃度（MCHC）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,380	32.5	1.1	91	32.9	1.0	109	32.9	1.0	141	32.9	1.0	180	32.9	1.0	365	32.5	1.2	494	32.2	1.1	403	32.3	1.1	279	32.2	1.1
女性	1,909	31.8	1.2	105	31.9	1.0	216	31.9	1.3	284	31.5	1.6	272	32.0	1.1	489	31.9	1.0	543	31.7	1.0	502	31.8	1.0	312	31.7	1.1

(25年)

第 34 表の 1 血清総たんぱく質値の分布—血清総たんぱく質値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男 性	総 数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	163	100.0	117	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	8	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	4	1.1	2	0.4	2	0.5	2	1.2	0	0.0
	6.5-6.9	179	13.0	7	7.7	12	11.0	14	9.9	24	13.3	48	13.2	74	14.9	56	13.9	29	17.8	19	16.2
	7.0-7.4	630	45.6	30	33.0	46	42.2	56	39.7	87	48.3	175	47.9	236	47.6	183	45.3	82	50.3	55	47.0
	7.5-7.9	464	33.6	44	48.4	40	36.7	63	44.7	62	34.4	114	31.2	141	28.4	127	31.4	37	22.7	34	29.1
	8.0-8.4	91	6.6	9	9.9	10	9.2	7	5.0	4	2.2	23	6.3	38	7.7	35	8.7	11	6.7	7	6.0
	8.5g/dL以上	10	0.7	1	1.1	1	0.9	0	0.0	2	1.1	1	0.3	5	1.0	1	0.2	2	1.2	2	1.7
女 性	総 数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	175	100.0	138	100.0
	6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	22	1.1	2	1.9	2	0.9	0	0.0	3	1.1	1	0.2	14	2.6	6	1.2	4	2.3	4	2.9
	6.5-6.9	218	11.4	4	3.8	23	10.6	36	12.7	21	7.7	57	11.6	77	14.0	67	13.2	23	13.1	22	15.9
	7.0-7.4	801	41.8	33	31.1	81	37.2	141	49.8	123	45.2	202	41.2	221	40.3	210	41.3	70	40.0	52	37.7
	7.5-7.9	702	36.6	57	53.8	87	39.9	92	32.5	99	36.4	182	37.1	185	33.7	178	35.0	59	33.7	47	34.1
	8.0-8.4	157	8.2	10	9.4	21	9.6	11	3.9	25	9.2	42	8.6	48	8.7	42	8.3	18	10.3	12	8.7
	8.5g/dL以上	17	0.9	0	0.0	3	1.4	3	1.1	1	0.4	6	1.2	4	0.7	5	1.0	1	0.6	1	0.7

(25年)

第 34 表の 2 血清総たんぱく質値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上

(g/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75-79歳			(再掲) 80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	7.4	0.4	91	7.5	0.4	109	7.5	0.4	141	7.4	0.3	180	7.3	0.4	365	7.3	0.4	496	7.4	0.4	404	7.4	0.4	163	7.3	0.4	117	7.3	0.4
女性	1,918	7.4	0.4	106	7.5	0.4	218	7.4	0.4	283	7.4	0.4	272	7.4	0.4	490	7.4	0.4	549	7.4	0.4	508	7.4	0.4	175	7.4	0.4	138	7.3	0.5

(25年)

第35表の1 血清アルブミン値の分布—血清アルブミン値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—
男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	163	100.0	117	100.0
	3.0g/dL未満	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	3.2-3.3	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.6	1	0.2	1	0.6	2	1.7
	3.6-3.7	10	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0	3	1.7	4	1.1	3	0.6	2	0.5	3	1.8	0	0
	3.8-3.9	48	3.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.7	7	1.9	37	7.5	16	4.0	12	7.4	13	11.1
	4.0-4.1	115	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0	6	3.3	34	9.3	75	15.1	46	11.4	30	18.4	23	19.7
	4.2-4.3	250	18.1	3	3.3	5	4.6	12	8.5	16	8.9	66	18.1	148	29.8	97	24.0	48	29.4	39	33.3
	4.4-4.5	295	21.3	7	7.7	10	9.2	20	14.2	38	21.1	104	28.5	116	23.4	107	26.5	33	20.2	21	17.9
	4.6-4.7	301	21.8	11	12.1	32	29.4	37	26.2	60	33.3	94	25.8	67	13.5	92	22.8	19	11.7	11	9.4
	4.8-4.9	215	15.6	27	29.7	31	28.4	47	33.3	36	20.0	42	11.5	32	6.5	32	7.9	10	6.1	6	5.1
	5.0-5.1	96	6.9	22	24.2	22	20.2	16	11.3	14	7.8	12	3.3	10	2.0	8	2.0	4	2.5	2	1.7
	5.2g/dL以上	47	3.4	21	23.1	9	8.3	8	5.7	4	2.2	1	0.3	4	0.8	3	0.7	2	1.2	0	0.0
	(再掲)3.5以下	5	0.4	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	0.8	1	0.2	2	1.2	2	1.7
女性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	175	100.0	138	100.0
	3.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	7	0.4	2	1.9	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0	2	0.4	0	0.0	1	0.6	1	0.7
	3.4-3.5	3	0.2	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	2	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0	1	0.7
	3.6-3.7	12	0.6	1	0.9	1	0.5	0	0	1	0.4	2	0.4	7	1.3	3	0.6	3	1.7	3	2.2
	3.8-3.9	55	2.9	1	0.9	0	0	2	0.7	4	1.5	8	1.6	40	7.3	21	4.1	11	6.3	13	9.4
	4.0-4.1	143	7.5	1	0.9	12	5.5	16	5.7	7	2.6	37	7.6	70	12.8	47	9.3	23	13.1	26	18.8
	4.2-4.3	381	19.9	7	6.6	32	14.7	63	22.3	47	17.3	97	19.8	135	24.6	105	20.7	44	25.1	40	29.0
	4.4-4.5	561	29.2	21	19.8	61	28.0	106	37.5	88	32.4	147	30.0	138	25.1	157	30.9	42	24.0	28	20.3
	4.6-4.7	429	22.4	27	25.5	52	23.9	62	21.9	67	24.6	113	23.1	108	19.7	112	22.0	39	22.3	15	10.9
	4.8-4.9	242	12.6	30	28.3	42	19.3	23	8.1	42	15.4	65	13.3	40	7.3	51	10	9	5.1	10	7.2
	5.0-5.1	73	3.8	12	11.3	13	6.0	10	3.5	14	5.1	17	3.5	7	1.3	11	2.2	3	1.7	1	0.7
	5.2g/dL以上	10	0.5	4	3.8	1	0.5	1	0.4	2	0.7	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	12	0.6	2	1.9	4	1.8	0	0.0	0	0	2	0.4	4	0.7	1	0.2	1	0.6	2	1.4

(25年)

第35表の2 血清アルブミン値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性,
20歳以上

(g/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75-79歳			(再掲) 80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	4.5	0.3	91	4.9	0.3	109	4.8	0.3	141	4.7	0.3	180	4.6	0.3	365	4.5	0.3	496	4.3	0.3	404	4.4	0.3	163	4.3	0.3	117	4.3	0.3
女性	1,918	4.5	0.3	106	4.7	0.4	218	4.5	0.3	283	4.5	0.2	272	4.5	0.3	490	4.5	0.3	549	4.4	0.3	508	4.4	0.3	175	4.4	0.3	138	4.3	0.3

(25年)

第36表の1 ヘモグロビンA1c (NGSP) の分布—ヘモグロビンA1c (NGSP) の区分, 年齢階級別,

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	3,290	100.0	196	100.0	325	100.0	425	100.0	452	100.0	854	100.0	1,038	100.0	906	100.0	591	100.0
	4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	3	0.1	1	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	6	0.2	0	0.0	2	0.6	0	0.0	2	0.4	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0
	4.7-4.8	54	1.6	15	7.7	16	4.9	6	1.4	7	1.5	8	0.9	2	0.2	5	0.6	1	0.2
	4.9-5.0	182	5.5	40	20.4	45	13.8	40	9.4	19	4.2	17	2.0	21	2.0	21	2.3	10	1.7
	5.1-5.2	410	12.5	61	31.1	98	30.2	79	18.6	42	9.3	69	8.1	61	5.9	64	7.1	30	5.1
	5.3	306	9.3	30	15.3	36	11.1	58	13.6	49	10.8	64	7.5	69	6.6	59	6.5	41	6.9
	5.4	334	10.2	13	6.6	43	13.2	61	14.4	67	14.8	69	8.1	81	7.8	68	7.5	45	7.6
	5.5	332	10.1	15	7.7	30	9.2	45	10.6	59	13.1	90	10.5	93	9.0	83	9.2	55	9.3
	5.6	331	10.1	11	5.6	15	4.6	50	11.8	59	13.1	90	10.5	106	10.2	98	10.8	57	9.6
	5.7	269	8.2	5	2.6	20	6.2	20	4.7	46	10.2	78	9.1	100	9.6	79	8.7	61	10.3
	5.8	219	6.7	4	2.0	6	1.8	27	6.4	24	5.3	77	9.0	81	7.8	73	8.1	48	8.1
	5.9	168	5.1	1	0.5	2	0.6	13	3.1	17	3.8	64	7.5	71	6.8	68	7.5	41	6.9
	6.0	132	4.0	0	0.0	3	0.9	7	1.6	17	3.8	39	4.6	66	6.4	50	5.5	41	6.9
	6.1	85	2.6	0	0.0	2	0.6	2	0.5	7	1.5	29	3.4	45	4.3	36	4.0	27	4.6
	6.2	72	2.2	0	0.0	1	0.3	4	0.9	6	1.3	25	2.9	36	3.5	31	3.4	19	3.2
	6.3	47	1.4	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.4	18	2.1	25	2.4	22	2.4	14	2.4
	6.4	53	1.6	0	0.0	0	0.0	2	0.5	3	0.7	16	1.9	32	3.1	21	2.3	19	3.2
	6.5	35	1.1	0	0.0	2	0.6	1	0.2	2	0.4	8	0.9	22	2.1	17	1.9	13	2.2
	6.6-6.7	58	1.8	0	0.0	0	0.0	2	0.5	3	0.7	19	2.2	34	3.3	28	3.1	18	3.0
	6.8-6.9	40	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	12	1.4	27	2.6	22	2.4	13	2.2
	7.0-7.1	36	1.1	0	0.0	1	0.3	1	0.2	4	0.9	12	1.4	18	1.7	18	2.0	7	1.2
	7.2-7.3	22	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	11	1.3	8	0.8	9	1.0	6	1.0
	7.4-7.5	23	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	1.2	13	1.3	10	1.1	8	1.4
	7.6-7.7	16	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.4	7	0.8	5	0.5	7	0.8	4	0.7
	7.8-7.9	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.2	6	0.6	2	0.2	5	0.8
	8.0-8.1	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.4	2	0.2	3	0.3	1	0.2
	8.2-8.3	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	1	0.1	2	0.2	2	0.2	1	0.2
8.4-8.5	8	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	4	0.5	1	0.1	1	0.1	1	0.2	
8.6-8.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	2	0.3	
8.8-8.9	3	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	
9.0-9.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	
9.2-9.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.4%以上	20	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.1	8	0.9	7	0.7	6	0.7	3	0.5	
男 性	総数	1,380	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	494	100.0	403	100.0	279	100.0
	4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	4	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	4.7-4.8	27	2.0	9	9.9	8	7.3	0	0.0	5	2.8	3	0.8	2	0.4	2	0.5	1	0.4
	4.9-5.0	83	6.0	21	23.1	17	15.6	18	12.8	9	5.0	11	3.0	7	1.4	11	2.7	1	0.4
	5.1-5.2	184	13.3	29	31.9	39	35.8	29	20.6	18	10.0	36	9.9	33	6.7	33	8.2	18	6.5
	5.3	118	8.6	12	13.2	8	7.3	22	15.6	13	7.2	31	8.5	32	6.5	31	7.7	19	6.8
	5.4	118	8.6	6	6.6	10	9.2	14	9.9	34	18.9	22	6.0	32	6.5	25	6.2	16	5.7
	5.5	134	9.7	5	5.5	11	10.1	14	9.9	24	13.3	38	10.4	42	8.5	35	8.7	26	9.3
	5.6	132	9.6	7	7.7	2	1.8	21	14.9	19	10.6	32	8.8	51	10.3	46	11.4	26	9.3
	5.7	104	7.5	1	1.1	7	6.4	7	5.0	14	7.8	33	9.0	42	8.5	29	7.2	26	9.3
	5.8	74	5.4	1	1.1	2	1.8	5	3.5	6	3.3	25	6.8	35	7.1	29	7.2	19	6.8
	5.9	69	5.0	0	0.0	1	0.9	2	1.4	6	3.3	23	6.3	37	7.5	27	6.7	18	6.5
	6.0	52	3.8	0	0.0	1	0.9	1	0.7	9	5.0	14	3.8	27	5.5	17	4.2	19	6.8
	6.1	37	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	13	3.6	23	4.7	16	4.0	16	5.7
	6.2	31	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	2.2	11	3.0	15	3.0	11	2.7	10	3.6
	6.3	24	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	9	2.5	13	2.6	6	1.5	11	3.9
	6.4	30	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	21	4.3	11	2.7	13	4.7
	6.5	15	1.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.6	4	1.1	9	1.8	7	1.7	6	2.2
	6.6-6.7	37	2.7	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.6	11	3.0	23	4.7	19	4.7	11	3.9
	6.8-6.9	24	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	6	1.6	17	3.4	14	3.5	7	2.5
	7.0-7.1	20	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	7	1.9	11	2.2	12	3.0	4	1.4
	7.2-7.3	10	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	4	1.1	4	0.8	5	1.2	2	0.7
	7.4-7.5	10	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	5	1.0	4	1.0	3	1.1
	7.6-7.7	11	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	1.1	4	1.1	3	0.6	4	1.0	2	0.7
	7.8-7.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.2	2	0.5	0	0.0
	8.0-8.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	2	0.5	1	0.4
	8.2-8.3	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.4
8.4-8.5	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.4	
8.6-8.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.4	
8.8-8.9	1	0.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.2-9.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.4%以上	13	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	7	1.9	3	0.6	3	0.7	1	0.4	

人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,910	100.0	105	100.0	216	100.0	284	100.0	272	100.0	489	100.0	544	100.0	503	100.0	312	100.0
4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	2	0.1	1	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	2	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.7-4.8	27	1.4	6	5.7	8	3.7	6	2.1	2	0.7	5	1.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0
4.9-5.0	99	5.2	19	18.1	28	13.0	22	7.7	10	3.7	6	1.2	14	2.6	10	2.0	9	2.9
5.1-5.2	226	11.8	32	30.5	59	27.3	50	17.6	24	8.8	33	6.7	28	5.1	31	6.2	12	3.8
5.3	188	9.8	18	17.1	28	13.0	36	12.7	36	13.2	33	6.7	37	6.8	28	5.6	22	7.1
5.4	216	11.3	7	6.7	33	15.3	47	16.5	33	12.1	47	9.6	49	9.0	43	8.5	29	9.3
5.5	198	10.4	10	9.5	19	8.8	31	10.9	35	12.9	52	10.6	51	9.4	48	9.5	29	9.3
5.6	199	10.4	4	3.8	13	6.0	29	10.2	40	14.7	58	11.9	55	10.1	52	10.3	31	9.9
5.7	165	8.6	4	3.8	13	6.0	13	4.6	32	11.8	45	9.2	58	10.7	50	9.9	35	11.2
5.8	145	7.6	3	2.9	4	1.9	22	7.7	18	6.6	52	10.6	46	8.5	44	8.7	29	9.3
5.9	99	5.2	1	1.0	1	0.5	11	3.9	11	4.0	41	8.4	34	6.3	41	8.2	23	7.4
6.0	80	4.2	0	0.0	2	0.9	6	2.1	8	2.9	25	5.1	39	7.2	33	6.6	22	7.1
6.1	48	2.5	0	0.0	2	0.9	2	0.7	6	2.2	16	3.3	22	4.0	20	4.0	11	3.5
6.2	41	2.1	0	0.0	1	0.5	3	1.1	2	0.7	14	2.9	21	3.9	20	4.0	9	2.9
6.3	23	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	9	1.8	12	2.2	16	3.2	3	1.0
6.4	23	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	1.1	7	1.4	11	2.0	10	2.0	6	1.9
6.5	20	1.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	1	0.4	4	0.8	13	2.4	10	2.0	7	2.2
6.6-6.7	21	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	8	1.6	11	2.0	9	1.8	7	2.2
6.8-6.9	16	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.2	10	1.8	8	1.6	6	1.9
7.0-7.1	16	0.8	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	1.1	5	1.0	7	1.3	6	1.2	3	1.0
7.2-7.3	12	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	7	1.4	4	0.7	4	0.8	4	1.3
7.4-7.5	13	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.0	8	1.5	6	1.2	5	1.6
7.6-7.7	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	2	0.4	3	0.6	2	0.6
7.8-7.9	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	5	0.9	0	0.0	5	1.6
8.0-8.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0
8.2-8.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
8.4-8.5	4	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0
8.6-8.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
8.8-8.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
9.0-9.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4%以上	7	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.2	4	0.7	3	0.6	2	0.6

(25年)

第36表の2 ヘモグロビンA1c (NGSP) の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	3,290	5.7	0.7	196	5.2	0.3	325	5.3	0.4	425	5.5	0.4	452	5.6	0.7	854	5.8	0.8	1,038	5.9	0.7	906	5.9	0.7	591	5.9	0.7
男性	1,380	5.7	0.8	91	5.2	0.2	109	5.3	0.5	141	5.5	0.5	180	5.7	0.9	365	5.9	1.0	494	5.9	0.7	403	5.9	0.8	279	5.9	0.6
女性	1,910	5.7	0.6	105	5.2	0.3	216	5.3	0.4	284	5.4	0.4	272	5.6	0.6	489	5.8	0.6	544	5.9	0.7	503	5.9	0.7	312	5.9	0.7

(25年)

第 36 表の 3 ヘモグロビン A1c (NGSP) の分布—ヘモグロビン A1c (NGSP) の区分, 年齢階級別,

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3068	100.0	195	100.0	322	100.0	419	100.0	430	100.0	788	100.0	914	100.0	812	100.0	518	100.0
	4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	3	0.1	1	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	6	0.2	0	0.0	2	0.6	0	0.0	2	0.5	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0
	4.7-4.8	53	1.7	15	7.7	16	5.0	6	1.4	7	1.6	7	0.9	2	0.2	5	0.6	1	0.2
	4.9-5.0	181	5.9	40	20.5	45	14.0	40	9.5	18	4.2	17	2.2	21	2.3	21	2.6	10	1.9
	5.1-5.2	408	13.3	60	30.8	97	30.1	79	18.9	42	9.8	69	8.8	61	6.7	64	7.9	30	5.8
	5.3	306	10.0	30	15.4	36	11.2	58	13.8	49	11.4	64	8.1	69	7.5	59	7.3	41	7.9
	5.4	333	10.9	13	6.7	43	13.4	61	14.6	67	15.6	68	8.6	81	8.9	67	8.3	45	8.7
	5.5	332	10.8	15	7.7	30	9.3	45	10.7	59	13.7	90	11.4	93	10.2	83	10.2	55	10.6
	5.6	328	10.7	11	5.6	15	4.7	50	11.9	59	13.7	89	11.3	104	11.4	95	11.7	57	11.0
	5.7	266	8.7	5	2.6	20	6.2	20	4.8	46	10.7	78	9.9	97	10.6	77	9.5	60	11.6
	5.8	214	7.0	4	2.1	6	1.9	27	6.4	23	5.3	74	9.4	80	8.8	72	8.9	47	9.1
	5.9	162	5.3	1	0.5	2	0.6	12	2.9	17	4.0	62	7.9	68	7.4	66	8.1	39	7.5
	6.0	125	4.1	0	0.0	2	0.6	7	1.7	16	3.7	39	4.9	61	6.7	50	6.2	36	6.9
	6.1	77	2.5	0	0.0	2	0.6	2	0.5	7	1.6	28	3.6	38	4.2	30	3.7	25	4.8
	6.2	58	1.9	0	0.0	1	0.3	3	0.7	4	0.9	23	2.9	27	3.0	24	3.0	15	2.9
	6.3	37	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.5	17	2.2	17	1.9	18	2.2	9	1.7
	6.4	36	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.5	11	1.4	21	2.3	15	1.8	11	2.1
	6.5	24	0.8	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	5	0.6	17	1.9	13	1.6	9	1.7
	6.6-6.7	34	1.1	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.5	14	1.8	16	1.8	14	1.7	10	1.9
	6.8-6.9	23	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	8	1.0	14	1.5	15	1.8	5	1.0
	7.0-7.1	20	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.5	8	1.0	9	1.0	11	1.4	2	0.4
	7.2-7.3	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	4	0.4	2	0.2	3	0.6
7.4-7.5	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	3	0.3	1	0.1	2	0.4	
7.6-7.7	6	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	0.3	2	0.2	3	0.4	1	0.2	
7.8-7.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.3	1	0.1	2	0.4	
8.0-8.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8.2-8.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	
8.4-8.5	3	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8.6-8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8.8-8.9	1	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.4%以上	13	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	6	0.8	5	0.5	4	0.5	3	0.6	
男 性	総 数	1,252	100.0	91	100.0	108	100.0	138	100.0	167	100.0	326	100.0	422	100.0	350	100.0	236	100.0
	4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	4	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.2	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
	4.7-4.8	27	2.2	9	9.9	8	7.4	0	0.0	5	3.0	3	0.9	2	0.5	2	0.6	1	0.4
	4.9-5.0	82	6.5	21	23.1	17	15.7	18	13.0	8	4.8	11	3.4	7	1.7	11	3.1	1	0.4
	5.1-5.2	184	14.7	29	31.9	39	36.1	29	21.0	18	10.8	36	11.0	33	7.8	33	9.4	18	7.6
	5.3	118	9.4	12	13.2	8	7.4	22	15.9	13	7.8	31	9.5	32	7.6	31	8.9	19	8.1
	5.4	117	9.3	6	6.6	10	9.3	14	10.1	34	20.4	21	6.4	32	7.6	24	6.9	16	6.8
	5.5	134	10.7	5	5.5	11	10.2	14	10.1	24	14.4	38	11.7	42	10.0	35	10.0	26	11.0
	5.6	130	10.4	7	7.7	2	1.9	21	15.2	19	11.4	31	9.5	50	11.8	44	12.6	26	11.0
	5.7	102	8.1	1	1.1	7	6.5	7	5.1	14	8.4	33	10.1	40	9.5	27	7.7	26	11.0
	5.8	70	5.6	1	1.1	2	1.9	5	3.6	5	3.0	23	7.1	34	8.1	29	8.3	18	7.6
	5.9	64	5.1	0	0.0	1	0.9	2	1.4	6	3.6	21	6.4	34	8.1	25	7.1	16	6.8
	6.0	49	3.9	0	0.0	1	0.9	1	0.7	9	5.4	14	4.3	24	5.7	17	4.9	16	6.8
	6.1	32	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	12	3.7	19	4.5	12	3.4	15	6.4
	6.2	23	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	10	3.1	11	2.6	9	2.6	7	3.0
	6.3	19	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	8	2.5	9	2.1	4	1.1	8	3.4
	6.4	20	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.8	14	3.3	8	2.3	8	3.4
	6.5	9	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	8	1.9	4	1.1	5	2.1
	6.6-6.7	23	1.8	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.6	10	3.1	10	2.4	10	2.9	6	2.5
	6.8-6.9	13	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	4	1.2	8	1.9	9	2.6	2	0.8
	7.0-7.1	9	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	0.9	5	1.2	7	2.0	0	0.0
	7.2-7.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
7.4-7.5	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	1	0.3	1	0.4	
7.6-7.7	4	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.6	0	0.0	
7.8-7.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	
8.0-8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8.2-8.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	
8.4-8.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8.6-8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8.8-8.9	1	0.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.4%以上	8	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	5	1.5	2	0.5	2	0.6	1	0.4	

人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,816	100.0	104	100.0	214	100.0	281	100.0	263	100.0	462	100.0	492	100.0	462	100.0	282	100.0
女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.2%以下	2	0.1	1	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	2	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	26	1.4	6	5.8	8	3.7	6	2.1	2	0.8	4	0.9	0	0.0	3	0.6	0	0.0
4.7-4.8	99	5.5	19	18.3	28	13.1	22	7.8	10	3.8	6	1.3	14	2.8	10	2.2	9	3.2
4.9-5.0	224	12.3	31	29.8	58	27.1	50	17.8	24	9.1	33	7.1	28	5.7	31	6.7	12	4.3
5.1-5.2	188	10.4	18	17.3	28	13.1	36	12.8	36	13.7	33	7.1	37	7.5	28	6.1	22	7.8
5.3	216	11.9	7	6.7	33	15.4	47	16.7	33	12.5	47	10.2	49	10.0	43	9.3	29	10.3
5.4	198	10.9	10	9.6	19	8.9	31	11.0	35	13.3	52	11.3	51	10.4	48	10.4	29	10.3
5.5	198	10.9	4	3.8	13	6.1	29	10.3	40	15.2	58	12.6	54	11.0	51	11.0	31	11.0
5.6	164	9.0	4	3.8	13	6.1	13	4.6	32	12.2	45	9.7	57	11.6	50	10.8	34	12.1
5.7	144	7.9	3	2.9	4	1.9	22	7.8	18	6.8	51	11.0	46	9.3	43	9.3	29	10.3
5.8	98	5.4	1	1.0	1	0.5	10	3.6	11	4.2	41	8.9	34	6.9	41	8.9	23	8.2
5.9	76	4.2	0	0.0	1	0.5	6	2.1	7	2.7	25	5.4	37	7.5	33	7.1	20	7.1
6.0	45	2.5	0	0.0	2	0.9	2	0.7	6	2.3	16	3.5	19	3.9	18	3.9	10	3.5
6.1	35	1.9	0	0.0	1	0.5	3	1.1	2	0.8	13	2.8	16	3.3	15	3.2	8	2.8
6.2	18	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	9	1.9	8	1.6	14	3.0	1	0.4
6.3	16	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.8	5	1.1	7	1.4	7	1.5	3	1.1
6.4	15	0.8	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	4	0.9	9	1.8	9	1.9	4	1.4
6.5	11	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	0.9	6	1.2	4	0.9	4	1.4
6.6-6.7	10	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	6	1.2	6	1.3	3	1.1
6.8-6.9	11	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	5	1.1	4	0.8	4	0.9	2	0.7
7.0-7.1	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	3	0.6	1	0.2	3	1.1
7.2-7.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4
7.4-7.5	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.4
7.6-7.7	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.4	0	0.0	2	0.7
7.8-7.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.0-8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.2-8.3	2	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.4-8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.6-8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4%以上	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.2	3	0.6	2	0.4	2	0.7

注)インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外。

(25年)

第36表の4 ヘモグロビンA1c (NGSP) の平均値及び標準偏差一年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－全国，男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	3,068	5.6	0.6	195	5.2	0.3	322	5.3	0.4	419	5.4	0.4	430	5.6	0.6	788	5.7	0.7	914	5.8	0.6	812	5.8	0.6	518	5.8	0.6
男性	1,252	5.6	0.7	91	5.2	0.2	108	5.3	0.4	138	5.4	0.4	167	5.6	0.7	326	5.8	0.9	422	5.8	0.6	350	5.8	0.7	236	5.8	0.5
女性	1,816	5.6	0.5	104	5.2	0.3	214	5.3	0.4	281	5.4	0.3	263	5.6	0.5	462	5.7	0.5	492	5.8	0.6	462	5.7	0.5	282	5.8	0.6

注)インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外。

(25年)

第 37 表の 1 血糖値の分布－血糖値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総 数	1,037	100.0	69	100.0	79	100.0	115	100.0	142	100.0	272	100.0	360	100.0	295	100.0	206	100.0	
男 性	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0
	60-79	50	4.8	7	10.1	6	7.6	5	4.3	3	2.1	14	5.1	15	4.2	10	3.4	10	4.9
	80-99	560	54.0	52	75.4	59	74.7	87	75.7	91	64.1	133	48.9	138	38.3	134	45.4	73	35.4
	100-119	265	25.6	9	13.0	9	11.4	20	17.4	34	23.9	75	27.6	118	32.8	90	30.5	69	33.5
	120-139	74	7.1	1	1.4	2	2.5	1	0.9	7	4.9	19	7.0	44	12.2	28	9.5	25	12.1
	140-159	30	2.9	0	0.0	2	2.5	1	0.9	1	0.7	6	2.2	20	5.6	13	4.4	11	5.3
	160-179	17	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7	5	1.8	10	2.8	10	3.4	5	2.4
	180-199	7	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	1.5	2	0.6	3	1.0	1	0.5
	200-219	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	5	1.4	1	0.3	5	2.4
	220-239	7	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	1.5	2	0.6	2	0.7	2	1.0
	240-259	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.6	0	0.0	2	1.0
	260mg/dL以上	15	1.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0	3	2.1	7	2.6	4	1.1	3	1.0	3	1.5
	(再掲)110以上	247	23.8	3	4.3	5	6.3	7	6.1	24	16.9	68	25.0	140	38.9	91	30.8	85	41.3
総 数	1,363	100.0	79	100.0	144	100.0	210	100.0	204	100.0	338	100.0	388	100.0	360	100.0	219	100.0	
女 性	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-79	56	4.1	13	16.5	7	4.9	11	5.2	11	5.4	9	2.7	5	1.3	8	2.2	2	0.9
	80-99	769	56.4	57	72.2	121	84.0	155	73.8	122	59.8	170	50.3	144	37.1	155	43.1	76	34.7
	100-119	367	26.9	9	11.4	11	7.6	37	17.6	55	27.0	114	33.7	141	36.3	137	38.1	73	33.3
	120-139	88	6.5	0	0.0	3	2.1	6	2.9	8	3.9	26	7.7	45	11.6	29	8.1	32	14.6
	140-159	40	2.9	0	0.0	1	0.7	1	0.5	4	2.0	9	2.7	25	6.4	17	4.7	14	6.4
	160-179	13	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	2	0.6	8	2.1	4	1.1	6	2.7
	180-199	9	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	5	1.3	5	1.4	4	1.8
	200-219	8	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.1	1	0.3	7	3.2
	220-239	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	0.9
	240-259	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260mg/dL以上	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	5	1.3	4	1.1	3	1.4
	(再掲)110以上	291	21.3	1	1.3	6	4.2	17	8.1	33	16.2	80	23.7	154	39.7	108	30.0	97	44.3

(25年)

第 37 表の 2 血糖値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,037	106.3	39.6	69	91.0	10.0	79	95.2	25.1	115	93.9	12.7	142	102.9	36.8	272	112.3	56.4	360	112.3	34.7	295	109.3	37.0	206	115.1	40.1
女性	1,363	102.4	25.8	79	89.3	9.4	144	91.1	10.9	210	93.8	11.3	204	99.2	19.2	338	104.7	26.7	388	113.6	33.7	360	108.1	28.5	219	117.1	37.5

(25年)

第37表の3 血糖値の分布－血糖値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	939	100.0	69	100.0	78	100.0	112	100.0	133	100.0	243	100.0	304	100.0	253	100.0	174	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	60-79	50	5.3	7	10.1	6	7.7	5	4.5	3	2.3	14	5.8	15	4.9	10	4.0	10	5.7
	80-99	544	57.9	52	75.4	59	75.6	85	75.9	89	66.9	129	53.1	130	42.8	126	49.8	70	40.2
	100-119	241	25.7	9	13.0	9	11.5	20	17.9	32	24.1	68	28.0	103	33.9	80	31.6	61	35.1
	120-139	60	6.4	1	1.4	2	2.6	1	0.9	6	4.5	16	6.6	34	11.2	20	7.9	21	12.1
	140-159	18	1.9	0	0.0	1	1.3	1	0.9	1	0.8	4	1.6	11	3.6	8	3.2	5	2.9
	160-179	7	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	0.8	4	1.3	5	2.0	1	0.6
	180-199	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	0.4	1	0.6
	200-219	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	0	0.0	3	1.7
	220-239	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.6
	240-259	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260mg/dL以上	9	1.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.8	6	2.5	1	0.3	2	0.8	1	0.6
	(再掲)110以上	175	18.6	3	4.3	4	5.1	6	5.4	19	14.3	46	18.9	97	31.9	61	24.1	58	33.3
女性	総数	1,298	100.0	79	100.0	142	100.0	208	100.0	198	100.0	323	100.0	348	100.0	334	100.0	194	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-79	56	4.3	13	16.5	7	4.9	11	5.3	11	5.6	9	2.8	5	1.4	8	2.4	2	1.0
	80-99	762	58.7	57	72.2	120	84.5	154	74.0	122	61.6	169	52.3	140	40.2	153	45.8	73	37.6
	100-119	352	27.1	9	11.4	10	7.0	36	17.3	52	26.3	111	34.4	134	38.5	128	38.3	72	37.1
	120-139	76	5.9	0	0.0	3	2.1	6	2.9	7	3.5	24	7.4	36	10.3	25	7.5	26	13.4
	140-159	29	2.2	0	0.0	1	0.7	1	0.5	4	2.0	6	1.9	17	4.9	13	3.9	8	4.1
	160-179	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.6	4	1.1	3	0.9	3	1.5
	180-199	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	0.9	3	0.9	2	1.0
	200-219	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0	0.0	5	2.6
	220-239	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5
	240-259	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	1	0.3	2	1.0
	(再掲)110以上	242	18.6	1	1.3	6	4.2	17	8.2	28	14.1	69	21.4	121	34.8	89	26.6	76	39.2

注)インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外。

(25年)

第37表の4 血糖値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	2,237	100.7	26.8	148	90.1	9.7	220	92.3	17.0	320	93.6	11.2	331	98.4	22.2	566	103.5	36.1	652	108.1	27.5	587	104.7	27.0	368	109.9	31.2
男性	939	101.6	33.4	69	91.0	10.0	78	94.5	24.4	112	93.3	11.0	133	98.6	27.6	243	106.2	51.5	304	106.6	26.0	253	104.5	33.5	174	107.5	29.8
女性	1,298	100.0	20.7	79	89.3	9.4	142	91.1	11.0	208	93.7	11.4	198	98.2	17.9	323	101.5	16.9	348	109.4	28.8	334	104.8	20.9	194	112.1	32.3

注)インスリン注射または血糖を下げる薬の使用者除外。

(25年)

第 38 表の 1 血清総コレステロール値の分布－血清総コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男 性	総 数	1,382	100	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	1,065	100.0	404	100.0	280	100.0
	120mg/dL未満	8	1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	6	1.2	6	0.6	0	0.0	6	2.1
	120-139	45	3	4	4.4	2	1.8	1	0.7	3	1.7	8	2.2	27	5.4	29	2.7	12	3.0	18	6.4
	140-159	131	10	16	17.6	7	6.4	10	7.1	11	6.1	30	8.2	57	11.5	94	8.8	39	9.7	37	13.2
	160-179	251	18	30	33.0	17	15.6	25	17.7	24	13.3	59	16.2	96	19.4	179	16.8	72	17.8	51	18.2
	180-199	339	25	19	20.9	29	26.6	34	24.1	45	25.0	84	23.0	128	25.8	257	24.1	93	23.0	75	26.8
	200-219	276	20	10	11.0	24	22.0	28	19.9	39	21.7	82	22.5	93	18.8	221	20.8	86	21.3	52	18.6
	220-239	190	14	5	5.5	17	15.6	21	14.9	31	17.2	57	15.6	59	11.9	159	14.9	61	15.1	28	10.0
	240-259	88	6	4	4.4	11	10.1	10	7.1	19	10.6	25	6.8	19	3.8	72	6.8	27	6.7	8	2.9
	260-279	31	2	2	2.2	2	1.8	4	2.8	4	2.2	15	4.1	4	0.8	27	2.5	9	2.2	1	0.4
	280-299	14	1	0	0.0	0	0.0	3	2.1	1	0.6	4	1.1	6	1.2	13	1.2	4	1.0	4	1.4
	300mg/dL以上	9	1	1	1.1	0	0.0	4	2.8	2	1.1	1	0.3	1	0.2	8	0.8	1	0.2	0	0.0
女 性	総 数	1,918	100	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	1,456	100.0	508	100.0	313	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	32	1.7	6	5.7	10	4.6	6	2.1	3	1.1	0	0.0	7	1.3	14	1.0	4	0.8	3	1.0
	140-159	114	5.9	17	16.0	28	12.8	22	7.8	5	1.8	16	3.3	26	4.7	60	4.1	16	3.1	21	6.7
	160-179	285	14.9	34	32.1	54	24.8	55	19.4	17	6.3	45	9.2	80	14.6	179	12.3	61	12.0	48	15.3
	180-199	399	20.8	23	21.7	56	25.7	74	26.1	41	15.1	79	16.1	126	23.0	289	19.8	104	20.5	70	22.4
	200-219	432	22.5	13	12.3	31	14.2	71	25.1	63	23.2	122	24.9	132	24.0	344	23.6	124	24.4	77	24.6
	220-239	333	17.4	10	9.4	25	11.5	31	11.0	64	23.5	105	21.4	98	17.9	280	19.2	99	19.5	58	18.5
	240-259	179	9.3	1	0.9	5	2.3	17	6.0	45	16.5	65	13.3	46	8.4	168	11.5	59	11.6	18	5.8
	260-279	91	4.7	0	0.0	2	0.9	6	2.1	25	9.2	34	6.9	24	4.4	80	5.5	28	5.5	14	4.5
	280-299	25	1.3	1	0.9	4	1.8	1	0.4	4	1.5	10	2.0	5	0.9	19	1.3	6	1.2	2	0.6
	300mg/dL以上	28	1.5	1	0.9	3	1.4	0	0.0	5	1.8	14	2.9	5	0.9	23	1.6	7	1.4	2	0.6

(25年)

第 38 表の 2 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕
(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	3,300	203	35.4	197	184	34.8	327	193	34.2	424	199	32.6	452	215	33.5	855	212	36.0	1,045	199	33.8	2,521	206	34.9	912	206	33.7	593	196	33.9
男性	1,382	197	34.2	91	184	36.4	109	200	30.4	141	204	38.4	180	205	33.0	365	201	33.0	496	190	32.8	1,065	199	34.1	404	198	32.3	280	187	33.2
女性	1,918	207	35.6	106	183	33.5	218	190	35.6	283	197	29.1	272	221	32.2	490	220	36.2	549	207	32.8	1,456	212	34.4	508	212	33.3	313	204	32.4

(25年)

第38表の3 血清総コレステロール値の分布－血清総コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,176	100.0	91	100.0	109	100.0	136	100.0	155	100.0	298	100.0	387	100.0	879	100.0	312	100.0	221	100.0
	120mg/dL未満	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	4	1.0	4	0.5	0	0.0	4	1.8
	120-139	36	3.1	4	4.4	2	1.8	1	0.7	3	1.9	6	2.0	20	5.2	22	2.5	7	2.2	14	6.3
	140-159	98	8.3	16	17.6	7	6.4	9	6.6	9	5.8	21	7.0	36	9.3	64	7.3	23	7.4	26	11.8
	160-179	197	16.8	30	33.0	17	15.6	24	17.6	18	11.6	38	12.8	70	18.1	129	14.7	46	14.7	38	17.2
	180-199	292	24.8	19	20.9	29	26.6	33	24.3	39	25.2	69	23.2	103	26.6	215	24.5	67	21.5	65	29.4
	200-219	243	20.7	10	11.0	24	22.0	27	19.9	34	21.9	70	23.5	78	20.2	190	21.6	78	25.0	40	18.1
	220-239	174	14.8	5	5.5	17	15.6	21	15.4	27	17.4	52	17.4	52	13.4	144	16.4	54	17.3	24	10.9
	240-259	83	7.1	4	4.4	11	10.1	10	7.4	19	12.3	23	7.7	16	4.1	68	7.7	24	7.7	7	3.2
	260-279	28	2.4	2	2.2	2	1.8	4	2.9	3	1.9	14	4.7	3	0.8	24	2.7	9	2.9	0	0.0
	280-299	12	1.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	1	0.6	4	1.3	4	1.0	12	1.4	3	1.0	3	1.4
	300mg/dL以上	8	0.7	1	1.1	0	0.0	4	2.9	1	0.6	1	0.3	1	0.3	7	0.8	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,593	100.0	105	100.0	216	100.0	279	100.0	249	100.0	374	100.0	370	100.0	1,176	100.0	353	100.0	216	100.0
	120mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	28	1.8	6	5.7	10	4.6	6	2.2	3	1.2	0	0.0	3	0.8	12	1.0	3	0.8	0	0.0
	140-159	92	5.8	17	16.2	28	13.0	22	7.9	3	1.2	8	2.1	14	3.8	39	3.3	6	1.7	13	6.0
	160-179	227	14.2	33	31.4	54	25.0	53	19.0	14	5.6	25	6.7	48	13.0	131	11.1	31	8.8	33	15.3
	180-199	332	20.8	23	21.9	56	25.9	74	26.5	36	14.5	55	14.7	88	23.8	228	19.4	66	18.7	53	24.5
	200-219	342	21.5	13	12.4	29	13.4	69	24.7	56	22.5	90	24.1	85	23.0	269	22.9	88	24.9	51	23.6
	220-239	280	17.6	10	9.5	25	11.6	31	11.1	60	24.1	85	22.7	69	18.6	233	19.8	76	21.5	39	18.1
	240-259	159	10.0	1	1.0	5	2.3	17	6.1	44	17.7	57	15.2	35	9.5	150	12.8	46	13.0	13	6.0
	260-279	86	5.4	0	0.0	2	0.9	6	2.2	25	10.0	32	8.6	21	5.7	76	6.5	26	7.4	12	5.6
	280-299	21	1.3	1	1.0	4	1.9	1	0.4	3	1.2	8	2.1	4	1.1	16	1.4	5	1.4	1	0.5
	300mg/dL以上	26	1.6	1	1.0	3	1.4	0	0.0	5	2.0	14	3.7	3	0.8	22	1.9	6	1.7	1	0.5

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。(25年)

第38表の4 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕
(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,176	198.7	34.0	91	183.8	36.4	109	200.3	30.4	136	205.6	37.7	155	205.5	32.8	298	204.4	33.0	387	192.4	32.1	879	202.0	33.8	312	202.3	31.6	221	187.6	32.3
女性	1,593	208.6	36.3	105	183.3	33.7	216	189.7	35.7	279	196.7	29.2	249	223.1	31.9	374	224.8	36.4	370	209.5	32.7	1,176	214.7	34.9	353	217.8	33.2	216	205.3	31.7

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。(25年)

第 39 表の 1 血清 HDL コレステロール値の分布—血清 HDL コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	1,065	100.0	404	100.0	280	100.0
	30mg/dL未満	11	0.8	1	1.1	4	3.7	1	0.7	1	0.6	2	0.5	2	0.4	5	0.5	2	0.5	1	0.4
	30-39	159	11.5	7	7.7	9	8.3	15	10.6	15	8.3	46	12.6	67	13.5	127	11.9	49	12.1	41	14.6
	40-49	345	25.0	18	19.8	29	26.6	38	27.0	43	23.9	78	21.4	139	28.0	261	24.5	108	26.7	71	25.4
	50-59	388	28.1	31	34.1	27	24.8	42	29.8	55	30.6	96	26.3	137	27.6	298	28.0	98	24.3	85	30.4
	60-69	253	18.3	19	20.9	22	20.2	29	20.6	32	17.8	77	21.1	74	14.9	193	18.1	85	21.0	40	14.3
	70-79	131	9.5	10	11.0	10	9.2	8	5.7	24	13.3	42	11.5	37	7.5	104	9.8	33	8.2	21	7.5
	80-89	65	4.7	4	4.4	7	6.4	6	4.3	6	3.3	16	4.4	26	5.2	50	4.7	19	4.7	14	5.0
	90-99	18	1.3	0	0.0	1	0.9	1	0.7	3	1.7	4	1.1	9	1.8	16	1.5	5	1.2	5	1.8
	100mg/dL以上	12	0.9	1	1.1	0	0.0	1	0.7	1	0.6	4	1.1	5	1.0	11	1.0	5	1.2	2	0.7
女性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	1,456	100.0	508	100.0	313	100.0
	30mg/dL未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.2	1	0.2	3	0.2	2	0.4	0	0.0
	30-39	64	3.3	0	0.0	3	1.4	4	1.4	6	2.2	25	5.1	26	4.7	53	3.6	21	4.1	19	6.1
	40-49	221	11.5	8	7.5	17	7.8	17	6.0	25	9.2	67	13.7	87	15.8	170	11.7	76	15.0	55	17.6
	50-59	434	22.6	23	21.7	47	21.6	67	23.7	47	17.3	104	21.2	146	26.6	328	22.5	127	25.0	83	26.5
	60-69	522	27.2	34	32.1	67	30.7	86	30.4	75	27.6	119	24.3	141	25.7	380	26.1	115	22.6	80	25.6
	70-79	368	19.2	21	19.8	47	21.6	59	20.8	58	21.3	92	18.8	91	16.6	281	19.3	99	19.5	48	15.3
	80-89	171	8.9	16	15.1	26	11.9	28	9.9	29	10.7	40	8.2	32	5.8	126	8.7	39	7.7	16	5.1
	90-99	93	4.8	2	1.9	6	2.8	16	5.7	21	7.7	29	5.9	19	3.5	82	5.6	21	4.1	10	3.2
	100mg/dL以上	42	2.2	2	1.9	5	2.3	6	2.1	10	3.7	13	2.7	6	1.1	33	2.3	8	1.6	2	0.6

(25年)

第 39 表の 2 血清 HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	55.5	14.6	91	56.2	13.3	109	55.2	14.5	141	54.6	13.1	180	56.4	13.8	365	56.5	15.1	496	54.6	15.1	1,065	55.7	14.9	404	55.5	15.2	280	54.5	15.0
女性	1,918	65.1	15.5	106	66.8	12.9	218	67.0	14.1	283	67.4	14.8	272	68.3	16.2	490	64.7	16.7	549	61.6	14.5	1,456	65.2	15.8	508	63.2	15.0	313	60.2	14.2

(25年)

第39表の3 血清HDLコレステロール値の分布—血清HDLコレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,176	100.0	91	100.0	109	100.0	136	100.0	155	100.0	298	100.0	387	100.0	879	100.0	312	100.0	221	100.0
	30mg/dL未満	10	0.9	1	1.1	4	3.7	1	0.7	1	0.6	2	0.7	1	0.3	5	0.6	2	0.6	0	0.0
	30-39	132	11.2	7	7.7	9	8.3	14	10.3	15	9.7	37	12.4	50	12.9	102	11.6	36	11.5	33	14.9
	40-49	287	24.4	18	19.8	29	26.6	37	27.2	37	23.9	59	19.8	107	27.6	210	23.9	79	25.3	55	24.9
	50-59	334	28.4	31	34.1	27	24.8	41	30.1	45	29.0	81	27.2	109	28.2	250	28.4	80	25.6	68	30.8
	60-69	212	18.0	19	20.9	22	20.2	28	20.6	28	18.1	58	19.5	57	14.7	155	17.6	62	19.9	30	13.6
	70-79	117	9.9	10	11.0	10	9.2	7	5.1	20	12.9	39	13.1	31	8.0	91	10.4	28	9.0	18	8.1
	80-89	58	4.9	4	4.4	7	6.4	6	4.4	5	3.2	14	4.7	22	5.7	43	4.9	17	5.4	12	5.4
	90-99	15	1.3	0	0.0	1	0.9	1	0.7	3	1.9	4	1.3	6	1.6	13	1.5	4	1.3	3	1.4
	100mg/dL以上	11	0.9	1	1.1	0	0.0	1	0.7	1	0.6	4	1.3	4	1.0	10	1.1	4	1.3	2	0.9
女性	総数	1,593	100.0	105	100.0	216	100.0	279	100.0	249	100.0	374	100.0	370	100.0	1,176	100.0	353	100.0	216	100.0
	30mg/dL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	2	0.2	1	0.3	0	0.0
	30-39	50	3.1	0	0.0	3	1.4	4	1.4	5	2.0	17	4.5	21	5.7	41	3.5	17	4.8	15	6.9
	40-49	176	11.0	8	7.6	17	7.9	17	6.1	25	10.0	46	12.3	63	17.0	133	11.3	52	14.7	41	19.0
	50-59	351	22.0	23	21.9	47	21.8	65	23.3	43	17.3	78	20.9	95	25.7	254	21.6	86	24.4	57	26.4
	60-69	445	27.9	34	32.4	66	30.6	84	30.1	64	25.7	98	26.2	99	26.8	315	26.8	83	23.5	58	26.9
	70-79	308	19.3	21	20.0	46	21.3	59	21.1	53	21.3	70	18.7	59	15.9	230	19.6	72	20.4	28	13.0
	80-89	146	9.2	15	14.3	26	12.0	28	10.0	28	11.2	31	8.3	18	4.9	104	8.8	24	6.8	10	4.6
	90-99	79	5.0	2	1.9	6	2.8	16	5.7	20	8.0	22	5.9	13	3.5	69	5.9	14	4.0	6	2.8
	100mg/dL以上	36	2.3	2	1.9	5	2.3	6	2.2	10	4.0	11	2.9	2	0.5	28	2.4	4	1.1	1	0.5

注)コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。

(25年)

第39表の4 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,176	55.7	14.7	91	56.2	13.3	109	55.2	14.5	136	54.6	13.1	155	56.2	14.1	298	57.1	15.6	387	54.9	15.1	879	56.0	15.0	312	55.9	15.4	221	54.8	15.0
女性	1,593	65.5	15.3	105	66.7	12.9	216	67.0	14.2	279	67.5	14.9	249	68.6	16.5	374	65.2	16.3	370	60.8	14.0	1,176	65.6	15.8	353	62.8	14.7	216	59.3	13.8

注)コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。

(25年)

第40表の1 血清LDLコレステロール値（直接法）の分布—血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	1,065	100.0	404	100.0	280	100.0
	40mg/dL未満	7	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.1	3	0.8	1	0.2	6	0.6	2	0.5	1	0.4
	40-49	9	0.7	0	0.0	1	0.9	1	0.7	1	0.6	3	0.8	3	0.6	7	0.7	2	0.5	2	0.7
	50-59	22	1.6	2	2.2	2	1.8	2	1.4	1	0.6	5	1.4	10	2.0	16	1.5	6	1.5	6	2.1
	60-69	49	3.5	3	3.3	2	1.8	2	1.4	4	2.2	9	2.5	29	5.8	37	3.5	15	3.7	18	6.4
	70-79	65	4.7	10	11.0	2	1.8	5	3.5	7	3.9	15	4.1	26	5.2	47	4.4	19	4.7	14	5.0
	80-89	125	9.0	8	8.8	7	6.4	5	3.5	13	7.2	32	8.8	60	12.1	93	8.7	43	10.6	38	13.6
	90-99	145	10.5	12	13.2	6	5.5	11	7.8	19	10.6	37	10.1	60	12.1	109	10.2	45	11.1	36	12.9
	100-109	176	12.7	12	13.2	14	12.8	21	14.9	22	12.2	44	12.1	63	12.7	137	12.9	38	9.4	40	14.3
	110-119	167	12.1	13	14.3	14	12.8	19	13.5	20	11.1	37	10.1	64	12.9	121	11.4	47	11.6	37	13.2
	120-129	184	13.3	9	9.9	18	16.5	17	12.1	24	13.3	57	15.6	59	11.9	146	13.7	63	15.6	27	9.6
	130-139	127	9.2	8	8.8	15	13.8	8	5.7	22	12.2	37	10.1	37	7.5	96	9.0	40	9.9	17	6.1
	140-149	116	8.4	5	5.5	6	5.5	16	11.3	18	10.0	35	9.6	36	7.3	97	9.1	30	7.4	21	7.5
	150-159	82	5.9	6	6.6	6	5.5	14	9.9	11	6.1	19	5.2	26	5.2	64	6.0	23	5.7	14	5.0
	160-169	49	3.5	1	1.1	8	7.3	6	4.3	8	4.4	14	3.8	12	2.4	40	3.8	16	4.0	5	1.8
	170-179	21	1.5	0	0.0	4	3.7	2	1.4	1	0.6	10	2.7	4	0.8	17	1.6	9	2.2	1	0.4
	180-189	17	1.2	1	1.1	2	1.8	4	2.8	4	2.2	4	1.1	2	0.4	14	1.3	2	0.5	1	0.4
	190-199	10	0.7	0	0.0	1	0.9	5	3.5	3	1.7	1	0.3	0	0.0	9	0.8	1	0.2	0	0.0
	200-209	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	2	0.4	4	0.4	1	0.2	1	0.4
	210-219	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.2	1	0.2	1	0.4
	220mg/dL以上	4	0.3	1	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.5	0	0.0	3	0.3	1	0.2	0	0.0
女性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	1,456	100.0	508	100.0	313	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49	7	0.4	0	0.0	2	0.9	2	0.7	2	0.7	1	0.2	0	0.0	5	0.3	0	0.0	0	0.0
	50-59	16	0.8	2	1.9	2	0.9	5	1.8	0	0.0	1	0.2	6	1.1	11	0.8	1	0.2	5	1.6
	60-69	41	2.1	3	2.8	13	6.0	6	2.1	4	1.5	4	0.8	11	2.0	22	1.5	7	1.4	7	2.2
	70-79	81	4.2	14	13.2	15	6.9	12	4.2	2	0.7	12	2.4	26	4.7	46	3.2	25	4.9	13	4.2
	80-89	141	7.4	14	13.2	27	12.4	27	9.5	10	3.7	28	5.7	35	6.4	91	6.3	26	5.1	24	7.7
	90-99	183	9.5	11	10.4	37	17.0	31	11.0	19	7.0	33	6.7	52	9.5	119	8.2	37	7.3	32	10.2
	100-109	258	13.5	19	17.9	34	15.6	51	18.0	20	7.4	50	10.2	84	15.3	186	12.8	67	13.2	44	14.1
	110-119	249	13.0	16	15.1	21	9.6	41	14.5	33	12.1	66	13.5	72	13.1	193	13.3	66	13.0	43	13.7
	120-129	264	13.8	11	10.4	19	8.7	28	9.9	40	14.7	75	15.3	91	16.6	208	14.3	76	15.0	58	18.5
	130-139	212	11.1	8	7.5	16	7.3	34	12.0	38	14.0	56	11.4	60	10.9	173	11.9	65	12.8	29	9.3
	140-149	158	8.2	4	3.8	12	5.5	17	6.0	31	11.4	54	11.0	40	7.3	131	9.0	51	10.0	21	6.7
	150-159	112	5.8	1	0.9	9	4.1	14	4.9	21	7.7	43	8.8	24	4.4	100	6.9	33	6.5	12	3.8
	160-169	67	3.5	2	1.9	2	0.9	7	2.5	18	6.6	21	4.3	17	3.1	61	4.2	19	3.7	9	2.9
	170-179	45	2.3	0	0.0	2	0.9	3	1.1	13	4.8	15	3.1	12	2.2	39	2.7	13	2.6	6	1.9
	180-189	37	1.9	0	0.0	2	0.9	3	1.1	12	4.4	10	2.0	10	1.8	32	2.2	11	2.2	6	1.9
	190-199	14	0.7	0	0.0	1	0.5	1	0.4	4	1.5	5	1.0	3	0.5	13	0.9	3	0.6	0	0.0
	200-209	9	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	1.1	4	0.8	1	0.2	7	0.5	3	0.6	1	0.3
	210-219	9	0.5	0	0.0	1	0.5	1	0.4	1	0.4	3	0.6	3	0.5	8	0.5	3	0.6	1	0.3
	220mg/dL以上	15	0.8	1	0.9	2	0.9	0	0.0	1	0.4	9	1.8	2	0.4	11	0.8	2	0.4	2	0.6

(25年)

第40表の2 血清LDLコレステロール値（直接法）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	116.1	31.5	91	110.4	32.5	109	122.5	30.8	141	126.9	34.7	180	119.7	30.8	365	117.8	31.3	496	110.0	29.5	1,065	117.0	31.6	404	115.7	30.4	280	107.4	28.9
女性	1,918	120.9	31.7	106	105.1	27.4	218	108.4	30.9	283	113.9	27.7	272	132.8	30.7	490	129.3	33.4	549	119.3	29.5	1,456	124.2	31.5	508	124.0	29.7	313	117.7	29.6

(25年)

第40表の3 血清LDLコレステロール値(直接法)の分布-血清LDLコレステロール値の区分,年齢階級別,人数,割合-男性・女性,20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,176	100.0	91	100.0	109	100.0	136	100.0	155	100.0	298	100.0	387	100.0	879	100.0	312	100.0	221	100.0
	40mg/dL未満	7	0.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.3	3	1.0	1	0.3	6	0.7	2	0.6	1	0.5
	40-49	8	0.7	0	0.0	1	0.9	1	0.7	1	0.6	3	1.0	2	0.5	6	0.7	1	0.3	2	0.9
	50-59	17	1.4	2	2.2	2	1.8	1	0.7	1	0.6	3	1.0	8	2.1	11	1.3	5	1.6	4	1.8
	60-69	39	3.3	3	3.3	2	1.8	2	1.5	3	1.9	8	2.7	21	5.4	28	3.2	11	3.5	13	5.9
	70-79	47	4.0	10	11.0	2	1.8	4	2.9	6	3.9	9	3.0	16	4.1	32	3.6	9	2.9	10	4.5
	80-89	86	7.3	8	8.8	7	6.4	4	2.9	8	5.2	21	7.0	38	9.8	58	6.6	22	7.1	28	12.7
	90-99	120	10.2	12	13.2	6	5.5	11	8.1	15	9.7	28	9.4	48	12.4	86	9.8	33	10.6	29	13.1
	100-109	149	12.7	12	13.2	14	12.8	20	14.7	20	12.9	34	11.4	49	12.7	113	12.9	29	9.3	29	13.1
	110-119	139	11.8	13	14.3	14	12.8	19	14.0	16	10.3	29	9.7	48	12.4	94	10.7	31	9.9	32	14.5
	120-129	170	14.5	9	9.9	18	16.5	17	12.5	24	15.5	51	17.1	51	13.2	133	15.1	57	18.3	22	10.0
	130-139	114	9.7	8	8.8	15	13.8	7	5.1	21	13.5	29	9.7	34	8.8	84	9.6	34	10.9	15	6.8
	140-149	104	8.8	5	5.5	6	5.5	16	11.8	15	9.7	31	10.4	31	8.0	86	9.8	29	9.3	17	7.7
	150-159	73	6.2	6	6.6	6	5.5	14	10.3	9	5.8	18	6.0	20	5.2	57	6.5	20	6.4	11	5.0
	160-169	47	4.0	1	1.1	8	7.3	6	4.4	8	5.2	13	4.4	11	2.8	38	4.3	14	4.5	5	2.3
	170-179	21	1.8	0	0.0	4	3.7	2	1.5	1	0.6	10	3.4	4	1.0	17	1.9	9	2.9	1	0.5
	180-189	16	1.4	1	1.1	2	1.8	4	2.9	3	1.9	4	1.3	2	0.5	13	1.5	2	0.6	1	0.5
	190-199	9	0.8	0	0.0	1	0.9	5	3.7	2	1.3	1	0.3	0	0.0	8	0.9	1	0.3	0	0.0
	200-209	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	2	0.5	4	0.5	1	0.3	1	0.5
	210-219	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.2	1	0.3	0	0.0
	220mg/dL以上	4	0.3	1	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.7	0	0.0	3	0.3	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,593	100.0	105	100.0	216	100.0	279	100.0	249	100.0	374	100.0	370	100.0	1,176	100.0	353	100.0	216	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49	6	0.4	0	0.0	2	0.9	2	0.7	2	0.8	0	0.0	0	0.0	4	0.3	0	0.0	0	0.0
	50-59	11	0.7	2	1.9	2	0.9	5	1.8	0	0.0	1	0.3	1	0.3	7	0.6	0	0.0	1	0.5
	60-69	35	2.2	3	2.9	13	6.0	6	2.2	4	1.6	3	0.8	6	1.6	17	1.4	4	1.1	4	1.9
	70-79	57	3.6	14	13.3	15	6.9	12	4.3	1	0.4	3	0.8	12	3.2	26	2.2	9	2.5	6	2.8
	80-89	108	6.8	13	12.4	27	12.5	26	9.3	8	3.2	12	3.2	22	5.9	60	5.1	13	3.7	17	7.9
	90-99	149	9.4	11	10.5	37	17.1	31	11.1	16	6.4	24	6.4	30	8.1	93	7.9	22	6.2	20	9.3
	100-109	200	12.6	19	18.1	34	15.7	50	17.9	18	7.2	28	7.5	51	13.8	134	11.4	36	10.2	30	13.9
	110-119	201	12.6	16	15.2	20	9.3	41	14.7	27	10.8	53	14.2	44	11.9	151	12.8	43	12.2	30	13.9
	120-129	210	13.2	11	10.5	18	8.3	27	9.7	36	14.5	55	14.7	63	17.0	162	13.8	54	15.3	39	18.1
	130-139	182	11.4	8	7.6	16	7.4	33	11.8	35	14.1	46	12.3	44	11.9	146	12.4	51	14.4	20	9.3
	140-149	143	9.0	4	3.8	12	5.6	17	6.1	31	12.4	46	12.3	33	8.9	118	10.0	40	11.3	18	8.3
	150-159	107	6.7	1	1.0	9	4.2	14	5.0	20	8.0	42	11.2	21	5.7	96	8.2	30	8.5	11	5.1
	160-169	61	3.8	2	1.9	2	0.9	7	2.5	18	7.2	16	4.3	16	4.3	55	4.7	17	4.8	8	3.7
	170-179	43	2.7	0	0.0	2	0.9	3	1.1	13	5.2	14	3.7	11	3.0	38	3.2	12	3.4	5	2.3
	180-189	34	2.1	0	0.0	2	0.9	3	1.1	11	4.4	10	2.7	8	2.2	30	2.6	11	3.1	4	1.9
	190-199	14	0.9	0	0.0	1	0.5	1	0.4	4	1.6	5	1.3	3	0.8	13	1.1	3	0.8	0	0.0
	200-209	9	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	1.2	4	1.1	1	0.3	7	0.6	3	0.8	1	0.5
	210-219	9	0.6	0	0.0	1	0.5	1	0.4	1	0.4	3	0.8	3	0.8	8	0.7	3	0.8	1	0.5
	220mg/dL以上	14	0.9	1	1.0	2	0.9	0	0.0	1	0.4	9	2.4	1	0.3	11	0.9	2	0.6	1	0.5

注)コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。(25年)

第40表の4 血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差-年齢階級別,人数,平均値,標準偏差-男性・女性,20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,176	118.1	31.6	91	110.4	32.5	109	122.5	30.8	136	128.3	34.2	155	120.5	30.2	298	120.5	32.1	387	112.2	29.4	879	119.7	31.9	312	119.9	30.7	221	108.5	28.6
女性	1,593	123.1	32.4	105	105.3	27.5	216	108.4	31.1	279	114.0	27.7	249	134.4	30.8	374	135.0	33.6	370	123.9	29.6	1,176	127.6	32.1	353	130.3	30.0	216	120.7	28.4

注)コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。(25年)

第41表の1 血清LDLコレステロール値（Friedwaldの式）の分布—血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,324	100.0	89	100.0	101	100.0	135	100.0	162	100.0	350	100.0	487	100.0	1,017	100.0	395	100.0	276	100.0
	40mg/dL未満	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.6	1	0.2	4	0.4	3	0.8	0	0.0
	40-49	19	1.4	0	0.0	1	1.0	1	0.7	0	0.0	7	2.0	10	2.1	16	1.6	8	2.0	5	1.8
	50-59	23	1.7	2	2.2	1	1.0	3	2.2	2	1.2	7	2.0	8	1.6	19	1.9	7	1.8	4	1.4
	60-69	49	3.7	6	6.7	1	1.0	4	3.0	5	3.1	7	2.0	26	5.3	35	3.4	11	2.8	18	6.5
	70-79	83	6.3	11	12.4	3	3.0	5	3.7	9	5.6	17	4.9	38	7.8	60	5.9	29	7.3	21	7.6
	80-89	152	11.5	14	15.7	11	10.9	8	5.9	14	8.6	39	11.1	66	13.6	110	10.8	47	11.9	40	14.5
	90-99	155	11.7	14	15.7	10	9.9	19	14.1	18	11.1	27	7.7	67	13.8	113	11.1	39	9.9	41	14.9
	100-109	182	13.7	11	12.4	21	20.8	18	13.3	20	12.3	49	14.0	63	12.9	128	12.6	47	11.9	37	13.4
	110-119	177	13.4	11	12.4	14	13.9	21	15.6	23	14.2	46	13.1	62	12.7	137	13.5	55	13.9	34	12.3
	120-129	156	11.8	8	9.0	9	8.9	12	8.9	23	14.2	48	13.7	56	11.5	131	12.9	48	12.2	30	10.9
	130-139	121	9.1	5	5.6	11	10.9	13	9.6	18	11.1	38	10.9	36	7.4	98	9.6	35	8.9	21	7.6
	140-149	88	6.6	4	4.5	6	5.9	9	6.7	12	7.4	29	8.3	28	5.7	72	7.1	33	8.4	12	4.3
	150-159	42	3.2	1	1.1	7	6.9	8	5.9	5	3.1	11	3.1	10	2.1	31	3.0	14	3.5	4	1.4
	160-169	29	2.2	0	0.0	3	3.0	4	3.0	9	5.6	6	1.7	7	1.4	25	2.5	8	2.0	4	1.4
	170-179	24	1.8	1	1.1	2	2.0	2	1.5	3	1.9	12	3.4	4	0.8	21	2.1	5	1.3	2	0.7
	180-189	10	0.8	0	0.0	1	1.0	5	3.7	0	0.0	3	0.9	1	0.2	9	0.9	3	0.8	1	0.4
	190-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-209	4	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	2	0.4	4	0.4	1	0.3	1	0.4
	210-219	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.1	1	0.3	1	0.4
	220mg/dL以上	4	0.3	1	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	1	0.2	3	0.3	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,883	100.0	106	100.0	217	100.0	279	100.0	270	100.0	473	100.0	538	100.0	1,424	100.0	493	100.0	309	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49	4	0.2	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	3	0.2	1	0.2	2	0.6
	50-59	24	1.3	1	0.9	5	2.3	6	2.2	2	0.7	3	0.6	7	1.3	16	1.1	3	0.6	6	1.9
	60-69	57	3.0	4	3.8	15	6.9	9	3.2	2	0.7	10	2.1	17	3.2	34	2.4	12	2.4	11	3.6
	70-79	104	5.5	17	16.0	16	7.4	19	6.8	9	3.3	16	3.4	27	5.0	65	4.6	25	5.1	14	4.5
	80-89	150	8.0	14	13.2	34	15.7	31	11.1	10	3.7	20	4.2	41	7.6	90	6.3	28	5.7	26	8.4
	90-99	206	10.9	15	14.2	40	18.4	43	15.4	20	7.4	44	9.3	44	8.2	139	9.8	40	8.1	29	9.4
	100-109	243	12.9	19	17.9	35	16.1	37	13.3	26	9.6	47	9.9	79	14.7	168	11.8	65	13.2	41	13.3
	110-119	270	14.3	14	13.2	19	8.8	40	14.3	39	14.4	70	14.8	88	16.4	217	15.2	74	15.0	50	16.2
	120-129	250	13.3	12	11.3	21	9.7	36	12.9	38	14.1	62	13.1	81	15.1	194	13.6	71	14.4	49	15.9
	130-139	193	10.2	4	3.8	11	5.1	31	11.1	33	12.2	60	12.7	54	10.0	162	11.4	56	11.4	35	11.3
	140-149	145	7.7	3	2.8	11	5.1	10	3.6	33	12.2	52	11.0	36	6.7	126	8.8	42	8.5	16	5.2
	150-159	84	4.5	1	0.9	2	0.9	7	2.5	22	8.1	29	6.1	23	4.3	77	5.4	30	6.1	9	2.9
	160-169	51	2.7	0	0.0	2	0.9	4	1.4	12	4.4	21	4.4	12	2.2	44	3.1	13	2.6	8	2.6
	170-179	40	2.1	0	0.0	2	0.9	2	0.7	13	4.8	14	3.0	9	1.7	37	2.6	15	3.0	3	1.0
	180-189	27	1.4	0	0.0	1	0.5	2	0.7	7	2.6	8	1.7	9	1.7	23	1.6	8	1.6	6	1.9
	190-199	12	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	4	0.8	5	0.9	11	0.8	6	1.2	1	0.3
	200-209	9	0.5	1	0.9	2	0.9	1	0.4	1	0.4	4	0.8	0	0.0	6	0.4	1	0.2	0	0.0
	210-219	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	3	0.2	2	0.4	1	0.3
	220mg/dL以上	11	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	7	1.5	2	0.4	9	0.6	1	0.2	2	0.6

(25年)

第41表の2 血清LDLコレステロール値（Friedwaldの式）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,324	110.9	29.8	89	102.7	30.3	101	115.5	26.7	135	118.5	33	162	115	27.6	350	114	30.6	487	105.7	28.5	1,017	112	30.3	395	110.8	30.5	276	104.4	27.5
女性	1,883	117.3	30.8	106	101	24	217	103.7	28.4	279	109.3	26.3	270	128.3	28.8	473	126.1	32.9	538	116.9	29.7	1,424	120.6	30.7	493	121.2	29.5	309	115.3	30.4

(25年)

第41表の3 血清LDLコレステロール値（Friedwaldの式）の分布—血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,125	100.0	89	100.0	101	100.0	130	100.0	138	100.0	286	100.0	381	100.0	838	100.0	306	100.0	219	100.0
	40mg/dL未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	0.7	0	0.0	3	0.4	2	0.7	0	0.0
	40-49	14	1.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	5	1.7	8	2.1	11	1.3	6	2.0	4	1.8
	50-59	16	1.4	2	2.2	1	1.0	2	1.5	2	1.4	5	1.7	4	1.0	12	1.4	3	1.0	3	1.4
	60-69	32	2.8	6	6.7	1	1.0	4	3.1	2	1.4	5	1.7	14	3.7	21	2.5	5	1.6	10	4.6
	70-79	63	5.6	11	12.4	3	3.0	3	2.3	8	5.8	11	3.8	27	7.1	41	4.9	17	5.6	17	7.8
	80-89	123	10.9	14	15.7	11	10.9	8	6.2	9	6.5	29	10.1	52	13.6	84	10.0	34	11.1	32	14.6
	90-99	126	11.2	14	15.7	10	9.9	19	14.6	15	10.9	17	5.9	51	13.4	87	10.4	25	8.2	31	14.2
	100-109	160	14.2	11	12.4	21	20.8	18	13.8	19	13.8	39	13.6	52	13.6	109	13.0	39	12.7	30	13.7
	110-119	144	12.8	11	12.4	14	13.9	21	16.2	19	13.8	36	12.6	43	11.3	106	12.6	36	11.8	26	11.9
	120-129	145	12.9	8	9.0	9	8.9	11	8.5	22	15.9	44	15.4	51	13.4	121	14.4	47	15.4	26	11.9
	130-139	107	9.5	5	5.6	11	10.9	13	10.0	15	10.9	32	11.2	31	8.1	85	10.1	30	9.8	18	8.2
	140-149	83	7.4	4	4.5	6	5.9	9	6.9	11	8.0	27	9.4	26	6.8	68	8.1	31	10.1	11	5.0
	150-159	39	3.5	1	1.1	7	6.9	8	6.2	4	2.9	11	3.8	8	2.1	29	3.5	13	4.2	3	1.4
	160-169	27	2.4	0	0.0	3	3.0	4	3.1	8	5.8	6	2.1	6	1.6	23	2.7	7	2.3	4	1.8
	170-179	24	2.1	1	1.1	2	2.0	2	1.5	3	2.2	12	4.2	4	1.0	21	2.5	5	1.6	2	0.9
	180-189	10	0.9	0	0.0	1	1.0	5	3.8	0	0.0	3	1.0	1	0.3	9	1.1	3	1.0	1	0.5
	190-199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-209	4	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	2	0.5	4	0.5	1	0.3	1	0.5
	210-219	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.3	0	0.0
	220mg/dL以上	4	0.4	1	1.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.3	1	0.3	3	0.4	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,568	100.0	105	100.0	215	100.0	275	100.0	247	100.0	364	100.0	362	100.0	1,153	100.0	342	100.0	213	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49	2	0.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.5
	50-59	18	1.1	1	1.0	5	2.3	6	2.2	2	0.8	0	0.0	4	1.1	11	1.0	1	0.3	3	1.4
	60-69	43	2.7	4	3.8	15	7.0	9	3.3	2	0.8	7	1.9	6	1.7	23	2.0	7	2.0	4	1.9
	70-79	80	5.1	16	15.2	16	7.4	19	6.9	7	2.8	7	1.9	15	4.1	44	3.8	11	3.2	9	4.2
	80-89	117	7.5	14	13.3	34	15.8	29	10.5	8	3.2	10	2.7	22	6.1	60	5.2	12	3.5	16	7.5
	90-99	170	10.8	15	14.3	40	18.6	43	15.6	17	6.9	27	7.4	28	7.7	106	9.2	24	7.0	20	9.4
	100-109	183	11.7	19	18.1	34	15.8	37	13.5	22	8.9	30	8.2	41	11.3	119	10.3	33	9.6	25	11.7
	110-119	217	13.8	14	13.3	18	8.4	39	14.2	34	13.8	55	15.1	57	15.7	171	14.8	51	14.9	34	16.0
	120-129	212	13.5	12	11.4	21	9.8	36	13.1	34	13.8	47	12.9	62	17.1	162	14.1	55	16.1	35	16.4
	130-139	173	11.0	4	3.8	11	5.1	30	10.9	32	13.0	53	14.6	43	11.9	143	12.4	44	12.9	29	13.6
	140-149	131	8.4	3	2.9	11	5.1	10	3.6	32	13.0	45	12.4	30	8.3	114	9.9	34	9.9	13	6.1
	150-159	77	4.9	1	1.0	2	0.9	7	2.5	22	8.9	26	7.1	19	5.2	71	6.2	26	7.6	7	3.3
	160-169	47	3.0	0	0.0	2	0.9	4	1.5	12	4.9	19	5.2	10	2.8	41	3.6	11	3.2	7	3.3
	170-179	39	2.5	0	0.0	2	0.9	2	0.7	12	4.9	14	3.8	9	2.5	36	3.1	15	4.4	3	1.4
	180-189	25	1.6	0	0.0	1	0.5	2	0.7	7	2.8	8	2.2	7	1.9	22	1.9	8	2.3	4	1.9
	190-199	12	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.8	4	1.1	5	1.4	11	1.0	6	1.8	1	0.5
	200-209	9	0.6	1	1.0	2	0.9	1	0.4	1	0.4	4	1.1	0	0.0	6	0.5	1	0.3	0	0.0
	210-219	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	3	0.3	2	0.6	1	0.5
	220mg/dL以上	10	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	7	1.9	1	0.3	9	0.8	1	0.3	1	0.5

注)コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。(25年)

第41表の4 血清LDLコレステロール値（Friedwaldの式）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,125	113.1	29.8	89	102.7	30.3	101	115.5	26.7	130	120.2	32.1	138	116.6	27.3	286	117.2	31.1	381	108.3	28.1	838	115.1	30.3	306	115.3	30.3	219	105.9	27.1
女性	1,568	119.4	31.3	105	101.3	24.0	215	103.6	28.6	275	109.4	26.3	247	130.0	28.8	364	131.8	32.8	362	121.8	29.4	1,153	124.0	31.1	342	127.5	29.6	213	118.5	29.1

注)コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。(25年)

第42表の1 血清 non HDL コレステロール値（直接法）の分布—血清 non HDL コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合—
男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	1,065	100.0	404	100.0	280	100.0
	70mg/dL未満	16	1.2	2	2.2	1	0.9	2	1.4	3	1.7	6	1.6	2	0.4	13	1.2	4	1.0	1	0.4
	70-80未満	25	1.8	3	3.3	2	1.8	0	0.0	2	1.1	5	1.4	13	2.6	16	1.5	5	1.2	10	3.6
	80-90未満	32	2.3	6	6.6	1	0.9	3	2.1	5	2.8	4	1.1	13	2.6	20	1.9	3	0.7	11	3.9
	90-100未満	72	5.2	11	12.1	3	2.8	4	2.8	6	3.3	11	3.0	37	7.5	49	4.6	23	5.7	20	7.1
	100-110未満	111	8.0	8	8.8	8	7.3	6	4.3	4	2.2	25	6.8	60	12.1	80	7.5	40	9.9	35	12.5
	110-120未満	121	8.8	14	15.4	11	10.1	14	9.9	15	8.3	25	6.8	42	8.5	86	8.1	29	7.2	23	8.2
	120-130未満	155	11.2	9	9.9	13	11.9	19	13.5	21	11.7	36	9.9	57	11.5	111	10.4	42	10.4	35	12.5
	130-140未満	172	12.4	11	12.1	14	12.8	22	15.6	16	8.9	57	15.6	52	10.5	133	12.5	50	12.4	32	11.4
	140-150未満	159	11.5	7	7.7	9	8.3	12	8.5	17	9.4	48	13.2	66	13.3	131	12.3	52	12.9	37	13.2
	150-160未満	129	9.3	7	7.7	11	10.1	5	3.5	23	12.8	37	10.1	46	9.3	103	9.7	43	10.6	23	8.2
	160-170未満	119	8.6	3	3.3	10	9.2	17	12.1	21	11.7	34	9.3	34	6.9	101	9.5	32	7.9	18	6.4
	170-180未満	81	5.9	2	2.2	4	3.7	9	6.4	15	8.3	29	7.9	22	4.4	68	6.4	25	6.2	12	4.3
	180-190未満	68	4.9	3	3.3	7	6.4	5	3.5	14	7.8	17	4.7	22	4.4	54	5.1	24	5.9	10	3.6
	190-200未満	50	3.6	1	1.1	8	7.3	6	4.3	8	4.4	12	3.3	15	3.0	40	3.8	14	3.5	8	2.9
	200-210未満	25	1.8	1	1.1	5	4.6	5	3.5	2	1.1	5	1.4	7	1.4	19	1.8	7	1.7	2	0.7
	210-220未満	17	1.2	0	0.0	1	0.9	3	2.1	2	1.1	8	2.2	3	0.6	16	1.5	5	1.2	1	0.4
	220mg/dL以上	30	2.2	3	3.3	1	0.9	9	6.4	6	3.3	6	1.6	5	1.0	25	2.3	6	1.5	2	0.7
女性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	1,456	100.0	508	100.0	313	100.0
	70mg/dL未満	10	0.5	2	1.9	5	2.3	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0
	70-80未満	20	1.0	3	2.8	5	2.3	9	3.2	0	0.0	1	0.2	2	0.4	12	0.8	1	0.2	1	0.3
	80-90未満	58	3.0	14	13.2	14	6.4	11	3.9	6	2.2	5	1.0	8	1.5	29	2.0	9	1.8	3	1.0
	90-100未満	87	4.5	11	10.4	27	12.4	15	5.3	4	1.5	6	1.2	24	4.4	41	2.8	13	2.6	17	5.4
	100-110未満	140	7.3	15	14.2	31	14.2	34	12.0	7	2.6	21	4.3	32	5.8	86	5.9	26	5.1	21	6.7
	110-120未満	198	10.3	16	15.1	36	16.5	42	14.8	21	7.7	37	7.6	46	8.4	135	9.3	39	7.7	30	9.6
	120-130未満	213	11.1	14	13.2	24	11.0	39	13.8	21	7.7	48	9.8	67	12.2	158	10.9	53	10.4	34	10.9
	130-140未満	247	12.9	14	13.2	21	9.6	41	14.5	39	14.3	59	12.0	73	13.3	192	13.2	66	13.0	38	12.1
	140-150未満	215	11.2	6	5.7	18	8.3	25	8.8	25	9.2	60	12.2	81	14.8	174	12.0	67	13.2	49	15.7
	150-160未満	198	10.3	4	3.8	12	5.5	20	7.1	35	12.9	60	12.2	67	12.2	161	11.1	65	12.8	39	12.5
	160-170未満	164	8.6	4	3.8	5	2.3	16	5.7	38	14.0	50	10.2	51	9.3	141	9.7	52	10.2	27	8.6
	170-180未満	120	6.3	1	0.9	7	3.2	14	4.9	25	9.2	45	9.2	28	5.1	108	7.4	37	7.3	16	5.1
	180-190未満	79	4.1	1	0.9	4	1.8	7	2.5	11	4.0	36	7.3	20	3.6	70	4.8	24	4.7	11	3.5
	190-200未満	50	2.6	0	0.0	3	1.4	4	1.4	16	5.9	13	2.7	14	2.6	43	3.0	11	2.2	9	2.9
	200-210未満	43	2.2	0	0.0	1	0.5	1	0.4	10	3.7	19	3.9	12	2.2	38	2.6	21	4.1	6	1.9
	210-220未満	27	1.4	0	0.0	1	0.5	2	0.7	8	2.9	4	0.8	12	2.2	23	1.6	10	2.0	6	1.9
	220mg/dL以上	49	2.6	1	0.9	4	1.8	1	0.4	5	1.8	26	5.3	12	2.2	42	2.9	14	2.8	6	1.9

(25年)

$$\text{non HDL コレステロール (mg/dL)} = \text{総コレステロール (mg/dL)} - \text{HDL コレステロール (mg/dL)}$$

第42表の2 血清 non HDL コレステロール値（直接法）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	141.1	34.9	91	127.6	39.3	109	145.1	34.2	141	149.6	39.8	180	148.2	34.8	365	144.3	33.3	496	135.4	32.5	1,065	143.2	34.7	404	142.0	32.9	280	132.0	31.5
女性	1,918	142.2	35.3	106	116.4	28.4	218	122.8	33.7	283	129.1	29.1	272	153.0	32.5	490	154.8	36.2	549	144.9	32.3	1,456	146.7	34.5	508	149.2	33.2	313	143.9	31.9

(25年)

第42表の3 血清 non HDL コレステロール値（直接法）の分布—血清 non HDL コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,176	100.0	91	100.0	109	100.0	136	100.0	155	100.0	298	100.0	387	100.0	879	100.0	312	100.0	221	100.0
	70mg/dL未満	14	1.2	2	2.2	1	0.9	1	0.7	3	1.9	6	2.0	1	0.3	11	1.3	3	1.0	1	0.5
	70-80未満	22	1.9	3	3.3	2	1.8	0	0.0	2	1.3	4	1.3	11	2.8	13	1.5	3	1.0	9	4.1
	80-90未満	24	2.0	6	6.6	1	0.9	3	2.2	4	2.6	3	1.0	7	1.8	14	1.6	2	0.6	6	2.7
	90-100未満	59	5.0	11	12.1	3	2.8	3	2.2	6	3.9	8	2.7	28	7.2	38	4.3	15	4.8	16	7.2
	100-110未満	80	6.8	8	8.8	8	7.3	5	3.7	2	1.3	14	4.7	43	11.1	51	5.8	22	7.1	29	13.1
	110-120未満	98	8.3	14	15.4	11	10.1	14	10.3	11	7.1	18	6.0	30	7.8	64	7.3	18	5.8	16	7.2
	120-130未満	122	10.4	9	9.9	13	11.9	19	14.0	15	9.7	24	8.1	42	10.9	83	9.4	30	9.6	25	11.3
	130-140未満	145	12.3	11	12.1	14	12.8	22	16.2	13	8.4	47	15.8	38	9.8	108	12.3	37	11.9	24	10.9
	140-150未満	140	11.9	7	7.7	9	8.3	11	8.1	17	11.0	41	13.8	55	14.2	112	12.7	42	13.5	33	14.9
	150-160未満	116	9.9	7	7.7	11	10.1	4	2.9	21	13.5	34	11.4	39	10.1	92	10.5	39	12.5	18	8.1
	160-170未満	107	9.1	3	3.3	10	9.2	17	12.5	18	11.6	29	9.7	30	7.8	89	10.1	28	9.0	15	6.8
	170-180未満	70	6.0	2	2.2	4	3.7	9	6.6	14	9.0	24	8.1	17	4.4	59	6.7	21	6.7	9	4.1
	180-190未満	65	5.5	3	3.3	7	6.4	5	3.7	13	8.4	16	5.4	21	5.4	51	5.8	23	7.4	10	4.5
	190-200未満	48	4.1	1	1.1	8	7.3	6	4.4	8	5.2	12	4.0	13	3.4	39	4.4	13	4.2	7	3.2
	200-210未満	25	2.1	1	1.1	5	4.6	5	3.7	2	1.3	5	1.7	7	1.8	19	2.2	7	2.2	2	0.9
	210-220未満	15	1.3	0	0.0	1	0.9	3	2.2	2	1.3	7	2.3	2	0.5	14	1.6	4	1.3	0	0.0
	220mg/dL以上	26	2.2	3	3.3	1	0.9	9	6.6	4	2.6	6	2.0	3	0.8	22	2.5	5	1.6	1	0.5
女性	総数	1,593	100.0	105	100.0	216	100.0	279	100.0	249	100.0	374	100.0	370	100.0	1,176	100.0	353	100.0	216	100.0
	70mg/dL未満	10	0.6	2	1.9	5	2.3	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0
	70-80未満	19	1.2	3	2.9	5	2.3	9	3.2	0	0.0	1	0.3	1	0.3	11	0.9	0	0.0	1	0.5
	80-90未満	53	3.3	14	13.3	14	6.5	11	3.9	6	2.4	3	0.8	5	1.4	24	2.0	7	2.0	1	0.5
	90-100未満	68	4.3	10	9.5	27	12.5	15	5.4	2	0.8	3	0.8	11	3.0	27	2.3	6	1.7	8	3.7
	100-110未満	113	7.1	15	14.3	31	14.4	33	11.8	6	2.4	11	2.9	17	4.6	62	5.3	12	3.4	13	6.0
	110-120未満	160	10.0	16	15.2	36	16.7	41	14.7	18	7.2	20	5.3	29	7.8	101	8.6	18	5.1	22	10.2
	120-130未満	171	10.7	14	13.3	24	11.1	39	14.0	18	7.2	34	9.1	42	11.4	123	10.5	36	10.2	20	9.3
	130-140未満	201	12.6	14	13.3	20	9.3	41	14.7	33	13.3	43	11.5	50	13.5	150	12.8	40	11.3	31	14.4
	140-150未満	168	10.5	6	5.7	18	8.3	23	8.2	23	9.2	44	11.8	54	14.6	133	11.3	45	12.7	33	15.3
	150-160未満	158	9.9	4	3.8	11	5.1	20	7.2	34	13.7	46	12.3	43	11.6	126	10.7	45	12.7	25	11.6
	160-170未満	136	8.5	4	3.8	5	2.3	16	5.7	34	13.7	42	11.2	35	9.5	119	10.1	42	11.9	17	7.9
	170-180未満	110	6.9	1	1.0	7	3.2	14	5.0	25	10.0	38	10.2	25	6.8	99	8.4	30	8.5	15	6.9
	180-190未満	71	4.5	1	1.0	4	1.9	7	2.5	11	4.4	33	8.8	15	4.1	62	5.3	20	5.7	9	4.2
	190-200未満	47	3.0	0	0.0	3	1.4	4	1.4	16	6.4	12	3.2	12	3.2	41	3.5	11	3.1	7	3.2
	200-210未満	39	2.4	0	0.0	1	0.5	1	0.4	10	4.0	16	4.3	11	3.0	35	3.0	19	5.4	5	2.3
	210-220未満	27	1.7	0	0.0	1	0.5	2	0.7	8	3.2	4	1.1	12	3.2	23	2.0	10	2.8	6	2.8
	220mg/dL以上	42	2.6	1	1.0	4	1.9	1	0.4	4	1.6	24	6.4	8	2.2	37	3.1	12	3.4	3	1.4

注)コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。(25年)

$$\text{non HDL コレステロール (mg/dL)} = \text{総コレステロール (mg/dL)} - \text{HDL コレステロール (mg/dL)}$$

第42表の4 血清 non HDL コレステロール値（直接法）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,176	143.0	35.3	91	127.6	39.3	109	145.1	34.2	136	151.0	39.3	155	149.3	34.4	298	147.3	34.0	387	137.5	32.5	879	145.9	35.0	312	146.4	32.8	221	132.8	31.5
女性	1,593	143.1	36.2	105	116.6	28.4	216	122.7	33.8	279	129.2	29.2	249	154.6	32.5	374	159.6	36.9	370	148.6	32.2	1,176	149.0	35.4	353	155.0	33.6	216	146.0	30.8

注)コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。(25年)

第 43 表の 1 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布－血清中性脂肪（トリグリセライド）値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	280	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	49	3.5	14	15.4	4	3.7	3	2.1	6	3.3	4	1.1	18	3.6	8	2.0	13	4.6
	50-79	239	17.3	23	25.3	23	21.1	26	18.4	29	16.1	62	17.0	76	15.3	56	13.9	51	18.2
	80-109	249	18.0	17	18.7	24	22.0	26	18.4	30	16.7	66	18.1	86	17.3	65	16.1	51	18.2
	110-139	230	16.6	9	9.9	13	11.9	26	18.4	17	9.4	67	18.4	98	19.8	80	19.8	56	20.0
	140-169	178	12.9	6	6.6	16	14.7	16	11.3	32	17.8	44	12.1	64	12.9	52	12.9	37	13.2
	170-199	106	7.7	3	3.3	5	4.6	8	5.7	11	6.1	37	10.1	42	8.5	43	10.6	20	7.1
	200mg/dL以上	331	24.0	19	20.9	24	22.0	36	25.5	55	30.6	85	23.3	112	22.6	100	24.8	52	18.6
	150以上(再掲)	549	39.7	27	29.7	36	33.0	55	39.0	89	49.4	150	41.1	192	38.7	180	44.6	91	32.5
女性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	313	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	156	8.1	34	32.1	35	16.1	39	13.8	16	5.9	20	4.1	12	2.2	11	2.2	6	1.9
	50-79	453	23.6	35	33.0	80	36.7	80	28.3	61	22.4	100	20.4	97	17.7	113	22.2	50	16.0
	80-109	421	21.9	21	19.8	42	19.3	77	27.2	64	23.5	99	20.2	118	21.5	89	17.5	76	24.3
	110-139	306	16.0	7	6.6	21	9.6	41	14.5	51	18.8	74	15.1	112	20.4	94	18.5	58	18.5
	140-169	194	10.1	4	3.8	15	6.9	21	7.4	27	9.9	60	12.2	67	12.2	66	13.0	32	10.2
	170-199	121	6.3	1	0.9	8	3.7	10	3.5	24	8.8	28	5.7	50	9.1	41	8.1	28	8.9
	200mg/dL以上	267	13.9	4	3.8	17	7.8	15	5.3	29	10.7	109	22.2	93	16.9	94	18.5	63	20.1
	150以上(再掲)	497	25.9	8	7.5	30	13.8	34	12.0	71	26.1	172	35.1	182	33.2	171	33.7	113	36.1

(25年)

第 43 表の 2 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	162	127	91	138	171	109	175	176	141	163	117	180	194	170	365	161	109	496	152	95	404	162	100	280	140	85
女性	1,918	127	93	106	77	46	218	97	64	283	102	71	272	124	73	490	149	105	549	144	107	508	146	114	313	145	81

(25年)

第43表の3 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布—血清中性脂肪（トリグリセライド）値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,176	100.0	91	100.0	109	100.0	136	100.0	155	100.0	298	100.0	387	100.0	312	100.0	221	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	44	3.7	14	15.4	4	3.7	3	2.2	5	3.2	4	1.3	14	3.6	7	2.2	10	4.5
	50-79	210	17.9	23	25.3	23	21.1	25	18.4	27	17.4	53	17.8	59	15.2	42	13.5	42	19.0
	80-109	218	18.5	17	18.7	24	22.0	25	18.4	27	17.4	52	17.4	73	18.9	50	16.0	44	19.9
	110-139	189	16.1	9	9.9	13	11.9	25	18.4	14	9.0	52	17.4	76	19.6	63	20.2	41	18.6
	140-169	149	12.7	6	6.6	16	14.7	16	11.8	24	15.5	38	12.8	49	12.7	39	12.5	30	13.6
	170-199	83	7.1	3	3.3	5	4.6	8	5.9	8	5.2	30	10.1	29	7.5	31	9.9	16	7.2
	200mg/dL以上	283	24.1	19	20.9	24	22.0	34	25.0	50	32.3	69	23.2	87	22.5	80	25.6	38	17.2
	150以上(再掲)	458	38.9	27	29.7	36	33.0	53	39.0	75	48.4	125	41.9	142	36.7	139	44.6	68	30.8
女性	総数	1,593	100.0	105	100.0	216	100.0	279	100.0	249	100.0	374	100.0	370	100.0	353	100.0	216	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	151	9.5	34	32.4	35	16.2	39	14.0	16	6.4	17	4.5	10	2.7	9	2.5	4	1.9
	50-79	402	25.2	34	32.4	80	37.0	79	28.3	58	23.3	77	20.6	74	20.0	84	23.8	37	17.1
	80-109	357	22.4	21	20.0	41	19.0	77	27.6	54	21.7	82	21.9	82	22.2	62	17.6	58	26.9
	110-139	245	15.4	7	6.7	21	9.7	39	14.0	46	18.5	57	15.2	75	20.3	62	17.6	42	19.4
	140-169	163	10.2	4	3.8	15	6.9	20	7.2	27	10.8	52	13.9	45	12.2	54	15.3	18	8.3
	170-199	84	5.3	1	1.0	7	3.2	10	3.6	22	8.8	18	4.8	26	7.0	20	5.7	18	8.3
	200mg/dL以上	191	12.0	4	3.8	17	7.9	15	5.4	26	10.4	71	19.0	58	15.7	62	17.6	39	18.1
	150以上(再掲)	363	22.8	8	7.6	29	13.4	34	12.2	66	26.5	118	31.6	108	29.2	113	32.0	67	31.0

注)コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。

(25年)

第43表の4 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,176	162.1	132.3	91	137.5	171.4	109	174.9	175.6	136	162.4	117.2	155	197.8	179.8	298	160.3	111.4	387	151.2	98.7	312	162.9	103.9	221	136.7	84.2
女性	1,593	120.1	79.7	105	76.7	46.2	216	96.5	63.7	279	101.4	71.4	249	123.2	73.6	374	141.0	90.8	370	137.0	82.2	353	142.5	92.1	216	139.3	79.4

注)コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外。

(25年)

第44表の1 血清クレアチニン値の分布—血清クレアチニン値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—
男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	280	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	3	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.4
	0.50-0.59	29	2.1	0	0.0	3	2.8	1	0.7	4	2.2	12	3.3	9	1.8	8	2.0	6	2.1
	0.60-0.69	162	11.7	12	13.2	10	9.2	24	17.0	25	13.9	48	13.2	43	8.7	43	10.6	20	7.1
	0.70-0.79	367	26.6	32	35.2	35	32.1	36	25.5	46	25.6	95	26.0	123	24.8	102	25.2	63	22.5
	0.80-0.89	369	26.7	31	34.1	35	32.1	44	31.2	56	31.1	91	24.9	112	22.6	108	26.7	57	20.4
	0.90-0.99	249	18.0	13	14.3	23	21.1	26	18.4	37	20.6	69	18.9	81	16.3	70	17.3	47	16.8
	1.00-1.19	141	10.2	3	3.3	1	0.9	9	6.4	12	6.7	38	10.4	78	15.7	47	11.6	56	20.0
	1.20-1.39	37	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	28	5.6	15	3.7	18	6.4
	1.40-1.59	11	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	10	2.0	6	1.5	5	1.8
	1.60-1.79	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	2	0.5	1	0.4
	1.80-1.99	4	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	1	0.2	2	0.7
	2.00mg/dL以上	7	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	5	1.0	1	0.2	4	1.4
女性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	313	100.0
	0.40mg/dL未満	10	0.5	1	0.9	1	0.5	1	0.4	3	1.1	0	0.0	4	0.7	2	0.4	2	0.6
	0.40-0.49	169	8.8	16	15.1	30	13.8	19	6.7	21	7.7	48	9.8	35	6.4	45	8.9	17	5.4
	0.50-0.59	652	34.0	39	36.8	96	44.0	111	39.2	93	34.2	165	33.7	148	27.0	163	32.1	75	24.0
	0.60-0.69	692	36.1	35	33.0	70	32.1	120	42.4	116	42.6	164	33.5	187	34.1	170	33.5	105	33.5
	0.70-0.79	271	14.1	14	13.2	14	6.4	26	9.2	32	11.8	86	17.6	99	18.0	91	17.9	60	19.2
	0.80-0.89	69	3.6	1	0.9	4	1.8	5	1.8	7	2.6	12	2.4	40	7.3	23	4.5	22	7.0
	0.90-0.99	25	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	6	1.2	18	3.3	6	1.2	16	5.1
	1.00-1.19	13	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	4	0.8	8	1.5	2	0.4	8	2.6
	1.20-1.39	8	0.4	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	0.9	1	0.2	5	1.6
	1.40-1.59	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	1.60-1.79	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	3	0.6	0	0.0
	1.80-1.99	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	2.00mg/dL以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.5	1	0.2	2	0.6

(25年)

第44表の2 血清クレアチニン値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性,
20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	0.9	0.4	91	0.8	0.1	109	0.8	0.1	141	0.8	0.3	180	0.8	0.1	365	0.9	0.4	496	0.9	0.5	404	0.9	0.2	280	1.0	0.6
女性	1,918	0.6	0.3	106	0.6	0.1	218	0.6	0.1	283	0.6	0.1	272	0.6	0.1	490	0.6	0.4	549	0.7	0.2	508	0.6	0.2	313	0.7	0.2

(25年)

第45表の1 推算GFRの分布—推算GFRの区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	280	100.0
	15ml/min/1.73m ² 未満	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	2	0.4	0	0.0	2	0.7
	15-30未満	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.2	2	0.5	4	1.4
	30-60未満	230	16.6	0	0.0	1	0.9	4	2.8	6	3.3	55	15.1	164	33.1	93	23.0	109	38.9
	60-90未満	876	63.4	23	25.3	65	59.6	95	67.4	140	77.8	257	70.4	296	59.7	273	67.6	153	54.6
	90ml/min/1.73m ² 以上	266	19.2	68	74.7	43	39.4	41	29.1	34	18.9	52	14.2	28	5.6	36	8.9	12	4.3
女 性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	313	100.0
	15ml/min/1.73m ² 未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	1	0.2	1	0.3
	15-30未満	7	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	4	0.7	4	0.8	3	1.0
	30-60未満	218	11.4	0	0.0	3	1.4	3	1.1	10	3.7	52	10.6	150	27.3	81	15.9	104	33.2
	60-90未満	1,238	64.5	22	20.8	79	36.2	193	68.2	216	79.4	368	75.1	360	65.6	370	72.8	193	61.7
	90ml/min/1.73m ² 以上	452	23.6	84	79.2	136	62.4	87	30.7	46	16.9	66	13.5	33	6.0	52	10.2	12	3.8

(25年)

$$\begin{aligned} \text{推算GFR (ml/min/1.73m}^2\text{)} &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dl)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \text{ (男性)} \\ &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dl)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \times 0.739 \text{ (女性)} \end{aligned}$$

注) エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2013の推算式。

第45表の2 推算GFRの平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

(ml/min/1.73 m²)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	75.4	17.9	91	99.2	13.2	109	89.8	15.2	141	83.1	14.4	180	78.6	12.9	365	73.8	15.2	496	65.7	15.9	404	69.8	14.8	280	63.5	16.2
女性	1,918	79.0	18.2	106	104.9	19.0	218	95.2	16.9	283	85.5	12.3	272	79.7	12.7	490	74.9	14.7	549	67.7	15.1	508	72.5	14.5	313	65.1	15.1

(25年)

第 46 表の 1 血清鉄の分布—血清鉄の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20 歳以上
[貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	280	100.0
	40 μ g/dL未満	44	3.2	1	1.1	3	2.8	7	5.0	4	2.2	7	1.9	22	4.4	7	1.7	17	6.1
	40-59	166	12.0	14	15.4	15	13.8	11	7.8	15	8.3	42	11.5	69	13.9	54	13.4	44	15.7
	60-79	298	21.6	18	19.8	20	18.3	26	18.4	32	17.8	75	20.5	127	25.6	95	23.5	68	24.3
	80-99	361	26.1	25	27.5	26	23.9	44	31.2	51	28.3	95	26.0	120	24.2	102	25.2	68	24.3
	100-119	219	15.8	13	14.3	15	13.8	19	13.5	31	17.2	67	18.4	74	14.9	70	17.3	38	13.6
	120-139	142	10.3	6	6.6	15	13.8	17	12.1	25	13.9	39	10.7	40	8.1	36	8.9	24	8.6
	140-159	89	6.4	7	7.7	10	9.2	11	7.8	15	8.3	20	5.5	26	5.2	22	5.4	12	4.3
	160-179	32	2.3	3	3.3	2	1.8	2	1.4	6	3.3	8	2.2	11	2.2	7	1.7	7	2.5
	180-199	12	0.9	2	2.2	1	0.9	4	2.8	0	0.0	2	0.5	3	0.6	3	0.7	0	0.0
	200 μ g/dL以上	19	1.4	2	2.2	2	1.8	0	0.0	1	0.6	10	2.7	4	0.8	8	2.0	2	0.7
女性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	313	100.0
	40 μ g/dL未満	236	12.3	16	15.1	44	20.2	84	29.7	17	6.3	29	5.9	46	8.4	31	6.1	34	10.9
	40-59	440	22.9	23	21.7	44	20.2	52	18.4	72	26.5	117	23.9	132	24.0	121	23.8	72	23.0
	60-79	571	29.8	31	29.2	50	22.9	64	22.6	70	25.7	168	34.3	188	34.2	178	35.0	99	31.6
	80-99	387	20.2	19	17.9	34	15.6	38	13.4	65	23.9	118	24.1	113	20.6	114	22.4	70	22.4
	100-119	162	8.4	11	10.4	20	9.2	19	6.7	28	10.3	38	7.8	46	8.4	43	8.5	23	7.3
	120-139	67	3.5	2	1.9	14	6.4	15	5.3	8	2.9	10	2.0	18	3.3	15	3.0	11	3.5
	140-159	32	1.7	2	1.9	8	3.7	4	1.4	7	2.6	8	1.6	3	0.5	3	0.6	2	0.6
	160-179	15	0.8	1	0.9	4	1.8	3	1.1	3	1.1	1	0.2	3	0.5	2	0.4	2	0.6
	180-199	4	0.2	1	0.9	0	0.0	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μ g/dL以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0

(25年)

第 46 表の 2 血清鉄の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20 歳以上
[貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	94.1	36.0	91	96.0	38.5	109	96.9	37.5	141	95.5	34.1	180	98.7	32.4	365	97.2	38.1	496	88.7	34.9	404	93.9	37.5	280	86.3	34.2
女性	1,918	71.7	30.7	106	70.8	31.5	218	71.9	37.1	283	64.3	38.9	272	77.0	32.2	490	73.5	25.5	549	71.3	25.4	508	73.1	25.1	313	70.5	26.5

(25年)

第46表の3 血清鉄の分布—血清鉄の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上
[貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,371	100.0	91	100.0	108	100.0	141	100.0	180	100.0	363	100.0	488	100.0	398	100.0	277	100.0
	40 μ g/dL未満	44	3.2	1	1.1	3	2.8	7	5.0	4	2.2	7	1.9	22	4.5	7	1.8	17	6.1
	40-59	165	12.0	14	15.4	15	13.9	11	7.8	15	8.3	42	11.6	68	13.9	54	13.6	43	15.5
	60-79	295	21.5	18	19.8	20	18.5	26	18.4	32	17.8	75	20.7	124	25.4	92	23.1	68	24.5
	80-99	360	26.3	25	27.5	26	24.1	44	31.2	51	28.3	95	26.2	119	24.4	101	25.4	68	24.5
	100-119	218	15.9	13	14.3	15	13.9	19	13.5	31	17.2	67	18.5	73	15.0	70	17.6	37	13.4
	120-139	140	10.2	6	6.6	14	13.0	17	12.1	25	13.9	38	10.5	40	8.2	36	9.0	24	8.7
	140-159	86	6.3	7	7.7	10	9.3	11	7.8	15	8.3	19	5.2	24	4.9	20	5.0	11	4.0
	160-179	32	2.3	3	3.3	2	1.9	2	1.4	6	3.3	8	2.2	11	2.3	7	1.8	7	2.5
	180-199	12	0.9	2	2.2	1	0.9	4	2.8	0	0.0	2	0.6	3	0.6	3	0.8	0	0.0
	200 μ g/dL以上	19	1.4	2	2.2	2	1.9	0	0.0	1	0.6	10	2.8	4	0.8	8	2.0	2	0.7
女性	総数	1,893	100.0	102	100.0	216	100.0	274	100.0	270	100.0	487	100.0	544	100.0	506	100.0	308	100.0
	40 μ g/dL未満	229	12.1	16	15.7	44	20.4	79	28.8	16	5.9	28	5.7	46	8.5	30	5.9	34	11.0
	40-59	435	23.0	22	21.6	44	20.4	51	18.6	72	26.7	116	23.8	130	23.9	120	23.7	70	22.7
	60-79	566	29.9	29	28.4	49	22.7	63	23.0	70	25.9	167	34.3	188	34.6	178	35.2	99	32.1
	80-99	384	20.3	19	18.6	34	15.7	37	13.5	65	24.1	118	24.2	111	20.4	114	22.5	68	22.1
	100-119	160	8.5	10	9.8	20	9.3	19	6.9	28	10.4	38	7.8	45	8.3	43	8.5	22	7.1
	120-139	65	3.4	2	2.0	13	6.0	14	5.1	8	3.0	10	2.1	18	3.3	15	3.0	11	3.6
	140-159	31	1.6	2	2.0	8	3.7	4	1.5	6	2.2	8	1.6	3	0.6	3	0.6	2	0.6
	160-179	15	0.8	1	1.0	4	1.9	3	1.1	3	1.1	1	0.2	3	0.6	2	0.4	2	0.6
	180-199	4	0.2	1	1.0	0	0.0	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μ g/dL以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0

注) 貧血治療のための薬の使用者除外。

(25年)

第46表の4 血清鉄の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上
[貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,371	94.0	36.0	91	96.0	38.5	108	96.6	37.6	141	95.5	34.1	180	98.7	32.4	363	97.0	38.1	488	88.7	34.8	398	93.8	37.5	277	86.1	34.0
女性	1,893	71.7	30.6	102	70.7	31.9	216	71.6	37.1	274	64.8	38.8	270	76.9	31.7	487	73.6	25.5	544	71.2	25.4	506	73.2	25.1	308	70.5	26.5

注) 貧血治療のための薬の使用者除外。

(25年)

第 47 表の 1 総鉄結合能 (TIBC) の分布—総鉄結合能の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男 性	総 数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	280	100.0
	200 μ g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	200-249	32	2.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.6	9	2.5	21	4.2	11	2.7	13	4.6
	250-299	359	26.0	29	31.9	25	22.9	18	12.8	37	20.6	86	23.6	164	33.1	119	29.5	102	36.4
	300-349	624	45.2	37	40.7	53	48.6	70	49.6	94	52.2	177	48.5	193	38.9	172	42.6	105	37.5
	350-399	293	21.2	22	24.2	27	24.8	47	33.3	41	22.8	71	19.5	85	17.1	78	19.3	43	15.4
	400-449	65	4.7	3	3.3	3	2.8	6	4.3	7	3.9	20	5.5	26	5.2	19	4.7	14	5.0
	450-499	8	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	6	1.2	5	1.2	2	0.7
	500 μ g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女 性	総 数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	313	100.0
	200 μ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	13	0.7	0	0.0	3	1.4	0	0.0	2	0.7	4	0.8	4	0.7	3	0.6	4	1.3
	250-299	331	17.3	10	9.4	19	8.7	26	9.2	41	15.1	99	20.2	136	24.8	120	23.6	75	24.0
	300-349	862	44.9	45	42.5	80	36.7	87	30.7	145	53.3	257	52.4	248	45.2	244	48.0	139	44.4
	350-399	451	23.5	27	25.5	63	28.9	78	27.6	55	20.2	100	20.4	128	23.3	114	22.4	72	23.0
	400-449	209	10.9	16	15.1	39	17.9	75	26.5	26	9.6	26	5.3	27	4.9	26	5.1	17	5.4
	450-499	43	2.2	7	6.6	11	5.0	14	4.9	3	1.1	2	0.4	6	1.1	1	0.2	6	1.9
	500 μ g/dL以上	9	0.5	1	0.9	3	1.4	3	1.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(25年)

第 47 表の 2 総鉄結合能 (TIBC) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	325.8	42.7	91	323.7	37.5	109	327.7	39.3	141	339.9	33.9	180	331.5	35.2	365	325.9	43.3	496	319.6	47.4	404	322.6	45.0	280	316.6	47.8
女性	1,918	341.9	49.4	106	360.2	55.0	218	362.2	55.5	283	368.5	54.8	272	336.8	43.0	490	331.3	40.5	549	328.5	43.9	508	328.2	39.7	313	330.2	46.9

(25年)

第47表の3 総鉄結合能（TIBC）の分布—総鉄結合能の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔貧血治療のための薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,371	100.0	91	100.0	108	100.0	141	100.0	180	100.0	363	100.0	488	100.0	398	100.0	277	100.0
	200 μ g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	200-249	31	2.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.6	9	2.5	20	4.1	11	2.8	12	4.3
	250-299	355	25.9	29	31.9	25	23.1	18	12.8	37	20.6	86	23.7	160	32.8	116	29.1	101	36.5
	300-349	619	45.1	37	40.7	52	48.1	70	49.6	94	52.2	175	48.2	191	39.1	170	42.7	104	37.5
	350-399	293	21.4	22	24.2	27	25.0	47	33.3	41	22.8	71	19.6	85	17.4	78	19.6	43	15.5
	400-449	64	4.7	3	3.3	3	2.8	6	4.3	7	3.9	20	5.5	25	5.1	18	4.5	14	5.1
	450-499	8	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	6	1.2	5	1.3	2	0.7
	500 μ g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	1,893	100.0	102	100.0	216	100.0	274	100.0	270	100.0	487	100.0	544	100.0	506	100.0	308	100.0
	200 μ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	13	0.7	0	0.0	3	1.4	0	0.0	2	0.7	4	0.8	4	0.7	3	0.6	4	1.3
	250-299	326	17.2	10	9.8	19	8.8	26	9.5	41	15.2	98	20.1	132	24.3	120	23.7	71	23.1
	300-349	857	45.3	44	43.1	79	36.6	85	31.0	144	53.3	257	52.8	248	45.6	244	48.2	139	45.1
	350-399	445	23.5	26	25.5	63	29.2	76	27.7	55	20.4	98	20.1	127	23.3	112	22.1	71	23.1
	400-449	202	10.7	15	14.7	38	17.6	71	25.9	25	9.3	26	5.3	27	5.0	26	5.1	17	5.5
	450-499	42	2.2	7	6.9	11	5.1	13	4.7	3	1.1	2	0.4	6	1.1	1	0.2	6	1.9
	500 μ g/dL以上	8	0.4	0	0.0	3	1.4	3	1.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 貧血治療のための薬の使用者除外。

(25年)

第47表の4 総鉄結合能（TIBC）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔貧血治療のための薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差
男性	1,371	326.0 42.7	91	323.7 37.5	108	327.8 39.5	141	339.9 33.9	180	331.5 35.2	363	326.0 43.4	488	319.9 47.2	398	322.7 44.8	277	317.0 47.8
女性	1,893	341.6 49.1	102	358.1 52.8	216	362.1 55.7	274	367.8 54.9	270	336.5 42.7	487	331.3 40.5	544	328.9 43.9	506	328.1 39.7	308	330.9 46.8

注) 貧血治療のための薬の使用者除外。

(25年)

第48表の1 AST (GOT) の分布－AST (GOT) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	280	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	1	0.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	366	26.5	38	41.8	46	42.2	47	33.3	52	28.9	95	26.0	88	17.7	94	23.3	45	16.1
	20-29	743	53.8	42	46.2	54	49.5	66	46.8	89	49.4	196	53.7	296	59.7	217	53.7	171	61.1
	30-39	188	13.6	6	6.6	7	6.4	18	12.8	27	15.0	47	12.9	83	16.7	63	15.6	51	18.2
	40-49	48	3.5	3	3.3	1	0.9	5	3.5	5	2.8	15	4.1	19	3.8	18	4.5	10	3.6
50IU/L以上	36	2.6	1	1.1	1	0.9	5	3.5	7	3.9	12	3.3	10	2.0	12	3.0	3	1.1	
女性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	313	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	806	42.0	90	84.9	161	73.9	194	68.6	96	35.3	148	30.2	117	21.3	147	28.9	58	18.5
	20-29	925	48.2	15	14.2	48	22.0	76	26.9	146	53.7	290	59.2	350	63.8	291	57.3	211	67.4
	30-39	131	6.8	1	0.9	4	1.8	7	2.5	20	7.4	39	8.0	60	10.9	49	9.6	33	10.5
	40-49	34	1.8	0	0.0	3	1.4	4	1.4	3	1.1	9	1.8	15	2.7	14	2.8	8	2.6
50IU/L以上	22	1.1	0	0.0	2	0.9	2	0.7	7	2.6	4	0.8	7	1.3	7	1.4	3	1.0	

(25年)

第48表の2 AST (GOT) の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20歳以上

(IU/L)

		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	25.0	10.4	91	22.1	7.1	109	21.4	6.3	141	24.5	9.3	180	25.3	10.1	365	25.7	14.1	496	25.8	8.4	404	25.9	10.2	280	25.5	7.4	
女性	1,918	21.9	7.4	106	16.7	3.4	218	18.8	8.0	283	19.0	6.2	272	23.0	8.6	490	22.9	6.2	549	24.2	7.2	508	23.6	7.0	313	24.2	7.0	

(25年)

第49表の1 ALT (GPT) の分布－ALT (GPT) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	280	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	32	2.3	5	5.5	1	0.9	1	0.7	3	1.7	11	3.0	11	2.2	6	1.5	10	3.6
	10-19	611	44.2	33	36.3	52	47.7	48	34.0	56	31.1	161	44.1	261	52.6	180	44.6	160	57.1
	20-29	423	30.6	29	31.9	23	21.1	36	25.5	65	36.1	115	31.5	155	31.3	146	36.1	76	27.1
	30-39	164	11.9	11	12.1	18	16.5	26	18.4	25	13.9	46	12.6	38	7.7	41	10.1	18	6.4
	40-49	71	5.1	5	5.5	8	7.3	11	7.8	17	9.4	9	2.5	21	4.2	15	3.7	11	3.9
50IU/L以上	81	5.9	8	8.8	7	6.4	19	13.5	14	7.8	23	6.3	10	2.0	16	4.0	5	1.8	
女性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	313	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	141	7.4	23	21.7	43	19.7	32	11.3	11	4.0	9	1.8	23	4.2	15	3.0	12	3.8
	10-19	1,219	63.6	73	68.9	138	63.3	196	69.3	151	55.5	308	62.9	353	64.3	320	63.0	213	68.1
	20-29	389	20.3	6	5.7	19	8.7	40	14.1	68	25.0	127	25.9	129	23.5	122	24.0	70	22.4
	30-39	96	5.0	4	3.8	7	3.2	4	1.4	24	8.8	31	6.3	26	4.7	33	6.5	9	2.9
	40-49	30	1.6	0	0.0	4	1.8	4	1.4	6	2.2	7	1.4	9	1.6	8	1.6	6	1.9
50IU/L以上	43	2.2	0	0.0	7	3.2	7	2.5	12	4.4	8	1.6	9	1.6	10	2.0	3	1.0	

(25年)

第49表の2 ALT (GPT) の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20歳以上

(IU/L)

		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	24.6	16.1	91	27.0	19.9	109	25.6	17.1	141	31.0	19.3	180	27.7	18.3	365	24.8	18.2	496	20.9	9.2	404	23.6	15.5	280	19.9	8.9	
女性	1,918	18.4	11.4	106	13.2	5.5	218	16.6	16.2	283	16.6	12.2	272	21.4	12.8	490	19.6	10.3	549	18.7	9.0	508	19.5	9.8	313	18.0	8.8	

(25年)

第50表の1 γ -GT (γ -GTP) の分布— γ -GT (γ -GTP) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合— 男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	280	100.0
	10IU/L未満	10	0.7	2	2.2	1	0.9	0	0.0	1	0.6	1	0.3	5	1.0	3	0.7	3	1.1
	10-19	324	23.4	37	40.7	32	29.4	25	17.7	30	16.7	61	16.7	139	28.0	77	19.1	99	35.4
	20-29	380	27.5	37	40.7	33	30.3	35	24.8	46	25.6	82	22.5	147	29.6	110	27.2	76	27.1
	30-39	206	14.9	3	3.3	16	14.7	26	18.4	26	14.4	69	18.9	66	13.3	72	17.8	34	12.1
	40-49	134	9.7	5	5.5	12	11.0	14	9.9	16	8.9	47	12.9	40	8.1	39	9.7	22	7.9
	50-59	66	4.8	0	0.0	2	1.8	11	7.8	12	6.7	17	4.7	24	4.8	20	5.0	12	4.3
	60-69	46	3.3	1	1.1	1	0.9	3	2.1	9	5.0	16	4.4	16	3.2	21	5.2	5	1.8
	70-79	46	3.3	1	1.1	2	1.8	6	4.3	9	5.0	16	4.4	12	2.4	14	3.5	5	1.8
	80IU/L以上	170	12.3	5	5.5	10	9.2	21	14.9	31	17.2	56	15.3	47	9.5	48	11.9	24	8.6
女性	総数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	313	100.0
	10IU/L未満	78	4.1	16	15.1	29	13.3	11	3.9	6	2.2	8.0	1.6	8	1.5	7	1.4	6	1.9
	10-19	1,084	56.5	75	70.8	134	61.5	183	64.7	133	48.9	255	52.0	304	55.4	273	53.7	176	56.2
	20-29	399	20.8	8	7.5	30	13.8	55	19.4	59	21.7	124	25.3	123	22.4	117	23.0	72	23.0
	30-39	153	8.0	5	4.7	10	4.6	11	3.9	27	9.9	44	9.0	56	10.2	49	9.6	30	9.6
	40-49	70	3.6	1	0.9	7	3.2	9	3.2	11	4.0	17	3.5	25	4.6	21	4.1	13	4.2
	50-59	38	2.0	1	0.9	3	1.4	2	0.7	9	3.3	11	2.2	12	2.2	13	2.6	5	1.6
	60-69	33	1.7	0	0.0	1	0.5	6	2.1	9	3.3	10	2.0	7	1.3	9	1.8	3	1.0
	70-79	22	1.1	0	0.0	2	0.9	0	0.0	8	2.9	9	1.8	3	0.5	7	1.4	2	0.6
	80IU/L以上	41	2.1	0	0.0	2	0.9	6	2.1	10	3.7	12	2.4	11	2.0	12	2.4	6	1.9

(25年)

第50表の2 γ -GT (γ -GTP) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

(IU/L)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	44.6	53.3	91	27.3	25.1	109	36.0	32.1	141	48.7	47.8	180	53.1	53.5	365	54.5	76.2	496	38.1	37.5	404	44.8	43.2	280	35.0	33.8
女性	1,918	23.3	20.6	106	15.0	8.0	218	18.6	17.0	283	21.2	21.5	272	27.5	23.0	490	25.2	20.6	549	24.1	21.1	508	25.3	22.8	313	23.2	18.3

(25年)

第 51 表の 1 血清尿酸値の分布—血清尿酸値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男 性	総 数	1,382	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	365	100.0	496	100.0	404	100.0	280	100.0
	2.0mg/dL未満	4	0.3	1	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	2.0-2.9	12	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	5	1.4	6	1.2	3	0.7	5	1.8
	3.0-3.9	80	5.8	6	6.6	6	5.5	4	2.8	14	7.8	21	5.8	29	5.8	20	5.0	18	6.4
	4.0-4.9	267	19.3	23	25.3	17	15.6	25	17.7	27	15.0	66	18.1	109	22.0	75	18.6	66	23.6
	5.0-5.9	421	30.5	23	25.3	32	29.4	46	32.6	56	31.1	117	32.1	147	29.6	133	32.9	84	30.0
	6.0-6.9	379	27.4	29	31.9	38	34.9	38	27.0	43	23.9	98	26.8	133	26.8	113	28.0	68	24.3
	7.0-7.9	161	11.6	4	4.4	10	9.2	23	16.3	25	13.9	43	11.8	56	11.3	45	11.1	30	10.7
	8.0-8.9	47	3.4	5	5.5	5	4.6	5	3.5	12	6.7	8	2.2	12	2.4	9	2.2	8	2.9
	9.0-9.9	11	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	6	1.6	3	0.6	5	1.2	1	0.4
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女 性	総 数	1,918	100.0	106	100.0	218	100.0	283	100.0	272	100.0	490	100.0	549	100.0	508	100.0	313	100.0
	2.0mg/dL未満	7	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.4	1	0.4	2	0.4	2	0.4	2	0.4	0	0.0
	2.0-2.9	112	5.8	8	7.5	24	11.0	30	10.6	17	6.3	13	2.7	20	3.6	22	4.3	5	1.6
	3.0-3.9	538	28.1	37	34.9	86	39.4	112	39.6	78	28.7	107	21.8	118	21.5	116	22.8	62	19.8
	4.0-4.9	715	37.3	48	45.3	80	36.7	103	36.4	106	39.0	199	40.6	179	32.6	184	36.2	107	34.2
	5.0-5.9	399	20.8	11	10.4	19	8.7	32	11.3	62	22.8	119	24.3	156	28.4	131	25.8	88	28.1
	6.0-6.9	111	5.8	2	1.9	7	3.2	5	1.8	7	2.6	34	6.9	56	10.2	39	7.7	35	11.2
	7.0-7.9	24	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	9	1.8	14	2.6	9	1.8	12	3.8
	8.0-8.9	9	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	5	1.0	3	0.5	3	0.6	3	1.0
	9.0-9.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	2	0.4	1	0.3
	10mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(25年)

第 51 表の 2 血清尿酸値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,382	5.8	1.3	91	5.6	1.3	109	5.8	1.3	141	6.0	1.1	180	5.9	1.4	365	5.7	1.3	496	5.7	1.2	404	5.8	1.2	280	5.6	1.2
女性	1,918	4.4	1.1	106	4.1	0.8	218	4.0	0.9	283	4.0	0.9	272	4.3	0.9	490	4.7	1.1	549	4.7	1.1	508	4.6	1.1	313	4.9	1.1

(25年)

第52表 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況－メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の疑い、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	3,251	100.0	189	100.0	316	100.0	422	100.0	450	100.0	847	100.0	1,027	100.0	2,161	100.0	897	100.0	585	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	494	15.2	2	1.1	8	2.5	17	4.0	50	11.1	156	18.4	261	25.4	344	15.9	212	23.6	140	23.9
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	500	15.4	14	7.4	32	10.1	53	12.6	79	17.6	131	15.5	191	18.6	348	16.1	162	18.1	106	18.1
上記以外	2,257	69.4	173	91.5	276	87.3	352	83.4	321	71.3	560	66.1	575	56.0	1,469	68.0	523	58.3	339	57.9
総数	1,369	100.0	91	100.0	109	100.0	140	100.0	180	100.0	362	100.0	487	100.0	893	100.0	398	100.0	276	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	323	23.6	2	2.2	4	3.7	12	8.6	38	21.1	105	29.0	162	33.3	232	26.0	135	33.9	85	30.8
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	342	25.0	13	14.3	25	22.9	39	27.9	53	29.4	83	22.9	129	26.5	234	26.2	102	25.6	70	25.4
上記以外	704	51.4	76	83.5	80	73.4	89	63.6	89	49.4	174	48.1	196	40.2	427	47.8	161	40.5	121	43.8
総数	1,882	100.0	98	100.0	207	100.0	282	100.0	270	100.0	485	100.0	540	100.0	1,268	100.0	499	100.0	309	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	171	9.1	0	0.0	4	1.9	5	1.8	12	4.4	51	10.5	99	18.3	112	8.8	77	15.4	55	17.8
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	158	8.4	1	1.0	7	3.4	14	5.0	26	9.6	48	9.9	62	11.5	114	9.0	60	12.0	36	11.7
上記以外	1,553	82.5	97	99.0	196	94.7	263	93.3	232	85.9	386	79.6	379	70.2	1,042	82.2	362	72.5	218	70.6

注) 妊婦除外、ヘモグロビンA1c \geq 6.0% (NGSP値)の場合。
判定基準はp.15参照。

(25年)

第53表の1 腹囲区分別，血中脂質，血圧，血糖のいずれかのリスクを有する者の割合－年齢階級，腹囲の区分，血中脂質・血圧・血糖のリスク保有数別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除外〕

	腹囲(cm)	総数		リスク保有数								
		人数	%	0		1つ		2つ		3つ		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	<85cm(男)/90cm(女)	2,111	100.0	851	40.3	800	37.9	375	17.8	85	4.0	
	≥85cm(男)/90cm(女)	1,140	100.0	146	12.8	500	43.9	346	30.4	148	13.0	
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	160	100.0	146	91.3	13	8.1	1	0.6	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	29	100.0	13	44.8	14	48.3	2	6.9	0	0.0
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	251	100.0	208	82.9	39	15.5	4	1.6	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	65	100.0	25	38.5	32	49.2	6	9.2	2	3.1
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	318	100.0	220	69.2	89	28.0	7	2.2	2	0.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	104	100.0	34	32.7	53	51.0	15	14.4	2	1.9
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	294	100.0	125	42.5	137	46.6	32	10.9	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	156	100.0	27	17.3	79	50.6	34	21.8	16	10.3
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	527	100.0	96	18.2	258	49.0	146	27.7	27	5.1
		≥85cm(男)/90cm(女)	320	100.0	33	10.3	131	40.9	110	34.4	46	14.4
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	561	100.0	56	10.0	264	47.1	185	33.0	56	10.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	466	100.0	14	3.0	191	41.0	179	38.4	82	17.6
	(再掲) 40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,371	100.0	468	34.1	605	44.1	245	17.9	53	3.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	790	100.0	98	12.4	348	44.1	241	30.5	103	13.0
(再掲) 65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	505	100.0	65	12.9	250	49.5	145	28.7	45	8.9	
	≥85cm(男)/90cm(女)	392	100.0	18	4.6	162	41.3	144	36.7	68	17.3	
(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	329	100.0	29	8.8	143	43.5	125	38.0	32	9.7	
	≥85cm(男)/90cm(女)	256	100.0	10	3.9	106	41.4	97	37.9	43	16.8	
男性	<85cm	619	100.0	200	32.3	274	44.3	126	20.4	19	3.1	
	≥85cm	750	100.0	85	11.3	342	45.6	219	29.2	104	13.9	
	20-29歳	<85cm	67	100.0	53	79.1	13	19.4	1	1.5	0	0.0
		≥85cm	24	100.0	9	37.5	13	54.2	2	8.3	0	0.0
	30-39歳	<85cm	68	100.0	45	66.2	21	30.9	2	2.9	0	0.0
		≥85cm	41	100.0	12	29.3	25	61.0	3	7.3	1	2.4
	40-49歳	<85cm	68	100.0	40	58.8	24	35.3	4	5.9	0	0.0
		≥85cm	72	100.0	21	29.2	39	54.2	11	15.3	1	1.4
	50-59歳	<85cm	77	100.0	26	33.8	39	50.6	12	15.6	0	0.0
		≥85cm	103	100.0	12	11.7	53	51.5	24	23.3	14	13.6
	60-69歳	<85cm	152	100.0	22	14.5	81	53.3	42	27.6	7	4.6
		≥85cm	210	100.0	22	10.5	83	39.5	72	34.3	33	15.7
	70歳以上	<85cm	187	100.0	14	7.5	96	51.3	65	34.8	12	6.4
		≥85cm	300	100.0	9	3.0	129	43.0	107	35.7	55	18.3
	(再掲) 40-74歳	<85cm	370	100.0	93	25.1	191	51.6	77	20.8	9	2.4
		≥85cm	523	100.0	57	10.9	234	44.7	158	30.2	74	14.1
(再掲) 65-74歳	<85cm	149	100.0	13	8.7	87	58.4	43	28.9	6	4.0	
	≥85cm	249	100.0	12	4.8	102	41.0	89	35.7	46	18.5	
(再掲) 75歳以上	<85cm	114	100.0	9	7.9	49	43.0	46	40.4	10	8.8	
	≥85cm	162	100.0	7	4.3	70	43.2	56	34.6	29	17.9	
女性	<90cm	1,492	100.0	651	43.6	526	35.3	249	16.7	66	4.4	
	≥90cm	390	100.0	61	15.6	158	40.5	127	32.6	44	11.3	
	20-29歳	<90cm	93	100.0	93	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	5	100.0	4	80.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	<90cm	183	100.0	163	89.1	18	9.8	2	1.1	0	0.0
		≥90cm	24	100.0	13	54.2	7	29.2	3	12.5	1	4.2
	40-49歳	<90cm	250	100.0	180	72.0	65	26.0	3	1.2	2	0.8
		≥90cm	32	100.0	13	40.6	14	43.8	4	12.5	1	3.1
	50-59歳	<90cm	217	100.0	99	45.6	98	45.2	20	9.2	0	0.0
		≥90cm	53	100.0	15	28.3	26	49.1	10	18.9	2	3.8
	60-69歳	<90cm	375	100.0	74	19.7	177	47.2	104	27.7	20	5.3
		≥90cm	110	100.0	11	10.0	48	43.6	38	34.5	13	11.8
	70歳以上	<90cm	374	100.0	42	11.2	168	44.9	120	32.1	44	11.8
		≥90cm	166	100.0	5	3.0	62	37.3	72	43.4	27	16.3
	(再掲) 40-74歳	<90cm	1,001	100.0	375	37.5	414	41.4	168	16.8	44	4.4
		≥90cm	267	100.0	41	15.4	114	42.7	83	31.1	29	10.9
(再掲) 65-74歳	<90cm	356	100.0	52	14.6	163	45.8	102	28.7	39	11.0	
	≥90cm	143	100.0	6	4.2	60	42.0	55	38.5	22	15.4	
(再掲) 75歳以上	<90cm	215	100.0	20	9.3	94	43.7	79	36.7	22	10.2	
	≥90cm	94	100.0	3	3.2	36	38.3	41	43.6	14	14.9	

注)妊婦除外，ヘモグロビンA1c≥6.0% (NGSP値)の場合。
リスクの項目は基準はp.15参照。

(25年)

第53表の2 腹囲区別, 血中脂質, 血圧, 血糖のリスクの保有状況〔すべての組み合わせ(①血中脂質②血圧③血糖)一年齢階級, 腹囲の区分, 血中脂質・血圧・血糖のリスク保有組合せ別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	腹囲(cm)	総数		リスク保有組み合わせ																
				①有②有③有		①有②有③無		①無②有③有		①有②無③有		①有②無③無		①無②有③無		①無②無③有		①無②無③無		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	<85cm(男)/90cm(女)	2,111	100.0	85	4.0	182	8.6	170	8.1	23	1.1	57	2.7	683	32.4	60	2.8	851	40.3	
	≥85cm(男)/90cm(女)	1,140	100.0	148	13.0	166	14.6	167	14.6	13	1.1	37	3.2	441	38.7	22	1.9	146	12.8	
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	160	100.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	8.1	0	0.0	146	91.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	29	100.0	0	0.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0	5	17.2	9	31.0	0	0.0	13	44.8
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	251	100.0	0	0.0	3	1.2	1	0.4	0	0.0	4	1.6	34	13.5	1	0.4	208	82.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	65	100.0	2	3.1	1	1.5	4	6.2	1	1.5	5	7.7	26	40.0	1	1.5	25	38.5
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	318	100.0	2	0.6	4	1.3	3	0.9	0	0.0	4	1.3	78	24.5	7	2.2	220	69.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	104	100.0	2	1.9	8	7.7	7	6.7	0	0.0	8	7.7	39	37.5	6	5.8	34	32.7
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	294	100.0	0	0.0	20	6.8	12	4.1	0	0.0	9	3.1	113	38.4	15	5.1	125	42.5
		≥85cm(男)/90cm(女)	156	100.0	16	10.3	18	11.5	15	9.6	1	0.6	6	3.8	69	44.2	4	2.6	27	17.3
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	527	100.0	27	5.1	72	13.7	64	12.1	10	1.9	19	3.6	220	41.7	19	3.6	96	18.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	320	100.0	46	14.4	50	15.6	55	17.2	5	1.6	8	2.5	117	36.6	6	1.9	33	10.3
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	561	100.0	56	10.0	82	14.6	90	16.0	13	2.3	21	3.7	225	40.1	18	3.2	56	10.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	466	100.0	82	17.6	87	18.7	86	18.5	6	1.3	5	1.1	181	38.8	5	1.1	14	3.0
	(再掲) 40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,371	100.0	53	3.9	121	8.8	107	7.8	17	1.2	48	3.5	507	37.0	50	3.6	468	34.1
		≥85cm(男)/90cm(女)	790	100.0	103	13.0	115	14.6	119	15.1	7	0.9	23	2.9	306	38.7	19	2.4	98	12.4
(再掲) 65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	505	100.0	45	8.9	67	13.3	64	12.7	14	2.8	26	5.1	207	41.0	17	3.4	65	12.9	
	≥85cm(男)/90cm(女)	392	100.0	68	17.3	67	17.1	73	18.6	4	1.0	6	1.5	148	37.8	8	2.0	18	4.6	
(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	329	100.0	32	9.7	57	17.3	62	18.8	6	1.8	5	1.5	129	39.2	9	2.7	29	8.8	
	≥85cm(男)/90cm(女)	256	100.0	43	16.8	48	18.8	44	17.2	5	2.0	4	1.6	100	39.1	2	0.8	10	3.9	
男性	<85cm	619	100.0	19	3.1	45	7.3	74	12.0	7	1.1	22	3.6	237	38.3	15	2.4	200	32.3	
	≥85cm	750	100.0	104	13.9	109	14.5	101	13.5	9	1.2	28	3.7	302	40.3	12	1.6	85	11.3	
	20-29歳	<85cm	67	100.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	19.4	0	0.0	53	79.1
		≥85cm	24	100.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	0	0.0	5	20.8	8	33.3	0	0.0	9	37.5
	30-39歳	<85cm	68	100.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0	4	5.9	17	25.0	0	0.0	45	66.2
		≥85cm	41	100.0	1	2.4	1	2.4	2	4.9	0	0.0	5	12.2	20	48.8	0	0.0	12	29.3
	40-49歳	<85cm	68	100.0	0	0.0	3	4.4	1	1.5	0	0.0	2	2.9	21	30.9	1	1.5	40	58.8
		≥85cm	72	100.0	1	1.4	8	11.1	3	4.2	0	0.0	6	8.3	30	41.7	3	4.2	21	29.2
	50-59歳	<85cm	77	100.0	0	0.0	6	7.8	6	7.8	0	0.0	1	1.3	36	46.8	2	2.6	26	33.8
		≥85cm	103	100.0	14	13.6	15	14.6	8	7.8	1	1.0	4	3.9	48	46.6	1	1.0	12	11.7
	60-69歳	<85cm	152	100.0	7	4.6	15	9.9	25	16.4	2	1.3	5	3.3	71	46.7	5	3.3	22	14.5
		≥85cm	210	100.0	33	15.7	33	15.7	35	16.7	4	1.9	5	2.4	75	35.7	3	1.4	22	10.5
	70歳以上	<85cm	187	100.0	12	6.4	18	9.6	42	22.5	5	2.7	10	5.3	79	42.2	7	3.7	14	7.5
		≥85cm	300	100.0	55	18.3	50	16.7	53	17.7	4	1.3	3	1.0	121	40.3	5	1.7	9	3.0
	(再掲) 40-74歳	<85cm	370	100.0	9	2.4	28	7.6	46	12.4	3	0.8	15	4.1	166	44.9	10	2.7	93	25.1
		≥85cm	523	100.0	74	14.1	82	15.7	71	13.6	5	1.0	16	3.1	208	39.8	10	1.9	57	10.9
(再掲) 65-74歳	<85cm	149	100.0	6	4.0	14	9.4	27	18.1	2	1.3	10	6.7	72	48.3	5	3.4	13	8.7	
	≥85cm	249	100.0	46	18.5	43	17.3	43	17.3	3	1.2	4	1.6	92	36.9	6	2.4	12	4.8	
(再掲) 75歳以上	<85cm	114	100.0	10	8.8	14	12.3	28	24.6	4	3.5	3	2.6	41	36.0	5	4.4	9	7.9	
	≥85cm	162	100.0	29	17.9	24	14.8	28	17.3	4	2.5	2	1.2	66	40.7	2	1.2	7	4.3	
女性	<90cm	1,492	100.0	66	4.4	137	9.2	96	6.4	16	1.1	35	2.3	446	29.9	45	3.0	651	43.6	
	≥90cm	390	100.0	44	11.3	57	14.6	66	16.9	4	1.0	9	2.3	139	35.6	10	2.6	61	15.6	
	20-29歳	<90cm	93	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	93	100.0
		≥90cm	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	4	80.0
	30-39歳	<90cm	183	100.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	17	9.3	1	0.5	163	89.1
		≥90cm	24	100.0	1	4.2	0	0.0	2	8.3	1	4.2	0	0.0	6	25.0	1	4.2	13	54.2
	40-49歳	<90cm	250	100.0	2	0.8	1	0.4	2	0.8	0	0.0	2	0.8	57	22.8	6	2.4	180	72.0
		≥90cm	32	100.0	1	3.1	0	0.0	4	12.5	0	0.0	2	6.3	9	28.1	3	9.4	13	40.6
	50-59歳	<90cm	217	100.0	0	0.0	14	6.5	6	2.8	0	0.0	8	3.7	77	35.5	13	6.0	99	45.6
		≥90cm	53	100.0	2	3.8	3	5.7	7	13.2	0	0.0	2	3.8	21	39.6	3	5.7	15	28.3
	60-69歳	<90cm	375	100.0	20	5.3	57	15.2	39	10.4	8	2.1	14	3.7	149	39.7	14	3.7	74	19.7
		≥90cm	110	100.0	13	11.8	17	15.5	20	18.2	1	0.9	3	2.7	42	38.2	3	2.7	11	10.0
	70歳以上	<90cm	374	100.0	44	11.8	64	17.1	48	12.8	8	2.1	11	2.9	146	39.0	11	2.9	42	11.2
		≥90cm	166	100.0	27	16.3	37	22.3	33	19.9	2	1.2	2	1.2	60	36.1	0	0.0	5	3.0
	(再掲) 40-74歳	<90cm	1,001	100.0	44	4.4	93	9.3	61	6.1	14	1.4	33	3.3	341	34.1	40	4.0	375	37.5
		≥90cm	267	100.0	29	10.9	33	12.4	48	18.0	2	0.7	7	2.6	98	36.7	9	3.4	41	15.4
(再掲) 65-74歳	<90cm	356	100.0	39	11.0	53	14.9	37	10.4	12	3.4	16	4.5	135	37.9	12	3.4	52	14.6	
	≥90cm	143	100.0	22	15.4	24	16.8	30	21.0	1	0.7	2	1.4	56	39.2	2	1.4	6	4.2	
(再掲) 75歳以上	<90cm	215	100.0	22	10.2	43	20.0	34	15.8	2	0.9	2	0.9	88	40.9	4	1.9	20	9.3	
	≥90cm	94	100.0	14	14.9	24	25.5	16	17.0	1	1.1	2	2.1	34	36.2	0	0.0	3	3.2	

注)妊婦除外, ヘモグロビンA1c≥6.0%(NGSP値)の場合。
リスクの項目は基準はp.15参照。

(25年)

第54表 「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況－糖尿病が疑われる者の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,285	100.0	195	100.0	324	100.0	425	100.0	452	100.0	853	100.0	1,036	100.0	2,175	100.0	903	100.0	591	100.0
糖尿病が強く疑われる者	398	12.1	0	0.0	6	1.9	13	3.1	36	8.0	127	14.9	216	20.8	271	12.5	171	18.9	121	20.5
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者	217	54.5	0	0.0	2	33.3	6	46.2	22	61.1	65	51.2	122	56.5	142	52.4	91	53.2	73	60.3
糖尿病の可能性が否定できない者	311	9.5	0	0.0	5	1.5	15	3.5	31	6.9	110	12.9	150	14.5	217	10.0	127	14.1	89	15.1
上記以外	2,576	78.4	195	100.0	313	96.6	397	93.4	385	85.2	616	72.2	670	64.7	1,687	77.6	605	67.0	381	64.5
総数	1,377	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	364	100.0	492	100.0	898	100.0	400	100.0	279	100.0
糖尿病が強く疑われる者	223	16.2	0	0.0	2	1.8	9	6.4	21	11.7	71	19.5	120	24.4	154	17.1	94	23.5	67	24.0
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者	125	56.1	0	0.0	1	50.0	3	33.3	13	61.9	38	53.5	70	58.3	81	52.6	50	53.2	43	64.2
糖尿病の可能性が否定できない者	133	9.7	0	0.0	1	0.9	1	0.7	14	7.8	45	12.4	72	14.6	83	9.2	48	12.0	49	17.6
上記以外	1,021	74.1	91	100.0	106	97.2	131	92.9	145	80.6	248	68.1	300	61.0	661	73.6	258	64.5	163	58.4
総数	1,908	100.0	104	100.0	215	100.0	284	100.0	272	100.0	489	100.0	544	100.0	1,277	100.0	503	100.0	312	100.0
糖尿病が強く疑われる者	175	9.2	0	0.0	4	1.9	4	1.4	15	5.5	56	11.5	96	17.6	117	9.2	77	15.3	54	17.3
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者	92	52.6	0	0.0	1	25.0	3	75.0	9	60.0	27	48.2	52	54.2	61	52.1	41	53.2	30	55.6
糖尿病の可能性が否定できない者	178	9.3	0	0.0	4	1.9	14	4.9	17	6.3	65	13.3	78	14.3	134	10.5	79	15.7	40	12.8
上記以外	1,555	81.5	104	100.0	207	96.3	266	93.7	240	88.2	368	75.3	370	68.0	1,026	80.3	347	69.0	218	69.9

注)判定基準はp.16参照。

「服薬者」とは、身体状況調査票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者。

(25年)

「糖尿病が強く疑われる人」の判定
 ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c (NGSP) の値が6.5%以上、または、身体状況調査票の(7)「現在、糖尿病治療の有無」に「1有」と回答した者
 「糖尿病の可能性を否定できない人」の判定
 ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c (NGSP) 値が6.0%以上、6.5%未満で、「糖尿病が強く疑われる人」以外の人

第55表 「糖尿病が強く疑われる者」における治療の有無一糖尿病の治療の有無、年齢階級別、人数、割合一総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	398	100.0	0	0.0	6	100.0	13	100.0	36	100.0	127	100.0	216	100.0	271	100.0	171	100.0	121	100.0
治療有	279	70.1	0	0.0	3	50.0	8	61.5	29	80.6	82	64.6	157	72.7	184	67.9	116	67.8	92	76.0
治療無	119	29.9	0	0.0	3	50.0	5	38.5	7	19.4	45	35.4	59	27.3	87	32.1	55	32.2	29	24.0
総数	223	100.0	0	0.0	2	100.0	9	100.0	21	100.0	71	100.0	120	100.0	154	100.0	94	100.0	67	100.0
男性	157	70.4	0	0.0	2	100.0	5	55.6	17	81.0	46	64.8	87	72.5	99	64.3	59	62.8	56	83.6
治療有	66	29.6	0	0.0	0	0.0	4	44.4	4	19.0	25	35.2	33	27.5	55	35.7	35	37.2	11	16.4
治療無	175	100.0	0	0.0	4	100.0	4	100.0	15	100.0	56	100.0	96	100.0	117	100.0	77	100.0	54	100.0
女性	122	69.7	0	0.0	1	25.0	3	75.0	12	80.0	36	64.3	70	72.9	85	72.6	57	74.0	36	66.7
治療有	53	30.3	0	0.0	3	75.0	1	25.0	3	20.0	20	35.7	26	27.1	32	27.4	20	26.0	18	33.3
治療無																				

注)「治療有」とは、生活習慣調査票の問6-1に「1 過去から現在にかけて継続的に受けている」および「2 過去に中断したことがあるが、現在は受けている」と回答した者。(25年)

第56表 高血圧症有病者の状況－高血圧症有病者の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,552	100.0	209	100.0	340	100.0	447	100.0	486	100.0	921	100.0	1,149	100.0	2,344	100.0	987	100.0	659	100.0
高血圧症有病者	1,799	50.6	13	6.2	33	9.7	98	21.9	211	43.4	572	62.1	872	75.9	1,232	52.6	683	69.2	521	79.1
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者	1,049	58.3	2	15.4	3	9.1	24	24.5	90	42.7	300	52.4	630	72.2	639	51.9	415	60.8	405	77.7
正常高値血圧者	442	12.4	15	7.2	41	12.1	55	12.3	71	14.6	134	14.5	126	11.0	322	13.7	128	13.0	64	9.7
上記以外	1,311	36.9	181	86.6	266	78.2	294	65.8	204	42.0	215	23.3	151	13.1	790	33.7	176	17.8	74	11.2
総数	1,482	100.0	95	100.0	112	100.0	149	100.0	195	100.0	391	100.0	540	100.0	966	100.0	434	100.0	309	100.0
高血圧症有病者	866	58.4	11	11.6	20	17.9	49	32.9	110	56.4	266	68.0	410	75.9	599	62.0	318	73.3	236	76.4
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者	488	56.4	2	18.2	2	10.0	15	30.6	44	40.0	139	52.3	286	69.8	304	50.8	190	59.7	180	76.3
正常高値血圧者	213	14.4	14	14.7	24	21.4	25	16.8	33	16.9	51	13.0	66	12.2	140	14.5	52	12.0	35	11.3
上記以外	403	27.2	70	73.7	68	60.7	75	50.3	52	26.7	74	18.9	64	11.9	227	23.5	64	14.7	38	12.3
総数	2,070	100.0	114	100.0	228	100.0	298	100.0	291	100.0	530	100.0	609	100.0	1,378	100.0	553	100.0	350	100.0
高血圧症有病者	933	45.1	2	1.8	13	5.7	49	16.4	101	34.7	306	57.7	462	75.9	633	45.9	365	66.0	285	81.4
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者	561	60.1	0	0.0	1	7.7	9	18.4	46	45.5	161	52.6	344	74.5	335	52.9	225	61.6	225	78.9
正常高値血圧者	229	11.1	1	0.9	17	7.5	30	10.1	38	13.1	83	15.7	60	9.9	182	13.2	76	13.7	29	8.3
上記以外	908	43.9	111	97.4	198	86.8	219	73.5	152	52.2	141	26.6	87	14.3	563	40.9	112	20.3	36	10.3

注) 判定の基準はp.15参照。

「服薬者」とは、身体状況調査票で「血圧を下げる薬」の使用有と回答した者。

「高血圧症有病者」の判定
収縮期血圧 140mmHg以上、または拡張期血圧 90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者

(25年)

第57表 「脂質異常症が疑われる者」の状況－脂質異常症が疑われる者の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,288	100.0	196	100.0	325	100.0	424	100.0	452	100.0	852	100.0	1,039	100.0	2,178	100.0	908	100.0	589	100.0
脂質異常症が疑われる者	713	21.7	8	4.1	16	4.9	28	6.6	70	15.5	237	27.8	354	34.1	489	22.5	299	32.9	200	34.0
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者	519	72.8	0	0.0	0	0.0	9	32.1	48	68.6	180	75.9	282	79.7	367	75.1	243	81.3	152	76.0
上記以外	2,575	78.3	188	95.9	309	95.1	396	93.4	382	84.5	615	72.2	685	65.9	1,689	77.5	609	67.1	389	66.0
総数	1,377	100.0	91	100.0	109	100.0	141	100.0	180	100.0	363	100.0	493	100.0	899	100.0	402	100.0	278	100.0
脂質異常症が疑われる者	343	24.9	8	8.8	13	11.9	20	14.2	41	22.8	104	28.7	157	31.8	232	25.8	128	31.8	90	32.4
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者	201	58.6	0	0.0	0	0.0	5	25.0	25	61.0	65	62.5	106	67.5	144	62.1	90	70.3	57	63.3
上記以外	1,034	75.1	83	91.2	96	88.1	121	85.8	139	77.2	259	71.3	336	68.2	667	74.2	274	68.2	188	67.6
総数	1,911	100.0	105	100.0	216	100.0	283	100.0	272	100.0	489	100.0	546	100.0	1,279	100.0	506	100.0	311	100.0
脂質異常症が疑われる者	370	19.4	0	0.0	3	1.4	8	2.8	29	10.7	133	27.2	197	36.1	257	20.1	171	33.8	110	35.4
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者	318	85.9	0	0.0	0	0.0	4	50.0	23	79.3	115	86.5	176	89.3	223	86.8	153	89.5	95	86.4
上記以外	1,541	80.6	105	100.0	213	98.6	275	97.2	243	89.3	356	72.8	349	63.9	1,022	79.9	335	66.2	201	64.6

注)「服薬者」とは、身体状況調査票で「コレステロールを下げる薬」または「中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用有と回答した者。(25年)

「脂質異常症が疑われる人」の判定
国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記の通りとした。
HDLコレステロールが40mg/dL未満、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬を服用している者。

第58表 運動禁止の有無－運動禁止の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	4,086	100.0	273	100.0	435	100.0	561	100.0	558	100.0	997	100.0	1,262	100.0	2,291	100.0	1,795	100.0	1,058	100.0	737	100.0
	運動禁止の有	80	2.0	4	1.5	8	1.8	4	0.7	8	1.4	17	1.7	39	3.1	29	1.3	51	2.8	28	2.6	23	3.1
	運動禁止の無	4,006	98.0	269	98.5	427	98.2	557	99.3	550	98.6	980	98.3	1,223	96.9	2,262	98.7	1,744	97.2	1,030	97.4	714	96.9
男性	総数	1,761	100.0	130	100.0	168	100.0	210	100.0	233	100.0	435	100.0	585	100.0	954	100.0	807	100.0	470	100.0	337	100.0
	運動禁止の有	32	1.8	2	1.5	4	2.4	0	0.0	1	0.4	5	1.1	20	3.4	9	0.9	23	2.9	12	2.6	11	3.3
	運動禁止の無	1,729	98.2	128	98.5	164	97.6	210	100.0	232	99.6	430	98.9	565	96.6	945	99.1	784	97.1	458	97.4	326	96.7
女性	総数	2,325	100.0	143	100.0	267	100.0	351	100.0	325	100.0	562	100.0	677	100.0	1,337	100.0	988	100.0	588	100.0	400	100.0
	運動禁止の有	48	2.1	2	1.4	4	1.5	4	1.1	7	2.2	12	2.1	19	2.8	20	1.5	28	2.8	16	2.7	12	3.0
	運動禁止の無	2,277	97.9	141	98.6	263	98.5	347	98.9	318	97.8	550	97.9	658	97.2	1,317	98.5	960	97.2	572	97.3	388	97.0

(25年)

第59表 1週間の運動日数－1週間の運動日数，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	3,864	100.0	254	100.0	401	100.0	541	100.0	535	100.0	952	100.0	1,181	100.0	2,177	100.0	1,687	100.0	1,001	100.0	686	100.0
	運動無し	1,888	48.9	139	54.7	276	68.8	327	60.4	302	56.4	386	40.5	458	38.8	1,242	57.1	646	38.3	347	34.7	299	43.6
	1日/週	345	8.9	32	12.6	38	9.5	63	11.6	51	9.5	81	8.5	80	6.8	230	10.6	115	6.8	69	6.9	46	6.7
	2日/週	299	7.7	23	9.1	20	5	49	9.1	50	9.3	70	7.4	87	7.4	173	7.9	126	7.5	75	7.5	51	7.4
	3日/週	272	7	15	5.9	17	4.2	27	5	29	5.4	80	8.4	104	8.8	120	5.5	152	9	96	9.6	56	8.2
	4日/週	154	4	3	1.2	9	2.2	14	2.6	14	2.6	64	6.7	50	4.2	73	3.4	81	4.8	60	6	21	3.1
	5日/週	199	5.2	19	7.5	14	3.5	21	3.9	23	4.3	51	5.4	71	6	97	4.5	102	6	69	6.9	33	4.8
	6日/週	87	2.3	5	2.0	6	1.5	13	2.4	4	0.7	27	2.8	32	2.7	44	2	43	2.5	30	3	13	1.9
	7日/週	620	16	18	7.1	21	5.2	27	5	62	11.6	193	20.3	299	25.3	198	9.1	422	25	255	25.5	167	24.3
男性	総数	1,665	100.0	123	100.0	153	100.0	203	100.0	226	100.0	413	100.0	547	100.0	906	100.0	759	100.0	442	100.0	317	100.0
	運動無し	793	47.6	63	51.2	110	71.9	112	55.2	125	55.3	182	44.1	201	36.7	509	56.2	284	37.4	151	34.2	133	42
	1日/週	144	8.6	19	15.4	16	10.5	28	13.8	22	9.7	30	7.3	29	5.3	104	11.5	40	5.3	24	5.4	16	5
	2日/週	116	7	12	9.8	6	3.9	18	8.9	22	9.7	23	5.6	35	6.4	68	7.5	48	6.3	26	5.9	22	6.9
	3日/週	113	6.8	9	7.3	5	3.3	10	4.9	11	4.9	25	6.1	53	9.7	46	5.1	67	8.8	34	7.7	33	10.4
	4日/週	63	3.8	1	0.8	2	1.3	4	2.0	5	2.2	25	6.1	26	4.8	26	2.9	37	4.9	26	5.9	11	3.5
	5日/週	91	5.5	11	8.9	6	3.9	11	5.4	13	5.8	22	5.3	28	5.1	52	5.7	39	5.1	26	5.9	13	4.1
	6日/週	44	2.6	3	2.4	2	1.3	8	3.9	1	0.4	14	3.4	16	2.9	21	2.3	23	3	16	3.6	7	2.2
	7日/週	301	18.1	5	4.1	6	3.9	12	5.9	27	11.9	92	22.3	159	29.1	80	8.8	221	29.1	139	31.4	82	25.9
女性	総数	2,199	100.0	131	100.0	248	100.0	338	100.0	309	100.0	539	100.0	634	100.0	1,271	100.0	928	100.0	559	100.0	369	100.0
	運動無し	1,095	49.8	76	58	166	66.9	215	63.6	177	57.3	204	37.8	257	40.5	733	57.7	362	39	196	35.1	166	45
	1日/週	201	9.1	13	9.9	22	8.9	35	10.4	29	9.4	51	9.5	51	8	126	9.9	75	8.1	45	8.1	30	8.1
	2日/週	183	8.3	11	8.4	14	5.6	31	9.2	28	9.1	47	8.7	52	8.2	105	8.3	78	8.4	49	8.8	29	7.9
	3日/週	159	7.2	6	4.6	12	4.8	17	5	18	5.8	55	10.2	51	8	74	5.8	85	9.2	62	11.1	23	6.2
	4日/週	91	4.1	2	1.5	7	2.8	10	3	9	2.9	39	7.2	24	3.8	47	3.7	44	4.7	34	6.1	10	2.7
	5日/週	108	4.9	8	6.1	8	3.2	10	3	10	3.2	29	5.4	43	6.8	45	3.5	63	6.8	43	7.7	20	5.4
	6日/週	43	2	2	1.5	4	1.6	5	1.5	3	1	13	2.4	16	2.5	23	1.8	20	2.2	14	2.5	6	1.6
	7日/週	319	14.5	13	9.9	15	6	15	4.4	35	11.3	101	18.7	140	22.1	118	9.3	201	21.7	116	20.8	85	23

注)身体状況調査票の(8)現在，医師等からの運動禁止の有無に「1 無」と回答し，かつ(9)運動習慣の(a)-(c)すべてに回答した者について集計。(25年)

第60表 運動を行う日の平均運動時間—運動を行う日の平均運動時間，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,976	100.0	115	100.0	125	100.0	214	100.0	233	100.0	566	100.0	723	100.0	935	100.0	1,041	100.0	654	100.0	387	100.0
30分未満	238	12	11	9.6	16	12.8	26	12.1	28	12	76	13.4	81	11.2	113	12.1	125	12	70	10.7	55	14.2
30分以上60分未満	581	29.4	23	20	29	23.2	55	25.7	77	33	158	27.9	239	33.1	249	26.6	332	31.9	204	31.2	128	33.1
60分以上120分未満	709	35.9	41	35.7	49	39.2	77	36	77	33	221	39	244	33.7	346	37	363	34.9	242	37	121	31.3
120分以上180分未満	288	14.6	24	20.9	21	16.8	33	15.4	35	15.0	73	12.9	102	14.1	149	15.9	139	13.4	82	12.5	57	14.7
180分以上	160	8.1	16	13.9	10	8	23	10.7	16	6.9	38	6.7	57	7.9	78	8.3	82	7.9	56	8.6	26	6.7
男性	872	100.0	60	100.0	43	100.0	91	100.0	101	100.0	231	100.0	346	100.0	397	100.0	475	100.0	291	100.0	184	100.0
30分未満	82	9.4	5	8.3	4	9.3	7	7.7	15	14.9	29	12.6	22	6.4	42	10.6	40	8.4	25	8.6	15	8.2
30分以上60分未満	216	24.8	6	10	9	20.9	26	28.6	31	30.7	49	21.2	95	27.5	89	22.4	127	26.7	76	26.1	51	27.7
60分以上120分未満	322	36.9	18	30	17	39.5	26	28.6	30	29.7	99	42.9	132	38.2	141	35.5	181	38.1	117	40.2	64	34.8
120分以上180分未満	152	17.4	18	30	8	18.6	18	19.8	18	17.8	29	12.6	61	17.6	77	19.4	75	15.8	40	13.7	35	19.0
180分以上	100	11.5	13	21.7	5	11.6	14	15.4	7	6.9	25	10.8	36	10.4	48	12.1	52	10.9	33	11.3	19	10.3
女性	1,104	100.0	55	100.0	82	100.0	123	100.0	132	100.0	335	100.0	377	100.0	538	100.0	566	100.0	363	100.0	203	100.0
30分未満	156	14.1	6	10.9	12	14.6	19	15.4	13	9.8	47	14	59	15.6	71	13.2	85	15	45	12.4	40	19.7
30分以上60分未満	365	33.1	17	30.9	20	24.4	29	23.6	46	34.8	109	32.5	144	38.2	160	29.7	205	36.2	128	35.3	77	37.9
60分以上120分未満	387	35.1	23	41.8	32	39	51	41.5	47	35.6	122	36.4	112	29.7	205	38.1	182	32.2	125	34.4	57	28.1
120分以上180分未満	136	12.3	6	10.9	13	15.9	15	12.2	17	12.9	44	13.1	41	10.9	72	13.4	64	11.3	42	11.6	22	10.8
180分以上	60	5.4	3	5.5	5	6.1	9	7.3	9	6.8	13	3.9	21	5.6	30	5.6	30	5.3	23	6.3	7	3.4

注)身体状況調査票の(8)現在，医師等からの運動禁止の有無に「1 無」と回答し，かつ(9)運動習慣の(a)-(c)すべてに回答した者について集計。(25年)

第61表 運動習慣の有無—運動習慣の有無，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,864	100.0	254	100.0	401	100.0	541	100.0	535	100.0	952	100.0	1,181	100.0	2,177	100.0	1,687	100.0	1,001	100.0	686	100.0
運動の習慣有	1,161	30.0	42	16.5	52	13.0	105	19.4	114	21.3	342	35.9	506	42.8	449	20.6	712	42.2	452	45.2	260	37.9
運動の習慣無	2,703	70.0	212	83.5	349	87.0	436	80.6	421	78.7	610	64.1	675	57.2	1,728	79.4	975	57.8	549	54.8	426	62.1
男性	1,665	100.0	123	100.0	153	100.0	203	100.0	226	100.0	413	100.0	547	100.0	906	100.0	759	100.0	442	100.0	317	100.0
運動の習慣有	563	33.8	20	16.3	20	13.1	49	24.1	50	22.1	154	37.3	270	49.4	202	22.3	361	47.6	217	49.1	144	45.4
運動の習慣無	1,102	66.2	103	83.7	133	86.9	154	75.9	176	77.9	259	62.7	277	50.6	704	77.7	398	52.4	225	50.9	173	54.6
女性	2,199	100.0	131	100.0	248	100.0	338	100.0	309	100.0	539	100.0	634	100.0	1,271	100.0	928	100.0	559	100.0	369	100.0
運動の習慣有	598	27.2	22	16.8	32	12.9	56	16.6	64	20.7	188	34.9	236	37.2	247	19.4	351	37.8	235	42.0	116	31.4
運動の習慣無	1,601	72.8	109	83.2	216	87.1	282	83.4	245	79.3	351	65.1	398	62.8	1,024	80.6	577	62.2	324	58.0	253	68.6

注)身体状況調査票の(8)現在，医師等からの運動禁止の有無に「1 無」と回答し，かつ(9)運動習慣の(a)-(c)すべてに回答した者について集計。(25年)
「運動の習慣有」とは，1回30分以上の運動を週2回以上実施し，1年以上継続していること。

第62表 歩数の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—総数・男性・女性，20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 20-64歳			(再掲) 65歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
総数	6,084	6,642	4,191	531	7,704	4,607	752	7,545	4,484	912	7,549	4,144	930	7,405	4,040	1,368	6,638	3,756	1,591	4,898	3,809	3,780	7,405	4,211	2,304	5,390	3,844	1,363	6,242	3,864	941	4,155	3,463
男性	2,812	7,099	4,499	261	8,261	4,853	347	8,274	5,091	417	8,216	4,646	436	7,586	4,204	613	6,887	4,075	738	5,393	3,922	1,758	7,865	4,598	1,054	5,822	4,017	623	6,609	4,219	431	4,685	3,403
女性	3,272	6,249	3,865	270	7,165	4,296	405	6,919	3,786	495	6,988	3,578	494	7,245	3,886	755	6,437	3,465	853	4,470	3,658	2,022	7,006	3,799	1,250	5,026	3,654	740	5,934	3,511	510	3,707	3,454

注)栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動数(歩数)」および「歩数計の装着状況」の両方に回答した者について集計。(25年)