

## 第2部 身体状況調査の結果

第12表 身長・体重の平均値及び標準偏差—年齢階級，身長・体重別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，1歳以上〔体重は妊婦除外〕

	男 性						女 性					
	身 長(cm)			体 重(kg)			身 長(cm)			体 重(kg)		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	3,310	162.2	17.6	3,305	60.9	16.9	3,788	151.0	13.6	3,761	50.4	12.4
1 歳	25	80.2	4.5	25	10.7	1.4	24	77.4	2.9	25	9.9	0.9
2 歳	23	87.5	4.0	23	12.3	1.1	28	85.8	4.9	29	11.9	1.5
3 歳	23	96.2	3.0	23	14.3	1.5	22	96.2	5.3	22	14.2	2.2
4 歳	23	102.0	3.6	23	16.2	1.8	26	103.7	3.3	26	16.2	1.9
5 歳	33	110.1	6.1	33	18.6	2.7	18	107.8	5.4	18	17.6	2.4
6 歳	31	117.4	6.0	31	21.0	2.9	27	114.4	4.3	27	19.8	2.5
7 歳	41	122.0	6.0	41	23.7	5.1	22	119.3	5.4	23	21.8	2.6
8 歳	34	126.3	5.2	34	25.7	4.7	33	125.7	6.0	33	24.7	4.4
9 歳	20	134.6	6.4	21	28.7	5.7	33	133.7	6.2	33	30.3	6.9
10歳	38	139.2	7.2	39	34.4	6.5	37	139.3	7.1	37	32.7	5.8
11歳	21	145.1	7.3	20	36.7	8.8	35	146.8	5.9	36	36.3	5.4
12歳	34	152.6	7.2	34	43.8	8.8	28	150.8	6.1	28	43.0	8.4
13歳	39	158.1	8.4	39	49.5	12.2	33	155.2	4.8	33	44.1	5.8
14歳	42	164.1	6.0	42	53.1	7.8	36	156.4	4.4	35	48.6	6.2
15歳	29	165.6	7.6	29	55.3	13.5	31	155.8	5.0	31	49.0	6.0
16歳	23	169.4	5.1	23	56.4	8.0	28	158.7	4.5	28	52.6	5.9
17歳	22	170.9	5.2	22	59.4	8.8	29	156.1	4.3	29	50.6	6.1
18歳	28	172.1	6.4	26	64.3	11.7	29	157.3	4.4	29	49.5	6.4
19歳	30	172.4	6.8	30	66.9	14.1	23	155.9	4.5	23	49.5	5.7
20歳	18	171.8	7.8	18	61.8	9.3	27	158.3	5.2	27	51.7	7.3
21歳	18	171.4	6.0	18	65.5	15.6	18	158.5	5.0	18	50.5	8.4
22歳	21	172.6	5.2	21	64.3	14.5	28	156.1	5.4	28	48.9	6.1
23歳	18	170.9	6.6	18	65.0	9.4	15	157.4	5.0	15	53.2	9.2
24歳	18	172.9	6.3	18	69.4	16.5	26	157.9	6.1	25	51.5	7.4
25歳	18	173.7	4.4	18	71.3	20.3	19	159.6	5.4	19	54.8	8.0
26-29歳	66	172.0	5.5	66	66.6	10.4	103	157.8	5.3	98	53.9	11.5
30-39歳	325	171.5	5.8	323	69.2	12.0	367	158.3	5.1	353	54.6	9.9
40-49歳	390	171.0	5.6	388	70.4	11.5	477	158.0	5.2	470	55.3	9.3
50-59歳	425	169.4	5.7	425	68.8	10.3	515	156.2	5.2	514	55.2	9.0
60-69歳	664	166.1	6.1	664	65.3	9.7	750	153.2	5.4	750	53.5	8.7
70歳以上	770	161.9	6.3	770	60.7	9.4	901	148.3	6.2	899	50.1	8.7
(再掲)												
20歳以上	2,751	167.2	7.1	2,747	65.8	11.1	3,246	153.9	6.8	3,216	53.2	9.3
20-29歳	177	172.1	5.9	177	66.3	13.3	236	157.8	5.4	230	52.5	9.5
60-64歳	295	166.8	5.8	295	65.8	9.6	368	153.8	5.4	368	53.7	9.0
65-69歳	369	165.5	6.3	369	64.8	9.7	382	152.6	5.2	382	53.4	8.3
70-74歳	295	163.6	5.6	296	62.3	9.4	351	150.6	5.4	351	51.0	8.3
75-79歳	242	161.9	6.3	242	61.5	9.0	249	148.8	5.5	248	51.9	8.6
80歳以上	233	159.7	6.4	232	58.0	9.3	301	145.0	6.3	300	47.7	8.8

注)女性の体重の集計は妊婦12名を除外して行った。

(26年)

第13表 BMIの平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 15歳以上〔妊婦除外〕

	男 性			女 性		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	2,876	23.38	3.41	3,356	22.37	3.62
15-19歳	130	20.91	3.75	140	20.42	2.24
20-29歳	177	22.36	4.11	230	21.09	3.61
30-39歳	323	23.48	3.63	353	21.80	3.81
40-49歳	388	24.02	3.64	470	22.16	3.62
50-59歳	425	23.94	3.30	514	22.65	3.57
60-69歳	664	23.62	3.00	750	22.82	3.57
70歳以上	769	23.13	3.09	899	22.79	3.59
(再掲)						
20歳以上	2,746	23.49	3.35	3,216	22.45	3.64
20-69歳	1,977	23.63	3.44	2,317	22.32	3.66
40-69歳	1,477	23.82	3.27	1,734	22.59	3.59
65-69歳	369	23.62	2.97	382	22.95	3.54
70-74歳	295	23.22	3.11	351	22.49	3.51
75-79歳	242	23.45	3.07	248	23.37	3.37
80-84歳	155	22.67	3.26	165	22.92	3.69
80歳以上	232	22.68	3.06	300	22.67	3.81
85歳以上	77	22.69	2.65	135	22.36	3.93

注1)身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦12名を除外している。

(26年)

注2)BMIは体重(kg)／(身長(m))<sup>2</sup>で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

第14表 BMIの分布－BMIの区分，人数，割合－総数・男性・女性，15歳以上〔妊婦除外〕

	総数		男性		女性	
	人数	%	人数	%	人数	%
総数	6,232	100.0	2,876	100.0	3,356	100.0
15未満	18	0.3	5	0.2	13	0.4
15－16未満	27	0.4	8	0.3	19	0.6
16－17未満	99	1.6	28	1.0	71	2.1
17－18未満	218	3.5	75	2.6	143	4.3
18－19未満	416	6.7	125	4.3	291	8.7
19－20未満	579	9.3	188	6.5	391	11.7
20－21未満	693	11.1	255	8.9	438	13.1
21－22未満	730	11.7	345	12.0	385	11.5
22－23未満	717	11.5	365	12.7	352	10.5
23－24未満	668	10.7	346	12.0	322	9.6
24－25未満	586	9.4	340	11.8	246	7.3
25－26未満	410	6.6	243	8.4	167	5.0
26－27未満	329	5.3	180	6.3	149	4.4
27－28未満	244	3.9	137	4.8	107	3.2
28－29未満	156	2.5	72	2.5	84	2.5
29－30未満	107	1.7	51	1.8	56	1.7
30－31未満	86	1.4	41	1.4	45	1.3
31－32未満	47	0.8	21	0.7	26	0.8
32－33未満	31	0.5	17	0.6	14	0.4
33－34未満	28	0.4	12	0.4	16	0.5
34－35未満	12	0.2	8	0.3	4	0.1
35以上	31	0.5	14	0.5	17	0.5

注1)身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお，女性は妊婦12名を除外している。  
 注2)BMIは体重(kg)／(身長(m))<sup>2</sup>で算出し，小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

(26年)

第15表の1 BMIの状況—年齢階級, 肥満度(BMI)別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 15歳以上〔妊婦除外〕

	総数	総数		やせ		普通		肥満		(再掲) 20以下		(再掲) 25以上30未満		(再掲) 30以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
																18.5未満
総数	総数	6,232	100.0	532	8.5	4,211	67.6	1,489	23.9	1,368	22.0	1,253	20.1	236	3.8	
	15-19歳	270	100.0	61	22.6	192	71.1	17	6.3	122	45.2	11	4.1	6	2.2	
	20-29歳	407	100.0	63	15.5	283	69.5	61	15.0	160	39.3	45	11.1	16	3.9	
	30-39歳	676	100.0	71	10.5	461	68.2	144	21.3	177	26.2	109	16.1	35	5.2	
	40-49歳	858	100.0	62	7.2	596	69.5	200	23.3	178	20.7	157	18.3	43	5.0	
	50-59歳	939	100.0	52	5.5	619	65.9	268	28.5	176	18.7	225	24.0	43	4.6	
	60-69歳	1,414	100.0	94	6.6	933	66.0	387	27.4	240	17.0	341	24.1	46	3.3	
	70歳以上	1,668	100.0	129	7.7	1,127	67.6	412	24.7	315	18.9	365	21.9	47	2.8	
	(再掲)															
	20歳以上	5,962	100.0	471	7.9	4,019	67.4	1,472	24.7	1,246	20.9	1,242	20.8	230	3.9	
	20-69歳	4,294	100.0	342	8.0	2,892	67.3	1,060	24.7	931	21.7	877	20.4	183	4.3	
	40-69歳	3,211	100.0	208	6.5	2,148	66.9	855	26.6	594	18.5	723	22.5	132	4.1	
	65-69歳	751	100.0	47	6.3	502	66.8	202	26.9	115	15.3	173	23.0	29	3.9	
	70-74歳	646	100.0	50	7.7	454	70.3	142	22.0	128	19.8	123	19.0	19	2.9	
	75-79歳	490	100.0	27	5.5	325	66.3	138	28.2	70	14.3	122	24.9	16	3.3	
80-84歳	320	100.0	30	9.4	203	63.4	87	27.2	67	20.9	82	25.6	5	1.6		
80歳以上	532	100.0	52	9.8	348	65.4	132	24.8	117	22.0	120	22.6	12	2.3		
85歳以上	212	100.0	22	10.4	145	68.4	45	21.2	50	23.6	38	17.9	7	3.3		
男性	総数	2,876	100.0	172	6.0	1,904	66.2	800	27.8	431	15.0	686	23.9	114	4.0	
	15-19歳	130	100.0	34	26.2	84	64.6	12	9.2	62	47.7	7	5.4	5	3.8	
	20-29歳	177	100.0	23	13.0	117	66.1	37	20.9	52	29.4	29	16.4	8	4.5	
	30-39歳	323	100.0	16	5.0	219	67.8	88	27.2	44	13.6	70	21.7	18	5.6	
	40-49歳	388	100.0	11	2.8	257	66.2	120	30.9	34	8.8	96	24.7	24	6.2	
	50-59歳	425	100.0	13	3.1	266	62.6	146	34.4	49	11.5	121	28.5	25	5.9	
	60-69歳	664	100.0	26	3.9	431	64.9	207	31.2	76	11.4	187	28.2	20	3.0	
	70歳以上	769	100.0	49	6.4	530	68.9	190	24.7	114	14.8	176	22.9	14	1.8	
	(再掲)															
	20歳以上	2,746	100.0	138	5.0	1,820	66.3	788	28.7	369	13.4	679	24.7	109	4.0	
	20-69歳	1,977	100.0	89	4.5	1,290	65.3	598	30.2	255	12.9	503	25.4	95	4.8	
	40-69歳	1,477	100.0	50	3.4	954	64.6	473	32.0	159	10.8	404	27.4	69	4.7	
	65-69歳	369	100.0	16	4.3	241	65.3	112	30.4	42	11.4	99	26.8	13	3.5	
	70-74歳	295	100.0	16	5.4	202	68.5	77	26.1	42	14.2	71	24.1	6	2.0	
	75-79歳	242	100.0	11	4.5	170	70.2	61	25.2	32	13.2	54	22.3	7	2.9	
80-84歳	155	100.0	18	11.6	96	61.9	41	26.5	29	18.7	41	26.5	0	0.0		
80歳以上	232	100.0	22	9.5	158	68.1	52	22.4	40	17.2	51	22.0	1	0.4		
85歳以上	77	100.0	4	5.2	62	80.5	11	14.3	11	14.3	10	13.0	1	1.3		
女性	総数	3,356	100.0	360	10.7	2,307	68.7	689	20.5	937	27.9	567	16.9	122	3.6	
	15-19歳	140	100.0	27	19.3	108	77.1	5	3.6	60	42.9	4	2.9	1	0.7	
	20-29歳	230	100.0	40	17.4	166	72.2	24	10.4	108	47.0	16	7.0	8	3.5	
	30-39歳	353	100.0	55	15.6	242	68.6	56	15.9	133	37.7	39	11.0	17	4.8	
	40-49歳	470	100.0	51	10.9	339	72.1	80	17.0	144	30.6	61	13.0	19	4.0	
	50-59歳	514	100.0	39	7.6	353	68.7	122	23.7	127	24.7	104	20.2	18	3.5	
	60-69歳	750	100.0	68	9.1	502	66.9	180	24.0	164	21.9	154	20.5	26	3.5	
	70歳以上	899	100.0	80	8.9	597	66.4	222	24.7	201	22.4	189	21.0	33	3.7	
	(再掲)															
	20歳以上	3,216	100.0	333	10.4	2,199	68.4	684	21.3	877	27.3	563	17.5	121	3.8	
	20-69歳	2,317	100.0	253	10.9	1,602	69.1	462	19.9	676	29.2	374	16.1	88	3.8	
	40-69歳	1,734	100.0	158	9.1	1,194	68.9	382	22.0	435	25.1	319	18.4	63	3.6	
	65-69歳	382	100.0	31	8.1	261	68.3	90	23.6	73	19.1	74	19.4	16	4.2	
	70-74歳	351	100.0	34	9.7	252	71.8	65	18.5	86	24.5	52	14.8	13	3.7	
	75-79歳	248	100.0	16	6.5	155	62.5	77	31.0	38	15.3	68	27.4	9	3.6	
80-84歳	165	100.0	12	7.3	107	64.8	46	27.9	38	23.0	41	24.8	5	3.0		
80歳以上	300	100.0	30	10.0	190	63.3	80	26.7	77	25.7	69	23.0	11	3.7		
85歳以上	135	100.0	18	13.3	83	61.5	34	25.2	39	28.9	28	20.7	6	4.4		

注1)身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦12名を除外している。

(26年)

注2)BMIは体重(kg)/(身長(m))<sup>2</sup>で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3)BMIの判定は下記のとおり。

低体重(やせ):18.5未満

普通:18.5以上25.0未満

肥満:25.0以上

第15表の2 目標とするBMIの範囲の分布—年齢階級, 目標とするBMIの範囲, 人数, 割合—総数・男性・女性, 18歳以上〔妊婦除外〕

		総数		範囲未満		範囲内		範囲以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	18-49歳	2,049	100.0	219	10.7	1,414	69.0	416	20.3
	50-69歳	2,353	100.0	412	17.5	1,286	54.7	655	27.8
	70歳以上	1,668	100.0	578	34.7	678	40.6	412	24.7
男性	18-49歳	944	100.0	58	6.1	632	66.9	254	26.9
	50-69歳	1,089	100.0	125	11.5	611	56.1	353	32.4
	70歳以上	769	100.0	227	29.5	352	45.8	190	24.7
女性	18-49歳	1,105	100.0	161	14.6	782	70.8	162	14.7
	50-69歳	1,264	100.0	287	22.7	675	53.4	302	23.9
	70歳以上	899	100.0	351	39.0	326	36.3	222	24.7

注1)身長と体重の測定を行った18歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦12名(すべて18-49歳)を除外している。(26年)  
 注2)BMIは体重(kg)/(身長(m))<sup>2</sup>で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

<参考>目標とするBMIの範囲(18歳以上)<sup>1,2</sup>

年齢(歳)	目標とするBMI (kg/m <sup>2</sup> )
18-49	18.5-24.9
50-69	20.0-24.9
70以上	21.5-24.9 <sup>3</sup>

(26年)

<sup>1</sup> 男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。

<sup>2</sup> 観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かったBMIを基に、疾患別の発症率とBMIとの関連、死因とBMIとの関連、日本人のBMIの実態に配慮し、総合的に判断し目標とする範囲を設定。

<sup>3</sup> 70歳以上では、総死亡率が最も低かったBMIと実態との乖離が見られるため、虚弱の予防及び生活習慣病の予防の両者に配慮する必要があることも踏まえ、当面目標とするBMIの範囲を21.5-24.9とした。(厚生労働省「日本人の食事摂取基準2015年版」)

第16表 学校保健統計調査方式による肥満区分—学校保健統計調査方式による肥満区分, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 6-14歳

		総数		6-8歳		9-11歳		12-14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	582	100.0	188	100.0	183	100.0	211	100.0
	-30%以下	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0
	-30%超～-20%以下	24	4.1	7	3.7	9	4.9	8	3.8
	-20%超～-10%以下	134	23.0	30	16.0	52	28.4	52	24.6
	-10%超～0%未満	214	36.8	91	48.4	57	31.1	66	31.3
	0%以上～+10%未満	115	19.8	41	21.8	33	18.0	41	19.4
	+10%以上～+20%未満	56	9.6	12	6.4	16	8.7	28	13.3
	+20%以上～+30%未満	23	4.0	4	2.1	11	6.0	8	3.8
	+30%以上～+40%未満	9	1.5	2	1.1	4	2.2	3	1.4
	+40%以上～+50%未満	4	0.7	0	0.0	0	0.0	4	1.9
+50%以上	2	0.3	1	0.5	0	0.0	1	0.5	
男性	総数	299	100.0	106	100.0	78	100.0	115	100.0
	-30%以下	1	0.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0
	-30%超～-20%以下	11	3.7	4	3.8	4	5.1	3	2.6
	-20%超～-10%以下	62	20.7	17	16.0	21	26.9	24	20.9
	-10%超～0%未満	108	36.1	49	46.2	24	30.8	35	30.4
	0%以上～+10%未満	62	20.7	23	21.7	15	19.2	24	20.9
	+10%以上～+20%未満	30	10.0	8	7.5	5	6.4	17	14.8
	+20%以上～+30%未満	14	4.7	2	1.9	6	7.7	6	5.2
	+30%以上～+40%未満	5	1.7	2	1.9	2	2.6	1	0.9
	+40%以上～+50%未満	4	1.3	0	0.0	0	0.0	4	3.5
+50%以上	2	0.7	1	0.9	0	0.0	1	0.9	
女性	総数	283	100.0	82	100.0	105	100.0	96	100.0
	-30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	-30%超～-20%以下	13	4.6	3	3.7	5	4.8	5	5.2
	-20%超～-10%以下	72	25.4	13	15.9	31	29.5	28	29.2
	-10%超～0%未満	106	37.5	42	51.2	33	31.4	31	32.3
	0%以上～+10%未満	53	18.7	18	22.0	18	17.1	17	17.7
	+10%以上～+20%未満	26	9.2	4	4.9	11	10.5	11	11.5
	+20%以上～+30%未満	9	3.2	2	2.4	5	4.8	2	2.1
	+30%以上～+40%未満	4	1.4	0	0.0	2	1.9	2	2.1
	+40%以上～+50%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
+50%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

注1)身長と体重の測定を行った6-14歳の者を集計対象とした。

注2)学校保健統計調査方式による区分は, p.14参照。

(26年)

第17表 腹圍の分布－腹圍の区分，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，6歳以上〔妊婦除外〕

総数	6-8歳		9-11歳		12-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 40-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
	総数	1000	総数	1000	総数	1000	総数	1000	総数	1000	総数	1000	総数	1000	総数	1000	総数	1000	総数	1000	総数	1000	総数	1000	
50cm未満	24	0.4	22	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
50-55cm未満	110	1.7	79	47.9	2	1.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.1	2	0.1	
55-60	139	2.2	39	23.6	18	9.3	3	1.3	6	1.6	2	0.7	2	0.2	4	0.4	2	0.2	3	0.2	19	0.3	10	0.3	
60-65	289	4.5	46	27.2	54	27.8	38	16.2	33	9.0	17	2.7	22	2.7	17	1.7	17	1.2	29	1.9	135	2.4	68	1.8	
65-70	521	8.2	18	10.7	53	27.3	60	25.5	68	18.5	66	10.6	78	9.7	50	5.6	71	5.2	51	3.3	384	6.8	221	6.0	
70-75	776	12.2	9	5.3	40	20.6	59	25.1	87	23.7	110	17.7	107	13.3	110	12.3	128	9.4	124	7.9	666	11.9	401	10.9	
75-80	952	14.9	1	0.6	8	4.7	13	6.7	41	17.4	61	16.6	107	15.7	140	15.7	207	15.2	209	13.4	889	15.8	600	16.3	
80-85	1107	17.4	0	0.0	9	4.6	13	5.5	49	13.4	126	20.3	163	20.2	177	19.8	257	18.9	312	20.0	1,084	19.3	718	19.5	
85-90	1,054	16.5	0	0.0	3	1.5	8	3.4	20	5.4	74	11.9	131	16.3	180	20.2	305	22.4	333	21.3	1,043	18.6	745	20.2	
90-95	704	11.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	1.7	18	4.9	48	7.7	102	11.4	187	13.7	266	17.0	699	12.5	469	12.7	
95-100	380	6.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	10	2.7	23	3.7	40	5.0	63	7.1	105	7.7	136	8.7	377	6.7	249	6.8	
100-105	177	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	17	2.7	14	1.6	29	3.3	46	3.4	63	4.0	176	3.1	115	3.1	
105-110	73	1.1	0	0.0	1	0.5	3	1.3	1	0.3	7	1.1	6	0.7	14	1.6	23	1.7	18	1.2	69	1.2	52	1.4	
110-115	44	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	0.6	11	1.4	5	0.6	11	0.8	12	0.8	44	0.8	28	0.8	
115-120	12	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	6	0.4	12	0.2	6	0.2	
120cm以上	11	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	0.8	4	0.6	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	10	0.2	3	0.1	
総数	2,955	100.0	88	100.0	105	100.0	113	100.0	160	100.0	297	100.0	358	100.0	404	100.0	637	100.0	721	100.0	2,577	100.0	1,681	100.0	
50cm未満	9	0.3	7	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
50-55cm未満	55	1.9	41	46.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
55-60	55	1.9	20	22.7	9	8.6	1	0.9	1	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	
60-65	81	2.7	14	15.9	24	22.9	12	10.6	3	1.9	2	0.7	0	0.0	1	0.2	2	0.3	6	0.8	14	0.5	6	0.4	
65-70	135	4.6	4	4.5	8	11.1	28	26.7	24	21.2	11	3.7	5	1.4	6	1.5	10	1.6	18	2.5	71	2.8	26	1.5	
70-75	256	8.7	2	2.3	5	6.9	22	21.0	37	23.1	30	10.1	25	7.0	26	6.4	38	6.0	39	5.4	196	7.6	110	6.5	
75-80	408	13.8	0	0.0	3	4.2	10	9.5	20	17.7	27	16.9	61	17.0	59	14.6	85	13.3	81	11.2	375	14.6	243	14.5	
80-85	573	19.4	0	0.0	1	1.4	7	6.7	9	8.0	22	20.0	88	24.6	79	19.6	125	19.6	154	21.4	556	21.6	341	20.3	
85-90	570	19.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0	5	4.4	11	6.9	48	16.2	59	14.6	163	25.6	157	21.8	563	21.8	407	24.2	
90-95	417	14.1	0	0.0	1	1.0	3	2.7	11	6.9	27	9.1	50	14.0	59	14.6	113	17.7	153	21.2	413	16.0	282	16.8	
95-100	211	7.1	0	0.0	0	0.0	3	2.7	6	3.8	15	5.1	28	7.8	35	8.7	58	9.1	66	9.2	208	8.1	147	8.7	
100-105	108	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.8	13	4.4	8	2.2	5	1.2	27	4.2	32	4.4	108	4.2	72	4.3	
105-110	41	1.4	0	0.0	1	1.0	3	2.7	0	0.0	5	1.7	5	1.4	7	1.7	11	1.7	9	1.2	37	1.4	28	1.7	
110-115	22	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.7	8	2.2	2	0.5	4	0.6	5	0.7	22	0.9	14	0.8	
115-120	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.1	5	0.2	3	0.2	
120cm以上	9	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	3	1.9	3	1.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.3	2	0.1	
総数	3,418	100.0	77	100.0	89	100.0	122	100.0	207	100.0	323	100.0	448	100.0	488	100.0	725	100.0	842	100.0	3,033	100.0	2,006	100.0	
50cm未満	15	0.4	15	19.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
50-55cm未満	55	1.6	38	49.4	1	1.1	1	0.8	1	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.1	2	0.1	
55-60	84	2.5	19	24.7	9	10.1	2	1.6	5	2.4	1	0.3	2	0.4	4	0.8	2	0.3	3	0.4	17	0.6	10	0.5	
60-65	208	6.1	2	2.6	30	33.7	26	21.3	30	14.5	15	4.6	22	4.9	16	3.3	15	2.1	23	2.7	121	4.0	62	3.1	
65-70	386	11.3	2	2.6	25	28.1	36	29.5	47	22.7	55	17.0	73	16.3	44	9.0	61	8.4	33	3.9	313	10.3	195	9.7	
70-75	520	15.2	0	0.0	4	4.1	18	20.2	21	50	24.2	80	24.8	82	18.3	84	17.2	90	12.4	85	10.1	471	15.5	291	14.5
75-80	544	15.9	1	1.3	3	3.4	21	17.2	34	16.4	60	18.6	89	19.9	81	16.6	122	16.8	128	15.2	514	16.9	357	17.8	
80-85	534	15.6	0	0.0	2	2.2	4	3.3	17	8.2	48	14.9	75	16.7	98	20.1	132	18.2	158	18.8	528	17.4	377	18.8	
85-90	484	14.2	0	0.0	1	1.1	3	2.5	9	4.3	26	8.0	54	12.1	73	15.0	142	19.6	176	20.9	480	15.8	338	16.8	
90-95	287	8.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	7	3.4	21	6.5	25	5.6	28	5.7	47	6.5	70	8.3	286	9.4	187	9.3	
95-100	169	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.9	8	2.5	12	2.7	28	5.7	47	6.5	113	13.4	169	5.6	102	5.1	
100-105	69	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.5	4	1.2	6	1.3	7	1.4	19	2.6	31	3.7	68	2.2	43	2.1	
105-110	32	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.6	1	0.2	7	1.4	12	1.7	9	1.1	32	1.1	24	1.2	
110-115	22	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	0.7	3	0.6	7	1.0	7	0.8	22	0.7	14	0.7	
115-120	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	5	0.6	7	0.2	3	0.1	
120cm以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.0	

注)腹圍の測定を行った6歳以上の者を集計対象とした。なお女性は妊婦6名(20-29歳の3名と30-39歳の3名)を除外した。(26年)



第18表 腹囲の分布—腹囲の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	5,610	100.0	367	100.0	620	100.0	806	100.0	892	100.0	1,362	100.0	1,563	100.0	3,687	100.0
	<85cm(男)/<90cm(女)	3,660	65.2	314	85.6	469	75.6	577	71.6	571	64.0	825	60.6	904	57.8	2,358	64.0
	≥85cm(男)/≥90cm(女)	1,950	34.8	53	14.4	151	24.4	229	28.4	321	36.0	537	39.4	659	42.2	1,329	36.0
男性	総数	2,577	100.0	160	100.0	297	100.0	358	100.0	404	100.0	637	100.0	721	100.0	1,681	100.0
	<85cm	1,213	47.1	121	75.6	184	62.0	179	50.0	171	42.3	260	40.8	298	41.3	726	43.2
	≥85cm	1,364	52.9	39	24.4	113	38.0	179	50.0	233	57.7	377	59.2	423	58.7	955	56.8
女性	総数	3,033	100.0	207	100.0	323	100.0	448	100.0	488	100.0	725	100.0	842	100.0	2,006	100.0
	<90cm	2,447	80.7	193	93.2	285	88.2	398	88.8	400	82.0	565	77.9	606	72.0	1,632	81.4
	≥90cm	586	19.3	14	6.8	38	11.8	50	11.2	88	18.0	160	22.1	236	28.0	374	18.6

注) 腹囲の測定を行った6歳以上の者を集計対象とした。なお女性は妊婦6名(20-29歳の3名と30-39歳の3名)を除外した。

(26年)

第19表 BMI・腹囲の分布—BMI・腹囲の区分, 人数, 年齢階級別, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	総数	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	5,597	100.0	365	100.0	619	100.0	803	100.0	890	100.0	1,361	100.0	1,559	100.0	3,679	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm(男)/90cm(女)	3,395	60.7	298	81.6	448	72.4	530	66.0	515	57.9	762	56.0	842	54.0	2,174	59.1
	BMIのみ超(BMI≥25)	255	4.6	14	3.8	20	3.2	44	5.5	54	6.1	63	4.6	60	3.8	178	4.8
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm(男)/90cm(女))	809	14.5	11	3.0	40	6.5	85	10.6	119	13.4	227	16.7	327	21.0	551	15.0
	BMI≥25, 腹囲≥85cm(男)/90cm(女)	1,138	20.3	42	11.5	111	17.9	144	17.9	202	22.7	309	22.7	330	21.2	776	21.1
男性	総数	2,570	100.0	159	100.0	296	100.0	357	100.0	403	100.0	636	100.0	719	100.0	1,677	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	1,171	45.6	115	72.3	178	60.1	170	47.6	161	40.0	254	39.9	293	40.8	701	41.8
	BMIのみ超(BMI≥25)	38	1.5	5	3.1	5	1.7	8	2.2	9	2.2	6	0.9	5	0.7	23	1.4
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm)	654	25.4	10	6.3	37	12.5	76	21.3	101	25.1	184	28.9	246	34.2	452	27.0
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	707	27.5	29	18.2	76	25.7	103	28.9	132	32.8	192	30.2	175	24.3	501	29.9
女性	総数	3,027	100.0	206	100.0	323	100.0	446	100.0	487	100.0	725	100.0	840	100.0	2,002	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	2,224	73.5	183	88.8	270	83.6	360	80.7	354	72.7	508	70.1	549	65.4	1,473	73.6
	BMIのみ超(BMI≥25)	217	7.2	9	4.4	15	4.6	36	8.1	45	9.2	57	7.9	55	6.5	155	7.7
	腹囲のみ超(腹囲≥90cm)	155	5.1	1	0.5	3	0.9	9	2.0	18	3.7	43	5.9	81	9.6	99	4.9
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	431	14.2	13	6.3	35	10.8	41	9.2	70	14.4	117	16.1	155	18.5	275	13.7

注) 身長と体重および腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお女性は妊婦6名(20-29歳の3名と30-39歳の3名)を除外した。

(26年)

(参考) 内臓脂肪型肥満の診断基準:

- BMI 25 以上で, 男性のウエスト周囲径 85cm 以上, 女性のウエスト周囲径 90cm 以上を上半身肥満の疑いとする。
- 上半身肥満の疑いと判定され, 腹部CT法による内臓脂肪面積 100cm<sup>2</sup> 以上(男女とも)を内臓脂肪型肥満と診断する。(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会, 2011年)

※ 国民健康・栄養調査の「腹囲」は, 「立位のへその高さ」で計測したが, 計測位置は「ウエスト周囲径」と同じである。

第20表 薬の服用状況—薬の服用状況，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	4,230	100.0	209	100.0	420	100.0	566	100.0	662	100.0	1,069	100.0	1,304	100.0
	使用なし	2,632	62.2	206	98.6	409	97.4	515	91.0	476	71.9	580	54.3	446	34.2
	使用あり(一つ以上)	1,598	37.8	3	1.4	11	2.6	51	9.0	186	28.1	489	45.7	858	65.8
	血圧を下げる薬	1,188	28.1	0	0.0	1	0.2	32	5.7	118	17.8	366	34.2	671	51.5
	脈の乱れを治す薬	165	3.9	2	1.0	0	0.0	1	0.2	14	2.1	27	2.5	121	9.3
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	284	6.7	0	0.0	3	0.7	11	1.9	33	5.0	85	8.0	152	11.7
	コレステロールを下げる薬	622	14.7	1	0.5	2	0.5	16	2.8	71	10.7	209	19.6	323	24.8
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	189	4.5	0	0.0	1	0.2	2	0.4	28	4.2	58	5.4	100	7.7
	貧血治療のための薬(鉄剤)	54	1.3	0	0.0	4	1.0	8	1.4	8	1.2	6	0.6	28	2.1
男性	総数	1,835	100.0	77	100.0	162	100.0	232	100.0	275	100.0	488	100.0	601	100.0
	使用なし	1,096	59.7	76	98.7	160	98.8	208	89.7	177	64.4	261	53.5	214	35.6
	使用あり(一つ以上)	739	40.3	1	1.3	2	1.2	24	10.3	98	35.6	227	46.5	387	64.4
	血圧を下げる薬	586	31.9	0	0.0	0	0.0	19	8.2	73	26.5	193	39.5	301	50.1
	脈の乱れを治す薬	91	5.0	1	1.3	0	0.0	1	0.4	6	2.2	14	2.9	69	11.5
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	170	9.3	0	0.0	0	0.0	8	3.4	19	6.9	54	11.1	89	14.8
	コレステロールを下げる薬	217	11.8	0	0.0	0	0.0	7	3.0	27	9.8	68	13.9	115	19.1
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	98	5.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	18	6.5	37	7.6	42	7.0
	貧血治療のための薬(鉄剤)	15	0.8	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.7	3	0.6	9	1.5
女性	総数	2,395	100.0	132	100.0	258	100.0	334	100.0	387	100.0	581	100.0	703	100.0
	使用なし	1,536	64.1	130	98.5	249	96.5	307	91.9	299	77.3	319	54.9	232	33.0
	使用あり(一つ以上)	859	35.9	2	1.5	9	3.5	27	8.1	88	22.7	262	45.1	471	67.0
	血圧を下げる薬	602	25.1	0	0.0	1	0.4	13	3.9	45	11.6	173	29.8	370	52.6
	脈の乱れを治す薬	74	3.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0	8	2.1	13	2.2	52	7.4
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	114	4.8	0	0.0	3	1.2	3	0.9	14	3.6	31	5.3	63	9.0
	コレステロールを下げる薬	405	16.9	1	0.8	2	0.8	9	2.7	44	11.4	141	24.3	208	29.6
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	91	3.8	0	0.0	0	0.0	2	0.6	10	2.6	21	3.6	58	8.3
	貧血治療のための薬(鉄剤)	39	1.6	0	0.0	3	1.2	8	2.4	6	1.6	3	0.5	19	2.7

注1) 血圧を下げる薬，脈の乱れを治す薬，インスリン注射又は血糖を下げる薬，コレステロールを下げる薬，中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬，貧血治療のための薬(鉄剤)のすべての服用状況に回答した者を集計対象とした。(26年)

注2) 複数回答。

第21表の1 血圧の状況—年齢階級, 日本高血圧学会による血圧の分類別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*
総数	総数	3,702	100.0	862	23.3	733	19.8	813	22	987	26.7	237	6.4	70	1.9	724	19.6
	20-29歳	146	100.0	101	69.2	23	15.8	15	10.3	5	3.4	2	1.4	0	0.0	2	1.4
	30-39歳	331	100.0	212	64.0	57	17.2	29	8.8	30	9.1	2	0.6	1	0.3	12	3.6
	40-49歳	449	100.0	176	39.2	122	27.2	84	18.7	49	10.9	13	2.9	5	1.1	13	2.9
	50-59歳	581	100.0	136	23.4	139	23.9	114	19.6	152	26.2	33	5.7	7	1.2	63	10.8
	60-69歳	979	100.0	130	13.3	180	18.4	234	23.9	325	33.2	80	8.2	30	3.1	217	22.2
	70歳以上	1,216	100.0	107	8.8	212	17.4	337	27.7	426	35.0	107	8.8	27	2.2	417	34.3
	(再掲) 65-74歳	1,031	100.0	115	11.2	194	18.8	259	25.1	352	34.1	84	8.1	27	2.6	288	27.9
	(再掲) 75歳以上	723	100.0	58	8.0	109	15.1	198	27.4	265	36.7	73	10.1	20	2.8	267	36.9
男性	総数	1,554	100.0	208	13.4	297	19.1	393	25.3	498	32.0	120	7.7	38	2.4	334	21.5
	20-29歳	55	100.0	24	43.6	16	29.1	9	16.4	5	9.1	1	1.8	0	0.0	2	3.6
	30-39歳	110	100.0	43	39.1	25	22.7	17	15.5	22	20.0	2	1.8	1	0.9	7	6.4
	40-49歳	164	100.0	38	23.2	48	29.3	43	26.2	27	16.5	5	3.0	3	1.8	5	3.0
	50-59歳	229	100.0	29	12.7	46	20.1	45	19.7	83	36.2	20	8.7	6	2.6	28	12.2
	60-69歳	439	100.0	34	7.7	79	18.0	113	25.7	153	34.9	46	10.5	14	3.2	102	23.2
	70歳以上	557	100.0	40	7.2	83	14.9	166	29.8	208	37.3	46	8.3	14	2.5	190	34.1
	(再掲) 65-74歳	478	100.0	36	7.5	82	17.2	126	26.4	181	37.9	39	8.2	14	2.9	140	29.3
	(再掲) 75歳以上	335	100.0	24	7.2	46	13.7	97	29.0	126	37.6	33	9.9	9	2.7	121	36.1
女性	総数	2,148	100.0	654	30.4	436	20.3	420	19.6	489	22.8	117	5.4	32	1.5	390	18.2
	20-29歳	91	100.0	77	84.6	7	7.7	6	6.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	221	100.0	169	76.5	32	14.5	12	5.4	8	3.6	0	0.0	0	0.0	5	2.3
	40-49歳	285	100.0	138	48.4	74	26.0	41	14.4	22	7.7	8	2.8	2	0.7	8	2.8
	50-59歳	352	100.0	107	30.4	93	26.4	69	19.6	69	19.6	13	3.7	1	0.3	35	9.9
	60-69歳	540	100.0	96	17.8	101	18.7	121	22.4	172	31.9	34	6.3	16	3.0	115	21.3
	70歳以上	659	100.0	67	10.2	129	19.6	171	25.9	218	33.1	61	9.3	13	2.0	227	34.4
	(再掲) 65-74歳	553	100.0	79	14.3	112	20.3	133	24.1	171	30.9	45	8.1	13	2.4	148	26.8
	(再掲) 75歳以上	388	100.0	34	8.8	63	16.2	101	26.0	139	35.8	40	10.3	11	2.8	146	37.6

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお、拡張期血圧の値が欠損している者(男性1名)を除外した。

(26年)

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

注3) 日本高血圧学会による血圧の分類はp.15を参照。

\* 総数に対する割合。

第 21 表の 2 血圧の状況—年齢階級, 日本高血圧学会による血圧の分類別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20 歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

	総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I 度高血圧		II 度高血圧		III 度高血圧		(再掲)収縮期高血圧		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*	
総数	総数	2,624	100.0	795	30.3	577	22	504	19.2	557	21.2	143	5.4	48	1.8	377	14.4
	20-29歳	146	100.0	101	69.2	23	15.8	15	10.3	5	3.4	2	1.4	0	0.0	2	1.4
	30-39歳	330	100.0	212	64.2	56	17	29	8.8	30	9.1	2	0.6	1	0.3	12	3.6
	40-49歳	425	100.0	175	41.2	118	27.8	76	17.9	42	9.9	10	2.4	4	0.9	10	2.4
	50-59歳	474	100.0	130	27.4	123	25.9	85	17.9	106	22.4	24	5.1	6	1.3	41	8.6
	60-69歳	642	100.0	113	17.6	135	21.0	138	21.5	181	28.2	53	8.3	22	3.4	127	19.8
	70歳以上	607	100.0	64	10.5	122	20.1	161	26.5	193	31.8	52	8.6	15	2.5	185	30.5
	(再掲) 65-74歳	609	100.0	94	15.4	135	22.2	139	22.8	173	28.4	50	8.2	18	3.0	139	22.8
	(再掲) 75歳以上	337	100.0	29	8.6	57	16.9	89	26.4	116	34.4	34	10.1	12	3.6	115	34.1
男性	総数	1,033	100.0	180	17.4	228	22.1	245	23.7	279	27.0	73	7.1	28	2.7	171	16.6
	20-29歳	55	100.0	24	43.6	16	29.1	9	16.4	5	9.1	1	1.8	0	0.0	2	3.6
	30-39歳	110	100.0	43	39.1	25	22.7	17	15.5	22	20.0	2	1.8	1	0.9	7	6.4
	40-49歳	150	100.0	38	25.3	46	30.7	39	26.0	22	14.7	3	2.0	2	1.3	2	1.3
	50-59歳	164	100.0	27	16.5	38	23.2	27	16.5	52	31.7	15	9.1	5	3.0	16	9.8
	60-69歳	267	100.0	27	10.1	54	20.2	68	25.5	76	28.5	31	11.6	11	4.1	54	20.2
	70歳以上	287	100.0	21	7.3	49	17.1	85	29.6	102	35.5	21	7.3	9	3.1	90	31.4
	(再掲) 65-74歳	268	100.0	25	9.3	56	20.9	68	25.4	85	31.7	23	8.6	11	4.1	64	23.9
	(再掲) 75歳以上	168	100.0	10	6.0	25	14.9	50	29.8	62	36.9	15	8.9	6	3.6	57	33.9
女性	総数	1,591	100.0	615	38.7	349	21.9	259	16.3	278	17.5	70	4.4	20	1.3	206	12.9
	20-29歳	91	100.0	77	84.6	7	7.7	6	6.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	220	100.0	169	76.8	31	14.1	12	5.5	8	3.6	0	0.0	0	0.0	5	2.3
	40-49歳	275	100.0	137	49.8	72	26.2	37	13.5	20	7.3	7	2.5	2	0.7	8	2.9
	50-59歳	310	100.0	103	33.2	85	27.4	58	18.7	54	17.4	9	2.9	1	0.3	25	8.1
	60-69歳	375	100.0	86	22.9	81	21.6	70	18.7	105	28.0	22	5.9	11	2.9	73	19.5
	70歳以上	320	100.0	43	13.4	73	22.8	76	23.8	91	28.4	31	9.7	6	1.9	95	29.7
	(再掲) 65-74歳	341	100.0	69	20.2	79	23.2	71	20.8	88	25.8	27	7.9	7	2.1	75	22.0
	(再掲) 75歳以上	169	100.0	19	11.2	32	18.9	39	23.1	54	32.0	19	11.2	6	3.6	58	34.3

注 1) 血圧の測定を行い, 身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した 20 歳以上の者を集計対象とした。なお, 拡張期血圧の値が欠損している者(男性 1 名)を除外した。

(26年)

注 2) 数値は 2 回の測定値の平均値を用いた。なお, 1 回しか測定できなかった者については, その値を採用した。

注 3) 日本高血圧学会による血圧の分類は p.15 を参照。

\* 総数に対する割合。

第22表の1 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布—収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の区分、年齢階級別、人数、割合—男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-89歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男	収縮期(最高)血圧	総数	1,555	100.0	55	100.0	110	100.0	165	100.0	229	100.0	439	100.0	557	100.0	1,385	100.0
		90mmHg未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1
		90-99	12	0.8	2	3.6	1	0.9	2	1.2	3	1.3	1	0.2	3	0.5	9	0.6
		100-109	65	4.2	8	14.5	15	13.6	8	4.8	10	4.4	12	2.7	12	2.2	42	3.0
		110-119	184	11.8	15	27.3	36	32.7	43	26.1	27	11.8	33	7.5	30	5.4	133	9.6
		120-129	322	20.7	15	27.3	23	20.9	56	33.9	55	24.0	84	19.1	89	16.0	282	20.4
		130-139	408	26.2	13	23.6	20	18.2	39	23.6	46	20.1	119	27.1	171	30.7	374	27.0
		140-149	271	17.4	2	3.6	11	10.0	8	4.8	43	18.8	87	19.8	120	21.5	258	18.6
		150-159	166	10.7	0	0.0	3	2.7	5	3.0	29	12.7	55	12.5	74	13.3	162	11.7
		160-169	69	4.4	0	0.0	1	0.9	2	1.2	10	4.4	27	6.2	29	5.2	67	4.8
170-179	34	2.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2	3	1.3	14	3.2	15	2.7	34	2.5		
180mmHg以上	23	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	7	1.6	13	2.3	23	1.7		
性	拡張期(最低)血圧	総数	1,554	100.0	55	100.0	110	100.0	164	100.0	229	100.0	439	100.0	557	100.0	1,384	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1
		50-59	27	1.7	3	5.5	2	1.8	1	0.6	4	1.7	3	0.7	14	2.5	22	1.6
		60-69	178	11.5	12	21.8	18	16.4	12	7.3	7	3.1	39	8.9	90	16.2	147	10.6
		70-79	479	30.8	29	52.7	41	37.3	54	32.9	49	21.4	105	23.9	201	36.1	407	29.4
		80-89	547	35.2	7	12.7	31	28.2	67	40.9	88	38.4	180	41.0	174	31.2	507	36.6
		90-99	250	16.1	3	5.5	15	13.6	22	13.4	62	27.1	84	19.1	64	11.5	232	16.8
		100-109	50	3.2	1	1.8	2	1.8	5	3.0	13	5.7	17	3.9	12	2.2	47	3.4
		110-119	18	1.2	0	0.0	1	0.9	2	1.2	5	2.2	9	2.1	1	0.2	17	1.2
120-129	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.2	3	0.2		
130-139	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
女	収縮期(最高)血圧	総数	2,148	100.0	91	100.0	221	100.0	285	100.0	352	100.0	540	100.0	659	100.0	1,819	100.0
		90mmHg未満	9	0.4	0	0.0	3	1.4	1	0.4	4	1.1	0	0.0	1	0.2	6	0.3
		90-99	99	4.6	18	19.8	38	17.2	23	8.1	10	2.8	6	1.1	4	0.6	43	2.4
		100-109	257	12.0	39	42.9	72	32.6	55	19.3	41	11.6	33	6.1	17	2.6	146	8.0
		110-119	338	15.7	23	25.3	62	28.1	76	26.7	66	18.8	62	11.5	49	7.4	251	13.8
		120-129	459	21.4	5	5.5	32	14.5	79	27.7	95	27.0	113	20.9	135	20.5	420	23.1
		130-139	410	19.1	5	5.5	9	4.1	31	10.9	70	19.9	125	23.1	170	25.8	392	21.6
		140-149	275	12.8	0	0.0	5	2.3	7	2.5	43	12.2	97	18.0	123	18.7	264	14.5
		150-159	173	8.1	0	0.0	0	0.0	8	2.8	13	3.7	61	11.3	91	13.8	172	9.5
		160-169	70	3.3	1	1.1	0	0.0	4	1.4	8	2.3	19	3.5	38	5.8	68	3.7
170-179	34	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	14	2.6	18	2.7	33	1.8		
180mmHg以上	24	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	10	1.9	13	2.0	24	1.3		
性	拡張期(最低)血圧	総数	2,148	100.0	91	100.0	221	100.0	285	100.0	352	100.0	540	100.0	659	100.0	1,819	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	10	0.5	1	1.1	4	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.6	5	0.3
		50-59	100	4.7	9	9.9	28	12.7	7	2.5	9	2.6	11	2.0	36	5.5	60	3.3
		60-69	450	20.9	43	47.3	83	37.6	68	23.9	59	16.8	79	14.6	118	17.9	320	17.6
		70-79	778	36.2	28	30.8	76	34.4	115	40.4	127	36.1	188	34.8	244	37.0	665	36.6
		80-89	562	26.2	9	9.9	27	12.2	71	24.9	109	31.0	154	28.5	192	29.1	525	28.9
		90-99	202	9.4	0	0.0	3	1.4	16	5.6	40	11.4	87	16.1	56	8.5	199	10.9
		100-109	34	1.6	1	1.1	0	0.0	6	2.1	8	2.3	11	2.0	8	1.2	33	1.8
		110-119	10	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	7	1.3	1	0.2	10	0.5
120-129	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1		
130-139	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

注1)血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(26年)  
 注2)数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

第22表の2 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-89歳		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	収縮期(最高)血圧	1,555	135.3	17.5	55	120.6	11.6	110	123.1	13.5	165	125.7	13.0	229	134.5	17.3	439	138.7	17.1	557	139.8	17.2	1,385	136.9	17.3
	拡張期(最低)血圧	1,554	81.1	11.0	55	73.0	9.8	110	78.8	11.0	164	81.9	10.3	229	85.9	11.0	439	83.4	10.7	557	78.4	10.4	1,384	81.7	10.9
女性	収縮期(最高)血圧	2,148	128.7	19.3	91	108.4	11.3	221	110.2	11.9	285	118.7	14.7	352	125.4	16.0	540	135.0	18.4	659	138.5	17.3	1,819	131.8	18.5
	拡張期(最低)血圧	2,148	76.5	11.0	91	68.9	8.7	221	69.3	9.5	285	76.1	10.2	352	78.1	10.2	540	79.9	11.4	659	76.4	10.6	1,819	77.8	10.8

注1)血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(26年)  
 注2)数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

第22表の3 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布—収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-89歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男	収縮期(最高)血圧	総数	1,034	100.0	55	100.0	110	100.0	151	100.0	164	100.0	267	100.0	287	100.0	868	100.0
		90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90-99	12	1.2	2	3.6	1	0.9	2	1.3	3	1.8	1	0.4	3	1.0	9	1.0
		100-109	58	5.6	8	14.5	15	13.6	8	5.3	10	6.1	10	3.7	7	2.4	35	4.0
		110-119	157	15.2	15	27.3	36	32.7	43	28.5	21	12.8	26	9.7	16	5.6	106	12.2
		120-129	239	23.1	15	27.3	23	20.9	52	34.4	45	27.4	53	19.9	51	17.8	201	23.2
		130-139	250	24.2	13	23.6	20	18.2	35	23.2	28	17.1	68	25.5	86	30.0	217	25.0
		140-149	152	14.7	2	3.6	11	10.0	5	3.3	27	16.5	45	16.9	62	21.6	139	16.0
		150-159	91	8.8	0	0.0	3	2.7	4	2.6	18	11.0	33	12.4	33	11.5	88	10.1
		160-169	40	3.9	0	0.0	1	0.9	1	0.7	7	4.3	16	6.0	15	5.2	38	4.4
170-179	18	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.8	9	3.4	5	1.7	18	2.1		
180mmHg以上	17	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	6	2.2	9	3.1	17	2.0		
女	拡張期(最低)血圧	総数	1,033	100.0	55	100.0	110	100.0	150	100.0	164	100.0	267	100.0	287	100.0	867	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-59	16	1.5	3	5.5	2	1.8	1	0.7	2	1.2	1	0.4	7	2.4	11	1.3
		60-69	121	11.7	12	21.8	18	16.4	12	8.0	7	4.3	29	10.9	43	15.0	91	10.5
		70-79	312	30.2	29	52.7	41	37.3	53	35.3	39	23.8	62	23.2	88	30.7	242	27.9
		80-89	375	36.3	7	12.7	31	28.2	59	39.3	60	36.6	111	41.6	107	37.3	336	38.8
		90-99	156	15.1	3	5.5	15	13.6	20	13.3	42	25.6	44	16.5	32	11.1	138	15.9
		100-109	36	3.5	1	1.8	2	1.8	3	2.0	9	5.5	12	4.5	9	3.1	33	3.8
		110-119	13	1.3	0	0.0	1	0.9	1	0.7	4	2.4	7	2.6	0	0.0	12	1.4
120-129	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.4	1	0.3	3	0.3		
130-139	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.1		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
男	収縮期(最高)血圧	総数	1,591	100.0	91	100.0	220	100.0	275	100.0	310	100.0	375	100.0	320	100.0	1,274	100.0
		90mmHg未満	8	0.5	0	0.0	3	1.4	1	0.4	4	1.3	0	0.0	0	0.0	5	0.4
		90-99	98	6.2	18	19.8	38	17.3	23	8.4	10	3.2	6	1.6	3	0.9	42	3.3
		100-109	246	15.5	39	42.9	72	32.7	55	20.0	39	12.6	31	8.3	10	3.1	135	10.6
		110-119	308	19.4	23	25.3	62	28.2	75	27.3	63	20.3	53	14.1	32	10.0	222	17.4
		120-129	361	22.7	5	5.5	31	14.1	75	27.3	87	28.1	86	22.9	77	24.1	324	25.4
		130-139	248	15.6	5	5.5	9	4.1	27	9.8	58	18.7	74	19.7	75	23.4	232	18.2
		140-149	157	9.9	0	0.0	5	2.3	7	2.5	31	10.0	61	16.3	53	16.6	150	11.8
		150-159	91	5.7	0	0.0	0	0.0	7	2.5	11	3.5	35	9.3	38	11.9	91	7.1
		160-169	42	2.6	1	1.1	0	0.0	4	1.5	5	1.6	12	3.2	20	6.3	41	3.2
170-179	18	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	10	2.7	6	1.9	18	1.4		
180mmHg以上	14	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	7	1.9	6	1.9	14	1.1		
女	拡張期(最低)血圧	総数	1,591	100.0	91	100.0	220	100.0	275	100.0	310	100.0	375	100.0	320	100.0	1,274	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	8	0.5	1	1.1	4	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	3	0.2
		50-59	78	4.9	9	9.9	28	12.7	7	2.5	9	2.9	8	2.1	17	5.3	40	3.1
		60-69	362	22.8	43	47.3	83	37.7	68	24.7	55	17.7	61	16.3	52	16.3	233	18.3
		70-79	586	36.8	28	30.8	75	34.1	110	40.0	117	37.7	136	36.3	120	37.5	481	37.8
		80-89	395	24.8	9	9.9	27	12.3	69	25.1	90	29.0	104	27.7	96	30.0	359	28.2
		90-99	127	8.0	0	0.0	3	1.4	14	5.1	33	10.6	52	13.9	25	7.8	124	9.7
		100-109	26	1.6	1	1.1	0	0.0	5	1.8	6	1.9	6	1.6	8	2.5	25	2.0
		110-119	7	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	5	1.3	0	0.0	7	0.5
120-129	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1		
130-139	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

注1)血圧の測定を行い,身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)  
注2)数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお,1回しか測定できなかった者については,その値を採用した。

第22表の4 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-89歳		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	収縮期(最高)血圧	1,034	132.9	17.9	55	120.6	11.6	110	123.1	13.5	151	124.4	12.1	164	132.7	17.9	267	137.8	18.5	287	139.1	18.0	868	134.9	18.0
	拡張期(最低)血圧	1,033	81.2	11.2	55	73.0	9.8	110	78.8	11.0	150	81.2	10.0	164	85.6	11.3	267	83.4	11.2	287	79.3	10.6	867	82.0	11.1
女性	収縮期(最高)血圧	1,591	124.8	18.9	91	108.4	11.3	220	110.2	11.9	275	118.2	14.7	310	124.0	15.8	375	132.9	19.0	320	136.6	17.9	1,274	128.5	18.5
	拡張期(最低)血圧	1,591	75.9	11.0	91	68.9	8.7	220	69.3	9.5	275	75.8	10.2	310	77.5	10.2	375	79.2	11.6	320	76.9	10.6	1,274	77.5	10.7

注1)血圧の測定を行い,身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)  
注2)数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお,1回しか測定できなかった者については,その値を採用した。

第23表の1 血色素量の分布—血色素量の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,471	100.0	51	100.0	108	100.0	160	100.0	218	100.0	419	100.0	515	100.0	444	100.0	314	100.0
	10.0g/dL未満	11	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	4	1.0	6	1.2	5	1.1	4	1.3
	10.0-10.9	9	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	7	1.4	2	0.5	6	1.9
	11.0-11.9	31	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	27	5.2	5	1.1	25	8.0
	12.0-12.9	102	6.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	6	2.8	28	6.7	67	13.0	42	9.5	45	14.3
	13.0-13.9	267	18.2	2	3.9	11	10.2	9	5.6	31	14.2	78	18.6	136	26.4	92	20.7	87	27.7
	14.0-14.9	452	30.7	14	27.5	28	25.9	59	36.9	71	32.6	135	32.2	145	28.2	142	32.0	80	25.5
	15.0-15.9	386	26.2	18	35.3	42	38.9	61	38.1	70	32.1	110	26.3	85	16.5	101	22.7	42	13.4
	16.0-16.9	168	11.4	14	27.5	25	23.1	25	15.6	29	13.3	45	10.7	30	5.8	43	9.7	18	5.7
	17.0-17.9	39	2.7	2	3.9	2	1.9	5	3.1	10	4.6	10	2.4	10	1.9	9	2.0	6	1.9
18.0g/dL以上	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	0.7	2	0.4	3	0.7	1	0.3	
女性	総数	2,019	100.0	86	100.0	213	100.0	277	100.0	341	100.0	507	100.0	595	100.0	509	100.0	348	100.0
	10.0g/dL未満	49	2.4	2	2.3	5	2.3	16	5.8	7	2.1	6	1.2	13	2.2	8	1.6	8	2.3
	10.0-10.9	62	3.1	2	2.3	10	4.7	18	6.5	7	2.1	3	0.6	22	3.7	4	0.8	20	5.7
	11.0-11.9	196	9.7	7	8.1	23	10.8	28	10.1	18	5.3	35	6.9	85	14.3	52	10.2	55	15.8
	12.0-12.9	558	27.6	18	20.9	64	30.0	73	26.4	77	22.6	137	27.0	189	31.8	144	28.3	111	31.9
	13.0-13.9	736	36.5	42	48.8	71	33.3	95	34.3	140	41.1	195	38.5	193	32.4	195	38.3	102	29.3
	14.0-14.9	345	17.1	13	15.1	35	16.4	39	14.1	74	21.7	102	20.1	82	13.8	86	16.9	45	12.9
	15.0-15.9	71	3.5	2	2.3	5	2.3	8	2.9	17	5.0	29	5.7	10	1.7	20	3.9	6	1.7
	16.0-16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	17.0-17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

注)血色素量の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第23表の2 血色素量の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,471	14.6	1.4	51	15.4	1.0	108	15.2	0.9	160	15.1	1.1	218	15.0	1.1	419	14.6	1.3	515	14.0	1.5	444	14.5	1.3	314	13.8	1.5
女性	2,019	13.0	1.2	86	13.1	1.1	213	12.9	1.2	277	12.7	1.5	341	13.3	1.2	507	13.3	1.1	595	12.8	1.2	509	13.1	1.1	348	12.7	1.2

注)血色素量の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第23表の3 血色素量の分布—血色素量の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上  
[貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,459	100.0	51	100.0	107	100.0	159	100.0	218	100.0	415	100.0	509	100.0	439	100.0	311	100.0
	10.0g/dL未満	10	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	3	0.7	6	1.2	4	0.9	4	1.3
	10.0-10.9	8	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	7	1.4	1	0.2	6	1.9
	11.0-11.9	31	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	27	5.3	5	1.1	25	8.0
	12.0-12.9	100	6.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	6	2.8	28	6.7	65	12.8	41	9.3	44	14.1
	13.0-13.9	263	18.0	2	3.9	11	10.3	9	5.7	31	14.2	77	18.6	133	26.1	90	20.5	86	27.7
	14.0-14.9	451	30.9	14	27.5	28	26.2	59	37.1	71	32.6	135	32.5	144	28.3	142	32.3	79	25.4
	15.0-15.9	384	26.3	18	35.3	41	38.3	61	38.4	70	32.1	109	26.3	85	16.7	101	23.0	42	13.5
	16.0-16.9	167	11.4	14	27.5	25	23.4	24	15.1	29	13.3	45	10.8	30	5.9	43	9.8	18	5.8
	17.0-17.9	39	2.7	2	3.9	2	1.9	5	3.1	10	4.6	10	2.4	10	2.0	9	2.1	6	1.9
	18.0g/dL以上	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	0.7	2	0.4	3	0.7	1	0.3
女性	総数	1,988	100.0	86	100.0	211	100.0	271	100.0	337	100.0	504	100.0	579	100.0	499	100.0	341	100.0
	10.0g/dL未満	42	2.1	2	2.3	5	2.4	15	5.5	6	1.8	4	0.8	10	1.7	6	1.2	6	1.8
	10.0-10.9	58	2.9	2	2.3	10	4.7	17	6.3	7	2.1	3	0.6	19	3.3	3	0.6	18	5.3
	11.0-11.9	191	9.6	7	8.1	22	10.4	27	10.0	18	5.3	35	6.9	82	14.2	49	9.8	55	16.1
	12.0-12.9	553	27.8	18	20.9	63	29.9	71	26.2	77	22.8	137	27.2	187	32.3	142	28.5	111	32.6
	13.0-13.9	729	36.7	42	48.8	71	33.6	94	34.7	138	40.9	195	38.7	189	32.6	194	38.9	99	29.0
	14.0-14.9	344	17.3	13	15.1	35	16.6	39	14.4	74	22.0	101	20.0	82	14.2	86	17.2	45	13.2
	15.0-15.9	69	3.5	2	2.3	5	2.4	8	3.0	16	4.7	29	5.8	9	1.6	19	3.8	6	1.8
	16.0-16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	17.0-17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	18.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注)血色素量の測定を行い、身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第23表の4 血色素量の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,459	14.6	1.4	51	15.4	1.0	107	15.2	0.9	159	15.1	1.1	218	15.0	1.1	415	14.6	1.3	509	14.0	1.5	439	14.5	1.3	311	13.8	1.5
女性	1,988	13.0	1.2	86	13.1	1.1	211	12.9	1.2	271	12.7	1.5	337	13.3	1.2	504	13.3	1.0	579	12.8	1.2	499	13.1	1.1	341	12.7	1.2

注)血色素量の測定を行い、身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)



第24表の1 赤血球数の分布—赤血球数の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,471	100.0	51	100.0	108	100.0	160	100.0	218	100.0	419	100.0	515	100.0	444	100.0	314	100.0
	400万個/mm <sup>3</sup> 未満	118	8.0	0	0.0	1	0.9	1	0.6	3	1.4	32	7.6	81	15.7	42	9.5	59	18.8
	400-449	444	30.2	3	5.9	11	10.2	23	14.4	58	26.6	131	31.3	218	42.3	164	36.9	135	43.0
	450-499	610	41.5	17	33.3	56	51.9	74	46.3	102	46.8	190	45.3	171	33.2	182	41.0	96	30.6
	500-549	265	18.0	24	47.1	36	33.3	57	35.6	49	22.5	60	14.3	39	7.6	49	11.0	22	7.0
	550-599	33	2.2	7	13.7	4	3.7	4	2.5	6	2.8	6	1.4	6	1.2	7	1.6	2	0.6
	600-649	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm <sup>3</sup> 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	2,019	100.0	86	100.0	213	100.0	277	100.0	341	100.0	507	100.0	595	100.0	509	100.0	348	100.0
	400万個/mm <sup>3</sup> 未満	376	18.6	3	3.5	26	12.2	36	13.0	39	11.4	72	14.2	200	33.6	104	20.4	137	39.4
	400-449	1,067	52.8	51	59.3	113	53.1	156	56.3	173	50.7	272	53.6	302	50.8	283	55.6	162	46.6
	450-499	525	26.0	30	34.9	66	31.0	75	27.1	115	33.7	148	29.2	91	15.3	117	23.0	48	13.8
	500-549	45	2.2	2	2.3	8	3.8	10	3.6	11	3.2	13	2.6	1	0.2	5	1.0	0	0.0
	550-599	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	2	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	600-649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm <sup>3</sup> 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 赤血球数の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第24表の2 赤血球数の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,471	461.6	45.9	51	508.7	34.3	108	491.5	33.6	160	488.0	36.4	218	472.3	38.0	419	459.1	42.6	515	440.1	45.3	444	453.1	42.8	314	434.5	46.7
女性	2,019	430.6	37.1	86	443.1	28.6	213	439.2	33.8	277	435.2	32.9	341	441.2	34.8	507	435.7	35.0	595	413.3	38.4	509	426.6	35.5	348	409.1	40.3

注) 赤血球数の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第25表の1 ヘマトクリット値の分布—ヘマトクリット値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	1,471	100.0	51	100.0	108	100.0	160	100.0	218	100.0	419	100.0	515	100.0	444	100.0	314	100.0
	25.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	25.0-29.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	30.0-34.9	24	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.7	17	3.3	7	1.6	14	4.5
	35.0-39.9	173	11.8	0	0.0	2	1.9	3	1.9	12	5.5	44	10.5	112	21.7	59	13.3	83	26.4
	40.0-44.9	696	47.3	17	33.3	42	38.9	72	45.0	108	49.5	197	47.0	260	50.5	212	47.7	155	49.4
	45.0-49.9	501	34.1	29	56.9	56	51.9	77	48.1	87	39.9	150	35.8	102	19.8	142	32.0	46	14.6
	50.0-54.9	67	4.6	4	7.8	8	7.4	6	3.8	10	4.6	19	4.5	20	3.9	21	4.7	13	4.1
	55.0%以上	7	0.5	1	2.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	1	0.2	3	0.6	2	0.5	2	0.6
	(再掲)39.8未満	184	12.5	0	0.0	1	0.9	3	1.9	12	5.5	49	11.7	119	23.1	63	14.2	90	28.7
(再掲)51.9以上	24	1.6	2	3.9	1	0.9	2	1.3	5	2.3	7	1.7	7	1.4	9	2.0	5	1.6	
女 性	総数	2,019	100.0	86	100.0	213	100.0	277	100.0	341	100.0	507	100.0	595	100.0	509	100.0	348	100.0
	25.0%未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	1	0.3
	25.0-29.9	20	1.0	1	1.2	2	0.9	6	2.2	3	0.9	2	0.4	6	1.0	3	0.6	5	1.4
	30.0-34.9	104	5.2	2	2.3	13	6.1	25	9.0	11	3.2	9	1.8	44	7.4	17	3.3	31	8.9
	35.0-39.9	777	38.5	34	39.5	90	42.3	117	42.2	105	30.8	173	34.1	258	43.4	191	37.5	158	45.4
	40.0-44.9	980	48.5	46	53.5	97	45.5	114	41.2	192	56.3	278	54.8	253	42.5	257	50.5	137	39.4
	45.0-49.9	133	6.6	3	3.5	11	5.2	14	5.1	29	8.5	45	8.9	31	5.2	40	7.9	15	4.3
	50.0-54.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	71	3.5	2	2.3	6	2.8	19	6.9	6	1.8	9	1.8	29	4.9	14	2.8	20	5.7
(再掲)45.0以上	135	6.7	3	3.5	11	5.2	14	5.1	30	8.8	45	8.9	32	5.4	40	7.9	16	4.6	

注)ヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第25表の2 ヘマトクリット値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—  
男性・女性, 20歳以上

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,471	43.9	3.9	51	46.2	3.1	108	45.6	2.9	160	45.2	3.1	218	44.9	3.1	419	44.0	3.8	515	42.5	4.2	444	43.7	3.9	314	41.9	4.4
女性	2,019	40.1	3.4	86	40.1	3.0	213	39.9	3.3	277	39.3	3.8	341	40.8	3.2	507	40.9	3.0	595	39.5	3.6	509	40.4	3.3	348	39.2	3.7

注)ヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第26表の1 平均赤血球容積（MCV）の分布—平均赤血球容積の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,471	100.0	51	100.0	108	100.0	160	100.0	218	100.0	419	100.0	515	100.0	444	100.0	314	100.0
	70fl未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-75未満	1	0.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.2	1	0.3
	80-85未満	21	1.4	0	0.0	3	2.8	3	1.9	3	1.4	5	1.2	7	1.4	3	0.7	6	1.9
	85-90未満	160	10.9	19	37.3	26	24.1	35	21.9	18	8.3	33	7.9	29	5.6	28	6.3	16	5.1
	90-95未満	515	35.0	20	39.2	48	44.4	81	50.6	85	39.0	141	33.7	140	27.2	132	29.7	84	26.8
	95-100未満	507	34.5	10	19.6	22	20.4	28	17.5	74	33.9	153	36.5	220	42.7	177	39.9	135	43.0
	100-105未満	205	13.9	1	2.0	7	6.5	8	5.0	32	14.7	68	16.2	89	17.3	76	17.1	59	18.8
	105-110未満	46	3.1	0	0.0	1	0.9	3	1.9	5	2.3	14	3.3	23	4.5	25	5.6	9	2.9
	110-115未満	7	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	3	0.7	3	0.6	1	0.2	3	1.0
	115-120未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.3
120fl以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	2,019	100.0	86	100.0	213	100.0	277	100.0	341	100.0	507	100.0	595	100.0	509	100.0	348	100.0
	70fl未満	18	0.9	1	1.2	2	0.9	9	3.2	3	0.9	2	0.4	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	70-75未満	13	0.6	1	1.2	3	1.4	5	1.8	4	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	75-80未満	24	1.2	2	2.3	6	2.8	12	4.3	2	0.6	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	80-85未満	59	2.9	7	8.1	13	6.1	20	7.2	6	1.8	7	1.4	6	1.0	9	1.8	2	0.6
	85-90未満	322	15.9	16	18.6	61	28.6	61	22.0	70	20.5	72	14.2	42	7.1	56	11.0	22	6.3
	90-95未満	799	39.6	41	47.7	75	35.2	94	33.9	154	45.2	231	45.6	204	34.3	206	40.5	118	33.9
	95-100未満	578	28.6	13	15.1	43	20.2	58	20.9	77	22.6	145	28.6	242	40.7	164	32.2	151	43.4
	100-105未満	178	8.8	4	4.7	10	4.7	18	6.5	23	6.7	41	8.1	82	13.8	63	12.4	43	12.4
	105-110未満	23	1.1	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	5	1.0	15	2.5	9	1.8	9	2.6
	110-115未満	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	3	0.5	0	0.0	3	0.9
	115-120未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120fl以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

注) 赤血球数およびヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第26表の2 平均赤血球容積（MCV）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上

(fl)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,471	95.4	5.3	51	91.0	5.0	108	93.0	4.8	160	92.8	5.2	218	95.3	4.7	419	96.0	5.0	515	96.7	5.1	444	96.7	5.0	314	96.7	5.0
女性	2,019	93.3	5.9	86	90.8	6.7	213	91.0	6.1	277	90.5	7.6	341	92.5	5.5	507	94.0	4.8	595	95.8	4.7	509	94.8	4.8	348	96	4.4

注) 赤血球数およびヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 27 表の 1 平均赤血球血色素量 (MCH) の分布—平均赤血球血色素量の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,471	100.0	51	100.0	108	100.0	160	100.0	218	100.0	419	100.0	515	100.0	444	100.0	314	100.0
	20pg未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-25未満	7	0.5	1	2.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2	4	0.8	2	0.5	2	0.6
	25-27未満	10	0.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.5	4	1.0	4	0.8	2	0.5	4	1.3
	27-29未満	56	3.8	7	13.7	4	3.7	8	5.0	10	4.6	11	2.6	16	3.1	8	1.8	10	3.2
	29-31未満	385	26.2	27	52.9	43	39.8	57	35.6	52	23.9	94	22.4	112	21.7	103	23.2	64	20.4
	31-33未満	704	47.9	15	29.4	49	45.4	80	50.0	98	45.0	220	52.5	242	47.0	216	48.6	153	48.7
	33-35未満	261	17.7	1	2.0	9	8.3	11	6.9	46	21.1	75	17.9	119	23.1	94	21.2	71	22.6
	35-40未満	47	3.2	0	0.0	2	1.9	2	1.3	11	5.0	14	3.3	18	3.5	19	4.3	10	3.2
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	2,019	100.0	86	100.0	213	100.0	277	100.0	341	100.0	507	100.0	595	100.0	509	100.0	348	100.0
	20pg未満	14	0.7	1	1.2	1	0.5	7	2.5	3	0.9	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	20-25未満	51	2.5	3	3.5	12	5.6	22	7.9	9	2.6	4	0.8	1	0.2	1	0.2	1	0.3
	25-27未満	55	2.7	5	5.8	15	7.0	16	5.8	7	2.1	7	1.4	5	0.8	9	1.8	1	0.3
	27-29未満	202	10.0	11	12.8	37	17.4	44	15.9	36	10.6	38	7.5	36	6.1	37	7.3	19	5.5
	29-31未満	897	44.4	46	53.5	100	46.9	97	35.0	167	49.0	263	51.9	224	37.6	220	43.2	133	38.2
	31-33未満	695	34.4	17	19.8	46	21.6	74	26.7	108	31.7	173	34.1	277	46.6	210	41.3	162	46.6
	33-35未満	100	5.0	3	3.5	2	0.9	17	6.1	8	2.3	21	4.1	49	8.2	30	5.9	31	8.9
	35-40未満	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0	0.0	2	0.3	1	0.2	1	0.3
	40pg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 血色素量および赤血球数の測定を行った 20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 27 表の 2 平均赤血球血色素量 (MCH) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上

(pg)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,471	31.7	1.9	51	30.3	1.8	108	31.0	1.6	160	31.0	2.0	218	31.9	1.8	419	31.9	1.7	515	31.9	1.9	444	32.0	1.7	314	31.9	1.9
女性	2,019	30.3	2.2	86	29.6	2.6	213	29.5	2.4	277	29.2	3.2	341	30.1	2.3	507	30.5	1.7	595	31.0	1.5	509	30.8	1.6	348	31.1	1.4

注) 血色素量および赤血球数の測定を行った 20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第28表の1 平均赤血球血色素濃度（MCHC）の分布—平均赤血球血色素濃度の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,471	100.0	51	100.0	108	100.0	160	100.0	218	100.0	419	100.0	515	100.0	444	100.0	314	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	28-30未満	9	0.6	1	2.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	3	0.7	4	0.8	3	0.7	2	0.6
	30-32未満	193	13.1	8	15.7	14	13.0	18	11.3	22	10.1	55	13.1	76	14.8	70	15.8	44	14.0
	32-34未満	871	59.2	23	45.1	55	50.9	80	50.0	119	54.6	257	61.3	337	65.4	270	60.8	215	68.5
	34%以上	396	26.9	19	37.3	38	35.2	61	38.1	77	35.3	104	24.8	97	18.8	101	22.7	52	16.6
女性	総数	2,019	100.0	86	100.0	213	100.0	277	100.0	341	100.0	507	100.0	595	100.0	509	100.0	348	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24-26未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-28未満	9	0.4	1	1.2	0	0.0	5	1.8	2	0.6	1.0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28-30未満	61	3.0	3	3.5	10	4.7	15	5.4	12	3.5	5	1.0	16	2.7	8	1.6	10	2.9
	30-32未満	510	25.3	20	23.3	65	30.5	75	27.1	64	18.8	122	24.1	164	27.6	128	25.1	95	27.3
	32-34未満	1,291	63.9	53	61.6	118	55.4	155	56.0	228	66.9	350	69.0	387	65.0	351	69.0	224	64.4
	34%以上	145	7.2	9	10.5	20	9.4	26	9.4	33	9.7	29	5.7	28	4.7	22	4.3	19	5.5

注) 血色素量およびヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第28表の2 平均赤血球血色素濃度（MCHC）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,471	33.2	1.2	51	33.3	1.5	108	33.4	1.3	160	33.4	1.3	218	33.4	1.1	419	33.2	1.1	515	33.0	1.1	444	33.1	1.1	314	33.0	1.1
女性	2,019	32.4	1.2	86	32.5	1.4	213	32.4	1.3	277	32.2	1.5	341	32.6	1.4	507	32.5	1.1	595	32.4	1.1	509	32.5	1.0	348	32.4	1.1

注) 血色素量およびヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 29 表の 1 血清総たんぱく質値の分布—血清総たんぱく質値の区分，年齢階級別，人数，割合—  
男性・女性，20 歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	169	100.0	144	100.0
	6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	6.0-6.4	15	1.0	0	0.0	1	0.9	2	1.2	1	0.5	5	1.2	6	1.2	4	0.9	2	1.2	3	2.1
	6.5-6.9	203	13.8	2	3.8	5	4.6	22	13.7	37	16.9	49	11.7	88	17.2	51	11.5	29	17.2	32	22.2
	7.0-7.4	646	43.9	22	42.3	46	42.6	67	41.6	89	40.6	190	45.2	232	45.2	214	48.2	80	47.3	54	37.5
	7.5-7.9	478	32.5	25	48.1	43	39.8	61	37.9	73	33.3	144	34.3	132	25.7	134	30.2	45	26.6	30	20.8
	8.0-8.4	114	7.7	3	5.8	11	10.2	9	5.6	18	8.2	26	6.2	47	9.2	36	8.1	10	5.9	21	14.6
	8.5g/dL以上	16	1.1	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	0.5	6	1.4	7	1.4	5	1.1	2	1.2	4	2.8
	(再掲)6.5未満	16	1.1	0	0.0	1	0.9	2	1.2	1	0.5	5	1.2	7	1.4	4	0.9	3	1.8	3	2.1
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	179	100.0	170	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0-6.4	22	1.1	1	1.2	2	0.9	1	0.4	5	1.5	4	0.8	9	1.5	8	1.6	1	0.6	4	2.4
	6.5-6.9	239	11.8	3	3.5	14	6.5	34	12.2	38	11.1	53	10.5	97	16.2	65	12.7	23	12.8	36	21.2
	7.0-7.4	880	43.4	28	32.6	97	44.7	150	54.0	144	42.2	199	39.3	262	43.9	224	43.8	82	45.8	73	42.9
	7.5-7.9	696	34.4	37	43.0	79	36.4	82	29.5	116	34.0	199	39.3	183	30.7	172	33.7	55	30.7	44	25.9
	8.0-8.4	173	8.5	17	19.8	23	10.6	9	3.2	37	10.9	47	9.3	40	6.7	37	7.2	17	9.5	11	6.5
	8.5g/dL以上	16	0.8	0	0.0	2	0.9	2	0.7	1	0.3	5	1.0	6	1.0	5	1.0	1	0.6	2	1.2
	(再掲)6.5未満	22	1.1	1	1.2	2	0.9	1	0.4	5	1.5	4	0.8	9	1.5	8	1.6	1	0.6	4	2.4

注)血清総たんぱく質値の測定を行った 20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 29 表の 2 血清総たんぱく質値の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—  
男性・女性，20 歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75-79歳			(再掲) 80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1473	7.4	0.4	52	7.5	0.3	108	7.5	0.4	161	7.4	0.4	219	7.4	0.4	420	7.4	0.4	513	7.3	0.5	444	7.4	0.4	169	7.3	0.4	144	7.4	0.6
女性	2,026	7.4	0.4	86	7.6	0.4	217	7.5	0.4	278	7.3	0.4	341	7.4	0.4	507	7.4	0.4	597	7.3	0.4	511	7.4	0.4	179	7.4	0.4	170	7.3	0.5

注)血清総たんぱく質値の測定を行った 20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第30表の1 血清アルブミン値の分布—血清アルブミン値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	169	100.0	144	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	2	1.2	1	0.7
	3.4-3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	3.6-3.7	23	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	19	3.7	7	1.6	5	3.0	11	7.6
	3.8-3.9	65	4.4	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	0.9	13	3.1	48	9.4	18	4.1	14	8.3	24	16.7
	4.0-4.1	141	9.6	0	0.0	2	1.9	1	0.6	8	3.7	34	8.1	96	18.7	52	11.7	29	17.2	34	23.6
	4.2-4.3	250	17.0	1	1.9	3	2.8	8	5.0	28	12.8	82	19.5	128	25.0	101	22.7	44	26.0	29	20.1
	4.4-4.5	359	24.4	8	15.4	7	6.5	34	21.1	61	27.9	126	30.0	123	24.0	117	26.4	51	30.2	30	20.8
	4.6-4.7	294	20.0	6	11.5	28	25.9	39	24.2	53	24.2	102	24.3	66	12.9	98	22.1	17	10.1	11	7.6
	4.8-4.9	212	14.4	14	26.9	33	30.6	48	29.8	45	20.5	47	11.2	25	4.9	39	8.8	6	3.6	4	2.8
	5.0-5.1	93	6.3	16	30.8	24	22.2	21	13.0	18	8.2	11	2.6	3	0.6	9	2.0	1	0.6	0	0.0
	5.2g/dL以上	32	2.2	7	13.5	11	10.2	8	5.0	4	1.8	1	0.2	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8	1	0.2	2	1.2	1	0.7
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	179	100.0	170	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	3.2-3.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	3.4-3.5	5	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.7	3	0.6	0	0.0	1	0.6
	3.6-3.7	18	0.9	3	3.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.4	12	2.0	5	1.0	2	1.1	6	3.5
	3.8-3.9	64	3.2	1	1.2	1	0.5	4	1.4	5	1.5	15	3.0	38	6.4	20	3.9	10	5.6	16	9.4
	4.0-4.1	214	10.6	0	0.0	9	4.1	25	9.0	19	5.6	49	9.7	112	18.8	70	13.7	32	17.9	44	25.9
	4.2-4.3	417	20.6	6	7.0	22	10.1	65	23.4	81	23.8	102	20.1	141	23.6	116	22.7	41	22.9	43	25.3
	4.4-4.5	536	26.5	18	20.9	56	25.8	88	31.7	84	24.6	135	26.6	155	26.0	135	26.4	49	27.4	35	20.6
	4.6-4.7	484	23.9	29	33.7	70	32.3	70	25.2	86	25.2	136	26.8	93	15.6	108	21.1	35	19.6	17	10.0
	4.8-4.9	211	10.4	19	22.1	38	17.5	20	7.2	51	15.0	53	10.5	30	5.0	39	7.6	8	4.5	6	3.5
	5.0-5.1	59	2.9	4	4.7	17	7.8	3	1.1	14	4.1	12	2.4	9	1.5	13	2.5	2	1.1	0	0.0
	5.2g/dL以上	15	0.7	6	7.0	2	0.9	2	0.7	1	0.3	3	0.6	1	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	8	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	6	1.0	3	0.6	0	0.0	3	1.8

注)血清アルブミン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第30表の2 血清アルブミン値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—  
男性・女性, 20歳以上

(g/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75-79歳			(再掲) 80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
男性	1,473	4.5	0.3	52	4.9	0.3	108	4.8	0.3	161	4.7	0.3	219	4.6	0.3	420	4.5	0.3	513	4.3	0.3	444	4.4	0.3	169	4.3	0.3	144	4.2	0.3
女性	2,026	4.4	0.3	86	4.6	0.3	217	4.6	0.3	278	4.4	0.3	341	4.5	0.3	507	4.5	0.3	597	4.3	0.3	511	4.4	0.3	179	4.4	0.3	170	4.2	0.3

注)血清アルブミン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 31 表の 1 ヘモグロビン A1c (NGSP) の分布—ヘモグロビン A1c (NGSP) の区分, 年齢階級別,

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	3,488	100.0	137	100.0	321	100.0	437	100.0	559	100.0	925	100.0	1,109	100.0	952	100.0	661	100.0
4.2%以下	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2
4.5-4.6	7	0.2	2	1.5	1	0.3	3	0.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.7-4.8	32	0.9	6	4.4	6	1.9	8	1.8	5	0.9	5	0.5	2	0.2	3	0.3	1	0.2
4.9-5.0	123	3.5	23	16.8	27	8.4	30	6.9	16	2.9	17	1.8	10	0.9	12	1.3	9	1.4
5.1-5.2	319	9.1	32	23.4	63	19.6	62	14.2	50	8.9	54	5.8	58	5.2	52	5.5	35	5.3
5.3	248	7.1	14	10.2	51	15.9	45	10.3	48	8.6	50	5.4	40	3.6	37	3.9	27	4.1
5.4	301	8.6	25	18.2	42	13.1	46	10.5	52	9.3	62	6.7	74	6.7	65	6.8	45	6.8
5.5	407	11.7	18	13.1	41	12.8	56	12.8	74	13.2	111	12.0	107	9.6	110	11.6	63	9.5
5.6	367	10.5	6	4.4	25	7.8	50	11.4	62	11.1	100	10.8	124	11.2	102	10.7	73	11.0
5.7	350	10.0	7	5.1	24	7.5	35	8.0	69	12.3	96	10.4	119	10.7	105	11.0	68	10.3
5.8	263	7.5	1	0.7	16	5.0	38	8.7	47	8.4	79	8.5	82	7.4	74	7.8	47	7.1
5.9	242	6.9	1	0.7	10	3.1	17	3.9	39	7.0	78	8.4	97	8.7	80	8.4	56	8.5
6.0	144	4.1	2	1.5	4	1.2	11	2.5	17	3.0	44	4.8	66	6.0	47	4.9	41	6.2
6.1	118	3.4	0	0.0	7	2.2	11	2.5	18	3.2	33	3.6	49	4.4	36	3.8	28	4.2
6.2	96	2.8	0	0.0	0	0.0	7	1.6	11	2.0	36	3.9	42	3.8	39	4.1	21	3.2
6.3	73	2.1	0	0.0	0	0.0	3	0.7	8	1.4	26	2.8	36	3.2	28	2.9	23	3.5
6.4	69	2.0	0	0.0	0	0.0	7	1.6	6	1.1	19	2.1	37	3.3	24	2.5	25	3.8
6.5	35	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.9	10	1.1	20	1.8	13	1.4	13	2.0
6.6-6.7	74	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	0.9	27	2.9	41	3.7	35	3.7	27	4.1
6.8-6.9	60	1.7	0	0.0	0	0.0	2	0.5	7	1.3	15	1.6	36	3.2	27	2.8	17	2.6
7.0-7.1	33	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.4	10	1.1	19	1.7	13	1.4	11	1.7
7.2-7.3	27	0.8	0	0.0	1	0.3	0	0.0	7	1.3	9	1.0	10	0.9	11	1.2	6	0.9
7.4-7.5	21	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	7	0.8	12	1.1	10	1.1	5	0.8
7.6-7.7	13	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	7	0.8	3	0.3	5	0.5	1	0.2
7.8-7.9	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	4	0.4	2	0.2	3	0.3	2	0.3
8.0-8.1	12	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.6	6	0.5	6	0.6	4	0.6
8.2-8.3	12	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	4	0.4	7	0.6	6	0.6	3	0.5
8.4-8.5	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	4	0.4	1	0.1	4	0.6
8.6-8.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2
8.8-8.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	2	0.2	0	0.0
9.0-9.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
9.4%以上	18	0.5	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.4	10	1.1	4	0.4	5	0.5	4	0.6
総 数	1,469	100.0	51	100.0	108	100.0	160	100.0	218	100.0	418	100.0	514	100.0	443	100.0	313	100.0
4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	5	0.3	2	3.9	0	0.0	2	1.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.7-4.8	14	1.0	1	2.0	4	3.7	3	1.9	3	1.4	2	0.5	1	0.2	1	0.2	0	0.0
4.9-5.0	56	3.8	8	15.7	15	13.9	6	3.8	8	3.7	14	3.3	5	1.0	11	2.5	4	1.3
5.1-5.2	161	11.0	15	29.4	25	23.1	23	14.4	24	11.0	36	8.6	38	7.4	35	7.9	22	7.0
5.3	102	6.9	6	11.8	13	12.0	13	8.1	23	10.6	26	6.2	21	4.1	19	4.3	13	4.2
5.4	117	8.0	8	15.7	12	11.1	25	15.6	17	7.8	21	5.0	34	6.6	25	5.6	21	6.7
5.5	171	11.6	6	11.8	14	13.0	19	11.9	29	13.3	53	12.7	50	9.7	55	12.4	31	9.9
5.6	154	10.5	2	3.9	10	9.3	19	11.9	23	10.6	39	9.3	61	11.9	47	10.6	35	11.2
5.7	117	8.0	2	3.9	5	4.6	11	6.9	20	9.2	39	9.3	40	7.8	38	8.6	24	7.7
5.8	102	6.9	0	0.0	5	4.6	12	7.5	16	7.3	31	7.4	38	7.4	33	7.4	23	7.3
5.9	98	6.7	0	0.0	3	2.8	5	3.1	15	6.9	32	7.7	43	8.4	37	8.4	29	9.3
6.0	57	3.9	1	2.0	0	0.0	5	3.1	5	2.3	16	3.8	30	5.8	18	4.1	20	6.4
6.1	46	3.1	0	0.0	2	1.9	6	3.8	6	2.8	14	3.3	18	3.5	12	2.7	12	3.8
6.2	42	2.9	0	0.0	0	0.0	3	1.9	5	2.3	16	3.8	18	3.5	16	3.6	10	3.2
6.3	29	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.4	12	2.9	13	2.5	13	2.9	7	2.2
6.4	27	1.8	0	0.0	0	0.0	3	1.9	3	1.4	6	1.4	15	2.9	9	2.0	10	3.2
6.5	16	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	5	1.2	10	1.9	6	1.4	6	1.9
6.6-6.7	41	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.8	12	2.9	25	4.9	17	3.8	16	5.1
6.8-6.9	31	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.4	8	1.9	19	3.7	15	3.4	8	2.6
7.0-7.1	16	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	6	1.4	8	1.6	9	2.0	3	1.0
7.2-7.3	14	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	5	1.2	6	1.2	6	1.4	4	1.3
7.4-7.5	8	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	3	0.7	3	0.6	3	0.7	2	0.6
7.6-7.7	6	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	3	0.7	1	0.2	1	0.2	1	0.3
7.8-7.9	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.5	2	0.4	2	0.5	2	0.6
8.0-8.1	8	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.4	2	0.4	5	1.1	1	0.3
8.2-8.3	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.2	4	0.9	2	0.6
8.4-8.5	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.2	4	0.8	1	0.2	4	1.3
8.6-8.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3
8.8-8.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
9.0-9.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4%以上	9	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.7	2	0.4	4	0.9	2	0.6



人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	2,019	100.0	86	100.0	213	100.0	277	100.0	341	100.0	507	100.0	595	100.0	509	100.0	348	100.0
4.2%以下	2	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
4.5-4.6	2	0.1	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.7-4.8	18	0.9	5	5.8	2	0.9	5	1.8	2	0.6	3	0.6	1	0.2	2	0.4	1	0.3
4.9-5.0	67	3.3	15	17.4	12	5.6	24	8.7	8	2.3	3	0.6	5	0.8	1	0.2	5	1.4
5.1-5.2	158	7.8	17	19.8	38	17.8	39	14.1	26	7.6	18	3.6	20	3.4	17	3.3	13	3.7
5.3	146	7.2	8	9.3	38	17.8	32	11.6	25	7.3	24	4.7	19	3.2	18	3.5	14	4.0
5.4	184	9.1	17	19.8	30	14.1	21	7.6	35	10.3	41	8.1	40	6.7	40	7.9	24	6.9
5.5	236	11.7	12	14.0	27	12.7	37	13.4	45	13.2	58	11.4	57	9.6	55	10.8	32	9.2
5.6	213	10.5	4	4.7	15	7.0	31	11.2	39	11.4	61	12.0	63	10.6	55	10.8	38	10.9
5.7	233	11.5	5	5.8	19	8.9	24	8.7	49	14.4	57	11.2	79	13.3	67	13.2	44	12.6
5.8	161	8.0	1	1.2	11	5.2	26	9.4	31	9.1	48	9.5	44	7.4	41	8.1	24	6.9
5.9	144	7.1	1	1.2	7	3.3	12	4.3	24	7.0	46	9.1	54	9.1	43	8.4	27	7.8
6.0	87	4.3	1	1.2	4	1.9	6	2.2	12	3.5	28	5.5	36	6.1	29	5.7	21	6.0
6.1	72	3.6	0	0.0	5	2.3	5	1.8	12	3.5	19	3.7	31	5.2	24	4.7	16	4.6
6.2	54	2.7	0	0.0	0	0.0	4	1.4	6	1.8	20	3.9	24	4.0	23	4.5	11	3.2
6.3	44	2.2	0	0.0	0	0.0	2	0.7	5	1.5	14	2.8	23	3.9	15	2.9	16	4.6
6.4	42	2.1	0	0.0	0	0.0	4	1.4	3	0.9	13	2.6	22	3.7	15	2.9	15	4.3
6.5	19	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	5	1.0	10	1.7	7	1.4	7	2.0
6.6-6.7	33	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	15	3.0	16	2.7	18	3.5	11	3.2
6.8-6.9	29	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.2	7	1.4	17	2.9	12	2.4	9	2.6
7.0-7.1	17	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	4	0.8	11	1.8	4	0.8	8	2.3
7.2-7.3	13	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	4	1.2	4	0.8	4	0.7	5	1.0	2	0.6
7.4-7.5	13	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8	9	1.5	7	1.4	3	0.9
7.6-7.7	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	0.8	2	0.3	4	0.8	0	0.0
7.8-7.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0
8.0-8.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.7	1	0.2	3	0.9
8.2-8.3	6	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	4	0.8	1	0.2	2	0.4	1	0.3
8.4-8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.6-8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-8.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
9.4%以上	9	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.4	2	0.6	3	0.6	2	0.3	1	0.2	2	0.6

注)ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第31表の2 ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—総数・男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	3,488	5.8	0.7	137	5.3	0.3	321	5.4	0.4	437	5.5	0.4	559	5.7	0.6	925	5.9	0.8	1,109	5.9	0.6	952	5.9	0.7	661	5.9	0.7
男性	1,469	5.8	0.7	51	5.3	0.3	108	5.3	0.3	160	5.6	0.4	218	5.7	0.6	418	5.9	0.9	514	5.9	0.7	443	5.9	0.8	313	5.9	0.7
女性	2,019	5.7	0.6	86	5.3	0.3	213	5.5	0.5	277	5.5	0.5	341	5.7	0.6	507	5.9	0.7	595	5.9	0.6	509	5.9	0.6	348	5.9	0.6

注)ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第31表の3 ヘモグロビンA1c (NGSP) の分布—ヘモグロビンA1c (NGSP) の区分, 年齢階級別,

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	3,251	100.0	137	100.0	319	100.0	429	100.0	529	100.0	858	100.0	979	100.0	861	100.0	582	100.0
4.2%以下	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2
4.5-4.6	7	0.2	2	1.5	1	0.3	3	0.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.7-4.8	32	1.0	6	4.4	6	1.9	8	1.9	5	0.9	5	0.6	2	0.2	3	0.3	1	0.2
4.9-5.0	123	3.8	23	16.8	27	8.5	30	7.0	16	3.0	17	2.0	10	1.0	12	1.4	9	1.5
5.1-5.2	319	9.8	32	23.4	63	19.7	62	14.5	50	9.5	54	6.3	58	5.9	52	6.0	35	6.0
5.3	248	7.6	14	10.2	51	16.0	45	10.5	48	9.1	50	5.8	40	4.1	37	4.3	27	4.6
5.4	300	9.2	25	18.2	42	13.2	46	10.7	52	9.8	61	7.1	74	7.6	65	7.5	45	7.7
5.5	404	12.4	18	13.1	41	12.9	56	13.1	74	14.0	111	12.9	104	10.6	109	12.7	61	10.5
5.6	365	11.2	6	4.4	25	7.8	50	11.7	60	11.3	100	11.7	124	12.7	102	11.8	73	12.5
5.7	348	10.7	7	5.1	24	7.5	35	8.2	69	13.0	95	11.1	118	12.1	105	12.2	67	11.5
5.8	260	8.0	1	0.7	16	5.0	38	8.9	47	8.9	78	9.1	80	8.2	72	8.4	46	7.9
5.9	239	7.4	1	0.7	10	3.1	17	4.0	39	7.4	76	8.9	96	9.8	78	9.1	55	9.5
6.0	139	4.3	2	1.5	4	1.3	11	2.6	17	3.2	43	5.0	62	6.3	47	5.5	37	6.4
6.1	112	3.4	0	0.0	7	2.2	11	2.6	18	3.4	31	3.6	45	4.6	34	3.9	24	4.1
6.2	80	2.5	0	0.0	0	0.0	6	1.4	7	1.3	31	3.6	36	3.7	35	4.1	18	3.1
6.3	62	1.9	0	0.0	0	0.0	3	0.7	7	1.3	24	2.8	28	2.9	24	2.8	18	3.1
6.4	58	1.8	0	0.0	0	0.0	6	1.4	6	1.1	17	2.0	29	3.0	21	2.4	18	3.1
6.5	22	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	9	1.0	10	1.0	8	0.9	8	1.4
6.6-6.7	41	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	19	2.2	20	2.0	22	2.6	14	2.4
6.8-6.9	34	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	10	1.2	21	2.1	15	1.7	11	1.9
7.0-7.1	14	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	0.6	8	0.8	4	0.5	5	0.9
7.2-7.3	7	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	4	0.5	1	0.1	3	0.3	1	0.2
7.4-7.5	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	3	0.3	3	0.3	0	0.0
7.6-7.7	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.5	0	0.0	2	0.2	0	0.0
7.8-7.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2
8.0-8.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	2	0.3
8.2-8.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	1	0.2
8.4-8.5	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	2	0.3
8.6-8.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-8.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
9.0-9.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
9.4%以上	11	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	7	0.8	2	0.2	3	0.3	2	0.3
総 数	1,332	100.0	51	100.0	108	100.0	154	100.0	201	100.0	379	100.0	439	100.0	390	100.0	265	100.0
4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	5	0.4	2	3.9	0	0.0	2	1.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.7-4.8	14	1.1	1	2.0	4	3.7	3	1.9	3	1.5	2	0.5	1	0.2	1	0.3	0	0.0
4.9-5.0	56	4.2	8	15.7	15	13.9	6	3.9	8	4.0	14	3.7	5	1.1	11	2.8	4	1.5
5.1-5.2	161	12.1	15	29.4	25	23.1	23	14.9	24	11.9	36	9.5	38	8.7	35	9.0	22	8.3
5.3	102	7.7	6	11.8	13	12.0	13	8.4	23	11.4	26	6.9	21	4.8	19	4.9	13	4.9
5.4	116	8.7	8	15.7	12	11.1	25	16.2	17	8.5	20	5.3	34	7.7	25	6.4	21	7.9
5.5	168	12.6	6	11.8	14	13.0	19	12.3	29	14.4	53	14.0	47	10.7	54	13.8	29	10.9
5.6	152	11.4	2	3.9	10	9.3	19	12.3	21	10.4	39	10.3	61	13.9	47	12.1	35	13.2
5.7	117	8.8	2	3.9	5	4.6	11	7.1	20	10.0	39	10.3	40	9.1	38	9.7	24	9.1
5.8	99	7.4	0	0.0	5	4.6	12	7.8	16	8.0	30	7.9	36	8.2	31	7.9	22	8.3
5.9	95	7.1	0	0.0	3	2.8	5	3.2	15	7.5	30	7.9	42	9.6	35	9.0	28	10.6
6.0	54	4.1	1	2.0	0	0.0	5	3.2	5	2.5	15	4.0	28	6.4	18	4.6	18	6.8
6.1	44	3.3	0	0.0	2	1.9	6	3.9	6	3.0	13	3.4	17	3.9	11	2.8	11	4.2
6.2	32	2.4	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.0	13	3.4	15	3.4	14	3.6	8	3.0
6.3	24	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.0	10	2.6	11	2.5	12	3.1	5	1.9
6.4	20	1.5	0	0.0	0	0.0	2	1.3	3	1.5	5	1.3	10	2.3	7	1.8	6	2.3
6.5	10	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	5	1.3	4	0.9	3	0.8	3	1.1
6.6-6.7	19	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	9	2.4	9	2.1	11	2.8	5	1.9
6.8-6.9	19	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	6	1.6	12	2.7	9	2.3	6	2.3
7.0-7.1	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	0.8	2	0.5	2	0.5	1	0.4
7.2-7.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7.4-7.5	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
7.6-7.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7.8-7.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
8.0-8.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
8.2-8.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.3	1	0.4
8.4-8.5	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	0.8
8.6-8.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-8.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
9.0-9.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4%以上	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0	0.0	3	0.8	0	0.0

人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,919	100.0	86	100.0	211	100.0	275	100.0	328	100.0	479	100.0	540	100.0	471	100.0	317	100.0
女性	2	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.2%以下	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
4.3-4.4	2	0.1	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	18	0.9	5	5.8	2	0.9	5	1.8	2	0.6	3	0.6	1	0.2	2	0.4	1	0.3
4.7-4.8	67	3.5	15	17.4	12	5.7	24	8.7	8	2.4	3	0.6	5	0.9	1	0.2	5	1.6
4.9-5.0	158	8.2	17	19.8	38	18.0	39	14.2	26	7.9	18	3.8	20	3.7	17	3.6	13	4.1
5.1-5.2	146	7.6	8	9.3	38	18.0	32	11.6	25	7.6	24	5.0	19	3.5	18	3.8	14	4.4
5.3	184	9.6	17	19.8	30	14.2	21	7.6	35	10.7	41	8.6	40	7.4	40	8.5	24	7.6
5.4	236	12.3	12	14.0	27	12.8	37	13.5	45	13.7	58	12.1	57	10.6	55	11.7	32	10.1
5.5	213	11.1	4	4.7	15	7.1	31	11.3	39	11.9	61	12.7	63	11.7	55	11.7	38	12.0
5.6	231	12.0	5	5.8	19	9.0	24	8.7	49	14.9	56	11.7	78	14.4	67	14.2	43	13.6
5.7	161	8.4	1	1.2	11	5.2	26	9.5	31	9.5	48	10.0	44	8.1	41	8.7	24	7.6
5.8	144	7.5	1	1.2	7	3.3	12	4.4	24	7.3	46	9.6	54	10.0	43	9.1	27	8.5
5.9	85	4.4	1	1.2	4	1.9	6	2.2	12	3.7	28	5.8	34	6.3	29	6.2	19	6.0
6.0	68	3.5	0	0.0	5	2.4	5	1.8	12	3.7	18	3.8	28	5.2	23	4.9	13	4.1
6.1	48	2.5	0	0.0	0	0.0	4	1.5	5	1.5	18	3.8	21	3.9	21	4.5	10	3.2
6.2	38	2.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	5	1.5	14	2.9	17	3.1	12	2.5	13	4.1
6.3	38	2.0	0	0.0	0	0.0	4	1.5	3	0.9	12	2.5	19	3.5	14	3.0	12	3.8
6.4	12	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	4	0.8	6	1.1	5	1.1	5	1.6
6.5	22	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	10	2.1	11	2.0	11	2.3	9	2.8
6.6-6.7	15	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	4	0.8	9	1.7	6	1.3	5	1.6
6.8-6.9	8	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	6	1.1	2	0.4	4	1.3
7.0-7.1	6	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	4	0.8	1	0.2	3	0.6	1	0.3
7.2-7.3	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	2	0.4	0	0.0
7.4-7.5	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	2	0.4	0	0.0
7.6-7.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
7.8-7.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.0-8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.2-8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.4-8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.6-8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
9.4%以上	5	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	1	0.2	2	0.4	0	0.0	2	0.6

注)ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行い、身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第31表の4 ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－総数・男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	3,251	5.7	0.5	137	5.3	0.3	319	5.4	0.3	429	5.5	0.4	529	5.6	0.5	858	5.8	0.7	979	5.8	0.5	861	5.8	0.6	582	5.8	0.6
男性	1,332	5.7	0.6	51	5.3	0.3	108	5.3	0.3	154	5.5	0.3	201	5.6	0.4	379	5.8	0.8	439	5.8	0.5	390	5.8	0.7	265	5.8	0.5
女性	1,919	5.7	0.5	86	5.3	0.3	211	5.4	0.3	275	5.5	0.4	328	5.6	0.5	479	5.8	0.5	540	5.8	0.5	471	5.8	0.5	317	5.8	0.6

注)ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行い、身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第 32 表の 1 血糖値の分布－血糖値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上  
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男 性	総 数	1,086	100.0	34	100.0	80	100.0	120	100.0	172	100.0	317	100.0	363	100.0	311	100.0	228	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4
	60-79	59	5.4	1	2.9	6	7.5	10	8.3	6	3.5	21	6.6	15	4.1	18	5.8	7	3.1
	80-99	555	51.1	29	85.3	60	75.0	78	65.0	109	63.4	162	51.1	117	32.2	143	46.0	62	27.2
	100-119	275	25.3	4	11.8	12	15.0	28	23.3	41	23.8	67	21.1	123	33.9	75	24.1	85	37.3
	120-139	106	9.8	0	0.0	2	2.5	4	3.3	9	5.2	30	9.5	61	16.8	38	12.2	42	18.4
	140-159	44	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.9	13	4.1	26	7.2	17	5.5	16	7.0
	160-179	18	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	7	2.2	10	2.8	9	2.9	6	2.6
	180-199	14	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.8	5	1.4	6	1.9	5	2.2
	200-219	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
	220-239	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0
	240-259	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	1	0.3	1	0.3	1	0.4
	260mg/dL以上	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	3	0.8	2	0.6	3	1.3
	(再掲)110以上	290	26.7	2	5.9	4	5.0	9	7.5	29	16.9	91	28.7	155	42.7	102	32.8	110	48.2
女 性	総 数	1,428	100.0	59	100.0	148	100.0	205	100.0	249	100.0	364	100.0	403	100.0	334	100.0	248	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-79	49	3.4	5	8.5	16	10.8	7	3.4	6	2.4	6	1.6	9	2.2	8	2.4	5	2.0
	80-99	787	55.1	46	78.0	108	73.0	149	72.7	165	66.3	183	50.3	136	33.7	149	44.6	79	31.9
	100-119	409	28.6	7	11.9	16	10.8	37	18.0	61	24.5	124	34.1	164	40.7	120	35.9	100	40.3
	120-139	116	8.1	0	0.0	5	3.4	9	4.4	14	5.6	27	7.4	61	15.1	31	9.3	44	17.7
	140-159	36	2.5	1	1.7	2	1.4	1	0.5	2	0.8	12	3.3	18	4.5	16	4.8	11	4.4
	160-179	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	2	0.5	0	0.0	2	0.8
	180-199	9	0.6	0	0.0	1	0.7	1	0.5	0	0.0	2	0.5	5	1.2	4	1.2	2	0.8
	200-219	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	3	0.9	0	0.0
	220-239	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	3	0.7	1	0.3	3	1.2
	240-259	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	260mg/dL以上	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.1	1	0.2	2	0.6	1	0.4
	(再掲)110以上	306	21.4	2	3.4	11	7.4	22	10.7	34	13.7	93	25.5	144	35.7	89	26.6	102	41.1

注)血糖値の測定を行った 20歳以上の者のうち，血液採取が食後3時間以降に行われた者を集計対象とした。

(26年)

第 32 表の 2 血糖値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上  
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,086	105.3	30.0	34	92.3	8.3	80	92.4	10.5	120	94.0	11.9	172	99.3	17.4	317	108.8	39.0	363	112.9	31.0	311	108.8	32.7	228	116.1	34.2
女性	1,428	102.3	24.0	59	91.2	11.6	148	92.6	15.3	205	95.1	13.9	249	98.0	18.6	364	105.8	29.2	403	110.7	26.1	334	107.0	26.8	248	112.0	27.1

注)血糖値の測定を行った 20歳以上の者のうち，血液採取が食後3時間以降に行われた者を集計対象とした。

(26年)

第32表の3 血糖値の分布—血糖値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	983	100.0	34	100.0	80	100.0	115	100.0	158	100.0	285	100.0	311	100.0	272	100.0	194	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-79	55	5.6	1	2.9	6	7.5	10	8.7	5	3.2	20	7.0	13	4.2	17	6.3	6	3.1
	80-99	543	55.2	29	85.3	60	75.0	77	67.0	105	66.5	156	54.7	116	37.3	139	51.1	62	32.0
	100-119	251	25.5	4	11.8	12	15.0	25	21.7	38	24.1	62	21.8	110	35.4	69	25.4	75	38.7
	120-139	85	8.6	0	0.0	2	2.5	3	2.6	6	3.8	24	8.4	50	16.1	29	10.7	36	18.6
	140-159	26	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9	8	2.8	15	4.8	10	3.7	9	4.6
	160-179	10	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	4	1.4	5	1.6	3	1.1	4	2.1
	180-199	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.8	1	0.3	2	0.7	1	0.5
	200-219	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	220-239	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240-259	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.3	1	0.4	1	0.5
	260mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	(再掲)110以上	217	22.1	2	5.9	4	5.0	7	6.1	20	12.7	70	24.6	114	36.7	74	27.2	82	42.3
女性	総数	1,359	100.0	59	100.0	146	100.0	203	100.0	241	100.0	346	100.0	364	100.0	307	100.0	227	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-79	48	3.5	5	8.5	16	11.0	7	3.4	6	2.5	6	1.7	8	2.2	7	2.3	5	2.2
	80-99	779	57.3	46	78.0	108	74.0	148	72.9	165	68.5	181	52.3	131	36.0	146	47.6	76	33.5
	100-119	388	28.6	7	11.9	16	11.0	37	18.2	58	24.1	119	34.4	151	41.5	112	36.5	92	40.5
	120-139	101	7.4	0	0.0	4	2.7	8	3.9	11	4.6	25	7.2	53	14.6	26	8.5	40	17.6
	140-159	26	1.9	1	1.7	2	1.4	1	0.5	0	0.0	9	2.6	13	3.6	13	4.2	8	3.5
	160-179	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.5	0	0.0	2	0.9
	180-199	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.6	2	0.5	2	0.7	1	0.4
	200-219	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0
	220-239	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	0.9
	240-259	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.4
	(再掲)110以上	260	19.1	2	3.4	9	6.2	21	10.3	28	11.6	81	23.4	119	32.7	72	23.5	89	39.2

注)血糖値の測定を行った20歳以上の者のうち、血液採取を食後3時間以降に行い、かつ身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した者を集計対象とした。(26年)

第32表の4 血糖値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	983	101.9	24.5	34	92.3	8.3	80	92.4	10.5	115	93.3	11.4	158	97.4	13.7	285	105.2	35.5	311	107.8	21.3	272	104.1	27.2	194	110.3	22.4
女性	1,359	100.3	19.4	59	91.2	11.6	146	91.6	12.2	203	94.9	13.7	241	97.0	17.9	346	102.6	19.6	364	108.2	22.5	307	103.5	17.8	227	110.2	24.4

注)血糖値の測定を行った20歳以上の者のうち、血液採取を食後3時間以降に行い、かつ身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した者を集計対象とした。(26年)

第33表の1 血清総コレステロール値の分布—血清総コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	1,169	100.0	444	100.0	313	100.0
	120mg/dL未満	20	1.4	1	1.9	1	0.9	1	0.6	0	0.0	6	1.4	11	2.1	12	1.0	7	1.6	7	2.2
	120-139	46	3.1	5	9.6	1	0.9	2	1.2	3	1.4	8	1.9	27	5.3	29	2.5	10	2.3	19	6.1
	140-159	126	8.6	9	17.3	11	10.2	6	3.7	9	4.1	28	6.7	63	12.3	84	7.2	40	9.0	39	12.5
	160-179	259	17.6	9	17.3	22	20.4	13	8.1	32	14.6	69	16.4	114	22.2	194	16.6	73	16.4	77	24.6
	180-199	342	23.2	17	32.7	25	23.1	39	24.2	36	16.4	97	23.1	128	25.0	267	22.8	110	24.8	82	26.2
	200-219	324	22.0	5	9.6	30	27.8	41	25.5	58	26.5	96	22.9	94	18.3	268	22.9	103	23.2	48	15.3
	220-239	197	13.4	4	7.7	8	7.4	33	20.5	40	18.3	57	13.6	55	10.7	175	15.0	58	13.1	28	8.9
	240-259	104	7.1	1	1.9	4	3.7	21	13.0	26	11.9	39	9.3	13	2.5	96	8.2	27	6.1	8	2.6
	260-279	36	2.4	1	1.9	2	1.9	4	2.5	13	5.9	10	2.4	6	1.2	29	2.5	8	1.8	4	1.3
	280-299	16	1.1	0	0.0	2	1.9	1	0.6	2	0.9	9	2.1	2	0.4	14	1.2	7	1.6	1	0.3
	300mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	1,553	100.0	511	100.0	349	100.0
	120mg/dL未満	4	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	1	0.1	1	0.2	2	0.6
	120-139	29	1.4	2	2.3	5	2.3	5	1.8	2	0.6	3	0.6	12	2.0	17	1.1	6	1.2	8	2.3
	140-159	122	6.0	15	17.4	28	12.9	20	7.2	10	2.9	13	2.6	36	6.0	67	4.3	19	3.7	22	6.3
	160-179	276	13.6	22	25.6	51	23.5	53	19.1	20	5.9	39	7.7	91	15.2	166	10.7	42	8.2	68	19.5
	180-199	453	22.4	23	26.7	50	23.0	76	27.3	63	18.5	107	21.1	134	22.4	344	22.2	115	22.5	78	22.3
	200-219	448	22.1	17	19.8	41	18.9	65	23.4	66	19.4	118	23.3	141	23.6	348	22.4	122	23.9	85	24.4
	220-239	341	16.8	3	3.5	24	11.1	24	8.6	83	24.3	107	21.1	100	16.8	296	19.1	103	20.2	47	13.5
	240-259	187	9.2	3	3.5	10	4.6	23	8.3	44	12.9	65	12.8	42	7.0	166	10.7	53	10.4	20	5.7
	260-279	107	5.3	0	0.0	3	1.4	9	3.2	32	9.4	33	6.5	30	5.0	96	6.2	33	6.5	16	4.6
	280-299	40	2.0	1	1.2	2	0.9	1	0.4	14	4.1	17	3.4	5	0.8	37	2.4	13	2.5	0	0.0
	300mg/dL以上	19	0.9	0	0.0	2	0.9	2	0.7	7	2.1	5	1.0	3	0.5	15	1.0	4	0.8	3	0.9

注)血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第33表の2 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	196.6	34.2	52	179.5	32.7	108	195.3	34.9	161	208.6	30.3	219	209.1	32.3	420	200.7	34.8	513	186.1	31.9	1,169	199.5	33.3	444	196.4	33.6	313	183.8	32.1
女性	2,026	207.2	35.3	86	183.7	26.3	217	192.0	34.1	278	198.1	32.4	341	222.3	34.8	507	217.3	33.4	597	203.2	33.8	1,553	211.8	34.6	511	213.2	34.5	349	199.2	33.2

注)血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第33表の3 血清総コレステロール値の分布—血清総コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,259	100.0	52	100.0	107	100.0	156	100.0	187	100.0	353	100.0	404	100.0	991	100.0	365	100.0	246	100.0
	120mg/dL未満	13	1.0	1	1.9	1	0.9	1	0.6	0	0.0	4	1.1	6	1.5	7	0.7	3	0.8	5	2.0
	120-139	35	2.8	5	9.6	1	0.9	2	1.3	3	1.6	4	1.1	20	5.0	22	2.2	8	2.2	13	5.3
	140-159	100	7.9	9	17.3	11	10.3	6	3.8	5	2.7	20	5.7	49	12.1	63	6.4	30	8.2	30	12.2
	160-179	207	16.4	9	17.3	22	20.6	12	7.7	22	11.8	56	15.9	86	21.3	149	15.0	56	15.3	59	24.0
	180-199	285	22.6	17	32.7	25	23.4	39	25.0	30	16.0	76	21.5	98	24.3	219	22.1	86	23.6	63	25.6
	200-219	293	23.3	5	9.6	29	27.1	39	25.0	53	28.3	87	24.6	80	19.8	243	24.5	93	25.5	40	16.3
	220-239	180	14.3	4	7.7	8	7.5	32	20.5	35	18.7	52	14.7	49	12.1	160	16.1	52	14.2	26	10.6
	240-259	94	7.5	1	1.9	4	3.7	21	13.5	24	12.8	35	9.9	9	2.2	87	8.8	23	6.3	5	2.0
	260-279	33	2.6	1	1.9	2	1.9	3	1.9	13	7.0	9	2.5	5	1.2	26	2.6	6	1.6	4	1.6
	280-299	16	1.3	0	0.0	2	1.9	1	0.6	2	1.1	9	2.5	2	0.5	14	1.4	7	1.9	1	0.4
	300mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,642	100.0	85	100.0	216	100.0	269	100.0	297	100.0	377	100.0	398	100.0	1,222	100.0	349	100.0	242	100.0
	120mg/dL未満	4	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	1	0.1	1	0.3	2	0.8
	120-139	20	1.2	2	2.4	5	2.3	5	1.9	0	0.0	2	0.5	6	1.5	10	0.8	2	0.6	5	2.1
	140-159	95	5.8	15	17.6	28	13.0	19	7.1	8	2.7	5	1.3	20	5.0	43	3.5	8	2.3	13	5.4
	160-179	213	13.0	22	25.9	51	23.6	52	19.3	14	4.7	28	7.4	46	11.6	121	9.9	21	6.0	38	15.7
	180-199	351	21.4	22	25.9	50	23.1	72	26.8	57	19.2	64	17.0	86	21.6	256	20.9	71	20.3	51	21.1
	200-219	356	21.7	17	20.0	41	19.0	62	23.0	54	18.2	83	22.0	99	24.9	266	21.8	83	23.8	63	26.0
	220-239	285	17.4	3	3.5	24	11.1	24	8.9	74	24.9	84	22.3	76	19.1	241	19.7	77	22.1	37	15.3
	240-259	168	10.2	3	3.5	10	4.6	23	8.6	41	13.8	59	15.6	32	8.0	149	12.2	40	11.5	18	7.4
	260-279	95	5.8	0	0.0	3	1.4	9	3.3	29	9.8	32	8.5	22	5.5	86	7.0	29	8.3	12	5.0
	280-299	37	2.3	1	1.2	2	0.9	1	0.4	13	4.4	15	4.0	5	1.3	34	2.8	13	3.7	0	0.0
	300mg/dL以上	18	1.1	0	0.0	1	0.5	2	0.7	7	2.4	5	1.3	3	0.8	15	1.2	4	1.1	3	1.2

注)血清総コレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第33表の4 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,259	198.9	34.0	52	179.5	32.7	107	195.2	35.0	156	208.4	30.2	187	212.0	31.8	353	203.8	34.2	404	188.2	31.7	991	202.2	32.9	365	199.1	32.9	246	185.7	32.3
女性	1,642	209.1	35.8	85	183.7	26.5	216	191.2	32.3	269	198.5	32.6	297	224.3	34.4	377	222.5	33.8	398	207.4	34.3	1,222	214.9	35.0	349	219.1	34.7	242	203.2	34.1

注)血清総コレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第 34 表の 1 血清 HDL コレステロール値の分布—血清 HDL コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	1,169	100.0	444	100.0	313	100.0
	30mg/dL未満	16	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.5	4	1.0	9	1.8	14	1.2	5	1.1	7	2.2
	30-39	191	13.0	8	15.4	13	12.0	25	15.5	19	8.7	52	12.4	74	14.4	145	12.4	50	11.3	52	16.6
	40-49	339	23.0	13	25.0	29	26.9	31	19.3	45	20.5	98	23.3	123	24.0	261	22.3	108	24.3	76	24.3
	50-59	393	26.7	17	32.7	30	27.8	39	24.2	69	31.5	104	24.8	134	26.1	305	26.1	109	24.5	81	25.9
	60-69	291	19.8	9	17.3	28	25.9	34	21.1	43	19.6	79	18.8	98	19.1	229	19.6	87	19.6	57	18.2
	70-79	151	10.3	4	7.7	6	5.6	15	9.3	23	10.5	46	11.0	57	11.1	130	11.1	57	12.8	28	8.9
	80-89	59	4.0	1	1.9	1	0.9	11	6.8	10	4.6	22	5.2	14	2.7	53	4.5	18	4.1	9	2.9
	90-99	17	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	6	2.7	8	1.9	2	0.4	17	1.5	6	1.4	1	0.3
	100mg/dL以上	16	1.1	0	0.0	1	0.9	3	1.9	3	1.4	7	1.7	2	0.4	15	1.3	4	0.9	2	0.6
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	1,553	100.0	511	100.0	349	100.0
	30mg/dL未満	5	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.2	2	0.3	4	0.3	2	0.4	1	0.3
	30-39	64	3.2	2	2.3	3	1.4	6	2.2	9	2.6	13	2.6	31	5.2	48	3.1	16	3.1	21	6.0
	40-49	254	12.5	9	10.5	26	12.0	26	9.4	33	9.7	67	13.2	93	15.6	186	12.0	73	14.3	60	17.2
	50-59	493	24.3	22	25.6	52	24.0	54	19.4	68	19.9	135	26.6	162	27.1	365	23.5	131	25.6	104	29.8
	60-69	491	24.2	21	24.4	54	24.9	75	27.0	79	23.2	117	23.1	145	24.3	384	24.7	116	22.7	85	24.4
	70-79	399	19.7	20	23.3	49	22.6	58	20.9	82	24.0	97	19.1	93	15.6	308	19.8	93	18.2	48	13.8
	80-89	195	9.6	5	5.8	20	9.2	42	15.1	37	10.9	48	9.5	43	7.2	161	10.4	52	10.2	19	5.4
	90-99	81	4.0	6	7.0	6	2.8	9	3.2	20	5.9	20	3.9	20	3.4	63	4.1	20	3.9	7	2.0
	100mg/dL以上	44	2.2	1	1.2	6	2.8	7	2.5	13	3.8	9	1.8	8	1.3	34	2.2	8	1.6	4	1.1

注)血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 34 表の 2 血清 HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	55.4	14.9	52	52.4	12.2	108	53.6	12.4	161	56.0	16.2	219	57.5	15.1	420	56.7	16.2	513	54.0	13.9	1,169	56.1	15.4	444	56.3	15.2	313	53.0	14.1
女性	2,026	64.6	15.6	86	65.4	14.2	217	65.4	15.2	278	67.1	15.6	341	68.0	15.8	507	64.1	15.1	597	61.4	15.4	1,553	65.0	15.5	511	63.8	15.7	349	59.5	14.6

注)血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)



第34表の3 血清HDLコレステロール値の分布—血清HDLコレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,259	100.0	52	100.0	107	100.0	156	100.0	187	100.0	353	100.0	404	100.0	991	100.0	365	100.0	246	100.0
	30mg/dL未満	12	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	0.5	4	1.1	5	1.2	10	1.0	3	0.8	5	2.0
	30-39	158	12.5	8	15.4	13	12.1	24	15.4	14	7.5	39	11.0	60	14.9	117	11.8	38	10.4	42	17.1
	40-49	293	23.3	13	25.0	28	26.2	31	19.9	39	20.9	85	24.1	97	24.0	225	22.7	90	24.7	59	24.0
	50-59	326	25.9	17	32.7	30	28.0	37	23.7	54	28.9	86	24.4	102	25.2	252	25.4	89	24.4	62	25.2
	60-69	258	20.5	9	17.3	28	26.2	33	21.2	38	20.3	71	20.1	79	19.6	201	20.3	74	20.3	47	19.1
	70-79	131	10.4	4	7.7	6	5.6	15	9.6	22	11.8	38	10.8	46	11.4	111	11.2	48	13.2	21	8.5
	80-89	52	4.1	1	1.9	1	0.9	10	6.4	10	5.3	18	5.1	12	3.0	47	4.7	14	3.8	7	2.8
	90-99	14	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	6	3.2	6	1.7	1	0.2	14	1.4	5	1.4	1	0.4
	100mg/dL以上	15	1.2	0	0.0	1	0.9	3	1.9	3	1.6	6	1.7	2	0.5	14	1.4	4	1.1	2	0.8
女性	総数	1,642	100.0	85	100.0	216	100.0	269	100.0	297	100.0	377	100.0	398	100.0	1,222	100.0	349	100.0	242	100.0
	30mg/dL未満	3	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.4
	30-39	47	2.9	2	2.4	3	1.4	6	2.2	8	2.7	10	2.7	18	4.5	35	2.9	10	2.9	12	5.0
	40-49	189	11.5	9	10.6	26	12.0	24	8.9	24	8.1	48	12.7	58	14.6	133	10.9	48	13.8	41	16.9
	50-59	401	24.4	22	25.9	52	24.1	53	19.7	57	19.2	104	27.6	113	28.4	288	23.6	94	26.9	76	31.4
	60-69	400	24.4	20	23.5	53	24.5	72	26.8	70	23.6	81	21.5	104	26.1	304	24.9	81	23.2	62	25.6
	70-79	339	20.6	20	23.5	49	22.7	57	21.2	78	26.3	75	19.9	60	15.1	257	21.0	65	18.6	29	12.0
	80-89	160	9.7	5	5.9	20	9.3	40	14.9	32	10.8	37	9.8	26	6.5	127	10.4	35	10.0	12	5.0
	90-99	62	3.8	6	7.1	6	2.8	9	3.3	16	5.4	14	3.7	11	2.8	45	3.7	10	2.9	5	2.1
	100mg/dL以上	41	2.5	1	1.2	6	2.8	7	2.6	12	4.0	8	2.1	7	1.8	31	2.5	6	1.7	4	1.7

注)血清HDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第34表の4 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,259	55.8	15.0	52	52.4	12.2	107	53.7	12.4	156	55.9	16.2	187	58.6	15.5	353	57.0	15.9	404	54.3	14.0	991	56.5	15.4	365	56.8	15.1	246	53.2	14.4
女性	1,642	65.1	15.5	85	65.4	14.3	216	65.4	15.3	269	67.2	15.7	297	68.6	15.6	377	64.4	15.2	398	61.6	15.3	1,222	65.5	15.5	349	64.0	15.3	242	59.5	14.7

注)血清HDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第35表の1 血清LDLコレステロール値（直接法）の分布—血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用を含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	1,169	100.0	444	100.0	313	100.0
	40mg/dL未満	5	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.5	1	0.2	2	0.4	3	0.3	0	0.0	2	0.6
	40-49	11	0.7	1	1.9	1	0.9	1	0.6	1	0.5	3	0.7	4	0.8	7	0.6	4	0.9	3	1.0
	50-59	32	2.2	3	5.8	0	0.0	1	0.6	6	2.7	8	1.9	14	2.7	25	2.1	11	2.5	7	2.2
	60-69	56	3.8	2	3.8	2	1.9	3	1.9	5	2.3	12	2.9	32	6.2	38	3.3	16	3.6	22	7.0
	70-79	73	5.0	4	7.7	2	1.9	5	3.1	8	3.7	23	5.5	31	6.0	58	5.0	24	5.4	19	6.1
	80-89	117	7.9	5	9.6	10	9.3	8	5.0	8	3.7	34	8.1	52	10.1	88	7.5	37	8.3	37	11.8
	90-99	184	12.5	5	9.6	10	9.3	13	8.1	25	11.4	52	12.4	79	15.4	150	12.8	61	13.7	48	15.3
	100-109	181	12.3	9	17.3	15	13.9	16	9.9	16	7.3	54	12.9	71	13.8	135	11.5	59	13.3	42	13.4
	110-119	181	12.3	3	5.8	15	13.9	17	10.6	27	12.3	57	13.6	62	12.1	144	12.3	60	13.5	41	13.1
	120-129	159	10.8	8	15.4	15	13.9	20	12.4	28	12.8	38	9.0	50	9.7	124	10.6	40	9.0	26	8.3
	130-139	162	11.0	5	9.6	11	10.2	21	13.0	35	16.0	35	8.3	55	10.7	134	11.5	47	10.6	29	9.3
	140-149	109	7.4	3	5.8	9	8.3	23	14.3	17	7.8	32	7.6	25	4.9	89	7.6	30	6.8	16	5.1
	150-159	96	6.5	3	5.8	4	3.7	17	10.6	13	5.9	38	9.0	21	4.1	85	7.3	32	7.2	10	3.2
	160-169	45	3.1	0	0.0	3	2.8	8	5.0	13	5.9	14	3.3	7	1.4	40	3.4	10	2.3	5	1.6
	170-179	28	1.9	0	0.0	6	5.6	5	3.1	7	3.2	5	1.2	5	1.0	22	1.9	2	0.5	3	1.0
	180-189	17	1.2	1	1.9	1	0.9	2	1.2	6	2.7	6	1.4	1	0.2	14	1.2	6	1.4	1	0.3
	190-199	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	0.7	0	0.0	4	0.3	2	0.5	0	0.0
	200-209	7	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.9	3	0.7	1	0.2	6	0.5	1	0.2	1	0.3
	210-219	4	0.3	0	0.0	3	2.8	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0
	220mg/dL以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.3
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217.0	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	1,553	100.0	511	100.0	349	100.0
	40mg/dL未満	5	0.2	0	0.0	2	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.1	1	0.2	1	0.3
	40-49	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.1	1	0.2	0	0.0
	50-59	21	1.0	1	1.2	2	0.9	2	0.7	2	0.6	1	0.2	13	2.2	13	0.8	5	1.0	9	2.6
	60-69	50	2.5	7	8.1	10	4.6	7	2.5	5	1.5	8	1.6	13	2.2	30	1.9	12	2.3	8	2.3
	70-79	97	4.8	8	9.3	21	9.7	16	5.8	7	2.1	10	2.0	35	5.9	52	3.3	16	3.1	24	6.9
	80-89	141	7.0	11	12.8	28	12.9	18	6.5	14	4.1	24	4.7	46	7.7	86	5.5	26	5.1	30	8.6
	90-99	228	11.3	12	14.0	27	12.4	49	17.6	27	7.9	46	9.1	67	11.2	168	10.8	53	10.4	35	10.0
	100-109	284	14.0	14	16.3	24	11.1	53	19.1	41	12.0	55	10.8	97	16.2	223	14.4	74	14.5	55	15.8
	110-119	249	12.3	11	12.8	23	10.6	32	11.5	38	11.1	68	13.4	77	12.9	184	11.8	53	10.4	55	15.8
	120-129	240	11.8	12	14.0	25	11.5	30	10.8	38	11.1	72	14.2	63	10.6	186	12.0	65	12.7	36	10.3
	130-139	196	9.7	3	3.5	15	6.9	20	7.2	37	10.9	55	10.8	66	11.1	166	10.7	60	11.7	37	10.6
	140-149	172	8.5	3	3.5	18	8.3	13	4.7	50	14.7	50	9.9	38	6.4	143	9.2	45	8.8	18	5.2
	150-159	113	5.6	0	0.0	5	2.3	16	5.8	22	6.5	36	7.1	34	5.7	101	6.5	37	7.2	16	4.6
	160-169	88	4.3	1	1.2	5	2.3	12	4.3	18	5.3	31	6.1	21	3.5	79	5.1	23	4.5	11	3.2
	170-179	57	2.8	1	1.2	5	2.3	5	1.8	17	5.0	22	4.3	7	1.2	50	3.2	14	2.7	3	0.9
	180-189	39	1.9	1	1.2	3	1.4	1	0.4	13	3.8	12	2.4	9	1.5	32	2.1	13	2.5	6	1.7
	190-199	17	0.8	1	1.2	1	0.5	2	0.7	4	1.2	5	1.0	4	0.7	14	0.9	5	1.0	3	0.9
	200-209	14	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	0.9	8	1.6	2	0.3	11	0.7	3	0.6	2	0.6
	210-219	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.3	4	0.3	3	0.6	0	0.0
	220mg/dL以上	9	0.4	0	0.0	2	0.9	1	0.4	4	1.2	2	0.4	0	0.0	7	0.5	2	0.4	0	0.0

注)血清LDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第35表の2 血清LDLコレステロール値（直接法）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用を含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	115.0	31.2	52	106.8	30.3	108	121.1	32.5	161	125.3	28.7	219	122.2	32.1	420	116.5	32.1	513	107.1	28.4	1,169	116.2	30.9	444	113.3	30.3	313	105.8	29.1
女性	2,026	119.9	31.7	86	103.9	26.7	217	111.1	33.9	278	113.5	28.7	341	130.6	32.1	507	128.0	30.9	597	115.3	29.9	1,553	123.0	31.2	511	123.3	31.6	349	113.7	29.8

注)血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第35表の3 血清LDLコレステロール値（直接法）の分布－血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,259	100.0	52	100.0	107	100.0	156	100.0	187	100.0	353	100.0	404	100.0	991	100.0	365	100.0	246	100.0
	40mg/dL未満	4	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.5	2	0.2	0	0.0	2	0.8
	40-49	7	0.6	1	1.9	1	0.9	1	0.6	1	0.5	2	0.6	1	0.2	5	0.5	2	0.5	1	0.4
	50-59	27	2.1	3	5.8	0	0.0	1	0.6	5	2.7	7	2.0	11	2.7	20	2.0	7	1.9	7	2.8
	60-69	43	3.4	2	3.8	2	1.9	3	1.9	5	2.7	8	2.3	23	5.7	28	2.8	13	3.6	15	6.1
	70-79	60	4.8	4	7.7	2	1.9	5	3.2	5	2.7	20	5.7	24	5.9	49	4.9	21	5.8	14	5.7
	80-89	90	7.1	5	9.6	10	9.3	7	4.5	5	2.7	27	7.6	36	8.9	65	6.6	30	8.2	25	10.2
	90-99	140	11.1	5	9.6	10	9.3	13	8.3	17	9.1	33	9.3	62	15.3	111	11.2	40	11.0	39	15.9
	100-109	149	11.8	9	17.3	15	14.0	15	9.6	13	7.0	47	13.3	50	12.4	109	11.0	49	13.4	28	11.4
	110-119	155	12.3	3	5.8	15	14.0	17	10.9	23	12.3	46	13.0	51	12.6	122	12.3	49	13.4	35	14.2
	120-129	145	11.5	8	15.4	15	14.0	19	12.2	27	14.4	33	9.3	43	10.6	111	11.2	34	9.3	23	9.3
	130-139	147	11.7	5	9.6	11	10.3	20	12.8	30	16.0	33	9.3	48	11.9	121	12.2	41	11.2	26	10.6
	140-149	100	7.9	3	5.8	8	7.5	23	14.7	15	8.0	30	8.5	21	5.2	84	8.5	27	7.4	13	5.3
	150-159	90	7.1	3	5.8	4	3.7	16	10.3	13	7.0	35	9.9	19	4.7	80	8.1	31	8.5	8	3.3
	160-169	43	3.4	0	0.0	3	2.8	8	5.1	12	6.4	14	4.0	6	1.5	38	3.8	9	2.5	5	2.0
	170-179	27	2.1	0	0.0	6	5.6	5	3.2	7	3.7	5	1.4	4	1.0	21	2.1	2	0.5	2	0.8
	180-189	15	1.2	1	1.9	1	0.9	2	1.3	5	2.7	5	1.4	1	0.2	12	1.2	5	1.4	1	0.4
	190-199	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	0.8	0	0.0	4	0.4	2	0.5	0	0.0
	200-209	7	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.1	3	0.8	1	0.2	6	0.6	1	0.3	1	0.4
	210-219	4	0.3	0	0.0	3	2.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.3	0	0.0
	220mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.2	1	0.3	1	0.4
女性	総数	1,642	100.0	85	100.0	216.0	100.0	269	100.0	297	100.0	377	100.0	398	100.0	1,222	100.0	349	100.0	242	100.0
	40mg/dL未満	4	0.2	0	0.0	2	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.2	1	0.3	0	0.0
	40-49	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	50-59	15	0.9	1	1.2	2	0.9	2	0.7	0	0.0	1	0.3	9	2.3	8	0.7	4	1.1	6	2.5
	60-69	38	2.3	7	8.2	10	4.6	7	2.6	4	1.3	2	0.5	8	2.0	19	1.6	3	0.9	6	2.5
	70-79	71	4.3	7	8.2	21	9.7	16	5.9	6	2.0	6	1.6	15	3.8	34	2.8	5	1.4	13	5.4
	80-89	109	6.6	11	12.9	28	13.0	16	5.9	12	4.0	15	4.0	27	6.8	60	4.9	19	5.4	16	6.6
	90-99	164	10.0	12	14.1	27	12.5	49	18.2	19	6.4	24	6.4	33	8.3	111	9.1	19	5.4	22	9.1
	100-109	225	13.7	14	16.5	24	11.1	51	19.0	38	12.8	39	10.3	59	14.8	176	14.4	53	15.2	31	12.8
	110-119	196	11.9	11	12.9	23	10.6	28	10.4	35	11.8	43	11.4	56	14.1	136	11.1	32	9.2	41	16.9
	120-129	199	12.1	12	14.1	25	11.6	29	10.8	32	10.8	55	14.6	46	11.6	149	12.2	51	14.6	27	11.2
	130-139	155	9.4	3	3.5	15	6.9	20	7.4	30	10.1	39	10.3	48	12.1	129	10.6	42	12.0	27	11.2
	140-149	152	9.3	3	3.5	18	8.3	13	4.8	43	14.5	43	11.4	32	8.0	123	10.1	35	10.0	17	7.0
	150-159	99	6.0	0	0.0	5	2.3	16	5.9	20	6.7	32	8.5	26	6.5	88	7.2	28	8.0	14	5.8
	160-169	84	5.1	1	1.2	5	2.3	12	4.5	18	6.1	29	7.7	19	4.8	76	6.2	21	6.0	10	4.1
	170-179	54	3.3	1	1.2	5	2.3	5	1.9	17	5.7	21	5.6	5	1.3	47	3.8	11	3.2	3	1.2
	180-189	34	2.1	1	1.2	3	1.4	1	0.4	11	3.7	11	2.9	7	1.8	27	2.2	12	3.4	5	2.1
	190-199	17	1.0	1	1.2	1	0.5	2	0.7	4	1.3	5	1.3	4	1.0	14	1.1	5	1.4	3	1.2
	200-209	13	0.8	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	1.0	8	2.1	1	0.3	11	0.9	3	0.9	1	0.4
	210-219	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.5	4	0.3	3	0.9	0	0.0
	220mg/dL以上	8	0.5	0	0.0	1	0.5	1	0.4	4	1.3	2	0.5	0	0.0	7	0.6	2	0.6	0	0.0

注)血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第35表の4 血清LDLコレステロール値（直接法）の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,259	117.1	31.4	52	106.8	30.3	107	120.9	32.6	156	125.4	28.8	187	124.5	32.2	353	119.3	32.4	404	108.9	28.6	991	118.6	31.1	365	115.5	30.7	246	107.6	29.6
女性	1,642	122.0	32.2	85	104.2	26.7	216	110.3	31.8	269	113.7	29.0	297	132.3	32.1	377	133.1	31.4	398	119.7	30.2	1,222	126.1	31.7	349	129.0	32.1	242	118.0	30.2

注)血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第36表の1 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の分布－血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,426	100.0	51	100.0	107	100.0	150	100.0	206	100.0	404	100.0	508	100.0	1,125	100.0	435	100.0	309	100.0
総数	9	0.6	1	2.0	1	0.9	1	0.7	0	0.0	2	0.5	4	0.8	5	0.4	3	0.7	2	0.6
40mg/dL未満	14	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.9	4	1.0	6	1.2	13	1.2	5	1.1	4	1.3
40-49	28	2.0	4	7.8	1	0.9	2	1.3	0	0.0	8	2.0	13	2.6	20	1.8	10	2.3	7	2.3
50-59	47	3.3	3	5.9	1	0.9	2	1.3	8	3.9	14	3.5	19	3.7	36	3.2	17	3.9	9	2.9
60-69	110	7.7	5	9.8	8	7.5	5	3.3	13	6.3	27	6.7	52	10.2	76	6.8	36	8.3	35	11.3
70-79	135	9.5	8	15.7	14	13.1	10	6.7	10	4.9	37	9.2	56	11.0	98	8.7	39	9.0	35	11.3
80-89	178	12.5	6	11.8	10	9.3	18	12.0	19	9.2	53	13.1	72	14.2	146	13.0	55	12.6	47	15.2
90-99	190	13.3	6	11.8	12	11.2	17	11.3	22	10.7	61	15.1	72	14.2	151	13.4	63	14.5	48	15.5
100-109	185	13.0	6	11.8	19	17.8	19	12.7	28	13.6	52	12.9	61	12.0	137	12.2	52	12.0	38	12.3
110-119	151	10.6	5	9.8	11	10.3	20	13.3	25	12.1	37	9.2	53	10.4	127	11.3	48	11.0	28	9.1
120-129	129	9.0	2	3.9	11	10.3	19	12.7	29	14.1	29	7.2	39	7.7	110	9.8	39	9.0	14	4.5
130-139	110	7.7	3	5.9	6	5.6	19	12.7	18	8.7	31	7.7	33	6.5	90	8.0	28	6.4	23	7.4
140-149	60	4.2	1	2.0	4	3.7	11	7.3	11	5.3	21	5.2	12	2.4	51	4.5	19	4.4	6	1.9
150-159	33	2.3	0	0.0	1	0.9	3	2.0	9	4.4	11	2.7	9	1.8	31	2.8	8	1.8	7	2.3
160-169	21	1.5	1	2.0	4	3.7	3	2.0	2	1.0	8	2.0	3	0.6	14	1.2	6	1.4	3	1.0
170-179	10	0.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	5	2.4	1	0.2	3	0.6	7	0.6	2	0.5	2	0.6
180-189	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.0	1	0.2	0	0.0	4	0.4	0	0.0	0	0.0
190-199	9	0.6	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	0.5	6	1.5	0	0.0	7	0.6	4	0.9	0	0.0
200-209	1	0.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
210-219	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.3
220mg/dL以上	1,997	100.0	86	100.0	212.0	100.0	273	100.0	335	100.0	497	100.0	594	100.0	1,529	100.0	505	100.0	347	100.0
女性	3	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.1	1	0.2	1	0.3
40mg/dL未満	5	0.3	1	1.2	2	0.9	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	2	0.1	0	0.0	1	0.3
40-49	23	1.2	1	1.2	2	0.9	2	0.7	2	0.6	4	0.8	12	2.0	14	0.9	7	1.4	7	2.0
50-59	47	2.4	5	5.8	13	6.1	11	4.0	5	1.5	4	0.8	9	1.5	26	1.7	6	1.2	6	1.7
60-69	104	5.2	8	9.3	20	9.4	22	8.1	7	2.1	15	3.0	32	5.4	63	4.1	18	3.6	20	5.8
70-79	165	8.3	17	19.8	32	15.1	28	10.3	16	4.8	20	4.0	52	8.8	98	6.4	28	5.5	33	9.5
80-89	243	12.2	12	14.0	28	13.2	42	15.4	32	9.6	50	10.1	79	13.3	181	11.8	58	11.5	47	13.5
90-99	277	13.9	13	15.1	29	13.7	53	19.4	41	12.2	66	13.3	75	12.6	213	13.9	64	12.7	43	12.4
100-109	243	12.2	10	11.6	18	8.5	31	11.4	34	10.1	65	13.1	85	14.3	187	12.2	70	13.9	53	15.3
110-119	258	12.9	12	14.0	22	10.4	31	11.4	43	12.8	73	14.7	77	13.0	203	13.3	70	13.9	44	12.7
120-129	192	9.6	2	2.3	21	9.9	15	5.5	44	13.1	57	11.5	53	8.9	154	10.1	52	10.3	34	9.8
130-139	135	6.8	1	1.2	5	2.4	10	3.7	33	9.9	45	9.1	41	6.9	120	7.8	43	8.5	21	6.1
140-149	110	5.5	1	1.2	9	4.2	12	4.4	21	6.3	28	5.6	39	6.6	96	6.3	39	7.7	16	4.6
150-159	93	4.7	2	2.3	3	1.4	10	3.7	26	7.8	33	6.6	19	3.2	86	5.6	22	4.4	10	2.9
160-169	39	2.0	1	1.2	2	0.9	2	0.7	14	4.2	15	3.0	5	0.8	33	2.2	7	1.4	5	1.4
170-179	24	1.2	0	0.0	2	0.9	3	1.1	4	1.2	10	2.0	5	0.8	20	1.3	8	1.6	3	0.9
180-189	11	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	3	0.6	5	0.8	10	0.7	7	1.4	1	0.3
190-199	17	0.9	0	0.0	1	0.5	0	0.0	7	2.1	6	1.2	3	0.5	15	1.0	4	0.8	2	0.6
200-209	3	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0
210-219	5	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.4	2	0.6	1	0.2	0	0.0	4	0.3	1	0.2	0	0.0
220mg/dL以上	1,997	100.0	86	100.0	212.0	100.0	273	100.0	335	100.0	497	100.0	594	100.0	1,529	100.0	505	100.0	347	100.0

(26年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL) - 中性脂肪(mg/dL) / 5  
 (中性脂肪(トリグリセライド)が400mg/dL未満の場合。)

第36表の2 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,426	111.5	30.4	51	98.9	28.8	107	115.6	32.0	150	119.0	27.3	206	119.2	30.7	404	112.9	31.6	508	105.4	28.4	1,125	112.7	30.1	435	110.0	30.4	309	105.2	28.9
女性	1,997	117.9	30.6	86	100.9	24.4	212	106.9	31.9	273	109.8	27.2	335	127.9	31.4	497	126.1	29.9	594	115.5	28.7	1,529	121.2	30.2	505	122.4	30.0	347	113.8	28.1

(26年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL) - 中性脂肪(mg/dL) / 5  
 (中性脂肪(トリグリセライド)が400mg/dL未満の場合。)

第36表の3 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の分布—血清LDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合—男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,219	100.0	51	100.0	106	100.0	146	100.0	176	100.0	340	100.0	400	100.0	953	100.0	358	100.0	243	100.0
40mg/dL未満	7	0.6	1	2.0	1	0.9	1	0.7	0	0.0	1	0.3	3	0.8	3	0.3	1	0.3	2	0.8
40-49	8	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	3	0.9	2	0.5	8	0.8	2	0.6	2	0.8
50-59	24	2.0	4	7.8	1	0.9	2	1.4	0	0.0	7	2.1	10	2.5	17	1.8	9	2.5	5	2.1
60-69	36	3.0	3	5.9	1	0.9	2	1.4	5	2.8	10	2.9	15	3.8	27	2.8	14	3.9	7	2.9
70-79	87	7.1	5	9.8	8	7.5	4	2.7	11	6.3	21	6.2	38	9.5	60	6.3	29	8.1	24	9.9
80-89	104	8.5	8	15.7	14	13.2	10	6.8	7	4.0	27	7.9	38	9.5	71	7.5	27	7.5	24	9.9
90-99	143	11.7	6	11.8	10	9.4	17	11.6	13	7.4	40	11.8	57	14.3	115	12.1	43	12.0	36	14.8
100-109	153	12.6	6	11.8	12	11.3	17	11.6	16	9.1	48	14.1	54	13.5	119	12.5	50	14.0	38	15.6
110-119	167	13.7	6	11.8	19	17.9	19	13.0	27	15.3	45	13.2	51	12.8	121	12.7	43	12.0	33	13.6
120-129	139	11.4	5	9.8	10	9.4	19	13.0	24	13.6	36	10.6	45	11.3	119	12.5	43	12.0	24	9.9
130-139	118	9.7	2	3.9	11	10.4	19	13.0	24	13.6	27	7.9	35	8.8	99	10.4	35	9.8	12	4.9
140-149	103	8.4	3	5.9	6	5.7	19	13.0	18	10.2	29	8.5	28	7.0	87	9.1	26	7.3	19	7.8
150-159	54	4.4	1	2.0	4	3.8	10	6.8	11	6.3	19	5.6	9	2.3	46	4.8	16	4.5	5	2.1
160-169	31	2.5	0	0.0	1	0.9	3	2.1	8	4.5	11	3.2	8	2.0	29	3.0	8	2.2	6	2.5
170-179	20	1.6	1	2.0	4	3.8	3	2.1	2	1.1	7	2.1	3	0.8	13	1.4	5	1.4	3	1.2
180-189	9	0.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	4	2.3	1	0.3	3	0.8	6	0.6	2	0.6	2	0.8
190-199	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.1	1	0.3	0	0.0	4	0.4	0	0.0	0	0.0
200-209	9	0.7	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	0.6	6	1.8	0	0.0	7	0.7	4	1.1	0	0.0
210-219	1	0.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
220mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.2	1	0.3	1	0.4
女性	1,621	100.0	85	100.0	211.0	100.0	264	100.0	293	100.0	372	100.0	396	100.0	1,206	100.0	344	100.0	241	100.0
40mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-49	4	0.2	1	1.2	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.4
50-59	14	0.9	1	1.2	2	0.9	2	0.8	1	0.3	2	0.5	6	1.5	8	0.7	4	1.2	3	1.2
60-69	39	2.4	5	5.9	13	6.2	11	4.2	4	1.4	1	0.3	5	1.3	20	1.7	2	0.6	3	1.2
70-79	77	4.8	8	9.4	20	9.5	21	8.0	5	1.7	8	2.2	15	3.8	43	3.6	7	2.0	11	4.6
80-89	135	8.3	17	20.0	32	15.2	28	10.6	12	4.1	15	4.0	31	7.8	73	6.1	18	5.2	20	8.3
90-99	181	11.2	11	12.9	28	13.3	41	15.5	27	9.2	31	8.3	43	10.9	127	10.5	29	8.4	30	12.4
100-109	219	13.5	13	15.3	29	13.7	48	18.2	36	12.3	41	11.0	52	13.1	163	13.5	42	12.2	29	12.0
110-119	186	11.5	10	11.8	18	8.5	29	11.0	28	9.6	45	12.1	56	14.1	138	11.4	49	14.2	35	14.5
120-129	208	12.8	12	14.1	22	10.4	31	11.7	39	13.3	51	13.7	53	13.4	157	13.0	44	12.8	33	13.7
130-139	160	9.9	2	2.4	21	10.0	15	5.7	39	13.3	45	12.1	38	9.6	127	10.5	40	11.6	24	10.0
140-149	119	7.3	1	1.2	5	2.4	10	3.8	28	9.6	42	11.3	33	8.3	104	8.6	34	9.9	20	8.3
150-159	99	6.1	1	1.2	9	4.3	12	4.5	21	7.2	24	6.5	32	8.1	85	7.0	29	8.4	15	6.2
160-169	87	5.4	2	2.4	3	1.4	10	3.8	25	8.5	31	8.3	16	4.0	81	6.7	20	5.8	8	3.3
170-179	38	2.3	1	1.2	2	0.9	2	0.8	14	4.8	14	3.8	5	1.3	32	2.7	7	2.0	5	2.1
180-189	21	1.3	0	0.0	2	0.9	3	1.1	3	1.0	10	2.7	3	0.8	17	1.4	7	2.0	2	0.8
190-199	10	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	0.8	5	1.3	9	0.7	7	2.0	1	0.4
200-209	16	1.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	7	2.4	6	1.6	2	0.5	15	1.2	4	1.2	1	0.4
210-219	3	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
220mg/dL以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	0.3	0	0.0	4	0.3	1	0.3	0	0.0

(26年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL) - 中性脂肪(mg/dL) / 5  
 (中性脂肪(トリグリセライド)が400mg/dL未満の場合。)

第36表の4 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の平均値及び標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,219	113.7	30.4	51	98.9	28.8	106	115.5	32.1	146	119.2	27.2	176	122.0	30.1	340	115.7	31.9	400	107.6	28.3	953	115.2	30.0	358	112.4	30.3	243	107.5	29.3
女性	1,621	119.8	31.0	85	101.0	24.5	211	106.1	29.9	264	110.0	27.5	293	129.9	31.0	372	131.0	30.4	396	119.6	28.6	1,206	124.0	30.6	344	127.6	30.4	241	117.6	27.9

(26年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL) - 中性脂肪(mg/dL) / 5  
 (中性脂肪(トリグリセライド)が400mg/dL未満の場合。)

第 37 表の 1 血清 non HDL コレステロール値の分布—血清 non HDL コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	1,169	100.0	444	100.0	313	100.0	
男性	70mg/dL未満	15	1.0	1	1.9	2	1.9	1	0.6	0	0.0	3	0.7	8	1.6	9	0.8	6	1.4	5	1.6
	70-80未満	27	1.8	4	7.7	1	0.9	1	0.6	3	1.4	7	1.7	11	2.1	19	1.6	7	1.6	7	2.2
	80-90未満	54	3.7	3	5.8	3	2.8	4	2.5	4	1.8	14	3.3	26	5.1	34	2.9	12	2.7	17	5.4
	90-100未満	67	4.5	4	7.7	5	4.6	1	0.6	10	4.6	18	4.3	29	5.7	48	4.1	23	5.2	18	5.8
	100-110未満	98	6.7	6	11.5	11	10.2	7	4.3	6	2.7	21	5.0	47	9.2	67	5.7	23	5.2	34	10.9
	110-120未満	136	9.2	4	7.7	9	8.3	9	5.6	13	5.9	46	11.0	55	10.7	109	9.3	47	10.6	35	11.2
	120-130未満	178	12.1	6	11.5	11	10.2	21	13.0	20	9.1	43	10.2	77	15.0	140	12.0	63	14.2	45	14.4
	130-140未満	161	10.9	4	7.7	8	7.4	13	8.1	22	10.0	46	11.0	68	13.3	129	11.0	56	12.6	40	12.8
	140-150未満	161	10.9	6	11.5	16	14.8	17	10.6	23	10.5	52	12.4	47	9.2	127	10.9	39	8.8	32	10.2
	150-160未満	145	9.8	3	5.8	14	13.0	13	8.1	31	14.2	37	8.8	47	9.2	119	10.2	45	10.1	25	8.0
	160-170未満	125	8.5	4	7.7	11	10.2	18	11.2	25	11.4	30	7.1	37	7.2	101	8.6	37	8.3	20	6.4
	170-180未満	104	7.1	4	7.7	3	2.8	23	14.3	14	6.4	35	8.3	25	4.9	91	7.8	29	6.5	14	4.5
	180-190未満	83	5.6	1	1.9	5	4.6	14	8.7	17	7.8	26	6.2	20	3.9	73	6.2	27	6.1	10	3.2
	190-200未満	50	3.4	0	0.0	2	1.9	11	6.8	13	5.9	16	3.8	8	1.6	46	3.9	12	2.7	6	1.9
	200-210未満	31	2.1	2	3.8	3	2.8	4	2.5	8	3.7	12	2.9	2	0.4	26	2.2	8	1.8	1	0.3
	210-220未満	13	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	7	3.2	3	0.7	2	0.4	12	1.0	2	0.5	1	0.3
	220mg/dL以上	25	1.7	0	0.0	4	3.7	3	1.9	3	1.4	11	2.6	4	0.8	19	1.6	8	1.8	3	1.0
総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	1,553	100.0	511	100.0	349	100.0	
女性	70mg/dL未満	4	0.2	0	0.0	2	0.9	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0
	70-80未満	27	1.3	2	2.3	6	2.8	4	1.4	3	0.9	1	0.2	11	1.8	14	0.9	5	1.0	7	2.0
	80-90未満	60	3.0	10	11.6	19	8.8	10	3.6	5	1.5	6	1.2	10	1.7	28	1.8	8	1.6	6	1.7
	90-100未満	93	4.6	8	9.3	24	11.1	17	6.1	6	1.8	10	2.0	28	4.7	49	3.2	11	2.2	21	6.0
	100-110未満	157	7.7	12	14.0	33	15.2	38	13.7	19	5.6	21	4.1	34	5.7	97	6.2	20	3.9	22	6.3
	110-120未満	218	10.8	17	19.8	21	9.7	45	16.2	26	7.6	38	7.5	71	11.9	163	10.5	48	9.4	42	12.0
	120-130未満	217	10.7	14	16.3	17	7.8	39	14.0	31	9.1	48	9.5	68	11.4	162	10.4	58	11.4	40	11.5
	130-140未満	258	12.7	12	14.0	28	12.9	37	13.3	37	10.9	66	13.0	78	13.1	195	12.6	67	13.1	43	12.3
	140-150未満	225	11.1	3	3.5	18	8.3	22	7.9	37	10.9	57	11.2	88	14.7	181	11.7	63	12.3	54	15.5
	150-160未満	195	9.6	2	2.3	19	8.8	15	5.4	33	9.7	67	13.2	59	9.9	161	10.4	60	11.7	35	10.0
	160-170未満	156	7.7	2	2.3	8	3.7	14	5.0	35	10.3	57	11.2	40	6.7	138	8.9	53	10.4	23	6.6
	170-180未満	116	5.7	0	0.0	5	2.3	14	5.0	32	9.4	32	6.3	33	5.5	105	6.8	28	5.5	15	4.3
	180-190未満	96	4.7	0	0.0	6	2.8	6	2.2	18	5.3	35	6.9	31	5.2	82	5.3	32	6.3	12	3.4
	190-200未満	58	2.9	2	2.3	1	0.5	5	1.8	18	5.3	17	3.4	15	2.5	49	3.2	13	2.5	13	3.7
	200-210未満	63	3.1	1	1.2	4	1.8	5	1.8	19	5.6	20	3.9	14	2.3	56	3.6	17	3.3	8	2.3
	210-220未満	27	1.3	1	1.2	1	0.5	2	0.7	6	1.8	13	2.6	4	0.7	22	1.4	7	1.4	4	1.1
	220mg/dL以上	56	2.8	0	0.0	5	2.3	3	1.1	16	4.7	19	3.7	13	2.2	49	3.2	21	4.1	4	1.1

注)血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

$$\text{non HDL コレステロール (mg/dL)} = \text{総コレステロール (mg/dL)} - \text{HDL コレステロール (mg/dL)}$$

第 37 表の 2 血清 non HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性,  
20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差
男性	1,473	141.2: 34.5	52	127.1: 35.8	108	141.7: 37.8	161	152.6: 32.9	219	151.6: 33.8	420	144.0: 35.4	513	132.2: 30.9	1,169	143.4: 33.8	444	140.1: 33.4	313	130.8: 31.5
女性	2,026	142.6: 35.2	86	118.3: 27.0	217	126.5: 36.0	278	131.0: 32.2	341	154.3: 36.1	507	153.2: 33.5	597	141.7: 32.2	1,553	146.8: 34.5	511	149.4: 34.0	349	139.7: 31.9

注)血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第37表の3 血清 non HDL コレステロール値の分布—血清 non HDL コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,259	100.0	52	100.0	107	100.0	156	100.0	187	100.0	353	100.0	404	100.0	991	100.0	365	100.0	246	100.0
	70mg/dL未満	10	0.8	1	1.9	2	1.9	1	0.6	0	0.0	2	0.6	4	1.0	6	0.6	3	0.8	3	1.2
	70-80未満	24	1.9	4	7.7	1	0.9	1	0.6	3	1.6	6	1.7	9	2.2	16	1.6	4	1.1	7	2.8
	80-90未満	42	3.3	3	5.8	3	2.8	4	2.6	3	1.6	10	2.8	19	4.7	26	2.6	11	3.0	11	4.5
	90-100未満	57	4.5	4	7.7	5	4.7	1	0.6	8	4.3	15	4.2	24	5.9	39	3.9	20	5.5	15	6.1
	100-110未満	78	6.2	6	11.5	11	10.3	7	4.5	5	2.7	18	5.1	31	7.7	53	5.3	19	5.2	21	8.5
	110-120未満	106	8.4	4	7.7	9	8.4	9	5.8	7	3.7	35	9.9	42	10.4	83	8.4	35	9.6	28	11.4
	120-130未満	146	11.6	6	11.5	11	10.3	20	12.8	15	8.0	33	9.3	61	15.1	111	11.2	49	13.4	36	14.6
	130-140未満	127	10.1	4	7.7	8	7.5	12	7.7	19	10.2	34	9.6	50	12.4	101	10.2	41	11.2	30	12.2
	140-150未満	138	11.0	6	11.5	16	15.0	16	10.3	19	10.2	41	11.6	40	9.9	106	10.7	32	8.8	27	11.0
	150-160未満	133	10.6	3	5.8	14	13.1	13	8.3	29	15.5	33	9.3	41	10.1	109	11.0	40	11.0	21	8.5
	160-170未満	117	9.3	4	7.7	10	9.3	18	11.5	25	13.4	28	7.9	32	7.9	96	9.7	32	8.8	18	7.3
	170-180未満	95	7.5	4	7.7	3	2.8	22	14.1	13	7.0	33	9.3	20	5.0	85	8.6	27	7.4	10	4.1
	180-190未満	75	6.0	1	1.9	5	4.7	14	9.0	14	7.5	25	7.1	16	4.0	65	6.6	24	6.6	9	3.7
	190-200未満	45	3.6	0	0.0	2	1.9	10	6.4	11	5.9	15	4.2	7	1.7	41	4.1	11	3.0	5	2.0
	200-210未満	29	2.3	2	3.8	3	2.8	4	2.6	7	3.7	11	3.1	2	0.5	24	2.4	7	1.9	1	0.4
	210-220未満	12	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	6	3.2	3	0.8	2	0.5	11	1.1	2	0.5	1	0.4
	220mg/dL以上	25	2.0	0	0.0	4	3.7	3	1.9	3	1.6	11	3.1	4	1.0	19	1.9	8	2.2	3	1.2
女性	総数	1,642	100.0	85	100.0	216	100.0	269	100.0	297	100.0	377	100.0	398	100.0	1,222	100.0	349	100.0	242	100.0
	70mg/dL未満	4	0.2	0	0.0	2	0.9	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
	70-80未満	22	1.3	2	2.4	6	2.8	4	1.5	1	0.3	1	0.3	8	2.0	11	0.9	5	1.4	4	1.7
	80-90未満	49	3.0	10	11.8	19	8.8	10	3.7	4	1.3	2	0.5	4	1.0	18	1.5	0	0.0	4	1.7
	90-100未満	78	4.8	8	9.4	24	11.1	17	6.3	6	2.0	7	1.9	16	4.0	38	3.1	5	1.4	13	5.4
	100-110未満	129	7.9	12	14.1	33	15.3	36	13.4	16	5.4	13	3.4	19	4.8	74	6.1	12	3.4	13	5.4
	110-120未満	167	10.2	17	20.0	21	9.7	45	16.7	21	7.1	24	6.4	39	9.8	117	9.6	24	6.9	27	11.2
	120-130未満	159	9.7	13	15.3	17	7.9	34	12.6	26	8.8	30	8.0	39	9.8	116	9.5	34	9.7	23	9.5
	130-140未満	209	12.7	12	14.1	28	13.0	36	13.4	34	11.4	47	12.5	52	13.1	153	12.5	46	13.2	29	12.0
	140-150未満	171	10.4	3	3.5	18	8.3	21	7.8	33	11.1	38	10.1	58	14.6	134	11.0	43	12.3	34	14.0
	150-160未満	154	9.4	2	2.4	19	8.8	15	5.6	27	9.1	48	12.7	43	10.8	122	10.0	40	11.5	28	11.6
	160-170未満	126	7.7	2	2.4	8	3.7	14	5.2	29	9.8	44	11.7	29	7.3	110	9.0	39	11.2	19	7.9
	170-180未満	104	6.3	0	0.0	5	2.3	14	5.2	28	9.4	27	7.2	30	7.5	94	7.7	24	6.9	13	5.4
	180-190未満	85	5.2	0	0.0	6	2.8	6	2.2	17	5.7	31	8.2	25	6.3	72	5.9	26	7.4	11	4.5
	190-200未満	53	3.2	2	2.4	1	0.5	5	1.9	17	5.7	16	4.2	12	3.0	46	3.8	11	3.2	11	4.5
	200-210未満	56	3.4	1	1.2	4	1.9	5	1.9	18	6.1	18	4.8	10	2.5	49	4.0	14	4.0	6	2.5
	210-220未満	25	1.5	1	1.2	1	0.5	2	0.7	5	1.7	12	3.2	4	1.0	20	1.6	7	2.0	4	1.7
	220mg/dL以上	51	3.1	0	0.0	4	1.9	3	1.1	15	5.1	19	5.0	10	2.5	46	3.8	19	5.4	3	1.2

注)血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬 (26年) および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

$$\text{non HDL コレステロール (mg/dL)} = \text{総コレステロール (mg/dL)} - \text{HDL コレステロール (mg/dL)}$$

第37表の4 血清 non HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差
男性	1,259	143.1: 35.0	52	127.1: 35.8	107	141.4: 37.9	156	152.6: 33.1	187	153.4: 33.5	353	146.7: 36.2	404	134.0: 31.3	991	145.6: 34.1	365	142.3: 34.0	246	132.5: 32.2
女性	1,642	144.0: 36.2	85	118.3: 27.2	216	125.8: 34.2	269	131.3: 32.6	297	155.7: 36.2	377	158.0: 34.6	398	145.9: 32.9	1,222	149.4: 35.5	349	155.2: 35.0	242	143.6: 32.8

注)血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬 (26年) および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第 38 表の 1 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布—血清中性脂肪（トリグリセライド）値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男 性	総 数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	313	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	49	3.3	2	3.8	5	4.6	4	2.5	5	2.3	12	2.9	21	4.1	15	3.4	15	4.8
	50-79	245	16.6	9	17.3	21	19.4	22	13.7	30	13.7	67	16.0	96	18.7	70	15.8	62	19.8
	80-109	291	19.8	12	23.1	25	23.1	22	13.7	34	15.5	71	16.9	127	24.8	88	19.8	82	26.2
	110-139	240	16.3	7	13.5	21	19.4	23	14.3	43	19.6	67	16.0	79	15.4	70	15.8	47	15.0
	140-169	185	12.6	9	17.3	9	8.3	21	13.0	25	11.4	56	13.3	65	12.7	55	12.4	38	12.1
	170-199	126	8.6	4	7.7	10	9.3	15	9.3	26	11.9	35	8.3	36	7.0	33	7.4	24	7.7
	200mg/dL以上	337	22.9	9	17.3	17	15.7	54	33.5	56	25.6	112	26.7	89	17.3	113	25.5	45	14.4
	150以上(再掲)	582	39.5	18	34.6	34	31.5	83	51.6	97	44.3	182	43.3	168	32.7	178	40.1	94	30.0
女 性	総 数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	349	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	151	7.5	23	26.7	40	18.4	34	12.2	14	4.1	23	4.5	17	2.8	11	2.2	12	3.4
	50-79	476	23.5	34	39.5	78	35.9	92	33.1	78	22.9	75	14.8	119	19.9	95	18.6	69	19.8
	80-109	452	22.3	8	9.3	39	18.0	60	21.6	73	21.4	127	25.0	145	24.3	133	26.0	84	24.1
	110-139	322	15.9	5	5.8	23	10.6	40	14.4	55	16.1	86	17.0	113	18.9	86	16.8	66	18.9
	140-169	232	11.5	6	7.0	13	6.0	18	6.5	45	13.2	75	14.8	75	12.6	70	13.7	45	12.9
	170-199	138	6.8	6	7.0	5	2.3	10	3.6	28	8.2	50	9.9	39	6.5	35	6.8	25	7.2
	200mg/dL以上	255	12.6	4	4.7	19	8.8	24	8.6	48	14.1	71	14.0	89	14.9	81	15.9	48	13.8
	150以上(再掲)	547	27.0	14	16.3	33	15.2	43	15.5	109	32.0	169	33.3	179	30.0	161	31.5	101	28.9

注)血清中性脂肪(トリグリセライド)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 38 表の 2 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	155.5	110.9	52	145.6	92.0	108	132.3	77.5	161	183.9	131.7	219	180.3	163.8	420	162.9	107.5	513	135.9	76.6	444	154.0	91.0	313	131.6	77.1
女性	2,026	125.8	83.4	86	87.0	58.1	217	102.1	83.0	278	110.6	98.6	341	133.3	81.7	507	138.7	87.7	597	131.7	71.0	511	136.2	81.4	349	130.7	70.9

注)血清中性脂肪(トリグリセライド)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)



第38表の3 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布—血清中性脂肪（トリグリセライド）値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,259	100.0	52	100.0	107	100.0	156	100.0	187	100.0	353	100.0	404	100.0	365	100.0	246	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	43	3.4	2	3.8	5	4.7	4	2.6	5	2.7	10	2.8	17	4.2	13	3.6	12	4.9
	50-79	216	17.2	9	17.3	21	19.6	22	14.1	28	15.0	59	16.7	77	19.1	57	15.6	51	20.7
	80-109	255	20.3	12	23.1	25	23.4	21	13.5	29	15.5	63	17.8	105	26.0	77	21.1	68	27.6
	110-139	206	16.4	7	13.5	21	19.6	23	14.7	37	19.8	57	16.1	61	15.1	61	16.7	33	13.4
	140-169	156	12.4	9	17.3	9	8.4	20	12.8	21	11.2	48	13.6	49	12.1	42	11.5	30	12.2
	170-199	100	7.9	4	7.7	10	9.3	15	9.6	20	10.7	26	7.4	25	6.2	24	6.6	17	6.9
	200mg/dL以上	283	22.5	9	17.3	16	15.0	51	32.7	47	25.1	90	25.5	70	17.3	91	24.9	35	14.2
	150以上(再掲)	483	38.4	18	34.6	33	30.8	79	50.6	81	43.3	146	41.4	126	31.2	137	37.5	71	28.9
女性	総数	1,642	100.0	85	100.0	216	100.0	269	100.0	297	100.0	377	100.0	398	100.0	349	100.0	242	100.0
	20mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-49	138	8.4	23	27.1	40	18.5	33	12.3	14	4.7	19	5.0	9	2.3	7	2.0	6	2.5
	50-79	415	25.3	34	40.0	78	36.1	90	33.5	70	23.6	55	14.6	88	22.1	63	18.1	56	23.1
	80-109	363	22.1	8	9.4	38	17.6	57	21.2	65	21.9	95	25.2	100	25.1	94	26.9	57	23.6
	110-139	255	15.5	5	5.9	23	10.6	38	14.1	47	15.8	66	17.5	76	19.1	59	16.9	49	20.2
	140-169	167	10.2	5	5.9	13	6.0	17	6.3	38	12.8	55	14.6	39	9.8	43	12.3	25	10.3
	170-199	101	6.2	6	7.1	5	2.3	10	3.7	23	7.7	34	9.0	23	5.8	22	6.3	15	6.2
	200mg/dL以上	203	12.4	4	4.7	19	8.8	24	8.9	40	13.5	53	14.1	63	15.8	61	17.5	34	14.0
	150以上(再掲)	407	24.8	13	15.3	33	15.3	42	15.6	90	30.3	120	31.8	109	27.4	106	30.4	64	26.4

注)血清中性脂肪(トリグリセライド)値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第38表の4 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,259	154.3	112.0	52	145.6	92.0	107	131.7	77.6	156	182.1	131.4	187	177.0	163.8	353	160.9	110.0	404	134.3	76.1	365	152.1	91.8	246	129.5	75.5
女性	1,642	122.4	81.5	85	86.2	58.0	216	102.1	83.2	269	111.1	100.0	297	130.2	80.0	377	134.7	73.5	398	131.3	74.0	349	137.7	77.3	242	129.4	73.0

注)血清中性脂肪(トリグリセライド)値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第 39 表の 1 血清クレアチニン値の分布—血清クレアチニン値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20 歳以上

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総 数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	313	100.0
	0.40mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	0.50-0.59	16	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.5	4	1.0	9	1.8	7	1.6	4	1.3
	0.60-0.69	99	6.7	2	3.8	6	5.6	10	6.2	11	5.0	36	8.6	34	6.6	36	8.1	22	7.0
	0.70-0.79	357	24.2	15	28.8	19	17.6	40	24.8	62	28.3	111	26.4	110	21.4	109	24.5	63	20.1
	0.80-0.89	413	28.0	20	38.5	49	45.4	49	30.4	66	30.1	112	26.7	117	22.8	123	27.7	65	20.8
	0.90-0.99	302	20.5	13	25.0	30	27.8	48	29.8	40	18.3	87	20.7	84	16.4	74	16.7	56	17.9
	1.00-1.19	200	13.6	2	3.8	4	3.7	11	6.8	34	15.5	50	11.9	99	19.3	63	14.2	64	20.4
	1.20-1.39	52	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	8	1.9	41	8.0	19	4.3	28	8.9
	1.40-1.59	11	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.5	8	1.6	5	1.1	4	1.3
	1.60-1.79	7	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.5	4	0.8	2	0.5	3	1.0
	1.80-1.99	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.3
	2.00mg/dL以上	10	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	5	1.2	4	0.8	5	1.1	2	0.6
女性	総 数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	349	100.0
	0.40mg/dL未満	4	0.2	1	1.2	0	0.0	1	0.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	90	4.4	9	10.5	12	5.5	12	4.3	13	3.8	27	5.3	17	2.8	21	4.1	6	1.7
	0.50-0.59	559	27.6	24	27.9	87	40.1	90	32.4	81	23.8	145	28.6	132	22.1	136	26.6	63	18.1
	0.60-0.69	784	38.7	47	54.7	83	38.2	118	42.4	149	43.7	197	38.9	190	31.8	197	38.6	104	29.8
	0.70-0.79	366	18.1	2	2.3	27	12.4	44	15.8	76	22.3	93	18.3	124	20.8	98	19.2	80	22.9
	0.80-0.89	134	6.6	3	3.5	8	3.7	11	4.0	19	5.6	32	6.3	61	10.2	31	6.1	45	12.9
	0.90-0.99	33	1.6	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.3	4	0.8	26	4.4	10	2.0	18	5.2
	1.00-1.19	37	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	34	5.7	11	2.2	24	6.9
	1.20-1.39	11	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	8	1.3	4	0.8	6	1.7
	1.40-1.59	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	0	0.0	2	0.6
	1.60-1.79	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	1	0.3
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	2	0.4	0	0.0

注)血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 39 表の 2 血清クレアチニン値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—  
男性・女性, 20 歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	0.9	0.4	52	0.8	0.1	108	0.8	0.1	161	0.9	0.1	219	0.9	0.5	420	0.9	0.5	513	0.9	0.3	444	0.9	0.5	313	0.9	0.2
女性	2,026	0.7	0.3	86	0.6	0.1	217	0.6	0.1	278	0.6	0.1	341	0.6	0.1	507	0.7	0.5	597	0.7	0.2	511	0.7	0.4	349	0.7	0.2

注)血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第40表の1 推算GFRの分布—推算GFRの区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	313	100.0
	15ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	0.7	1	0.2	3	0.7	0	0.0
	15-30未満	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	5	1.0	3	0.7	3	1.0
	30-60未満	303	20.6	0	0.0	0	0.0	4	2.5	27	12.3	69	16.4	203	39.6	109	24.5	137	43.8
	60-90未満	999	67.8	19	36.5	82	75.9	126	78.3	174	79.5	314	74.8	284	55.4	305	68.7	161	51.4
	90ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上	159	10.8	33	63.5	26	24.1	31	19.3	17	7.8	32	7.6	20	3.9	24	5.4	12	3.8
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	349	100.0
	15ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	2	0.4	0	0.0
	15-30未満	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	0.8	1	0.2	4	1.1
	30-60未満	346	17.1	0	0.0	2	0.9	8	2.9	30	8.8	71	14	235	39.4	113	22.1	165	47.3
	60-90未満	1,339	66.1	24	27.9	111	51.2	206	74.1	268	78.6	391	77.1	339	56.8	366	71.6	175	50.1
	90ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上	332	16.4	62	72.1	104	47.9	64	23	43	12.6	42	8.3	17	2.8	29	5.7	5	1.4

注) 血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

$$\begin{aligned} \text{推算GFR (ml/min/1.73m}^2\text{)} &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dL)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \text{ (男性)} \\ &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dL)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \times 0.739 \text{ (女性)} \end{aligned}$$

注) CKDガイドライン 2009年版の推算式。

第40表の2 推算GFRの平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	71.7	16.4	52	94.4	11.1	108	84.8	9.7	161	79.3	12.0	219	73.5	12.8	420	71.3	16.4	513	63.8	15.3	444	68.1	14.9	313	62.7	15.2
女性	2,026	74.6	17.3	86	101.2	17.3	217	90.0	13.8	278	82.2	13.3	341	75.3	13.0	507	72.2	13.6	597	63.2	14.6	511	68.9	13.6	349	60.3	14.0

注) 血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

$$\begin{aligned} \text{推算GFR (ml/min/1.73m}^2\text{)} &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dL)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \text{ (男性)} \\ &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dL)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \times 0.739 \text{ (女性)} \end{aligned}$$

注) CKDガイドライン 2009年版の推算式。

第 41 表の 1 血清鉄の分布—血清鉄の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20 歳以上  
[貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	313	100.0
	40 $\mu$ g/dL未満	40	2.7	1	1.9	6	5.6	2	1.2	4	1.8	8	1.9	19	3.7	8	1.8	16	5.1
	40-59	148	10.0	6	11.5	9	8.3	13	8.1	12	5.5	38	9.0	70	13.6	46	10.4	44	14.1
	60-79	336	22.8	14	26.9	20	18.5	39	24.2	46	21.0	92	21.9	125	24.4	98	22.1	80	25.6
	80-99	346	23.5	7	13.5	30	27.8	45	28.0	52	23.7	87	20.7	125	24.4	92	20.7	83	26.5
	100-119	271	18.4	11	21.2	25	23.1	24	14.9	41	18.7	78	18.6	92	17.9	93	20.9	49	15.7
	120-139	177	12.0	4	7.7	5	4.6	20	12.4	36	16.4	66	15.7	46	9.0	54	12.2	25	8.0
	140-159	83	5.6	2	3.8	6	5.6	10	6.2	17	7.8	30	7.1	18	3.5	30	6.8	7	2.2
	160-179	38	2.6	5	9.6	4	3.7	2	1.2	3	1.4	15	3.6	9	1.8	12	2.7	6	1.9
	180-199	15	1.0	2	3.8	3	2.8	4	2.5	2	0.9	2	0.5	2	0.4	4	0.9	0	0.0
	200 $\mu$ g/dL以上	19	1.3	0	0.0	0	0.0	2	1.2	6	2.7	4	1.0	7	1.4	7	1.6	3	1.0
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	349	100.0
	40 $\mu$ g/dL未満	205	10.1	18	20.9	41	18.9	63	22.7	22	6.5	28	5.5	33	5.5	32	6.3	16	4.6
	40-59	429	21.2	18	20.9	48	22.1	49	17.6	66	19.4	100	19.7	148	24.8	118	23.1	93	26.6
	60-79	597	29.5	18	20.9	56	25.8	60	21.6	101	29.6	164	32.3	198	33.2	157	30.7	115	33.0
	80-99	424	20.9	12	14.0	30	13.8	53	19.1	86	25.2	122	24.1	121	20.3	114	22.3	68	19.5
	100-119	215	10.6	11	12.8	21	9.7	25	9.0	40	11.7	57	11.2	61	10.2	60	11.7	34	9.7
	120-139	88	4.3	3	3.5	8	3.7	11	4.0	17	5.0	28	5.5	21	3.5	21	4.1	14	4.0
	140-159	41	2.0	5	5.8	6	2.8	8	2.9	7	2.1	6	1.2	9	1.5	5	1.0	5	1.4
	160-179	15	0.7	0	0.0	2	0.9	4	1.4	2	0.6	2	0.4	5	0.8	4	0.8	3	0.9
	180-199	4	0.2	0	0.0	4	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 $\mu$ g/dL以上	8	0.4	1	1.2	1	0.5	5	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3

注)血清鉄の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 41 表の 2 血清鉄の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	96.0	35.7	52	99.9	41.4	108	94.0	35.3	161	97.6	35.4	219	102.4	36.7	420	99.2	34.9	513	90.1	34.8	444	98.4	35.8	313	86.6	33.3
女性	2,026	75.0	31.3	86	71.9	37.3	217	72.1	37.8	278	71.8	42.5	341	77.6	27.8	507	77.1	26.0	597	74.7	27.4	511	75.5	26.8	349	74.7	27.7

注)血清鉄の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第41表の3 血清鉄の分布—血清鉄の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,461	100.0	52	100.0	107	100.0	160	100.0	219	100.0	416	100.0	507	100.0	439	100.0	310	100.0
	40 $\mu$ g/dL未満	38	2.6	1	1.9	6	5.6	2	1.3	4	1.8	6	1.4	19	3.7	6	1.4	16	5.2
	40-59	148	10.1	6	11.5	9	8.4	13	8.1	12	5.5	38	9.1	70	13.8	46	10.5	44	14.2
	60-79	333	22.8	14	26.9	20	18.7	39	24.4	46	21.0	92	22.1	122	24.1	98	22.3	77	24.8
	80-99	343	23.5	7	13.5	29	27.1	45	28.1	52	23.7	87	20.9	123	24.3	90	20.5	83	26.8
	100-119	269	18.4	11	21.2	25	23.4	23	14.4	41	18.7	77	18.5	92	18.1	93	21.2	49	15.8
	120-139	177	12.1	4	7.7	5	4.7	20	12.5	36	16.4	66	15.9	46	9.1	54	12.3	25	8.1
	140-159	83	5.7	2	3.8	6	5.6	10	6.3	17	7.8	30	7.2	18	3.6	30	6.8	7	2.3
	160-179	37	2.5	5	9.6	4	3.7	2	1.3	3	1.4	14	3.4	9	1.8	12	2.7	6	1.9
	180-199	15	1.0	2	3.8	3	2.8	4	2.5	2	0.9	2	0.5	2	0.4	4	0.9	0	0.0
	200 $\mu$ g/dL以上	18	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.3	6	2.7	4	1.0	6	1.2	6	1.4	3	1.0
女性	総数	1,995	100.0	86	100.0	215	100.0	272	100.0	337	100.0	504	100.0	581	100.0	501	100.0	342	100.0
	40 $\mu$ g/dL未満	198	9.9	18	20.9	40	18.6	61	22.4	21	6.2	27	5.4	31	5.3	29	5.8	16	4.7
	40-59	424	21.3	18	20.9	48	22.3	48	17.6	66	19.6	100	19.8	144	24.8	116	23.2	91	26.6
	60-79	593	29.7	18	20.9	55	25.6	60	22.1	100	29.7	164	32.5	196	33.7	156	31.1	114	33.3
	80-99	417	20.9	12	14.0	30	14.0	52	19.1	85	25.2	122	24.2	116	20.0	110	22.0	67	19.6
	100-119	212	10.6	11	12.8	21	9.8	24	8.8	39	11.6	57	11.3	60	10.3	60	12.0	33	9.6
	120-139	87	4.4	3	3.5	8	3.7	11	4.0	17	5.0	27	5.4	21	3.6	21	4.2	14	4.1
	140-159	39	2.0	5	5.8	6	2.8	8	2.9	7	2.1	5	1.0	8	1.4	5	1.0	4	1.2
	160-179	15	0.8	0	0.0	2	0.9	4	1.5	2	0.6	2	0.4	5	0.9	4	0.8	3	0.9
	180-199	4	0.2	0	0.0	4	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 $\mu$ g/dL以上	6	0.3	1	1.2	1	0.5	4	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注)血清鉄の測定を行い, 身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第41表の4 血清鉄の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,461	96.0	35.5	52	99.9	41.4	107	94.0	35.4	160	97.5	35.5	219	102.4	36.7	416	99.3	34.6	507	90.0	34.3	439	98.4	35.0	310	86.8	33.4
女性	1,995	74.9	30.7	86	71.9	37.3	215	72.4	37.8	272	71.2	40.5	337	77.7	27.7	504	77.0	25.8	581	74.5	26.6	501	75.7	26.8	342	74.1	26.3

注)血清鉄の測定を行い, 身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第 42 表の 1 総鉄結合能 (TIBC) の分布—総鉄結合能の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	313	100.0
	200 $\mu$ g/dL未満	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	1	0.2	2	0.6
	200-249	38	2.6	0	0.0	0	0.0	2	1.2	4	1.8	5	1.2	27	5.3	12	2.7	19	6.1
	250-299	337	22.9	12	23.1	30	27.8	22	13.7	26	11.9	89	21.2	158	30.8	104	23.4	103	32.9
	300-349	670	45.5	27	51.9	53	49.1	78	48.4	98	44.7	199	47.4	215	41.9	217	48.9	118	37.7
	350-399	329	22.3	10	19.2	21	19.4	45	28.0	75	34.2	104	24.8	74	14.4	89	20.0	47	15.0
	400-449	77	5.2	2	3.8	4	3.7	12	7.5	14	6.4	16	3.8	29	5.7	14	3.2	20	6.4
	450-499	16	1.1	1	1.9	0	0.0	1	0.6	2	0.9	6	1.4	6	1.2	7	1.6	3	1.0
	500 $\mu$ g/dL以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	349	100.0
	200 $\mu$ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	17	0.8	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	0.9	3	0.6	10	1.7	6	1.2	7	2.0
	250-299	341	16.8	6	7.0	19	8.8	26	9.4	49	14.4	89	17.6	152	25.5	109	21.3	95	27.2
	300-349	878	43.3	31	36.0	72	33.2	86	30.9	162	47.5	263	51.9	264	44.2	253	49.5	146	41.8
	350-399	506	25.0	27	31.4	65	30.0	81	29.1	90	26.4	115	22.7	128	21.4	102	20.0	76	21.8
	400-449	209	10.3	19	22.1	43	19.8	56	20.1	27	7.9	33	6.5	31	5.2	33	6.5	19	5.4
	450-499	65	3.2	2	2.3	15	6.9	25	9.0	8	2.3	4	0.8	11	1.8	7	1.4	6	1.7
	500 $\mu$ g/dL以上	10	0.5	1	1.2	2	0.9	4	1.4	2	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0

注) 総鉄結合能(TIBC)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 42 表の 2 総鉄結合能 (TIBC) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	328.8	45.3	52	333.3	40.4	108	326.4	39.8	161	340.5	43.5	219	342.1	40.4	420	330.4	43.0	513	318.0	48.6	444	325.2	44.2	313	316.6	49.9
女性	2,026	344.2	50.1	86	363.7	48.4	217	367.4	54.5	278	371.0	57.0	341	342.4	46.2	507	335.5	40.6	597	329.0	45.6	511	332.1	44.5	349	327.5	45.6

注) 総鉄結合能(TIBC)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第42表の3 総鉄結合能（TIBC）の分布—総鉄結合能の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔貧血治療のための薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,461	100.0	52	100.0	107	100.0	160	100.0	219	100.0	416	100.0	507	100.0	439	100.0	310	100.0
	200 $\mu$ g/dL未満	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	1	0.2	2	0.6
	200-249	37	2.5	0	0.0	0	0.0	2	1.3	4	1.8	5	1.2	26	5.1	11	2.5	19	6.1
	250-299	334	22.9	12	23.1	30	28.0	22	13.8	26	11.9	89	21.4	155	30.6	104	23.7	100	32.3
	300-349	666	45.6	27	51.9	52	48.6	78	48.8	98	44.7	198	47.6	213	42.0	214	48.7	118	38.1
	350-399	325	22.2	10	19.2	21	19.6	44	27.5	75	34.2	101	24.3	74	14.6	88	20.0	47	15.2
	400-449	77	5.3	2	3.8	4	3.7	12	7.5	14	6.4	16	3.8	29	5.7	14	3.2	20	6.5
	450-499	16	1.1	1	1.9	0	0.0	1	0.6	2	0.9	6	1.4	6	1.2	7	1.6	3	1.0
	500 $\mu$ g/dL以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
女性	総数	1,995	100.0	86	100.0	215	100.0	272	100.0	337	100.0	504	100.0	581	100.0	501	100.0	342	100.0
	200 $\mu$ g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-249	15	0.8	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	0.9	3	0.6	8	1.4	5	1.0	6	1.8
	250-299	336	16.8	6	7.0	19	8.8	26	9.6	49	14.5	89	17.7	147	25.3	106	21.2	93	27.2
	300-349	867	43.5	31	36.0	70	32.6	84	30.9	161	47.8	261	51.8	260	44.8	249	49.7	145	42.4
	350-399	501	25.1	27	31.4	65	30.2	81	29.8	88	26.1	115	22.8	125	21.5	101	20.2	74	21.6
	400-449	204	10.2	19	22.1	43	20.0	53	19.5	26	7.7	32	6.3	31	5.3	33	6.6	19	5.6
	450-499	62	3.1	2	2.3	15	7.0	24	8.8	8	2.4	4	0.8	9	1.5	6	1.2	5	1.5
	500 $\mu$ g/dL以上	10	0.5	1	1.2	2	0.9	4	1.5	2	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0

注) 総鉄結合能(TIBC)の測定を行い，身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第42表の4 総鉄結合能（TIBC）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔貧血治療のための薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,461	328.8	45.3	52	333.3	40.4	107	326.3	40.0	160	340.2	43.5	219	342.1	40.4	416	330.1	43.0	507	318.3	48.7	439	325.2	44.2	310	316.9	50.0
女性	1,995	344.1	49.8	86	363.7	48.4	215	367.7	54.7	272	370.3	56.9	337	342.1	46.2	504	335.4	40.5	581	328.9	44.9	501	332.3	44.0	342	327.3	45.0

注) 総鉄結合能(TIBC)の測定を行い，身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(26年)

第43表の1 AST (GOT) の分布－AST (GOT) の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	313	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	10-19	341	23.2	27	51.9	39	36.1	49	30.4	45	20.5	91	21.7	90	17.5	88	19.8	51	16.3
	20-29	793	53.8	19	36.5	57	52.8	76	47.2	125	57.1	222	52.9	294	57.3	241	54.3	183	58.5
	30-39	220	14.9	3	5.8	10	9.3	17	10.6	31	14.2	68	16.2	91	17.7	73	16.4	59	18.8
	40-49	65	4.4	2	3.8	1	0.9	10	6.2	13	5.9	21	5.0	18	3.5	25	5.6	9	2.9
	50IU/L以上	51	3.5	1	1.9	1	0.9	8	5.0	5	2.3	16	3.8	20	3.9	16	3.6	11	3.5
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	349	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	5	0.2	1	1.2	2	0.9	1	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10-19	771	38.1	62	72.1	157	72.4	188	67.6	112	32.8	134	26.4	118	19.8	123	24.1	66	18.9
	20-29	1,007	49.7	21	24.4	47	21.7	76	27.3	187	54.8	303	59.8	373	62.5	311	60.9	220	63.0
	30-39	173	8.5	2	2.3	7	3.2	9	3.2	27	7.9	52	10.3	76	12.7	59	11.5	44	12.6
	40-49	34	1.7	0	0.0	1	0.5	1	0.4	7	2.1	9	1.8	16	2.7	10	2.0	11	3.2
	50IU/L以上	36	1.8	0	0.0	3	1.4	3	1.1	8	2.3	8	1.6	14	2.3	8	1.6	8	2.3

注)AST(GOT)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第43表の2 AST (GOT) の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上

(IU/L)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	26.2	13.1	52	21.7	8.9	108	22.3	6.8	161	25.8	11.4	219	26.8	17.8	420	26.5	11.7	513	27.3	13.4	444	27.1	12.2	313	27.2	14.2
女性	2,026	22.8	9.7	86	18.0	4.4	217	18.9	8.2	278	18.9	6.3	341	23.7	10.5	507	24.0	10.0	597	25.2	10.0	511	24.3	9.2	349	25.4	10.8

注)AST(GOT)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第44表の1 ALT (GPT) の分布－ALT (GPT) の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	313	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	39	2.6	3	5.8	1	0.9	1	0.6	5	2.3	16	3.8	13	2.5	9	2.0	11	3.5
	10-19	641	43.5	22	42.3	49	45.4	54	33.5	68	31.1	176	41.9	272	53.0	206	46.4	172	55.0
	20-29	452	30.7	14	26.9	25	23.1	52	32.3	77	35.2	138	32.9	146	28.5	135	30.4	91	29.1
	30-39	169	11.5	5	9.6	19	17.6	17	10.6	40	18.3	46	11.0	42	8.2	47	10.6	21	6.7
	40-49	65	4.4	2	3.8	4	3.7	9	5.6	9	4.1	18	4.3	23	4.5	21	4.7	11	3.5
	50IU/L以上	107	7.3	6	11.5	10	9.3	28	17.4	20	9.1	26	6.2	17	3.3	26	5.9	7	2.2
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	349	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5-9	140	6.9	13	15.1	39	18.0	32	11.5	11	3.2	14	2.8	31	5.2	15	2.9	23	6.6
	10-19	1,274	62.9	59	68.6	137	63.1	191	68.7	194	56.9	303	59.8	390	65.3	315	61.6	238	68.2
	20-29	421	20.8	9	10.5	25	11.5	38	13.7	90	26.4	129	25.4	130	21.8	132	25.8	64	18.3
	30-39	100	4.9	4	4.7	8	3.7	10	3.6	22	6.5	36	7.1	20	3.4	30	5.9	9	2.6
	40-49	34	1.7	0	0.0	1	0.5	2	0.7	8	2.3	11	2.2	12	2.0	10	2.0	6	1.7
	50IU/L以上	57	2.8	1	1.2	7	3.2	5	1.8	16	4.7	14	2.8	14	2.3	9	1.8	9	2.6

注)ALT(GPT)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第44表の2 ALT (GPT) の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上

(IU/L)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	25.1	16.5	52	26.0	18.4	108	25.8	15.8	161	31.7	22.5	219	27.9	16.8	420	24.4	14.9	513	22.2	14.6	444	24.1	14.3	313	21.2	15.1
女性	2,026	18.9	12.6	86	14.7	7.9	217	15.8	11.0	278	16.8	12.5	341	21.8	15.9	507	20.8	13.9	597	18.3	9.5	511	19.4	10.5	349	17.9	9.7

注)ALT(GPT)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)



第45表の1  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) の分布—  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—  
男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	313	100.0
	10IU/L未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.3
	10-19	366	24.8	28	53.8	39	36.1	33	20.5	30	13.7	80	19.0	156	30.4	96	21.6	105	33.5
	20-29	368	25.0	12	23.1	20	18.5	30	18.6	52	23.7	108	25.7	146	28.5	114	25.7	87	27.8
	30-39	234	15.9	6	11.5	12	11.1	27	16.8	40	18.3	74	17.6	75	14.6	67	15.1	50	16.0
	40-49	126	8.6	1	1.9	12	11.1	20	12.4	19	8.7	40	9.5	34	6.6	35	7.9	23	7.3
	50-59	96	6.5	3	5.8	6	5.6	12	7.5	15	6.8	32	7.6	28	5.5	34	7.7	14	4.5
	60-69	49	3.3	0	0.0	3	2.8	6	3.7	14	6.4	13	3.1	13	2.5	17	3.8	7	2.2
	70-79	46	3.1	0	0.0	2	1.9	13	8.1	11	5.0	7	1.7	13	2.5	11	2.5	7	2.2
	80IU/L以上	186	12.6	2	3.8	14	13.0	20	12.4	38	17.4	66	15.7	46	9.0	69	15.5	19	6.1
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	349	100.0
	10IU/L未満	89	4.4	15	17.4	24	11.1	22	7.9	5	1.5	7	1.4	16	2.7	12	2.3	7	2.0
	10-19	1,105	54.5	55	64.0	135	62.2	168	60.4	162	47.5	248	48.9	337	56.4	254	49.7	216	61.9
	20-29	433	21.4	9	10.5	32	14.7	47	16.9	83	24.3	129	25.4	133	22.3	125	24.5	67	19.2
	30-39	162	8.0	4	4.7	13	6.0	16	5.8	30	8.8	49	9.7	50	8.4	55	10.8	25	7.2
	40-49	71	3.5	2	2.3	5	2.3	8	2.9	15	4.4	23	4.5	18	3.0	22	4.3	8	2.3
	50-59	52	2.6	1	1.2	2	0.9	5	1.8	13	3.8	21	4.1	10	1.7	16	3.1	6	1.7
	60-69	30	1.5	0	0.0	1	0.5	6	2.2	10	2.9	7	1.4	6	1.0	5	1.0	4	1.1
	70-79	21	1.0	0	0.0	3	1.4	2	0.7	3	0.9	9	1.8	4	0.7	7	1.4	2	0.6
	80IU/L以上	63	3.1	0	0.0	2	0.9	4	1.4	20	5.9	14	2.8	23	3.9	15	2.9	14	4.0

注)  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第45表の2  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—  
男性・女性, 20歳以上

(IU/L)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	50.2	81.1	52	28.7	36.4	108	40.4	39.2	161	54.6	67.0	219	67.9	141.1	420	54.9	70.8	513	41.6	64.7	444	52.5	66.4	313	39.9	73.8
女性	2,026	25.1	30.8	86	15.7	8.7	217	18.6	13.7	278	20.5	16.4	341	32.7	47.8	507	26.1	19.7	597	25.7	36.3	511	26.1	27.9	349	24.9	36.6

注)  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 46 表の 1 血清尿酸値の分布—血清尿酸値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	1,473	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	420	100.0	513	100.0	444	100.0	313	100.0
	2.0mg/dL未満	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.9	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	2.0-2.9	16	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.4	4	1.0	8	1.6	5	1.1	6	1.9
	3.0-3.9	86	5.8	3	5.8	2	1.9	8	5.0	11	5.0	21	5.0	41	8.0	25	5.6	29	9.3
	4.0-4.9	248	16.8	6	11.5	12	11.1	18	11.2	29	13.2	79	18.8	104	20.3	85	19.1	71	22.7
	5.0-5.9	474	32.2	15	28.8	37	34.3	52	32.3	70	32.0	135	32.1	165	32.2	153	34.5	92	29.4
	6.0-6.9	396	26.9	14	26.9	35	32.4	45	28.0	63	28.8	115	27.4	124	24.2	110	24.8	78	24.9
	7.0-7.9	177	12.0	10	19.2	13	12.0	27	16.8	30	13.7	46	11.0	51	9.9	44	9.9	30	9.6
	8.0-8.9	54	3.7	3	5.8	8	7.4	5	3.1	8	3.7	14	3.3	16	3.1	19	4.3	4	1.3
	9.0-9.9	13	0.9	0	0.0	0	0.0	3	1.9	2	0.9	5	1.2	3	0.6	2	0.5	3	1.0
	10mg/dL以上	5	0.3	1	1.9	1	0.9	1	0.6	1	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	2,026	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	507	100.0	597	100.0	511	100.0	349	100.0
	2.0mg/dL未満	6	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.4	1	0.3	2	0.4	1	0.2	2	0.4	1	0.3
	2.0-2.9	114	5.6	6	7.0	16	7.4	25	9.0	20	5.9	24	4.7	23	3.9	29	5.7	6	1.7
	3.0-3.9	529	26.1	21	24.4	78	35.9	109	39.2	77	22.6	120	23.7	124	20.8	114	22.3	73	20.9
	4.0-4.9	775	38.3	45	52.3	89	41.0	97	34.9	134	39.3	190	37.5	220	36.9	200	39.1	118	33.8
	5.0-5.9	410	20.2	13	15.1	23	10.6	35	12.6	83	24.3	122	24.1	134	22.4	115	22.5	84	24.1
	6.0-6.9	143	7.1	1	1.2	6	2.8	7	2.5	23	6.7	38	7.5	68	11.4	34	6.7	49	14.0
	7.0-7.9	33	1.6	0	0.0	3	1.4	2	0.7	2	0.6	10	2.0	16	2.7	12	2.3	11	3.2
	8.0-8.9	11	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.7	1	0.3	0	0.0	7	1.2	2	0.4	5	1.4
	9.0-9.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	2	0.4	1	0.3
	10mg/dL以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.3

注)血清尿酸値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第 46 表の 2 血清尿酸値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,473	5.8	1.3	52	6.1	1.3	108	6.1	1.2	161	6.0	1.4	219	5.8	1.3	420	5.8	1.3	513	5.6	1.3	444	5.7	1.2	313	5.5	1.3
女性	2,026	4.5	1.1	86	4.3	0.7	217	4.1	1.0	278	4.1	1.0	341	4.5	1.0	507	4.6	1.1	597	4.8	1.2	511	4.6	1.1	349	4.9	1.2

注)血清尿酸値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(26年)

第47表 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況－メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の疑い、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	3,457	100.0	134	100.0	315	100.0	434	100.0	559	100.0	920	100.0	1,095	100.0	2,357	100.0	948	100.0	651	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	562	16.3	4	3.0	9	2.9	37	8.5	70	12.5	177	19.2	265	24.2	385	16.3	199	21.0	164	25.2
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	499	14.4	12	9.0	27	8.6	49	11.3	93	16.6	140	15.2	178	16.3	343	14.6	142	15.0	117	18.0
上記以外	2,396	69.3	118	88.1	279	88.6	348	80.2	396	70.8	603	65.5	652	59.5	1,629	69.1	607	64.0	370	56.8
総数	1,460	100.0	51	100.0	108	100.0	159	100.0	218	100.0	417	100.0	507	100.0	993	100.0	441	100.0	308	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	357	24.5	3	5.9	6	5.6	28	17.6	50	22.9	118	28.3	152	30.0	253	25.5	122	27.7	95	30.8
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	333	22.8	9	17.6	19	17.6	32	20.1	62	28.4	91	21.8	120	23.7	233	23.5	105	23.8	72	23.4
上記以外	770	52.7	39	76.5	83	76.9	99	62.3	106	48.6	208	49.9	235	46.4	507	51.1	214	48.5	141	45.8
総数	1,997	100.0	83	100.0	207	100.0	275	100.0	341	100.0	503	100.0	588	100.0	1,364	100.0	507	100.0	343	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	205	10.3	1	1.2	3	1.4	9	3.3	20	5.9	59	11.7	113	19.2	132	9.7	77	15.2	69	20.1
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	166	8.3	3	3.6	8	3.9	17	6.2	31	9.1	49	9.7	58	9.9	110	8.1	37	7.3	45	13.1
上記以外	1,626	81.4	79	95.2	196	94.7	249	90.5	290	85.0	395	78.5	417	70.9	1,122	82.3	393	77.5	229	66.8

注1) 血圧、腹囲、ヘモグロビンA1c、血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬、インスリン注射または血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況にすべて回答した20歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦3名(20-29歳の1名と30-39歳の2名)を除外した。

注2) ヘモグロビンA1c $\geq$ 6.0%(NGSP値)の場合。判定基準はp.16参照。

(26年)

第48表の1 腹囲区分別，血中脂質，血圧，血糖のいずれかのリスクを有する者の割合－年齢階級，腹囲の区分，血中脂質・血圧・血糖のリスク保有数別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除外〕

	腹囲(cm)	総数		リスク保有数								
		人数	%	0		1つ		2つ		3つ		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	<85cm(男)/90cm(女)	2,231	100.0	854	38.3	871	39.0	399	17.9	107	4.8
		≥85cm(男)/90cm(女)	1,226	100.0	165	13.5	499	40.7	390	31.8	172	14
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	107	100.0	96	89.7	9	8.4	2	1.9	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	27	100.0	11	40.7	12	44.4	4	14.8	0	0.0
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	246	100.0	201	81.7	42	17.1	3	1.2	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	69	100.0	33	47.8	27	39.1	8	11.6	1	1.4
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	315	100.0	219	69.5	87	27.6	7	2.2	2	0.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	119	100.0	33	27.7	49	41.2	26	21.8	11	9.2
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	358	100.0	160	44.7	151	42.2	37	10.3	10	2.8
		≥85cm(男)/90cm(女)	201	100.0	38	18.9	93	46.3	52	25.9	18	9.0
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	567	100.0	114	20.1	283	49.9	135	23.8	35	6.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	353	100.0	36	10.2	140	39.7	122	34.6	55	15.6
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	638	100.0	64	10.0	299	46.9	215	33.7	60	9.4
		≥85cm(男)/90cm(女)	457	100.0	14	3.1	178	38.9	178	38.9	87	19
(再掲)40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,514	100.0	524	34.6	658	43.5	262	17.3	70	4.6	
	≥85cm(男)/90cm(女)	843	100.0	115	13.6	343	40.7	267	31.7	118	14.0	
(再掲)65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	580	100.0	90	15.5	284	49.0	161	27.8	45	7.8	
	≥85cm(男)/90cm(女)	368	100.0	27	7.3	142	38.6	139	37.8	60	16.3	
(再掲)75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	364	100.0	33	9.1	162	44.5	132	36.3	37	10.2	
	≥85cm(男)/90cm(女)	287	100.0	6	2.1	117	40.8	111	38.7	53	18.5	
男性	総数	<85cm	668	100.0	196	29.3	305	45.7	135	20.2	32	4.8
		≥85cm	792	100.0	102	12.9	333	42.0	249	31.4	108	13.6
	20-29歳	<85cm	32	100.0	26	81.3	4	12.5	2	6.3	0	0.0
		≥85cm	19	100.0	7	36.8	9	47.4	3	15.8	0	0.0
	30-39歳	<85cm	64	100.0	39	60.9	23	35.9	2	3.1	0	0.0
		≥85cm	44	100.0	19	43.2	19	43.2	6	13.6	0	0.0
	40-49歳	<85cm	81	100.0	54	66.7	25	30.9	2	2.5	0	0.0
		≥85cm	78	100.0	18	23.1	32	41.0	17	21.8	11	14.1
	50-59歳	<85cm	83	100.0	27	32.5	44	53.0	11	13.3	1	1.2
		≥85cm	135	100.0	23	17.0	62	45.9	38	28.1	12	8.9
	60-69歳	<85cm	183	100.0	30	16.4	101	55.2	41	22.4	11	6
		≥85cm	234	100.0	25	10.7	91	38.9	87	37.2	31	13.2
	70歳以上	<85cm	225	100.0	20	8.9	108	48.0	77	34.2	20	8.9
		≥85cm	282	100.0	10	3.5	120	42.6	98	34.8	54	19.1
(再掲)40-74歳	<85cm	436	100.0	120	27.5	218	50.0	79	18.1	19	4.4	
	≥85cm	557	100.0	71	12.7	233	41.8	180	32.3	73	13.1	
(再掲)65-74歳	<85cm	195	100.0	27	13.8	105	53.8	48	24.6	15	7.7	
	≥85cm	246	100.0	19	7.7	105	42.7	88	35.8	34	13.8	
(再掲)75歳以上	<85cm	136	100.0	11	8.1	60	44.1	52	38.2	13	9.6	
	≥85cm	172	100.0	5	2.9	72	41.9	60	34.9	35	20.3	
女性	総数	<90cm	1,563	100.0	658	42.1	566	36.2	264	16.9	75	4.8
		≥90cm	434	100.0	63	14.5	166	38.2	141	32.5	64	14.7
	20-29歳	<90cm	75	100.0	70	93.3	5	6.7	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	8	100.0	4	50.0	3	37.5	1	12.5	0	0.0
	30-39歳	<90cm	182	100.0	162	89.0	19	10.4	1	0.5	0	0.0
		≥90cm	25	100.0	14	56.0	8	32.0	2	8.0	1	4.0
	40-49歳	<90cm	234	100.0	165	70.5	62	26.5	5	2.1	2	0.9
		≥90cm	41	100.0	15	36.6	17	41.5	9	22	0	0.0
	50-59歳	<90cm	275	100.0	133	48.4	107	38.9	26	9.5	9	3.3
		≥90cm	66	100.0	15	22.7	31	47.0	14	21.2	6	9.1
	60-69歳	<90cm	384	100.0	84	21.9	182	47.4	94	24.5	24	6.3
		≥90cm	119	100.0	11	9.2	49	41.2	35	29.4	24	20.2
	70歳以上	<90cm	413	100.0	44	10.7	191	46.2	138	33.4	40	9.7
		≥90cm	175	100.0	4	2.3	58	33.1	80	45.7	33	18.9
(再掲)40-74歳	<90cm	1,078	100.0	404	37.5	440	40.8	183	17.0	51	4.7	
	≥90cm	286	100.0	44	15.4	110	38.5	87	30.4	45	15.7	
(再掲)65-74歳	<90cm	385	100.0	63	16.4	179	46.5	113	29.4	30	7.8	
	≥90cm	122	100.0	8	6.6	37	30.3	51	41.8	26	21.3	
(再掲)75歳以上	<90cm	228	100.0	22	9.6	102	44.7	80	35.1	24	10.5	
	≥90cm	115	100.0	1	0.9	45	39.1	51	44.3	18	15.7	

注1)血圧，腹囲，ヘモグロビンA1c，血清HDLコレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診において血圧を下げる薬，インスリン注射または血糖を下げる薬，コレステロールを下げる薬，中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬の服用状況にすべて回答した20歳以上の者を集計対象とした。なお，女性は妊婦3名(20-29歳の1名と30-39歳の2名)を除外した。(26年)

注2)ヘモグロビンA1c≥6.0%(NGSP値)の場合。リスクの項目は基準はp.16参照。

第48表の2 腹囲区別、血中脂質、血圧、血糖のリスクの保有状況〔すべての組み合わせ(①血中脂質②血圧③血糖)一年齢階級、腹囲の区分、血中脂質・血圧・血糖のリスク保有組合せ別、人数、割合-全国、総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

性別	年齢階級	腹囲(cm)	総数		リスク保有組み合わせ															
			人数	%	①有②有③有		①有②有③無		①無②有③有		①有②無③有		①有②無③無		①無②有③無		①無②無③有		①無②無③無	
					人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	<85cm(男)/90cm(女)	2,231	100.0	107	4.8	179	8.0	191	8.6	29	1.3	82	3.7	708	31.7	81	3.6	854	38.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	1,226	100.0	172	14.0	177	14.4	190	15.5	23	1.9	35	2.9	429	35.0	35	2.9	165	13.5
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	107	100.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	3	2.8	6	5.6	0	0.0	96	89.7
		≥85cm(男)/90cm(女)	27	100.0	0	0.0	2	7.4	2	7.4	0	0.0	4	14.8	8	29.6	0	0.0	11	40.7
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	246	100.0	0	0.0	1	0.4	2	0.8	0	0.0	6	2.4	29	11.8	7	2.8	201	81.7
		≥85cm(男)/90cm(女)	69	100.0	1	1.4	6	8.7	2	2.9	0	0.0	5	7.2	21	30.4	1	1.4	33	47.8
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	315	100.0	2	0.6	2	0.6	4	1.3	1	0.3	9	2.9	67	21.3	11	3.5	219	69.5
		≥85cm(男)/90cm(女)	119	100.0	11	9.2	12	10.1	12	10.1	2	1.7	6	5.0	40	33.6	3	2.5	33	27.7
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	358	100.0	10	2.8	19	5.3	11	3.1	7	2.0	14	3.9	122	34.1	15	4.2	160	44.7
		≥85cm(男)/90cm(女)	201	100.0	18	9.0	23	11.4	25	12.4	4	2.0	4	2.0	82	40.8	7	3.5	38	18.9
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	567	100.0	35	6.2	56	9.9	71	12.5	8	1.4	24	4.2	234	41.3	25	4.4	114	20.1
		≥85cm(男)/90cm(女)	353	100.0	55	15.6	52	14.7	60	17.0	10	2.8	7	2.0	121	34.3	12	3.4	36	10.2
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	638	100.0	60	9.4	99	15.5	103	16.1	13	2.0	26	4.1	250	39.2	23	3.6	64	10.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	457	100.0	87	19.0	82	17.9	89	19.5	7	1.5	9	2.0	157	34.4	12	2.6	14	3.1
(再掲)40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,514	100.0	70	4.6	116	7.7	123	8.1	23	1.5	63	4.2	529	34.9	66	4.4	524	34.6	
	≥85cm(男)/90cm(女)	843	100.0	118	14.0	115	13.6	133	15.8	19	2.3	21	2.5	296	35.1	26	3.1	115	13.6	
(再掲)65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	580	100.0	45	7.8	71	12.2	77	13.3	13	2.2	27	4.7	229	39.5	28	4.8	90	15.5	
	≥85cm(男)/90cm(女)	368	100.0	60	16.3	58	15.8	74	20.1	7	1.9	6	1.6	125	34.0	11	3.0	27	7.3	
(再掲)75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	364	100.0	37	10.2	60	16.5	66	18.1	6	1.6	10	2.7	144	39.6	8	2.2	33	9.1	
	≥85cm(男)/90cm(女)	287	100.0	53	18.5	54	18.8	53	18.5	4	1.4	5	1.7	104	36.2	8	2.8	6	2.1	
男性	総数	<85cm	668	100.0	32	4.8	61	9.1	67	10.0	7	1.0	15	2.2	273	40.9	17	2.5	196	29.3
		≥85cm	792	100.0	108	13.6	120	15.2	118	14.9	11	1.4	24	3.0	291	36.7	18	2.3	102	12.9
	20-29歳	<85cm	32	100.0	0	0.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0	1	3.1	3	9.4	0	0.0	26	81.3
		≥85cm	19	100.0	0	0.0	2	10.5	1	5.3	0	0.0	3	15.8	6	31.6	0	0.0	7	36.8
	30-39歳	<85cm	64	100.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	0	0.0	3	4.7	19	29.7	1	1.6	39	60.9
		≥85cm	44	100.0	0	0.0	6	13.6	0	0.0	0	0.0	4	9.1	15	34.1	0	0.0	19	43.2
	40-49歳	<85cm	81	100.0	0	0.0	1	1.2	1	1.2	0	0.0	3	3.7	21	25.9	1	1.2	54	66.7
		≥85cm	78	100.0	11	14.1	9	11.5	7	9.0	1	1.3	5	6.4	27	34.6	0	0.0	18	23.1
	50-59歳	<85cm	83	100.0	1	1.2	7	8.4	2	2.4	2	2.4	1	1.2	41	49.4	2	2.4	27	32.5
		≥85cm	135	100.0	12	8.9	20	14.8	16	11.9	2	1.5	2	1.5	56	41.5	4	3.0	23	17.0
	60-69歳	<85cm	183	100.0	11	6.0	16	8.7	24	13.1	1	0.5	3	1.6	91	49.7	7	3.8	30	16.4
		≥85cm	234	100.0	31	13.2	40	17.1	44	18.8	3	1.3	3	1.3	81	34.6	7	3.0	25	10.7
	70歳以上	<85cm	225	100.0	20	8.9	34	15.1	39	17.3	4	1.8	4	1.8	98	43.6	6	2.7	20	8.9
		≥85cm	282	100.0	54	19.1	43	15.2	50	17.7	5	1.8	7	2.5	106	37.6	7	2.5	10	3.5
(再掲)40-74歳	<85cm	436	100.0	19	4.4	35	8.0	40	9.2	4	0.9	10	2.3	194	44.5	14	3.2	120	27.5	
	≥85cm	557	100.0	73	13.1	81	14.5	90	16.2	9	1.6	13	2.3	206	37.0	14	2.5	71	12.7	
(再掲)65-74歳	<85cm	195	100.0	15	7.7	20	10.3	26	13.3	2	1.0	5	2.6	92	47.2	8	4.1	27	13.8	
	≥85cm	246	100.0	34	13.8	35	14.2	50	20.3	3	1.2	4	1.6	93	37.8	8	3.3	19	7.7	
(再掲)75歳以上	<85cm	136	100.0	13	9.6	23	16.9	26	19.1	3	2.2	1	0.7	57	41.9	2	1.5	11	8.1	
	≥85cm	172	100.0	35	20.3	31	18.0	27	15.7	2	1.2	4	2.3	64	37.2	4	2.3	5	2.9	
女性	総数	<90cm	1,563	100.0	75	4.8	118	7.5	124	7.9	22	1.4	67	4.3	435	27.8	64	4.1	658	42.1
		≥90cm	434	100.0	64	14.7	57	13.1	72	16.6	12	2.8	11	2.5	138	31.8	17	3.9	63	14.5
	20-29歳	<90cm	75	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	3	4.0	0	0.0	70	93.3
		≥90cm	8	100.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	2	25.0	0	0.0	4	50.0
	30-39歳	<90cm	182	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	1.6	10	5.5	6	3.3	162	89.0
		≥90cm	25	100.0	1	4.0	0	0.0	2	8.0	0	0.0	1	4.0	6	24.0	1	4.0	14	56.0
	40-49歳	<90cm	234	100.0	2	0.9	1	0.4	3	1.3	1	0.4	6	2.6	46	19.7	10	4.3	165	70.5
		≥90cm	41	100.0	0	0.0	3	7.3	5	12.2	1	2.4	1	2.4	13	31.7	3	7.3	15	36.6
	50-59歳	<90cm	275	100.0	9	3.3	12	4.4	9	3.3	5	1.8	13	4.7	81	29.5	13	4.7	133	48.4
		≥90cm	66	100.0	6	9.1	3	4.5	9	13.6	2	3.0	2	3.0	26	39.4	3	4.5	15	22.7
	60-69歳	<90cm	384	100.0	24	6.3	40	10.4	47	12.2	7	1.8	21	5.5	143	37.2	18	4.7	84	21.9
		≥90cm	119	100.0	24	20.2	12	10.1	16	13.4	7	5.9	4	3.4	40	33.6	5	4.2	11	9.2
	70歳以上	<90cm	413	100.0	40	9.7	65	15.7	64	15.5	9	2.2	22	5.3	152	36.8	17	4.1	44	10.7
		≥90cm	175	100.0	33	18.9	39	22.3	39	22.3	2	1.1	2	1.1	51	29.1	5	2.9	4	2.3
(再掲)40-74歳	<90cm	1,078	100.0	51	4.7	81	7.5	83	7.7	19	1.8	53	4.9	335	31.1	52	4.8	404	37.5	
	≥90cm	286	100.0	45	15.7	34	11.9	43	15.0	10	3.5	8	2.8	90	31.5	12	4.2	44	15.4	
(再掲)65-74歳	<90cm	385	100.0	30	7.8	51	13.2	51	13.2	11	2.9	22	5.7	137	35.6	20	5.2	63	16.4	
	≥90cm	122	100.0	26	21.3	23	18.9	24	19.7	4	3.3	2	1.6	32	26.2	3	2.5	8	6.6	
(再掲)75歳以上	<90cm	228	100.0	24	10.5	37	16.2	40	17.5	3	1.3	9	3.9	87	38.2	6	2.6	22	9.6	
	≥90cm	115	100.0	18	15.7	23	20.0	26	22.6	2	1.7	1	0.9	40	34.8	4	3.5	1	0.9	

注1)血圧、腹囲、ヘモグロビンA1c、血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診において血圧を下げる薬、インスリン注射または血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況にすべて回答した20歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦3名(20-29歳の1名と30-39歳の2名)を除外した。(26年)

注2)ヘモグロビンA1c≥6.0%(NGSP値)の場合。  
リスクの項目は基準はp.16参照。

第49表 糖尿病の指摘の状況－糖尿病の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,479	100.0	137	100.0	320	100.0	437	100.0	556	100.0	923	100.0	1,106	100.0	2,363	100.0	950	100.0	659	100.0
あり	502	14.4	0	0.0	9	2.8	27	6.2	63	11.3	172	18.6	231	20.9	366	15.5	197	20.7	127	19.3
なし	2,977	85.6	137	100.0	311	97.2	410	93.8	493	88.7	751	81.4	875	79.1	1,997	84.5	753	79.3	532	80.7
総数	1,466	100.0	51	100.0	108	100.0	160	100.0	217	100.0	418	100.0	512	100.0	996	100.0	443	100.0	311	100.0
あり	268	18.3	0	0.0	4	3.7	13	8.1	31	14.3	96	23.0	124	24.2	194	19.5	107	24.2	70	22.5
なし	1,198	81.7	51	100.0	104	96.3	147	91.9	186	85.7	322	77.0	388	75.8	802	80.5	336	75.8	241	77.5
総数	2,013	100.0	86	100.0	212	100.0	277	100.0	339	100.0	505	100.0	594	100.0	1,367	100.0	507	100.0	348	100.0
あり	234	11.6	0	0.0	5	2.4	14	5.1	32	9.4	76	15.0	107	18.0	172	12.6	90	17.8	57	16.4
なし	1,779	88.4	86	100.0	207	97.6	263	94.9	307	90.6	429	85.0	487	82.0	1,195	87.4	417	82.2	291	83.6

注)ヘモグロビンA1c値を測定し，身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」，「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」，「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況のすべてに回答をしている者を集計対象とした。

第50表 糖尿病を指摘されたことがある者における，治療の状況－治療の状況，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	502	100.0	0	100.0	9	100.0	27	100.0	63	100.0	172	100.0	231	100.0	366	100.0	197	100.0	127	100.0
あり	233	46.4	0	0.0	2	22.2	8	29.6	30	47.6	66	38.4	127	55.0	155	42.3	91	46.2	76	59.8
なし	269	53.6	0	0.0	7	77.8	19	70.4	33	52.4	106	61.6	104	45.0	211	57.7	106	53.8	51	40.2
総数	268	100.0	0	100.0	4	100.0	13	100.0	31	100.0	96	100.0	124	100.0	194	100.0	107	100.0	70	100.0
あり	135	50.4	0	0.0	0	0.0	6	46.2	17	54.8	39	40.6	73	58.9	89	45.9	53	49.5	46	65.7
なし	133	49.6	0	0.0	4	100.0	7	53.8	14	45.2	57	59.4	51	41.1	105	54.1	54	50.5	24	34.3
総数	234	100.0	0	100.0	5	100.0	14	100.0	32	100.0	76	100.0	107	100.0	172	100.0	90	100.0	57	100.0
あり	98	41.9	0	0.0	2	40.0	2	14.3	13	40.6	27	35.5	54	50.5	66	38.4	38	42.2	30	52.6
なし	136	58.1	0	0.0	3	60.0	12	85.7	19	59.4	49	64.5	53	49.5	106	61.6	52	57.8	27	47.4

注1)ヘモグロビンA1c値を測定し，身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」，「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」，「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況のすべてに回答をした者のうち，「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。

注2)身体状況調査票の「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無」，「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」のいずれかに「有」と回答した者を糖尿病の治療ありとした。

第51表 「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況－糖尿病が疑われる人の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,479	100.0	137	100.0	320	100.0	437	100.0	556	100.0	923	100.0	1,106	100.0	2,363	100.0	950	100.0	659	100.0
糖尿病が強く疑われる人	425	12.2	0	0.0	3	0.9	11	2.5	45	8.1	151	16.4	215	19.4	292	12.4	174	18.3	130	19.7
(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち、服薬者*	234	55.1	0	0.0	2	66.7	8	72.7	30	66.7	66	43.7	128	59.5	155	53.1	91	52.3	77	59.2
糖尿病の可能性が否定できない人	428	12.3	2	1.5	11	3.4	37	8.5	54	9.7	133	14.4	191	17.3	303	12.8	150	15.8	112	17.0
上記以外	2,626	75.5	135	98.5	306	95.6	389	89.0	457	82.2	639	69.2	700	63.3	1,768	74.8	626	65.9	417	63.3
総数	1,466	100.0	51	100.0	108	100.0	160	100.0	217	100.0	418	100.0	512	100.0	996	100.0	443	100.0	311	100.0
糖尿病が強く疑われる人	227	15.5	0	0.0	0	0.0	6	3.8	23	10.6	84	20.1	114	22.3	158	15.9	95	21.4	69	22.2
(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち、服薬者*	135	59.5	0	0.0	0	0.0	6	100.0	17	73.9	39	46.4	73	64.0	89	56.3	53	55.8	46	66.7
糖尿病の可能性が否定できない人	165	11.3	1	2.0	2	1.9	16	10.0	18	8.3	49	11.7	79	15.4	115	11.5	58	13.1	47	15.1
上記以外	1,074	73.3	50	98.0	106	98.1	138	86.3	176	81.1	285	68.2	319	62.3	723	72.6	290	65.5	195	62.7
総数	2,013	100.0	86	100.0	212	100.0	277	100.0	339	100.0	505	100.0	594	100.0	1,367	100.0	507	100.0	348	100.0
糖尿病が強く疑われる人	198	9.8	0	0.0	3	1.4	5	1.8	22	6.5	67	13.3	101	17.0	134	9.8	79	15.6	61	17.5
(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち、服薬者*	99	50.0	0	0.0	2	66.7	2	40.0	13	59.1	27	40.3	55	54.5	66	49.3	38	48.1	31	50.8
糖尿病の可能性が否定できない人	263	13.1	1	1.2	9	4.2	21	7.6	36	10.6	84	16.6	112	18.9	188	13.8	92	18.1	65	18.7
上記以外	1,552	77.1	85	98.8	200	94.3	251	90.6	281	82.9	354	70.1	381	64.1	1,045	76.4	336	66.3	222	63.8

注1) 身体状況調査においてヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」, 「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」, 「(7-1)現在糖尿病の治療の(26年)有無」, 「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況のすべてに回答した者を集計対象とした。

注2) 判定基準はp.16参照。

\* 「服薬者」とは、身体状況調査票の問診(6)(c)「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無」に「有」と回答した者。

「糖尿病が強く疑われる人」の判定  
 ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c (NGSP) の値が6.5%以上、または、身体状況調査票の(7)「現在、糖尿病治療の有無」に「1有」と回答した者  
 「糖尿病の可能性を否定できない人」の判定  
 ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c (NGSP) 値が6.0%以上、6.5%未満で、「糖尿病が強く疑われる人」以外の人

第52表 「糖尿病が強く疑われる者」における治療の有無一糖尿病の治療の有無、年齢階級別、人数、割合一総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	425	100.0	0	0.0	3	100.0	11	100.0	45	100.0	151	100.0	215	100.0	292	100.0	174	100.0	130	100.0
あり	305	71.8	0	0.0	2	66.7	9	81.8	34	75.6	100	66.2	160	74.4	211	72.3	125	71.8	92	70.8
なし	120	28.2	0	0.0	1	33.3	2	18.2	11	24.4	51	33.8	55	25.6	81	27.7	49	28.2	38	29.2
総数	227	100.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	23	100.0	84	100.0	114	100.0	158	100.0	95	100.0	69	100.0
あり	169	74.4	0	0.0	0	0.0	6	100.0	17	73.9	57	67.9	89	78.1	116	73.4	72	75.8	53	76.8
なし	58	25.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	26.1	27	32.1	25	21.9	42	26.6	23	24.2	16	23.2
総数	198	100.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0	22	100.0	67	100.0	101	100.0	134	100.0	79	100.0	61	100.0
あり	136	68.7	0	0.0	2	66.7	3	60.0	17	77.3	43	64.2	71	70.3	95	70.9	53	67.1	39	63.9
なし	62	31.3	0	0.0	1	33.3	2	40.0	5	22.7	24	35.8	30	29.7	39	29.1	26	32.9	22	36.1

注1) 身体状況調査においてヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の、問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」、「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況のすべてに回答した者を集計対象とした。  
注2) 「糖尿病が強く疑われる人」の判定基準はD.I6参照。  
\* 身体状況調査票の問診(7-1)「現在糖尿病の治療の有無(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)」に「有」と回答した者を治療ありとした。(26年)



第53表 高血圧症有病者の状況－高血圧症有病者の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	3,699	100.0	146	100.0	331	100.0	449	100.0	581	100.0	978	100.0	1,214	100.0	2,501	100.0	1,031	100.0	721	100.0
高血圧症有病者	1,823	49.3	7	4.8	34	10.3	80	17.8	243	41.8	592	60.5	867	71.4	1,236	49.4	663	64.3	546	75.7
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	1,075	59.0	0	0.0	1	2.9	24	30.0	107	44.0	336	56.8	607	70.0	690	55.8	422	63.7	384	70.3
正常高値血圧者	504	13.6	15	10.3	29	8.8	76	16.9	85	14.6	138	14.1	161	13.3	371	14.8	139	13.5	89	12.3
上記以外	1,372	37.1	124	84.9	268	81.0	293	65.3	253	43.5	248	25.4	186	15.3	894	35.7	229	22.2	86	11.9
総数	1,552	100.0	55	100.0	110	100.0	164	100.0	229	100.0	439	100.0	555	100.0	1,054	100.0	478	100.0	333	100.0
高血圧症有病者	899	57.9	6	10.9	25	22.7	41	25.0	137	59.8	290	66.1	400	72.1	620	58.8	329	68.8	248	74.5
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	519	57.7	0	0.0	0	0.0	14	34.1	65	47.4	172	59.3	268	67.0	354	57.1	210	63.8	165	66.5
正常高値血圧者	245	15.8	9	16.4	17	15.5	39	23.8	27	11.8	68	15.5	85	15.3	169	16.0	68	14.2	50	15.0
上記以外	408	26.3	40	72.7	68	61.8	84	51.2	65	28.4	81	18.5	70	12.6	265	25.1	81	16.9	35	10.5
総数	2,147	100.0	91	100.0	221	100.0	285	100.0	352	100.0	539	100.0	659	100.0	1,447	100.0	553	100.0	388	100.0
高血圧症有病者	924	43.0	1	1.1	9	4.1	39	13.7	106	30.1	302	56.0	467	70.9	616	42.6	334	60.4	298	76.8
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	556	60.2	0	0.0	1	11.1	10	25.6	42	39.6	164	54.3	339	72.6	336	54.5	212	63.5	219	73.5
正常高値血圧者	259	12.1	6	6.6	12	5.4	37	13.0	58	16.5	70	13.0	76	11.5	202	14.0	71	12.8	39	10.1
上記以外	964	44.9	84	92.3	200	90.5	209	73.3	188	53.4	167	31.0	116	17.6	629	43.5	148	26.8	51	13.1

注1) 血圧を測定をし、身体状況調査の問診において「(6)(a)血圧を下げる薬」に回答をしている者を集計対象とした。

注2) 判定の基準はp.15参照。

\* 「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6)(a)血圧を下げる薬」に「有」と回答した者。

(26年)

「高血圧症有病者」の判定  
収縮期血圧 140mmHg以上、または拡張期血圧 90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者

第54表 「脂質異常症が疑われる者」の状況－脂質異常症が疑われる人の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,492	100.0	138	100.0	325	100.0	439	100.0	560	100.0	925	100.0	1,105	100.0	2,371	100.0	954	100.0	658	100.0
脂質異常症が疑われる人	811	23.2	11	8.0	19	5.8	47	10.7	99	17.7	248	26.8	387	35.0	551	23.2	291	30.5	230	35.0
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	591	72.9	1	9.1	2	10.5	14	29.8	76	76.8	195	78.6	303	78.3	418	75.9	240	82.5	170	73.9
上記以外	2,681	76.8	127	92.0	306	94.2	392	89.3	461	82.3	677	73.2	718	65.0	1,820	76.8	663	69.5	428	65.0
総数	1,470	100.0	52	100.0	108	100.0	161	100.0	219	100.0	419	100.0	511	100.0	999	100.0	444	100.0	311	100.0
脂質異常症が疑われる人	381	25.9	8	15.4	14	13.0	31	19.3	47	21.5	109	26.0	172	33.7	247	24.7	120	27.0	112	36.0
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	211	55.4	0	0.0	1	7.1	5	16.1	32	68.1	66	60.6	107	62.2	145	58.7	79	65.8	65	58.0
上記以外	1,089	74.1	44	84.6	94	87.0	130	80.7	172	78.5	310	74.0	339	66.3	752	75.3	324	73.0	199	64.0
総数	2,022	100.0	86	100.0	217	100.0	278	100.0	341	100.0	506	100.0	594	100.0	1,372	100.0	510	100.0	347	100.0
脂質異常症が疑われる人	430	21.3	3	3.5	5	2.3	16	5.8	52	15.2	139	27.5	215	36.2	304	22.2	171	33.5	118	34.0
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	380	88.4	1	33.3	1	20.0	9	56.3	44	84.6	129	92.8	196	91.2	273	89.8	161	94.2	105	89.0
上記以外	1,592	78.7	83	96.5	212	97.7	262	94.2	289	84.8	367	72.5	379	63.8	1,068	77.8	339	66.5	229	66.0

注)HDLコレステロールを測定し、身体状況調査の問診において「(6)(d)コレステロールを下げる薬」、「(6)(e)中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用状況に回答した者を集計対象とした。(26年)

\*「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6)(d)コレステロールを下げる薬」、「(6)(e)中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」に使用「有」と回答した者。

「脂質異常症が疑われる人」の判定  
国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記の通りとした。  
HDLコレステロールが40mg/dL未満、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬を服用している者。

第55表 運動禁止の有無－運動禁止の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	4,240	100.0	209	100.0	420	100.0	567	100.0	662	100.0	1,071	100.0	1,311	100.0	2,349	100.0	1,891	100.0	1,112	100.0	779	100.0
	運動禁止の有	72	1.7	1	0.5	1	0.2	3	0.5	9	1.4	15	1.4	43	3.3	20	0.9	52	2.7	23	2.1	29	3.7
	運動禁止の無	4,168	98.3	208	99.5	419	99.8	564	99.5	653	98.6	1,056	98.6	1,268	96.7	2,329	99.1	1,839	97.3	1,089	97.9	750	96.3
男性	総数	1,840	100.0	77	100.0	163	100.0	233	100.0	276	100.0	488	100.0	603	100.0	958	100.0	882	100.0	520	100.0	362	100.0
	運動禁止の有	34	1.8	1	1.3	0	0.0	0	0.0	6	2.2	8	1.6	19	3.2	10	1.0	24	2.7	11	2.1	13	3.6
	運動禁止の無	1,806	98.2	76	98.7	163	100.0	233	100.0	270	97.8	480	98.4	584	96.8	948	99.0	858	97.3	509	97.9	349	96.4
女性	総数	2,400	100.0	132	100.0	257	100.0	334	100.0	386	100.0	583	100.0	708	100.0	1,391	100.0	1,009	100.0	592	100.0	417	100.0
	運動禁止の有	38	1.6	0	0.0	1	0.4	3	0.9	3	0.8	7	1.2	24	3.4	10	0.7	28	2.8	12	2.0	16	3.8
	運動禁止の無	2,362	98.4	132	100.0	256	99.6	331	99.1	383	99.2	576	98.8	684	96.6	1,381	99.3	981	97.2	580	98.0	401	96.2

注)身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に回答した者を集計対象とした。

(26年)

第56表 1週間の運動日数－1週間の運動日数，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	4,100	100.0	203	100.0	411	100.0	553	100.0	640	100.0	1,039	100.0	1,254	100.0	2,283	100.0	1,817	100.0	1,078	100.0	739	100.0
	運動無し	2,117	51.6	127	62.6	287	69.8	351	63.5	369	57.7	450	43.3	533	42.5	1,362	59.7	755	41.6	416	38.6	339	45.9
	1日/週	342	8.3	19	9.4	39	9.5	62	11.2	71	11.1	90	8.7	61	4.9	228	10.0	114	6.3	78	7.2	36	4.9
	2日/週	293	7.1	12	5.9	34	8.3	39	7.1	44	6.9	79	7.6	85	6.8	168	7.4	125	6.9	81	7.5	44	6.0
	3日/週	297	7.2	12	5.9	21	5.1	26	4.7	49	7.7	96	9.2	93	7.4	152	6.7	145	8.0	102	9.5	43	5.8
	4日/週	155	3.8	11	5.4	3	0.7	15	2.7	15	2.3	47	4.5	64	5.1	65	2.8	90	5.0	59	5.5	31	4.2
	5日/週	196	4.8	9	4.4	14	3.4	16	2.9	30	4.7	55	5.3	72	5.7	90	3.9	106	5.8	72	6.7	34	4.6
	6日/週	85	2.1	6	3.0	1	0.2	8	1.4	6	0.9	37	3.6	27	2.2	33	1.4	52	2.9	37	3.4	15	2.0
	7日/週	615	15.0	7	3.4	12	2.9	36	6.5	56	8.8	185	17.8	319	25.4	185	8.1	430	23.7	233	21.6	197	26.7
男性	総数	1,780	100.0	74	100.0	160	100.0	231	100.0	264	100.0	474	100.0	577	100.0	931	100.0	849	100.0	506	100.0	343	100.0
	運動無し	882	49.6	35	47.3	101	63.1	132	57.1	156	59.1	222	46.8	236	40.9	530	56.9	352	41.5	204	40.3	148	43.1
	1日/週	141	7.9	13	17.6	23	14.4	31	13.4	29	11.0	28	5.9	17	2.9	108	11.6	33	3.9	22	4.3	11	3.2
	2日/週	126	7.1	5	6.8	13	8.1	20	8.7	20	7.6	36	7.6	32	5.5	73	7.8	53	6.2	36	7.1	17	5.0
	3日/週	120	6.7	7	9.5	12	7.5	10	4.3	19	7.2	35	7.4	37	6.4	62	6.7	58	6.8	38	7.5	20	5.8
	4日/週	66	3.7	5	6.8	1	0.6	8	3.5	3	1.1	18	3.8	31	5.4	24	2.6	42	4.9	25	4.9	17	5.0
	5日/週	91	5.1	2	2.7	8	5.0	9	3.9	15	5.7	19	4.0	38	6.6	44	4.7	47	5.5	32	6.3	15	4.4
	6日/週	48	2.7	3	4.1	0	0.0	5	2.2	5	1.9	21	4.4	14	2.4	18	1.9	30	3.5	22	4.3	8	2.3
	7日/週	306	17.2	4	5.4	2	1.3	16	6.9	17	6.4	95	20.0	172	29.8	72	7.7	234	27.6	127	25.1	107	31.2
女性	総数	2,320	100.0	129	100.0	251	100.0	322	100.0	376	100.0	565	100.0	677	100.0	1,352	100.0	968	100.0	572	100.0	396	100.0
	運動無し	1,235	53.2	92	71.3	186	74.1	219	68	213	56.6	228	40.4	297	43.9	832	61.5	403	41.6	212	37.1	191	48.2
	1日/週	201	8.7	6	4.7	16	6.4	31	9.6	42	11.2	62	11.0	44	6.5	120	8.9	81	8.4	56	9.8	25	6.3
	2日/週	167	7.2	7	5.4	21	8.4	19	5.9	24	6.4	43	7.6	53	7.8	95	7.0	72	7.4	45	7.9	27	6.8
	3日/週	177	7.6	5	3.9	9	3.6	16	5.0	30	8.0	61	10.8	56	8.3	90	6.7	87	9.0	64	11.2	23	5.8
	4日/週	89	3.8	6	4.7	2	0.8	7	2.2	12	3.2	29	5.1	33	4.9	41	3.0	48	5.0	34	5.9	14	3.5
	5日/週	105	4.5	7	5.4	6	2.4	7	2.2	15	4.0	36	6.4	34	5.0	46	3.4	59	6.1	40	7.0	19	4.8
	6日/週	37	1.6	3	2.3	1	0.4	3	0.9	1	0.3	16	2.8	13	1.9	15	1.1	22	2.3	15	2.6	7	1.8
	7日/週	309	13.3	3	2.3	10	4.0	20	6.2	39	10.4	90	15.9	147	21.7	113	8.4	196	20.2	106	18.5	90	22.7

注)身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し，(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。

(26年)

第57表 運動を行う日の平均運動時間—運動を行う日の平均運動時間の区分，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,983	100.0	76	100.0	124	100.0	202	100.0	271	100.0	589	100.0	721	100.0	921	100.0	1,062	100.0	662	100.0	400	100.0	
総数	30分未満	298	15.0	10	13.2	16	12.9	23	11.4	52	19.2	82	13.9	115	16.0	138	15.0	160	15.1	89	13.4	71	17.8
	30分以上60分未満	593	29.9	9	11.8	28	22.6	65	32.2	76	28.0	197	33.4	218	30.2	261	28.3	332	31.3	209	31.6	123	30.8
	60分以上120分未満	655	33.0	29	38.2	43	34.7	73	36.1	84	31.0	186	31.6	240	33.3	302	32.8	353	33.2	228	34.4	125	31.3
	120分以上180分未満	293	14.8	12	15.8	28	22.6	25	12.4	44	16.2	91	15.4	93	12.9	147	16.0	146	13.7	96	14.5	50	12.5
	180分以上	144	7.3	16	21.1	9	7.3	16	7.9	15	5.5	33	5.6	55	7.6	73	7.9	71	6.7	40	6.0	31	7.8
男性	898	100.0	39	100.0	59	100.0	99	100.0	108	100.0	252	100.0	341	100.0	401	100.0	497	100.0	302	100.0	195	100.0	
男性	30分未満	115	12.8	4	10.3	6	10.2	7	7.1	18	16.7	33	13.1	47	13.8	49	12.2	66	13.3	42	13.9	24	12.3
	30分以上60分未満	241	26.8	3	7.7	11	18.6	34	34.3	25	23.1	73	29.0	95	27.9	108	26.9	133	26.8	71	23.5	62	31.8
	60分以上120分未満	299	33.3	13	33.3	19	32.2	33	33.3	34	31.5	81	32.1	119	34.9	121	30.2	178	35.8	114	37.7	64	32.8
	120分以上180分未満	150	16.7	7	17.9	18	30.5	15	15.2	20	18.5	44	17.5	46	13.5	77	19.2	73	14.7	49	16.2	24	12.3
	180分以上	93	10.4	12	30.8	5	8.5	10	10.1	11	10.2	21	8.3	34	10.0	46	11.5	47	9.5	26	8.6	21	10.8
女性	1,085	100.0	37	100.0	65	100.0	103	100.0	163	100.0	337	100.0	380	100.0	520	100.0	565	100.0	360	100.0	205	100.0	
女性	30分未満	183	16.9	6	16.2	10	15.4	16	15.5	34	20.9	49	14.5	68	17.9	89	17.1	94	16.6	47	13.1	47	22.9
	30分以上60分未満	352	32.4	6	16.2	17	26.2	31	30.1	51	31.3	124	36.8	123	32.4	153	29.4	199	35.2	138	38.3	61	29.8
	60分以上120分未満	356	32.8	16	43.2	24	36.9	40	38.8	50	30.7	105	31.2	121	31.8	181	34.8	175	31.0	114	31.7	61	29.8
	120分以上180分未満	143	13.2	5	13.5	10	15.4	10	9.7	24	14.7	47	13.9	47	12.4	70	13.5	73	12.9	47	13.1	26	12.7
	180分以上	51	4.7	4	10.8	4	6.2	6	5.8	4	2.5	12	3.6	21	5.5	27	5.2	24	4.2	14	3.9	10	4.9

注)身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し，(9)のすべての質問に回答した者のうち，(26年)  
(9)(a)「1週間の運動日数」が1日以上と回答した者を集計対象とした。

第58表 運動習慣の有無—運動習慣の有無，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	4,100	100.0	203	100.0	411	100.0	553	100.0	640	100.0	1,039	100.0	1,254	100.0	2,283	100.0	1,817	100.0	1,078	100.0	739	100.0	
総数	運動の習慣有	1,138	27.8	27	13.3	47	11.4	92	16.6	123	19.2	357	34.4	492	39.2	432	18.9	706	38.9	437	40.5	269	36.4
	運動の習慣無	2,962	72.2	176	86.7	364	88.6	461	83.4	517	80.8	682	65.6	762	60.8	1,851	81.1	1,111	61.1	641	59.5	470	63.6
男性	1,780	100.0	74	100.0	160	100.0	231	100.0	264	100.0	474	100.0	577	100.0	931	100.0	849	100.0	506	100.0	343	100.0	
男性	運動の習慣有	555	31.2	14	18.9	21	13.1	50	21.6	53	20.1	171	36.1	246	42.6	195	20.9	360	42.4	216	42.7	144	42.0
	運動の習慣無	1,225	68.8	60	81.1	139	86.9	181	78.4	211	79.9	303	63.9	331	57.4	736	79.1	489	57.6	290	57.3	199	58.0
女性	2,320	100.0	129	100.0	251	100.0	322	100.0	376	100.0	565	100.0	677	100.0	1,352	100.0	968	100.0	572	100.0	396	100.0	
女性	運動の習慣有	583	25.1	13	10.1	26	10.4	42	13.0	70	18.6	186	32.9	246	36.3	237	17.5	346	35.7	221	38.6	125	31.6
	運動の習慣無	1,737	74.9	116	89.9	225	89.6	280	87.0	306	81.4	379	67.1	431	63.7	1,115	82.5	622	64.3	351	61.4	271	68.4

注)身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し，(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。(26年)

※「運動の習慣有」とは，身体状況調査の問診(9)で1回30分以上の運動を週2回以上実施し，1年以上継続していると回答した者。

第59表 歩数の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—総数・男性・女性，20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 20-64歳			(再掲) 65歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
総数	6,330	6,491	4,204	457	7,452	4,802	734	7,428	4,372	989	7,324	4,273	994	7,309	4,002	1,511	6,619	3,931	1,645	4,694	3,684	3,892	7,282	4,241	2,438	5,229	3,820	1,475	6,059	3,864	963	3,958	3,378
男性	2,934	7,043	4,589	196	8,015	5,212	349	8,488	5,093	451	7,773	4,564	459	7,745	4,373	719	7,037	4,311	760	5,276	4,011	1,782	7,860	4,683	1,152	5,779	4,136	709	6,562	4,294	443	4,527	3,531
女性	3,396	6,015	3,777	261	7,028	4,433	385	6,467	3,322	538	6,947	3,978	535	6,936	3,615	792	6,239	3,511	885	4,195	3,300	2,110	6,794	3,762	1,286	4,736	3,440	766	5,594	3,355	520	3,472	3,167

注)栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動数(歩数)」および「歩数計の装着状況」の両方に回答した者を集計対象とした。(26年)  
なお，歩数が100歩未満，50,000歩以上の者を除外した。