

(2) メタボリックシンドローム該当者・予備群の有所見の重複状況
(様式6-8)

様式6-8 メタボリックシンドローム該当者・予備群(40-74歳)

男性		総数			40歳代			50歳代			60歳代			70歳代			(再)65-74歳		
		人数	割合①	割合②	人数	割合①	割合②	人数	割合①	割合②	人数	割合①	割合②	人数	割合①	割合②	人数	割合①	割合②
被保険者数(40-74歳)																			
健診受診者数(受診率%)																			
腹囲85cm以上の者																			
(再)有所見の重複状況	腹囲のみ	高血糖	高血圧	高脂血															
	予備群	●																	
			●																
				●															
	該当者	●	●	●															
メタボ予備群																			
メタボ該当者																			

女性		総数			40歳代			50歳代			60歳代			70歳代			(再)65-74歳		
		人数	割合①	割合②	人数	割合①	割合②	人数	割合①	割合②	人数	割合①	割合②	人数	割合①	割合②	人数	割合①	割合②
被保険者数(40-74歳)																			
健診受診者数(受診率%)																			
腹囲90cm以上の者																			
(再)有所見の重複状況	腹囲のみ	高血糖	高血圧	高脂血															
	予備群	●																	
			●																
				●															
	該当者	●	●	●															
メタボ予備群																			
メタボ該当者																			

様式6-8

注)割合①の分母は健診受診者、割合②の分母は腹囲85cm以上または90cm以上

尼崎市の例

様式6-8 内臓脂肪症候群診断者の有所見の重複状況
(平成18年度 尼崎市国民健康保険生活習慣病予防健診結果より)

男性		総数		20代		30代		40代		50代	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
被保険者数(20-59歳)		36,462		8,239		10,004		7,411		10,808	
健診受診者数(受診率%)		1,558	4%	294	4%	706	7%	489	7%	69	1%
腹囲有所見者		581	37%	52	18%	269	38%	227	46%	33	48%
(再)有所見の重複状況	高血糖	●									
	高血圧		●								
	高脂血			●							
	●										
	●	●									
	●	●	●								
内臓脂肪症候群診断者(腹囲有所見者のうち)		203	35%	8	15%	78	29%	99	44%	18	55%
内臓脂肪症候群診断者(健診受診者のうち)		203	13%	8	3%	78	11%	99	20%	18	26%

女性		総数		20代		30代		40代		50代	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
被保険者数(20-59歳)		35,278		7,890		8,818		6,620		11,950	
健診受診者数(受診率%)		1,939	5%	479	6%	853	10%	544	8%	63	1%
腹囲有所見者		97	5%	12	3%	41	5%	38	7%	6	10%
(再)有所見の重複状況	高血糖	●									
	高血圧		●								
	高脂血			●							
	●										
	●	●									
	●	●	●								
内臓脂肪症候群診断者(腹囲有所見者のうち)		19	20%	1	8%	7	17%	7	18%	4	67%
内臓脂肪症候群診断者(健診受診者のうち)		19	1%	1	0%	7	1%	7	1%	4	6%