

要指導医薬品のリスク評価について

- 令和4年12月27日開催の安全対策調査会において、現在要指導医薬品に指定されているイソコナゾールについて、製造販売後調査期間の終了見込みに伴い、一般用医薬品としての適切性を確認するためのリスク評価を行った。

成分・含量	イソコナゾール硝酸塩 600mg（1錠中）
薬効分類	抗真菌剤
投与経路	外用
販売名（製造販売業者）	①メンソレータムフレディ CC1 ②メンソレータムフレディ CC1A （ロート製薬株式会社）
効能・効果	膣カンジダの再発（以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。）
用法・用量	①成人（15歳以上60歳未満）1回1錠を膣深部に挿入する（できれば就寝前）。ただし、3日間経過しても症状の改善が見られないか、6日間経過しても症状が消失しない場合は医師の診断を受けること。 ②成人（15歳以上60歳未満）1回1錠を膣深部にアプリケーターを用いて挿入する（できれば就寝前）。ただし、3日間経過しても症状の改善が見られないか、6日間経過しても症状が消失しない場合は医師の診断を受けること。
承認年月日	2019年11月27日
製造販売開始日	2020年1月20日
評価を行う理由	2023年1月19日の製造販売後調査終了見込みに伴い、一般用医薬品としての販売の可否について判断を行うため
製造販売後調査概要（中間報告書）	調査期間：2020年1月20日～2022年8月30日 特別調査：1,000症例 副作用：53例107件（5.3%） うち重篤な副作用：なし 未知の副作用：月経中間期出血（不正出血）、細菌性外陰膣炎、膣部異臭、頻尿、不眠症、悪心各1件 一般調査 副作用：95例137件 うち重篤な副作用：なし 未知の副作用：異物感（7件）、出血（5件）、下腹部痛（3件）、月経障害（2件）、口渇（2件）、腹

	痛、外陰腔の炎症、ドライアイ、息詰まり感、膣分泌異常、頭痛、悪心、腹部不快感、膀胱炎、生殖器内異物、振戦（体の震え）、下痢、動悸、不整脈、排尿困難、倦怠感、浮腫、尿閉（尿漏れ感）、適用部位異常感覚、状態悪化、過敏症、上腹部痛各1件
使用上の注意の改訂の指導	なし

【調査会における議論】

- ・ 参考人として、産科婦人科の専門家の出席のもとで審議を行った。
- ・ 製造販売後調査において、拒否事由に該当するようなリスクの高い副作用は発現していないことや同効薬が第1類医薬品として販売されていること等から、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行することは問題ないと評価された。

【参考】本剤と類似の有効成分を含む医薬品

分類	医薬品の例 販売名	成分・分量	効能・効果	用法・用量	リスク 区分
本剤	①メンソレー タムフレディ CC1 ②メンソレー タムフレディ CC1A	イソコナゾール 硝酸塩 600mg	腔カンジダの再発。 (以前に医師から、 腔カンジダの診断・ 治療を受けたこと のある人に限る。)	①成人(15歳以上60 歳未満) 1回1錠を 腔深部に挿入する (できれば就寝前)。 ただし、3日間経過 しても症状の改善が 見られないか、6日 間経過しても症状が 消失しない場合は医 師の診断を受けるこ と。 ②成人(15歳以上60 歳未満) 1回1錠を 腔深部にアプリケー ターを用いて挿入す る(できれば就寝 前)。ただし、3日間 経過しても症状の改 善が見られないか、 6日間経過しても症 状が消失しない場合 は医師の診断を受け ること。	要指 導医 薬品
一般 用医 薬品	メンソレー タムフレディ腔 錠	イソコナゾール 硝酸塩 100mg	腔カンジダの再発。 (以前に医師から、 腔カンジダの診断・ 治療を受けたこと のある人に限る。)	成人(15歳以上60歳 未満) 1日1回(でき れば就寝前)、1錠を 腔深部に挿入する。 6日間毎日続けて使 用すること。ただし、 3日間使用しても症 状の改善がみられな いか、6日間使用し ても症状が消失しな い場合は医師の診察 を受けること。	第1 類医 薬品
一般 用医 薬品	メディトリー ト	ミコナゾール硝 酸塩 100mg	腔カンジダの再発 (過去に医師の診 断・治療を受けた方 に限る)	成人(15歳以上60歳 未満)、1日1回1個 を就寝前に腔深部に 挿入してください。 なお、6日間連続し て使用してください。 ただし、3日間使用 しても症状の改善が みられないか、6日 間使用しても症状が 消失しない場合は、 医師の診察を受けて ください。	第1 類医 薬品

一般 用医 薬品	エンペシドL	クロトリマゾール 100mg	膣カンジダの再発 (過去に医師の診 断・治療を受けた方 に限る)	成人(15歳以上60歳 未満), 1日1回(で きれば就寝前)。1錠 剤を膣深部に挿入す る。6日間毎日続け て使用すること。た だし、3日間使用し ても改善がみられな いか、6日間使用し ても症状が消失しな い場合は、医師の診 療を受けること。	第1 類医 薬品
一般 用医 薬品	フェミニーナ 膣カンジダ錠	オキシコナゾール硝酸塩 100mg	膣カンジダの再発 (以前に医師から、 膣カンジダの診断・ 治療を受けたこと のある人に限る。)	成人(15歳以上60 歳未満) 1日1回1 錠を膣深部に挿入す る(就寝前が望まし い)。6日間連続し て使用すること。た だし、3日間使用し ても症状の改善がみ られないか、6日間 使用しても症状が消 失しない場合には医 師の診療を受けるこ と。	第1 類医 薬品

スイッチOTC薬等のリスク評価について

平成25年12月20日 医薬品等安全対策部会

1. 本年12月13日に公布された薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律（平成25年法律第103号）による改正後の薬事法（昭和35年法律第145号）第4条第5項第4号に規定する要指導医薬品のうち、スイッチOTC薬及びダイレクトOTC薬については、一定の期間が経過することにより一般用医薬品に移行することとなるため、移行の際には、一般用医薬品としての販売可否を確認するためのリスク評価を行う必要がある。
2. この評価については、原則3年間の製造販売後調査の終了までに行うこととし、製造販売後2年以降の時点において、評価対象の医薬品の製造販売後調査の中間報告の結果及び薬事法第77条の4の2に基づき報告される副作用報告を基に、重篤な副作用の発生状況を評価し、製造販売承認の拒否事由に該当する状況にないことを確認し、その後、製造販売後調査が終了するまでの間、当該評価が変わらないことを厚生労働省に確認させることにより、製造販売後調査の終了時点で、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行するものとする。
3. また、医薬品等安全対策部会は、一般用医薬品の区分の指定及びその変更に関する事項その他医薬品の安全性の確保に関する事項を調査審議するとされており、上記の一般用医薬品としての販売可否の確認についても所掌することとなるが、この確認手続については、今後、医薬品等安全対策部会長の了解を得て、安全対策調査会に行わせることとし、その結果を医薬品等安全対策部会に報告させることとする。
4. なお、リスク区分を決定するためのリスク評価は、上記の確認手続と異なり、死亡や重篤以外の副作用やその発生頻度も含めて評価した上で、他の医薬品との比較をしつつ検討するなど、より詳細な評価を行う必要があることから、従来と同様の取扱いとする。
5. ダイレクトOTC薬については、スイッチOTC薬と異なり、新規に開発された医療用医薬品と同様に使用経験がなく、副作用発生頻度の年次毎の変動や長期服薬時の安全性等を確認する必要があること等を踏まえ、これまでと同様に4～8年の再審査期間で製造販売後調査を行うこととし、評価手続の期間を短縮することにより、再審査期間終了時点で一般用医薬品としての販売可否の評価を行い、問題が無いことが確認されれば、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行するものとする。

以上

薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）（平成25年改正後）（抜粋）

第四条（略）

2～4（略）

5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一～三（略）

四 要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。）のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

イ その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項第一号に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

ハ 第四十四条第一項に規定する毒薬

ニ 第四十四条第二項に規定する劇薬


五 一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの（要指導医薬品を除く。）をいう。

【薬事分科会規定（部会及び調査会の所掌等）】

第3条第12項 医薬品等安全対策部会は、法第68条の8第2項の規定による感染症定期報告に関する事項（医療機器に係る報告に関する事項を除く。）、法第77条の4の4第1項の規定による副作用等の報告及び回収の報告に関する事項（医療機器に係る報告に関する事項を除く。）並びに法第36条の3第3項の規定による一般用医薬品の区分の指定及びその変更に関する事項その他医薬品、医薬部外品及び化粧品の安全性の確保に関する事項を調査審議する。

※ 「安全対策調査会」は、薬事分科会規程第4条第1項の規定に基づき、医薬品等安全対策部会に「安全対策調査会」が設置されている。また、同条第2項の規定で、調査会は、当該部会の調査審議事項の事前整理又はその事項のうち特別の事項の調査審議にあたることとされている。

スイッチOTC薬に係る要指導医薬品から 一般用医薬品への移行の流れ



注1 品目に応じて3年未満とする場合がある。また、期間内に目標症例数が集められない場合は、調査期間を延長する。
 なお、ダイレクトOTCについては、再審査期間(新有効成分8年間、新効能・新用量4年間、新投与経路6年間)とする。

注2 安全対策調査会後、製造販売後調査終了までの間の報告される重篤な副作用等を基に、厚生労働省において安全対策調査会時の評価結果に変更がないことを確認する。