

### 第Ⅲ回未承認薬・適応外薬の開発要望について

医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬について、平成25年8月1日から平成25年12月27日にかけて第3回目の第一期要望募集を行った。期間中に約40の団体等（学会、患者団体、個人）からの要望書を整理したところ、80件の要望が提出された。

なお、WGごとの要望件数は下表のとおりである。また、要望の一覧は別紙のとおりである。

		代謝	循環器	精神・神経	抗菌・抗炎症	抗がん	生物	合計	
未承認薬	優先	1	1	1	2	3	0	8	24
	その他	1	6	3	3	3	0	16	
適応外薬	優先	0	1	0	0	1	0	2	56
	その他	17	10	2	8	16	1	54	
合計		19	18	6	13	23	1	80	

※ 今後、要望内容を精査しWGを変更する可能性がある。

第三-①回未承認薬・適応外薬の開発要望一覧

別紙

○未承認薬

【優先的に取り扱う品目】

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
1	Ⅲ-①-10.1	Lorcaserin hydrochloride	肥満症(ただし、肥満による複数の合併症を有し、食事療法・運動療法を行っても十分な減量効果が得られずBMIが25 kg/m <sup>2</sup> 以上の場合に限る)	1回10 mgを1日2回経口投与する。	日本肥満症治療学会	エーザイ株式会社	A	精神・神経WG
	Ⅲ-①-10.2	Lorcaserin hydrochloride	肥満症(ただし、肥満による複数の合併症を有し、食事療法・運動療法を行っても十分な減量効果が得られずBMIが25 kg/m <sup>2</sup> 以上の場合に限る)	1回10 mgを1日2回経口投与する。	日本肥満学会	エーザイ株式会社	A	精神・神経WG
2	Ⅲ-①-11	Teduglutide recombinant Glucagon-like peptide-2 (GLP-2) analog	短腸症候群において残存腸管機能を増強し、静脈栄養、補液の依存度を軽減する	Gattexの推奨1日投与量(成人の場合)は、体重1kgあたり0.05mgの1日1回皮下注射である。注射は、大腿部、腕、腹部に行い、毎回注射部位を変更することが推奨されている。	日本外科学会	NPS Pharmaceuticals, Inc	A	代謝・その他WG
3	Ⅲ-①-13	アーテメター／ルメファトリン	マラリア 特に薬剤耐性熱帯熱マラリアで合併症がない場合の治療(成人)	通常体重の成人では4錠／回を0, 8, 24, 36, 48時間(3日間)に投与する。1回あたりの投与量は、体重が31～40 kgの場合は3錠, 40 kgを超える場合は4錠とする。	厚生労働科学研究費補助金・医療技術実用化総合研究事業(H25-医療技術-指定-012)	Novartis 社	A	抗菌・抗炎症WG
4	Ⅲ-①-14	アーテメター／ルメファトリン合剤	マラリア 特に薬剤耐性熱帯熱マラリアで合併症がない場合の治療(小児)	通常、小児には体重に応じて1錠～4錠を0, 8, 24, 36, 48, 60時間(3日間)に食後経口投与する。体重別の投与量は、下記のとおりである。 5～14 kg 1錠 15～24 kg 2錠 25～34 kg 3錠 >34 kg 4錠	厚生労働科学研究費補助金・医療技術実用化総合研究事業(H25-医療技術-指定-012)	Novartis社	A	抗菌・抗炎症WG(小児WG)

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
5	Ⅲ-①-23	カーフィルゾミブ	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28日間を1サイクルとして、KYPROLISを週2回、3週間(1,2,8,9,15,16日目)2~10分かけて静脈内投与した後、12日間休薬(17~28日目)する。第1サイクルでは20mg/m <sup>2</sup> の用量で投与し、忍容性が認められれば、第2サイクル以降は27mg/m <sup>2</sup> の用量で静脈内投与する。 ※詳しくは要望書参照	日本骨髄腫患者の会	Onyx Pharmaceuticals(米) 小野薬品工業株式会社	A	抗がんWG
6	Ⅲ-①-24	カツマキソマブ	標準的治療において抵抗性を有する癌性腹膜炎	Day 0、3、7、10において、それぞれ10μg、20μg、50μg、150μgを腹腔内投与する。	公益社団法人 日本産科婦人科学会	Fresenius Biotech GmbH, Germany	A	抗がんWG
7	Ⅲ-①-68	ポマリドミド	再発又は難治性の多発性骨髄腫	(1サイクル)1日1回4mgを21日間連続。7日間休薬。 (デキサメタゾンと併用)	日本骨髄腫患者の会	Celgene Corporation (米) Celgene Europe Ltd. (英、独、仏) セルジーン株式会社 (日本)	A	抗がんWG
8	Ⅲ-①-71.1	マシテンタン	肺動脈性肺高血圧症	10mgを1日1回経口投与	日本肺高血圧症学会	アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社	A	循環器WG
	Ⅲ-①-71.2	マシテンタン	肺動脈性肺高血圧症	10mgを1日1回経口投与	日本心臓病学会 日本循環器学会	アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社	A	循環器WG
	Ⅲ-①-71.3	マシテンタン	肺動脈性肺高血圧症	10mgを1日1回経口投与	日本呼吸器学会	アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社	A	循環器WG

【それ以外の品目】

1	Ⅲ-①-1	aminocaproic acid	線維素溶解(fibrinolysis)に伴う著しい出血に対する止血促進作用 線維素溶解に伴う著しい出血とは、人工心肺を伴う心臓手術、血液腫瘍疾患、胎盤早期剥離、前立腺がん、肺がん、胃がんなどの悪性新生物に対する手術後、および外傷後にしばしば認められる。 (成人)	4-5 gを最初の1時間で静注、続いて1時間当たり1gを静注、止血が得られるまで約8時間継続する。	日本小児救急医学会	American Regent, Inc. またはHospira, Inc.XANODYNE PHARMACEUTICALS	A	循環器WG
---	-------	-------------------	---	---	-----------	---	---	-------

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
2	Ⅲ-①-2	aminocaproic acid	線維素溶解(fibrinolysis)に伴う著しい出血に対する止血促進作用 線維素溶解に伴う著しい出血とは、人工心肺を伴う心臓手術、血液腫瘍疾患、胎盤早期剥離、前立腺がん、肺がん、胃がんなどの悪性新生物に対する手術後、および外傷後にしばしば認められる(小児)	1) 100-200 mg/kg IV 維持 100 mg/kg/dose 4-6 hr毎 最大量 : 30 g/24 hr または 2) 100 mg/kg または3 g/m <sup>2</sup> の初回投与、引き続き33.3 mg/kg/hrまたは1 g/m <sup>2</sup> /hr	日本小児救急医学会	American Regent, Inc. またはHospira, Inc.XANODYNE PHARMACEUTICALS	A	循環器WG (小児WG)
3	Ⅲ-①-3	cisatracurium	手術中、または、処置、検査、集中治療に際して、成人を対象に、全身麻酔や集中治療室での鎮静の補助として骨格筋を弛緩させ、気管挿管や人工呼吸を円滑に実施できるようにする。	静脈内投与 気管挿管:0.10~0.15 mg/kg 維持:0.02~0.03 mg/kg(10~25分毎) 持続投与:3 mcg/kg/min(開始時) 1-2 mcg/kg/min(安定時)	日本小児救急医学会	Abbvie(米国) GlaxoSmithKline(英国、その他)	A	精神・神経WG
4	Ⅲ-①-4	cisatracurium	手術中、または、処置、検査、集中治療に際して、小児を対象に、全身麻酔や集中治療室での鎮静の補助として骨格筋を弛緩させ、気管挿管や人工呼吸を円滑に実施できるようにする。	静脈内投与 気管挿管:0.10~0.15 mg/kg 維持:0.02~0.03 mg/kg(10~25分毎) 持続投与:3 mcg/kg/min(開始時) 1-2 mcg/kg/min(安定時)	日本小児救急医学会	Abbvie(米国) GlaxoSmithKline(英国、その他)	A	精神・神経WG(小児WG)
5	Ⅲ-①-5	Daunorubicin citrate liposome injection	小児急性骨髄性白血病に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法	DaunoXome 1回量60-80mg/m <sup>2</sup> を1時間かけて3日間点滴静脈内投与する。	日本小児血液・がん学会	Galen	A	抗がんWG
6	Ⅲ-①-6	Ketorolac tromethamine (注射液)	中等症から強い急性疼痛(FDA: moderately severe acute pain)に対して(成人)	静脈内投与・筋注 初回投与量: 0.5 mg/kg(最大量30 mg) 追加投与量: 0.25 - 0.5 mg/kg、6時間間隔で。 成人での一日の最大量120 mg 5日間を超えない	日本小児救急医学会	Roche(英国)、米国ではジェネリック商品として販売(Baxter Healthcare Corp、その他)	A	抗菌・抗炎症WG
7	Ⅲ-①-7	Ketorolac tromethamine (注射液)	中等症から強い急性疼痛(FDA: moderately severe acute pain)に対して(小児)	静脈内投与・筋注 初回投与量: 0.5 mg/kg(最大量30 mg) 追加投与量: 0.25 - 0.5 mg/kg、6時間間隔で。 成人での一日の最大量120 mg 5日間を超えない	日本小児救急医学会	Roche(英国)、米国ではジェネリック商品として販売(Baxter Healthcare Corp、その他)	A	抗菌・抗炎症WG(小児WG)
8	Ⅲ-①-8	levosimendan	低心拍出症候群、慢性心不全の急性増悪、 周術期心不全といった、急性心不全(成人)	初期投与; 12 μg/kgを10分かけて静注 維持量; 0.05-0.2 μg/kg/分にて持続静注 効果次第で適宜調節	日本小児救急医学会	Abbott, Orion	A	循環器WG

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
9	Ⅲ-①-9	levosimendan	低心拍出症候群、慢性心不全の急性増悪、 周術期心不全といった、急性心不全 (小児)	初期投与:12 $\mu$ g/kgを10分かけて静注 維持量:0.05-0.2 $\mu$ g/kg/分にて持続静注 効果次第で適宜調節	日本小児救急医学会	Abbott, Orion	A	循環器WG (小児WG)
10	Ⅲ-①-12	アーティカイン 塩酸塩・アドレ ナリン酒石酸 水素塩	歯科領域における浸潤麻酔又は伝達麻酔	浸潤麻酔:0.5~2.5mL (アーティカイン塩酸塩として20~100mg) 伝達麻酔:0.5~3.4mL (アーティカイン塩酸塩として20~136mg) 口腔外科における局所麻酔:1.0~5.1mL (アーティカイン塩酸塩として40~204mg)  * 欧米の製剤の多くは1カートリッジが1.7mLである。	一般社団法人 日本歯科麻酔学会	①Hospira ②PIERREL SPA ③DEPROCO ④DENTSPLY Pharmaceutical ⑤Septodont, Specialties Septodont Pty Ltd ⑥DENTSPLY CANADA Limited ⑦Novocol Pharmaceutical of Canada ⑧3M Australia Pty Ltd	A	精神・神経 WG
11	Ⅲ-①-15	イソトレチノイ ン	高リスク神経芽腫	160mg/m <sup>2</sup> /day 分2 経口投与 14日間投与、14日間休薬の28日を1サイクルとして 繰り返す。	個人	Roche / Ranbaxy / Mylan Pharmaceuticals / Teva Pharmaceuticals / Douglas Pharmaceuticals / Dr. Reddy' s Laboratories	A	抗がんWG
12	Ⅲ-①-35	サイトメガロウ イルス免疫グ ロブリン	サイトメガロウイルス陽性のドナーから移植 を受けたサイトメガロウイルス陰性のレシピ エントにおける、腎臓移植時のサイトメガロ ウイルス感染症	通常、1回あたりサイトメガロウイルス免疫グロブリン として50~150mg/kg体重を静脈内投与する。年 齢及び症状に応じて適宜増減する。  最大用量を用いた場合の推奨投与スケジュールは 以下の通り: 腎移植 移植 72 時間以内: 150 mg/kg 移植2週後: 100 mg/kg 移植4週後: 100 mg/kg 移植6週後: 100 mg/kg 移植8週後: 100 mg/kg 移植12週後: 50 mg/kg 移植16週後: 50 mg/kg	日本移植学会	CSL ベーリング	A	抗菌・抗炎症WG
13	Ⅲ-①-56	ヒト合成セクレ チン	ガストリノーマ診断のためのガストリン分泌 刺激	体重1kgあたり0.4 $\mu$ gを1分以上かけて静脈投与す る。	日本臓器学会	ChiRhoStim, Inc.社 (米国Burtonsville)	A	循環器WG

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
14	Ⅲ-①-57	ヒト合成セクレチン	膵外分泌機能検査における膵液分泌刺激	体重1kgあたり0.2 μgを1分以上かけて静脈投与する。	日本膵臓学会	ChiRhoStim, Inc.社 (米国Burtonsville)	A	循環器WG
15	Ⅲ-①-67	ペグフィルグラスチム	抗癌剤投与による発熱性好中球減少症リスクが高い悪性腫瘍患者における感染発現頻度の減少	ペグフィルグラスチム 3.6 mg を化学療法1 サイクルあたり1 回皮下投与	特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会	協和発酵キリン株式会社	A	抗がんWG
16	Ⅲ-①-69	ポリエチレングリコール	慢性便秘症	2歳～6歳 1日1パック(6.9 g) 7歳～14歳 1日2パック(13.8 g) (症状に応じて適宜増減、1日最大4パック(27.6 g)まで)	日本小児栄養消化器肝臓学会	Norgine社	A	代謝・その他WG

### ○適応外薬

#### 【優先的に取り扱う品目】

1	Ⅲ-①-27.1	カルボプラチン	乳癌(HER2陰性乳癌を含む)	通常、成人にはカルボプラチンとして、1日1回300～400mg/m <sup>2</sup> (体表面積)を投与し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。なお、投与量は、患者の状態により適宜減ずる。	特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会	ブリistol・マイヤーズ株式会社	B	抗がんWG
	Ⅲ-①-27.2	カルボプラチン	乳癌(HER2陰性乳癌を含む)	通常、成人にはカルボプラチンとして、1日1回300～400mg/m <sup>2</sup> (体表面積)を投与し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。なお、投与量は、患者の状態により適宜減ずる。	一般社団法人日本乳癌学会	ブリistol・マイヤーズ株式会社	B	抗がんWG
2	Ⅲ-①-74	リツキシマブ(遺伝子組換え)	慢性特発性血小板減少性紫斑病	1回当たり375 mg/m <sup>2</sup> を1週間間隔で4回投与	日本血液学会	全薬工業株式会社	B	循環器WG

#### 【それ以外の品目】

1	Ⅲ-①-16	イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え)塩化イットリウム( <sup>90</sup> Y)	CD20陽性の低悪性度濾胞性リンパ腫の初発例に対する寛解導入後の地固め療法	通常、成人には、リツキシマブ(遺伝子組換え)を点滴静注後、速やかに、イットリウム( <sup>90</sup> Y)イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え)として14.8MBq/kg(最大1184MBq)を10分間かけて静脈内投与する。	日本血液学会	スペクトラム・ファーマシューティカルズ合同会社	B	抗がんWG
2	Ⅲ-①-17	イマチニブメシル酸塩錠	肺動脈性肺高血圧症(WHO機能分類クラス2・3及び4で既存の肺高血圧症治療薬2剤(エンドセリン受容体拮抗薬、ホスホジエステラーゼ5阻害薬および/またはプロスタサイクリン製剤)以上を使用している)	1日1回400mg	NPO法人PAHの会	ノバルティス ファーマ株式会社	B	循環器WG

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
3	Ⅲ-①-18	A型ボツリヌス毒素製剤	抗コリン薬でコントロール不十分な、特定神経疾患(脊髄損傷又は多発性硬化症等)により生じた神経因性排尿筋過活動に起因する尿失禁の治療	推奨用量は200単位	日本排尿機能学会	グラクソ・スミスクライン株式会社	B	循環器WG
4	Ⅲ-①-19	A型ボツリヌス毒素製剤	抗コリン薬で効果不十分又は忍容性のない成人患者における切迫性尿失禁、尿意切迫感、頻尿症状を伴う過活動膀胱の治療	推奨用量は100単位	日本排尿機能学会	グラクソ・スミスクライン株式会社	B	循環器WG
5	Ⅲ-①-20	エボprostetノールナトリウム	肺動脈性肺高血圧症	<p>用量設定(投与開始時) 本剤は専用溶解液を用いて溶解し、通常、成人及び小児にはエボprostetノールとして1分間当たり2ng/kgの投与速度で精密持続点滴装置(シリンジポンプ又は輸液ポンプ)により、持続静脈内投与を開始する。患者の状態(症状、血圧、心拍数、血行動態等)を十分観察しながら15分以上の間隔をおいて1~2ng/kg/分ずつ増量し、10ng/kg/分までの範囲で最適投与速度を決定する。 最適投与速度の決定にあたっては、増量時における潮紅(軽微なものを除く)、頭痛、嘔気等の副作用の発現が重要な指標となる。このような症状が軽度でも認められた場合にはその後の増量を中止し、それらの症状が消失しない場合には15分以上の間隔をおいて2ng/kg/分ずつ減量すること。</p> <p><u>継続投与</u> その後は最適投与速度で維持し、定期的に患者を観察し症状に応じて投与速度を適宜調節する。</p> <p>(下線部が要望内容)</p>	日本小児循環器学会	グラクソ・スミスクライン株式会社	B	循環器WG (小児WG)
6	Ⅲ-①-21	オセルタミビルリン酸塩	【効果・効能】の新たな要望は、変更なし。ただし、(効能・効果に関連する使用上の注意)の項目3.1歳未満の患児(低出生体重児、新生児、乳児)に対する安全性及び有効性は確立していない(「小児等への投与」の項参照)を削除とする。	1. 治療に用いる場合 (3) 新生児、乳児 通常、オセルタミビルとして1回3mg/kg(ドラインロップ剤として100mg/kg)を1日2回、5日間、用時懸濁して経口投与する。	(一社)日本感染症学会、日本小児感染症学会、日本未熟児新生児学会	中外製薬株式会社	B	抗菌・抗炎症WG
7	Ⅲ-①-22.1	オランザピン	抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状(悪心嘔吐)	成人に対して他の制吐剤と併用し、オランザピン5mgもしくは10mgを投与する。	日本緩和医療学会	日本イーライリリー	B	代謝・その他WG



No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
	Ⅲ-①-22.2	オランザピン	抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状(悪心嘔吐)	成人に対して他の制吐剤と併用し、オランザピン5mgもしくは10mgを投与する。	日本消化器病学会	日本イーライリリー	B	代謝・その他WG
8	Ⅲ-①-25	カナキヌマブ	全身型若年性特発性関節炎	カナキヌマブとして1回4mg/kg(最大用量300mgまで)を4週毎に皮下投与する。	日本小児リウマチ学会	ノバルティス ファーマ株式会社	B	抗菌・抗炎症WG
9	Ⅲ-①-26	カペシタビン	直腸癌における補助化学療法	直腸癌における補助化学療法にはB法を使用する。 B法: 体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 体表面積 1回用量 1.33m <sup>2</sup> 未満 1,500 mg 1.33m <sup>2</sup> 以上1.57m <sup>2</sup> 未満 1,800 mg 1.57m <sup>2</sup> 以上1.81m <sup>2</sup> 未満 2,100 mg 1.81m <sup>2</sup> 以上 2,400 mg 放射線治療を併用する場合は、併用する期間中は、体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、週5日または7日間連日経口投与する。 体表面積 1回用量 1.36m <sup>2</sup> 未満 1,200 mg 1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満 1,500 mg 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満 1,800 mg 1.96m <sup>2</sup> 以上 2,100 mg	特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会	中外製薬株式会社	B	抗がんWG
10	Ⅲ-①-28	カルボプラチン	食道癌	術前化学放射線療法あるいは根治的化学放射線療法として、パクリタキセルとの併用において、カルボプラチンとして1回にAUC=2mg/ml・minを静注投与し、少なくとも1週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。なお、投与量は、患者の状態により適宜減ずる。  ※詳しくは要望書参照	特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会	ブリストル・マイヤーズ株式会社	B	抗がんWG
11	Ⅲ-①-29.1	乾燥人フィブリノゲン	大量出血に伴う後天性低フィブリノゲン血症の出血傾向の改善	注射用水に溶解し、静脈内に注入する。通常1回3gを用いる。なお、年齢・症状により適宜増減する。	日本麻酔科学会	一般社団法人日本血液製剤機構	B	生物WG
	Ⅲ-①-29.2	乾燥人フィブリノゲン	大量出血に伴う後天性低フィブリノゲン血症の出血傾向の改善	注射用水に溶解し、静脈内に注入する。通常1回3gを用いる。なお、年齢・症状により適宜増減する。	日本外傷学会	一般社団法人日本血液製剤機構	B	生物WG



No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
12	Ⅲ-①-30	クリゾチニブ	未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)陽性の再発・難治性未分化大細胞リンパ腫(ALCL)(成人)	250 mgを1日2回内服	日本リンパ網内系学会	ファイザー製薬	B	抗がんWG
13	Ⅲ-①-31	クリゾチニブ	未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)陽性の再発・難治性未分化大細胞リンパ腫(ALCL)(小児)	280 mg/m <sup>2</sup> を1日2回内服	日本小児血液・がん学会	ファイザー株式会社	B	抗がんWG (小児WG)
14	Ⅲ-①-32	ゲムツズマブ オゾガマイシン (遺伝子組換え)	小児の急性骨髄性白血病に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法	ゲムツズマブオゾガマイシン1回量 3 mg/m <sup>2</sup> (たん白質量として表記)を2時間かけて点滴静脈内投与する。	日本小児血液・がん学会	ファイザー株式会社	B	抗がんWG (小児WG)
15	Ⅲ-①-33.1	コハク酸メチル プレドニゾン ナトリウム (Methylprednisolone sodium succinate)	HTLV-1関連脊髄症(HAM)の急速進行	通常、成人にはメチルプレドニゾンとして1日500~1000mgを緩徐に静注又は点滴静注する。なお、年齢、症状により適宜増減する。	NPO法人スマイルリボン・全国HAM患者友の会(アトムの会)	ファイザー株式会社	B	精神・神経WG
	Ⅲ-①-33.2	コハク酸メチル プレドニゾン ナトリウム (Methylprednisolone sodium succinate)	HTLV-1関連脊髄症(HAM)の急速進行	通常、成人にはメチルプレドニゾンとして1日500~1000mgを緩徐に静注又は点滴静注する。なお、年齢、症状により適宜増減する。	日本神経免疫学会・日本神経感染症学会・日本神経学会	ファイザー株式会社	B	精神・神経WG
16	Ⅲ-①-34	コルヒチン	家族性地中海熱	小児には、標準投与量を0.01~0.02mg/kg/dayとし、1日1回又は2回に分けて投与する。無効例では0.04mg/kg/dayまで増量可とするが、1日2.0mgを超えないこと。	日本小児リウマチ学会	高田製薬株式会社	B	抗菌・抗炎症WG
17	Ⅲ-①-36	サリドマイド	慢性肉芽腫症	通常、成人にはサリドマイドとして1日1回100mgを就寝前に経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日400mgを超えないこと。小児には、1日1回1mg/kgを就寝前に経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日3mg/kg(あるいは400mg)を超えないこと。	日本小児リウマチ学会	藤本製薬株式会社	B	抗菌・抗炎症WG(小児WG)
18	Ⅲ-①-37	サリドマイド	慢性肉芽腫	通常、成人にはサリドマイドとして1日1回100mgを就寝前に経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日400mgを超えないこと。	日本小児感染症学会	藤本製薬株式会社	B	抗菌・抗炎症WG
19	Ⅲ-①-38	サリドマイド	ベーチェット病	通常、成人にはサリドマイドとして1日1回100mgを就寝前に経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日400mgを超えないこと。	日本小児感染症学会	藤本製薬株式会社	B	抗菌・抗炎症WG

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
20	Ⅲ-①-39	シルденаフィルクエン酸塩	小児の肺動脈性肺高血圧症	体重20kg以下の小児の最大用量は30mg、分3の経口投与。 体重20kg超の小児の最大用量は60mg、分3の経口投与。 なお、患者の状態により開始用量は0.5～1mg/kg/日、分3の経口投与としても良い。	日本小児循環器学会	ファイザー株式会社	B	循環器WG (小児WG)
21	Ⅲ-①-40	ドネペジル塩酸塩	レビー小体型認知症における認知機能障害及び精神症状・行動障害の改善	通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回 3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。効果不十分な場合には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により適宜減量できる。	レビー小体型認知症研究会	エーザイ株式会社	B	循環器WG
22	Ⅲ-①-41	トルバプタン	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善	7.5 mg ～ 15 mg、最大 30mgまで	日本内分泌学会	大塚製薬株式会社	B	循環器WG
23	Ⅲ-①-42	ニトロプルシドナトリウム	うっ血性心不全の治療(小児)	通常、成人には1分間に体重1kg当たりニトロプルシドナトリウムとして効能・効果ごとに下記に基づき投与する。なお、最高投与速度は3μg/kg/分を限度とする。また、開始投与速度は年齢、症状により適宜減量する。 <u>うっ血性心不全の治療</u> <u>小児</u> <u>0.5μg/kg/分の投与速度で投与を開始し、過度の血圧低下に注意しながら徐々に増量して目的とする血行動態を得るまで循環動態をモニターしながら投与速度を調節する。通常、3.0μg/kg/分以下の投与速度で目的とする血行動態が得られ、それを維持することができる。</u>  ※下線部及び取り消し線が要望の用法・用量	日本小児循環器学会・日本小児麻酔学会	丸石製薬株式会社	B	循環器WG (小児WG)

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
24	Ⅲ-①-43	ニトロプルシドナトリウム	高血圧性緊急症の治療(小児)	<p>通常、成人には1分間に体重1kg当たりニトロプルシドナトリウムとして効能・効果ごとに下記に基づき投与する。なお、最高投与速度は3<math>\mu</math>g/kg/分を限度とする。また、開始投与速度は年齢、症状により適宜減量する。</p> <p><b>高血圧性緊急症の治療</b>  <b>小児</b>  <u>0.5<math>\mu</math>g/kg/分の投与速度で投与を開始し、過度の血圧低下に注意しながら徐々に増量して目的とする血行動態を得るまで循環動態をモニターしながら投与速度を調節する。通常、3.0<math>\mu</math>g/kg/分以下の投与速度で目的とする血行動態が得られ、それを維持することができる。</u></p> <p>※下線部及び取り消し線が要望の用法・用量</p>	日本小児循環器学会・日本小児麻酔学会	丸石製薬株式会社	B	循環器WG (小児WG)
25	Ⅲ-①-44	パクリタキセル	胃癌	パクリタキセルとして、1日1回100mg/m <sup>2</sup> (体表面積)を1時間かけて点滴静注し、週1回投与を6週連続し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとして、投与を繰り返す。	特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会	ブリistol・マイヤーズ株式会社	B	抗がんWG
26	Ⅲ-①-45	バシリキシマブ(抗CD25抗体製剤:遺伝子組換え)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下記のような場合の心臓移植後の拒絶反応の予防並びに治療(成人)</li> <li>・ 心臓機能低下例</li> <li>・ ステロイド非使用が好ましい例(C型肝炎陽性例、小児など)</li> <li>・ その他、カルシニューリン阻害薬(CNIを一時的に中止又は減量しなければならない時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 20mgを移植手術2時間前と移植後4日目の2回投与する</li> <li>・ 本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない</li> <li>・ 本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない</li> </ul>	日本移植学会	ノバルティスファーマ株式会社	B	代謝・その他WG
27	Ⅲ-①-46	バシリキシマブ(抗CD25抗体製剤:遺伝子組換え)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下記のような場合の心臓移植後の拒絶反応の予防並びに治療(小児)</li> <li>・ 心臓機能低下例</li> <li>・ ステロイド非使用が好ましい例(C型肝炎陽性例、小児など)</li> <li>・ その他、カルシニューリン阻害薬(CNIを一時的に中止又は減量しなければならない時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 体重35kg以上では20mgを、35kg未満では10mgを、移植手術2時間前と移植後4日目の2回投与する</li> <li>・ 本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない</li> </ul>	日本移植学会	ノバルティスファーマ株式会社	B	代謝・その他WG(小児WG)

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
28	Ⅲ-①-47	バシリキシマブ (抗CD25抗体 製剤:遺伝子 組換え)	下記のような場合の肺移植後の拒絶反応の予防並びに治療(成人) ・呼吸機能低下例 ・ステロイド非使用が好ましい例(C型肝炎陽性例、小児など) ・その他、カルシニューリン阻害薬(CNIを一時的に中止又は減量しなければならない時	・20mgを移植手術2時間前と移植後4日目の2回投与する ・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない ・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない	日本移植学会	ノバルティスファーマ株式会社	B	代謝・その他WG
29	Ⅲ-①-48	バシリキシマブ (抗CD25抗体 製剤:遺伝子 組換え)	・下記のような場合の肺移植後の拒絶反応の予防並びに治療(小児) ・呼吸機能低下例 ・ステロイド非使用が好ましい例(C型肝炎陽性例、小児など) ・その他、カルシニューリン阻害薬(CNIを一時的に中止又は減量しなければならない時	・体重35kg以上では20mgを、35kg未満では10mgを、移植手術2時間前と移植後4日目の2回投与する ・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない	日本移植学会	ノバルティスファーマ株式会社	B	代謝・その他WG(小児WG)
30	Ⅲ-①-49	バシリキシマブ (抗CD25抗体 製剤:遺伝子 組換え)	・下記のような場合の肝臓移植後の拒絶反応の予防並びに治療(成人) ・肝機能低下例 ・ステロイド非使用が好ましい例(C型肝炎陽性例、小児など) ・その他、カルシニューリン阻害薬(CNIを一時的に中止又は減量しなければならない時	・20mgを移植手術2時間前と移植後4日目の2回投与する ・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない ・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない	日本移植学会	ノバルティスファーマ株式会社	B	代謝・その他WG
31	Ⅲ-①-50	バシリキシマブ (抗CD25抗体 製剤:遺伝子 組換え)	・下記のような場合の肝臓移植後の拒絶反応の予防並びに治療(小児) ・肝機能低下例 ・ステロイド非使用が好ましい例(C型肝炎陽性例、小児など) ・その他、カルシニューリン阻害薬(CNIを一時的に中止又は減量しなければならない時	・体重35kg以上では20mgを、35kg未満では10mgを、移植手術2時間前と移植後4日目の2回投与する ・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない	日本移植学会	ノバルティスファーマ株式会社	B	代謝・その他WG(小児WG)
32	Ⅲ-①-51	バシリキシマブ (抗CD25抗体 製剤:遺伝子 組換え)	・下記のような場合の膵臓移植後の拒絶反応の予防並びに治療(成人) ・膵機能低下例 ・ステロイド非使用が好ましい例(C型肝炎陽性例、小児など) ・その他、カルシニューリン阻害薬(CNIを一時的に中止又は減量しなければならない時	・20mgを移植手術2時間前と移植後4日目の2回投与する ・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない ・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない	日本移植学会	ノバルティスファーマ株式会社	B	代謝・その他WG

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
33	Ⅲ-①-52	バシリキシマブ (抗CD29抗体製剤:遺伝子組換え)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下記のような場合の小腸移植後の拒絶反応の予防並びに治療(成人)</li> <li>・小腸機能低下例</li> <li>・ステロイド非使用が好ましい例(C型肝炎陽性例、小児など)</li> <li>・その他、カルシニューリン阻害薬(CNIを一時的に中止又は減量しなければならない時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・20mgを移植手術2時間前と移植後4日目の2回投与する</li> <li>・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない</li> <li>・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない</li> </ul>	日本移植学会	ノバルティスファーマ株式会社	B	代謝・その他WG
34	Ⅲ-①-53	バシリキシマブ (抗CD25抗体製剤:遺伝子組換え)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下記のような場合の小腸移植後の拒絶反応の予防並びに治療(小児)</li> <li>・小腸機能低下例</li> <li>・ステロイド非使用が好ましい例(C型肝炎陽性例、小児など)</li> <li>・その他、カルシニューリン阻害薬(CNIを一時的に中止又は減量しなければならない時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重35kg以上では20mgを、35kg未満では10mgを、移植手術2時間前と移植後4日目の2回投与する</li> <li>・本薬剤に対する重篤な過敏反応や移植片が生着しなかったときには二回目の投与は行わない</li> </ul>	日本移植学会	ノバルティスファーマ株式会社	B	代謝・その他WG(小児WG)
35	Ⅲ-①-54	バルガンシクロピル	臓器移植後、サイトメガロウイルス(CMV)感染の発症に対してハイリスクと考えられる症例(術前の抗CMV抗体検査でドナー陽性(D+)/レシピエント陰性(R-)、あるいはALGやAlemuzmabなどの抗リンパ球抗体治療を受けた患者)に対する術後の予防投与。	通常、成人にはバルガンシクロピルとして1回900mg(450mg錠2錠)を1日2回、食後に経口投与する。 腎障害のある患者、腎機能の低下している患者では、消失半減期が延長されるので、クレアチニンクリアランス(CCr: mL/min)により投与量を調整する: CCr(mL/min) 投与量 ≥60: 1回900mgを1日2回 40~59: 1回450mgを1日2回 25~39: 1回450mgを1日1回 10~24: 1回450mgを隔日(2日に1回)	日本移植学会	田辺三菱製薬	B	抗菌・抗炎症WG
36	Ⅲ-①-55	人C1-インアクチベータ	遺伝性血管性浮腫の急性発作の治療及び予防	急性発作時ならびに発作予防時に皮下注にて投与を行う  (下線部が要望内容)	NPO法人血管性浮腫情報センター	CSLベーリング	B	抗菌・抗炎症WG
37	Ⅲ-①-58	人免疫グロブリンG (ホリエレンカリコール処理人免疫グロブリン)	腎移植における抗ドナー抗体陽性レシピエントの移植前脱感作 ・ドナーに対する抗体が陽性で、血漿交換療法によっても脱感作ができず移植の適応とならない患者を移植ができるレベルまで抗体価を低下させる。	1日1回1g/kg体重を点滴投与する。最大4回までとする。	日本移植学会	一般社団法人 日本血液製剤機構	B	代謝・その他WG

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
38	Ⅲ-①-59	ビノレルビン酒石酸塩	難治性小児肉腫	小児肉腫についてはビノレルビンとして、 30mg/m <sup>2</sup> (体表面積)を1週間間隔で6週連続投与し、7週目、8週目は休薬する。これを1コースとして、投与を繰り返す。なお、患者状態により適宜減量する。 経ロシクロホスファミドと併用する場合にはビノレルビンとして25mg/m <sup>2</sup> (体表面積)を週1回3週連続して点滴静注し、4週目は休薬する。これを1コースとして、投与を繰り返す。なお、患者状態により適宜減量する。	日本小児血液・がん学会	協和発酵キリン株式会社／日本化薬株式会社	B	抗がんWG (小児WG)
39	Ⅲ-①-60	ブスルファン	1. 同種造血幹細胞移植の前治療 2. ユーイング肉腫ファミリー腫瘍、神経芽細胞腫における自家造血幹細胞移植の前治療  (既承認内容と同様)	他の抗悪性腫瘍剤との併用において、ブスルファンとして以下の体重別の投与量を生理食塩液又は5%ブドウ糖液に混和・調製して3時間かけて点滴静注する。本剤は24時間毎に1日1回、4日間投与する。 なお、年齢、患者の状態により適宜減量する。 実体重 本剤投与量(mg/kg) 9kg未満 4.0 9kg以上16kg未満 4.8 16kg以上23kg以下 4.4 23kg超34kg以下 3.8 34kg超 3.2  ※詳しくは要望書参照	日本小児血液・がん学会	大塚製薬株式会社	B	抗がんWG (小児WG)
40	Ⅲ-①-61	ブスルファン	1. 同種造血幹細胞移植の前治療 2. ユーイング肉腫ファミリー腫瘍、神経芽細胞腫における自家造血幹細胞移植の前治療  (既承認内容と同様)	既承認内容(ブスルファンとして1回0.8 mg/kgを2時間かけて6時間毎に1日4回、4日間、点滴静注する)に加えて「ブスルファンとして1回3.2 mg/kgを3時間かけて1日1回、4日間」を追加する	日本造血細胞移植学会	大塚製薬株式会社	B	抗がんWG
41	Ⅲ-①-62	ブデソニド	潰瘍性大腸炎	1日1回2mgを直腸内投与する	ブデソニドの早期承認を求めるIBD患者会(全国のIBD患者会27団体)	味の素製薬(株) (英国はドクターファルク・ファーマ社)	B	代謝・その他WG
42	Ⅲ-①-63 ※要望者より取り下げの申し出があり	プリモニジン酒石酸塩	酒さに伴う顔面の紅斑(赤ら顔)	1日1回、顔面に適量塗布	個人	ガルデルマ株式会社	B	代謝・その他WG



No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
43	Ⅲ-①-64.1	プレドニゾロン (Prednisolone)	疾患活動性のあるHTLV-1関連脊髄症 (HAM)	通常、成人にはプレドニゾロンとして1日5~60mgを1~4回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。	NPO法人スマイルリボン・全国HAM患者友の会(アトムの会)	シオノギ製薬(株)、武田薬品工業(株)、旭化成ファーマ(株)、など	B	精神・神経WG
	Ⅲ-①-64.2	プレドニゾロン (Prednisolone)	疾患活動性のあるHTLV-1関連脊髄症 (HAM)	通常、成人にはプレドニゾロンとして1日5~60mgを1~4回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。	日本神経免疫学会・日本神経感染症学会・日本神経学会	シオノギ製薬(株)、武田薬品工業(株)、旭化成ファーマ(株)、など	B	精神・神経WG
44	Ⅲ-①-65	ブレントキシマブ ベドチン	CD30陽性の小児再発・難治性ホジキンリンパ腫	通常、3週間に1回、brentuximab vedotinとして1回1.8 mg/kg(体重)を30分以上かけて点滴静注する。	日本小児血液・がん学会	武田バイオ開発センター株式会社	B	抗がんWG (小児WG)
45	Ⅲ-①-66	ブレントキシマブ ベドチン	CD30陽性の小児再発・難治性未分化大細胞リンパ腫	通常、3週間に1回、brentuximab vedotinとして1回1.8 mg/kg(体重)を30分以上かけて点滴静注する。	日本小児血液・がん学会	武田バイオ開発センター株式会社	B	抗がんWG (小児WG)
46	Ⅲ-①-70	ボルテゾミブ	再発又は難治性の小児急性リンパ性白血病	再発又は難治性の小児急性リンパ性白血病 通常、ボルテゾミブとして1.3mg/m <sup>2</sup> (体表面積)1日1回、週2回静脈内投与又は皮下投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。  ※詳しくは要望書参照	日本小児血液・がん学会	ヤンセンファーマ株式会社	B	抗がんWG (小児WG)
47	Ⅲ-①-72	ランレオチド酢酸塩	甲状腺刺激ホルモン産生下垂体腫瘍	通常、成人にはランレオチドとして90 mgを4週毎に3カ月間、深部皮下に注射する。その後は患者の病態に応じて60 mg、90 mg又は120 mgを4週毎に投与する。	日本間脳下垂体腫瘍学会	帝人ファーマ株式会社	B	代謝・その他WG
48	Ⅲ-①-73	リツキシマブ (遺伝子組換え)	小児のCD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫(パーキットリンパ腫、前駆Bリンパ球性リンパ腫を含む)	通常成人には、リツキシマブ(遺伝子組換え)として1回量375mg/m <sup>2</sup> を1週間間隔で点滴静注する。最大投与回数は8回とする。  (下線部を削除)	日本小児血液・がん学会	全薬工業株式会社	B	抗がんWG (小児WG)
49	Ⅲ-①-75	リツキシマブ (遺伝子組換え)	小児の慢性特発性血小板減少性紫斑病	1回当たり375 mg/m <sup>2</sup> を1週間間隔で4回投与	日本血液学会	全薬工業株式会社	B	循環器WG (小児WG)



No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
50	Ⅲ-①-76.1	リツキシマブ (遺伝子組換え)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫</li> <li>・免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患</li> <li>・ウェゲナ肉芽腫症、顕微鏡的多発性血管炎</li> <li>・インジウム(<sup>111</sup>In)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液及びイットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液の前投与</li> </ul> <p>(既承認の効能・効果)</p>	<p>2. 本剤は用時生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液にて1~4mg/mLに希釈調製し使用する。</p> <p>用法・用量に関連する使用上の注意</p> <p>未治療のろ胞性、CD20陽性、B細胞性NHL及びびまん性大細胞型B細胞性、CD20陽性NHL(DLBCL)患者に対する投与</p> <p>リツキシマブ併用化学療法の第1サイクル時でグレード3又はグレード4のinfusion reactionの発現を認めない場合には、グルコルチコイドを含む化学療法の第2サイクルにおいて、90分間急速点滴静注により投与できる。</p> <p>投与開始速度として、投与量の20%を初期30分間で点滴静注し、その後60分間で残りの薬剤(投与量の80%に相当)を点滴静注する。第2サイクルで90分間点滴静注の忍容性が確認された場合には、第3サイクル以降の残りの治療サイクルで(第6サイクル又は第8サイクルまで)、90分間点滴静注を用いることができる。</p> <p>治療にあたり注意が必要な循環器系の疾患を有する患者、又は第2サイクル開始前の末梢血リンパ球数が5,000/mm<sup>3</sup>以上の患者については、90分間点滴静注を用いるべきではない</p> <p>(下線部が要望内容) ※詳しくは要望書参照</p>	日本リンパ網内系学会	全薬工業株式会社	B	抗がんWG

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
	Ⅲ-①-76.2	リツキシマブ (遺伝子組換え)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫</li> <li>・免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患</li> <li>・ウェゲナ肉芽腫症、顕微鏡的多発性血管炎</li> <li>・インジウム(<sup>111</sup>In)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液及びイットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液の前投与</li> </ul> <p>(既承認の効能・効果)</p>	<p>2. 本剤は用時生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液にて1mg/mLから4mg/mLに希釈調製し使用する。</p> <p>用法・用量に関連する使用上の注意</p> <p><u>未治療のろ胞性、CD20陽性、B細胞性NHL及びびまん性大細胞型B細胞性、CD20陽性NHL(DLBCL)患者に対する投与</u> リツキシマブ併用化学療法の第1サイクル時でグレード3又はグレード4のinfusion reactionの発現を認めない場合には、グルココルチコイドを含む化学療法の第2サイクルにおいて、90分間急速点滴静注により投与できる。</p> <p>投与開始速度として、投与量の20%を初期30分間で点滴静注し、その後60分間で残りの薬剤(投与量の80%に相当)を点滴静注する。第2サイクルで90分間点滴静注の忍容性が確認された場合には、第3サイクル以降の残りの治療サイクルで(第6サイクル又は第8サイクルまで)、90分間点滴静注を用いることができる。</p> <p><u>治療にあたり注意が必要な循環器系の疾患を有する患者、又は第2サイクル開始前の末梢血リンパ球数が5,000/mm<sup>3</sup>以上の患者については、90分間点滴静注を用いるべきではない</u></p> <p>(下線部が要望内容) ※詳しくは要望書参照</p>	日本血液学会	全薬工業株式会社	B	抗がんWG
51	Ⅲ-①-77	リツキシマブ (遺伝子組換え)	マントル細胞リンパ腫の維持療法	マントル細胞リンパ腫に対する寛解導入療法奏効例に対し、リツキシマブの1回当たり375 mg/m <sup>2</sup> を8週間間隔で腫瘍増悪を認めるまで投与する。	日本リンパ網内系学会	全薬工業株式会社	B	抗がんWG
52	Ⅲ-①-78	リツキシマブ (遺伝子組換え)	ループス腎症	1回当たり375 mg/m <sup>2</sup> を1週間間隔で4回投与、又は1回当たり1,000 mg/bodyを2週間空けて2回投与 (Day 1, Day 15)	一般社団法人日本リウマチ学会	全薬工業株式会社	B	代謝・その他WG
53	Ⅲ-①-79	リツキシマブ	ABO血液型不適合肝移植における術前脱感作治療	リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> 静脈内点滴投与 1回 (全身状態により適宜減量)	日本移植学会	ロシュ、全薬工業	B	代謝・その他WG

No	要望番号	成分名	要望効能・効果	要望用法・用量	要望者	会社名	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	WG
54	Ⅲ-①80	レボチロキシ ンナトリウム	粘液水腫性昏睡/重症甲状腺機能低下症	通常、成人にはレボチロキシ ンナトリウムとして初 回量50～200 μgを静脈内注射する。その後、50～ 100 μgを1日1回点滴静注し、意識障害が改善する まで継続する。なお、年齢、症状により適宜増減す る。	日本甲状腺学会 日本内分泌学会 日本救急医学会 日本病院総合診療 医学会	APP Pharma(米国) Henning Berlin/Sanofi (独国) Laboratoires SERB (仏国) PHARMACEUTICAL PARTNERS OF CANADA(加国)	B	代謝・その 他WG