

エネルギー
代謝改善薬

パニオン_{ユーワ錠}

パニオン_{ユーワ錠}はアデノシン三リン酸二ナトリウム(ATP)と4種のビタミンB類を同時配合していますので、体のすみずみの血流を増加させ、細胞一つ一つにおいて低下したエネルギー産生を高めます。従いまして、パニオン_{ユーワ錠}は年齢や体の変調などからくる身体各所の不快な症状(全身倦怠、しびれ、むくみ、めまい、食欲不振、心悸亢進)や、たまった疲れにすぐれた改善効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃腸障害、口内炎
精神神経系	頭痛、眠気、気分が落ち着かない
その他	全身拍動感、耳なり、脱力感
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
便秘

効能・効果

- 疲労回復、脚気様症候群(全身倦怠、しびれ、むくみ、めまい、食欲不振、心悸亢進)及び脚気、熱性・消耗性疾患の補助療法
- 神経痛、腰痛、背痛、関節痛、関節炎、五十肩、肩こり

用法・用量

下記の量を服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)錠剤をかんだり、つぶしたりせずにそのまま服用すること。また、制酸剤又は牛乳と同時に服用しないこと。

成分・分量(3錠中)

成分・分量	働 き
アデノシン三リン酸 二ナトリウム(ATP) 60.0mg	体のすみずみの血流を増加させ、 体内の代謝を活性化します。
チアミンジスルフィド(V.B ₁) 24.0mg	ビタミンB類が協力しあって働く ことで、栄養素からのエネルギー 産生を促進します。
リボフラビン(V.B ₂) 1.5mg	
ピリドキシン塩酸塩(V.B ₆) 24.0mg	
シアノコバラミン(V.B ₁₂) 0.06mg	

〔添加物〕ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート80、クエン酸トリエチル、タルク、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、ビタミンB₂(リボフラビン)によるものですから心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 水分が錠剤につくと内容成分の変化のもととなるので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないこと。
- (5) ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合があるので、服用のつどキャップをよくしめること。
- (6) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるので、キャップをあけた後は必ず捨てること。
- (7) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないこと。



本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00

