ペミロラストカリウムのリスク評価について

成分・含量	1日2錠中 ペミロラストカリウム 10mg						
薬効分類	鼻炎用内服薬						
投与経路	経口						
販売名(製造販売業者)	アレギサール鼻炎 他 (田辺三菱製薬株式会社)						
効能効果	花粉,ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギ						
	一症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり						
用法用量	年齢	1回服用量	1日服用回数				
	成人(15歳以上)	1錠	2回 (朝・夕)				
	15 歳未満	服用しないこと					
	TO MX/NIM MX/II O'S V 'C C						
承認年月日	平成 23 年 11 月 18 日						
製造販売開始日	平成 24 年 1 月 11 日						
評価を行う理由	製造販売後調査の終了見込み(平成27年1月10日)						
製造販売後調査	調査期間:平成23年11月18日~平成26年5月31日						
の概要	(製造販売開始後、約2年4ヶ月間)						
(中間報告書)	特別調査:4,338例(安全性集計対象症例)						
	副作用:90例121件(副作用発現症例率2.07%)						
	傾眠 23 件、そう痒症 8 件、倦怠感 7 件など						
	うち重篤な副作用:1例1件						
	腸炎 1 件						
	一般調査						
	副作用: 6 例 15 件						
	嘔吐2件、口唇炎2件など						
	うち重篤な副作用:0例						
薬事法第 77 条の	○中間報告書データロック後に、製造販売業者が報告した副作用報						
4の2に基づく	告						
報告 	平成26年6月1日~平成26年7月31日:なし						
	○医薬関係者が報告した報告						
	なし						
使用上の注意の	なし						
改訂の指導							

重篤な副作用報告

No	番号	1日使用量	副作用 PT	転帰	既知	資料 2-4-2 の
	(性) (年齢)	使用期間			/未知	掲載ページ
1	特別 81	2 錠	腸炎	回復	未知	7
	(男) (30)	9 日				