

# 臨床調査個人票 107. 全身型若年性特発性関節炎（新規）

## ■基本情報

<b>氏名</b>			
姓(漢字)	名(漢字)	姓(かな)	名(かな)
<b>住所</b>			
郵便番号	住所		
<b>生年月日等</b>			
生年月日	西暦	年	月 日
出生市区町村	性別		
出生時氏名(変更のある場合)	姓(漢字)	名(漢字)	姓(かな) 名(かな)
<b>家族歴</b>			
近親者の発症者の有無	1.あり 2.なし 3.不明 発症者続柄 1.父 2.母 3.子 4.同胞(男性) 5.同胞(女性) 6.祖父(父方) 7.祖母(父方) 8.祖父(母方) 9.祖母(母方) 10.いとこ 11.その他 続柄		
両親の近親結婚	1.あり 2.なし 3.不明 詳細:		
<b>発病時の状況</b>			
発症年月	西暦	年	月
<b>社会保障</b>			
介護認定	1.要介護 2.要支援 3.なし		要介護度 1 2 3 4 5
<b>生活状況</b>			
移動の程度	1.歩き回るのが問題はない 2.いくらか問題がある 3.寝たきりである		
身の回りの管理	1.洗面や着替えに問題はない 2.いくらか問題がある 3.自分でできない		
ふだんの活動	1.問題はない 2.いくらか問題がある 3.行うことができない		
痛み/不快感	1.ない 2.中程度ある 3.ひどい		
不安/ふさぎ込み	1.問題はない 2.中程度 3.ひどく不安あるいはふさぎ込んでいる		
<b>連絡事項</b>			
<b>■診断</b>			
<b>診断</b>			
遺伝子診断	検査遺伝子名 疾患関連変異 1.あり 2.なし 3.不明		

■臨床所見

全身症状			
臨床症状の発作型	1.遷延型 2.再発性 3.混合型		
発作時の症状	38度以上の発熱1.あり 2.なし 38度未満の微熱1.あり 2.なし 弛張熱1.あり 2.なし 倦怠感1.あり 2.なし 不快感1.あり 2.なし 気分障害1.あり 2.なし 体重減少1.あり 2.なし 熱感・体温上昇と連動しない悪寒1.あり 2.なし		
再発・混合型の場合	発作時に一定の傾向1.あり 2.なし ありの場合平均発作期間 日 時間 年間発作回数 回 発作パターン1.規則的 2.不規則 季節性1.あり 2.なし 発熱時の悪寒1.あり 2.なし 発作の誘因(すべて記載) 1.寒冷2.心身ストレス3.ワクチン4.感染5.外傷6.食物7.月経8.疲労9.旅行10.その他 その他		
皮膚粘膜症状			
該当するものを選択	1.アフタ性口内炎2.滲出性咽頭炎3.咽頭発赤4.斑状皮疹5.蕁麻疹様皮疹6.遊走性紅斑7.浸潤を触れる紫斑 8.丹毒様発赤9.毛嚢炎様皮疹10.丘疹膿疱性皮疹11.ざ瘡12.乾癬13.陰部潰瘍14.壊疽性膿皮症15.手蹠膿疱症 16.結節性紅斑17.結節性紅斑以外のその他脂肪織炎18.魚鱗癬様皮疹19.針反応陽性20.その他  その他の症状		
筋骨格症状			
該当するものを選択	1.関節痛2.単関節炎3.少関節炎(<5) 4.多関節炎(≥5) 5.腱鞘滑膜炎6.筋痛7.筋炎8.筋膜炎9.骨痛 10.骨炎11.骨軟骨過形成12.骨幹端過形成13.その他  その他の症状		
眼症状			
該当するものを選択	1.眼周囲浮腫2.眼痛3.結膜炎4.前部ぶどう膜炎5.後部ぶどう膜炎6.角膜炎7.強膜炎8.上強膜炎 9.涙腺炎10.乳頭浮腫11.視神経萎縮12.網膜血管炎13.その他  その他の症状		
消化器症状			
該当するものを選択	1.嘔吐2.腹痛3.便秘4.下痢5.消化管潰瘍6.肛門・肛門周囲膿瘍7.消化管出血8.無菌性腹膜炎9.その他 その他の症状		
リンパ組織病変			
該当するものを選択	1.全身リンパ節腫大2.頸部リンパ節腫大3.肝腫大4.脾腫大5.有痛性リンパ節病変6.その他 頸部リンパ節腫大の部位  その他の症状		
心臓・血管症状			
該当するものを選択	1.胸痛2.咯血3.遷延性咳嗽4.肺炎5.心膜炎6.胸膜炎7.静脈血栓症8.動脈血栓症9.その他 その他の症状		
神経症状			
該当するものを選択	1.頭痛(早朝)2.頭痛(随時)3.けいれん4.めまい5.脳神経麻痺6.視神経炎7.無菌性髄膜炎8.髄液細胞増多 9.その他  その他の症状		
性線・泌尿器病変			
該当するものを選択	1.尿道炎・膀胱炎2.性腺痛3.その他  その他の症状		
二次性徴障害			
二次性徴障害1.あり 2.なし ありの場合 身長 cm 体重 kg Tanner分類 度 思春期の遅延1.あり 2.なし 骨年齢の遅延1.あり 2.なし 骨年齢遅延の特徴			
合併症(該当するものを記入)			
白内障	発症年月 西暦 年 月 重症度:1.軽度 2.重度 3.不明	帯状角膜炎	発症年月 西暦 年 月 重症度:1.軽度 2.重度 3.不明
視神経萎縮	発症年月 西暦 年 月 重症度:1.軽度 2.重度 3.不明	視力障害	発症年月 西暦 年 月 重症度:1.軽度 2.重度 3.不明
全盲	発症年月 西暦 年 月	その他の眼合併症	発症年月 西暦 年 月 症状
消化管穿孔	発症年月 西暦 年 月 重症度:1.軽度 2.重度 3.不明	腹膜癒着	発症年月 西暦 年 月 重症度:1.軽度 2.重度 3.不明
炎症性腸疾患	発症年月 西暦 年 月 重症度:1.軽度 2.重度 3.不明	消化管閉塞	発症年月 西暦 年 月 重症度:1.軽度 2.重度 3.不明
その他の消化管合併症	発症年月 西暦 年 月 症状	虚血性心疾患	発症年月 西暦 年 月
動脈瘤	発症年月 西暦 年 月	大血管障害	発症年月 西暦 年 月
心筋症	発症年月 西暦 年 月	水頭症	発症年月 西暦 年 月
感音性難聴	発症年月 西暦 年 月	末梢神経障害	発症年月 西暦 年 月
小脳症状	発症年月 西暦 年 月	第Ⅰ-第ⅧⅡ脳神経障害	発症年月 西暦 年 月
発達障害	発症年月 西暦 年 月 知能指数1.IQ<70 2.IQ<35 3.不明	その他の神経合併症	発症年月 西暦 年 月
高血圧	発症年月 西暦 年 月	腎障害	発症年月 西暦 年 月
AAアミロイドーシス	発症年月 西暦 年 月	耳鼻科的異常	発症年月 西暦 年 月 症状
マクロファージ活性化症候群	発症年月 西暦 年 月	不妊	発症年月 西暦 年 月
腫瘍	発症年月 西暦 年 月		

■ 検査所見

血液検査			
白血球	1. 高値 2. 正常 3. 低値	好中球	1. 高値 2. 正常 3. 低値
単球数	1. 高値 2. 正常 3. 低値	血小板	1. 高値 2. 正常 3. 低値
CRP	1. 高値 2. 正常	赤沈	1. 高値 2. 正常
血清アミロイド	1. 高値 2. 正常	プロカルシトニン	1. 高値 2. 正常
AST	1. 高値 2. 正常	ALT	1. 高値 2. 正常
LDH	1. 高値 2. 正常	ALP	1. 高値 2. 正常 3. 低値
CRE	1. 高値 2. 正常	BUN	1. 高値 2. 正常
抗核抗体	1. 陽性 2. 陰性	その他陽性自己抗体	

尿検査			
尿潜血	1. 陽性 2. 陰性	尿白血球	1. 陽性 2. 陰性

画像診断			
脳・脊髄 MRI・CT検査	撮影日 西暦 年 月 日	病変の数	カ所
病変の部位 (すべてを選択)	1. 中枢神経病変2. 慢性髄膜炎3. 視床・神経節病変4. 脳幹・小脳病変5. 白質病変6. 皮質病変7. 脊髄病変 8. 内耳病変9. 皮質周囲炎10. 静脈洞血11. 脳萎		

■ 鑑別診断

鑑別診断	
鑑別できるものにチェック	1. 感染症：急性感染症、菌血症・敗血症、伝染性単核球症、伝染性紅斑 2. 感染症に対するアレルギー性反応：ウイルス性血球貪食症候群 3. 炎症性腸疾患：クローン病、潰瘍性大腸炎 4. 他のリウマチ性疾患：血管炎症候群（とくに大動脈炎症候群、結節性多発動脈炎）、全身性エリテマトーデス、若年性皮膚筋炎 5. 腫瘍性病変・悪性腫瘍：白血病、筋線維芽腫症 6. 自己炎症性症候群：新生児発症多臓器炎症性疾患または慢性炎症性神経皮膚関節症候群、高IgD症候群、家族性地中海熱、TNF 受容体関連周期性発熱症候群、キャスルマン病

■ 重症度

重症度	
該当するものを選択	1. ステロイドの減量・中止が困難で、免疫抑制剤や生物学的製剤の使用が必要 2. マクロファージ活性化症候群を繰り返す 3. 難治性・進行性の関節炎を合併する

■治療その他

薬物療法（使用経験のある薬剤）

NSAID	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
ステロイド	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
コルヒチン	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
スルファサラジン	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
メトトレキサート	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
I型インターフェロン	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
シクロフォスファミド	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
アザチオプリン	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
シクロスポリン	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
サリドマイド	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
アナキンラ	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
カナキヌマブ	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
インフリキシマブ	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
エタネルセプト	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
アダリムマブ	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
リロナセプト	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
トシリズマブ	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
シメチジン	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
スタチン	投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
その他1	薬品名： 投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
その他2	薬品名 投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化
その他3	薬品名： 投与状況：1.発作時 2.非発作時 3.持続 4.中止	効果：1.著効 2.有効 3.無効 4.悪化

人工呼吸器（使用者のみ詳細記入）

使用の有無	1.あり 2.なし		
以下 有の場合 開始時期	西暦 年 月	離脱の見込み	1.あり 2.なし
種類	1.気管切開口を介した人工呼吸器 2.鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器		
施行状況	1.間欠的施行 2.夜間に継続的に施行 3.一日中施行 4.現在は未施行		
生活状況	食事1.自立 2.部分介助 3.全介助 椅子とベッド間の移動1.自立 2.軽度の介助 3.部分介助 4.全介助 整容1.自立 2.部分介助 3.全介助 トイレ動作1.自立 2.部分介助 3.全介助 入浴1.自立 2.部分介助 3.全介助 移動1.自立 2.軽度の介助 3.部分介助 4.全介助 階段昇降1.自立 2.部分介助 3.全介助 更衣1.自立 2.部分介助 3.全介助 排便コントロール1.自立 2.部分介助 3.全介助 排尿コントロール1.自立 2.部分介助 3.全介助		

医療機関名	指定医番号
医療機関所在地	電話番号 ( )
医師の氏名	記載年月日：平成 年 月 日

- 診断書には過去6か月間で一番悪い状態の内容を記載してください。 ※自筆または押印のこと
- ただし、診断に関わる項目については、いつの時点のものでも構いません。
- 診断基準、重症度分類については、「難病に係る診断基準及び重症度分類等について」（平成26年11月12日健発1112第1号健康局長通知）を参照の上、ご記入ください。
- 審査のため、検査結果等について別途提出をお願いすることがあります。