

# 3

## 使用上の注意の改訂について (その288)

平成29年9月12日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせします。

### 1 血液凝固阻止剤 ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

[販売名] プラザキサカプセル75mg, 同カプセル110mg (日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社)  
[副作用 (重大な副作用)] 急性肝不全, 肝機能障害, 黄疸:急性肝不全, 肝機能障害, 黄疸があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

### 2 抗ウイルス剤 パリビズマブ (遺伝子組換え)

[販売名] シナジス筋注液50mg, 同筋注液100mg (アッヴィ合同会社)  
[副作用 (重大な副作用)] 血小板減少:血小板減少があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 3 その他の生物学的製剤 インターフェロンベータ

[販売名] フェロン注射用100万, 同注射用300万, 同注射用600万 (東レ株式会社)  
[用法及び用量に関連する使用上の注意] 投与期間は, 臨床効果及び副作用の程度を考慮し, 慎重に決定する。通常, 成人は1日600万国際単位を1週間, 以後1日300万国際単位を5週間連日, 7週目より1日300万国際単位を週3回静脈内投与又は点滴静注し, 投与期間は34～36週間 (総投与量として39,900万国際単位) とする。