

平成26年度 健康実態調査結果の報告

平成27年1月

厚生労働省医薬食品局食品安全部

1 調査の概要	- 1 -
1.1 調査の目的	- 1 -
1.2 調査の対象	- 1 -
1.3 調査期間	- 1 -
1.4 調査項目	- 1 -
1.5 調査の方法	- 1 -
1.6 調査の実施状況	- 1 -
2 調査結果	- 2 -
2.1 調査回答者の属性について	- 2 -
2.2 生活習慣について	- 3 -
2.2.1 1日の歩行時間について	- 3 -
2.2.2 運動（スポーツ）頻度	- 4 -
2.2.3 飲酒頻度	- 5 -
2.2.4 喫煙状況	- 7 -
2.2.5 睡眠時間	- 13 -
2.2.6 労働時間	- 14 -
2.2.7 1日平均の野菜摂取量	- 15 -
2.2.8 1日平均の果物類摂取量	- 16 -
2.2.9 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬	- 17 -
2.3 健康・悩み・ストレスについて	- 18 -
2.3.1 日常生活での悩みやストレスの有無	- 19 -
2.4 介護や日常生活動作の状況について	- 21 -
2.4.1 病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況	- 21 -
2.4.2 要介護認定の状況	- 22 -
2.4.3 介助なしでできること	- 25 -
2.5 この1年間の治療状況について	- 26 -
2.5.1 現在の受診頻度について	- 26 -
2.5.2 この1年間の治療の内容について	- 27 -
2.5.3 油症検診の受診について	- 28 -
2.5.4 油症検診に関する案内を受けたか	- 29 -
2.5.5 油症検診に関する案内があれば受診するか	- 30 -
2.6 油症患者受療券（油症券）の使用状況について	- 31 -
2.6.1 油症券の保有について	- 31 -
2.6.2 油症券の使用について	- 32 -
2.6.3 油症券を使用せずに受診したことがあるか	- 33 -
2.7 これまでにかかったことのある病気（今かかっている病気・症状も含む）について	- 35 -
2.7.1 悪性腫瘍（がん）について	- 36 -
2.7.2 脳・精神・神経の病気・症状について	- 37 -
2.7.3 自律神経系の病気・症状について	- 38 -
2.7.4 眼の病気・症状について	- 39 -
2.7.5 口の中の病気・症状について	- 39 -
2.7.6 耳・鼻の病気・症状について	- 40 -
2.7.7 甲状腺の病気・症状について	- 41 -
2.7.8 のど・気管支・肺の病気・症状について	- 42 -
2.7.9 心臓の病気・症状について	- 43 -
2.7.10 高血圧や血管の病気・症状について	- 46 -
2.7.11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について	- 49 -
2.7.12 すい臓の病気・症状について	- 50 -
2.7.13 腎臓・膀胱の病気・症状について	- 53 -
2.7.14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状について	- 54 -
2.7.15 血液・リンパの病気・症状について	- 55 -
2.7.16 前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状について（男性のみ）	- 58 -
2.7.17 子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について（女性のみ）	- 59 -
2.7.18 月経・妊娠・出産に関することについて（女性のみ）	- 60 -
2.7.19 骨・関節の病気・症状について	- 63 -
2.7.20 皮膚・爪の病気・症状について	- 66 -
2.7.21 アレルギー疾患について	- 67 -
2.7.22 膠原病について	- 68 -
2.7.23 その他の病気・症状について	- 71 -
2.8 調査票の自由記入欄について	- 72 -
別表 調査結果の性・年齢（5歳階級）別集計表	- 74 -
参考資料 調査票	- 150 -

1 調査の概要

1.1 調査の目的

平成24年9月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」(厚生労働省・農林水産省告示)に基づき、カネミ油症患者の生活習慣、病状、治療内容等について把握し、カネミ油症に関する調査研究を更に推進することを目的とする。

1.2 調査の対象

各都道府県で把握している1,651人(平成26年3月31日時点の推計生存認定患者)のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方を除く1,437人に調査にご協力頂いた。

1.3 調査期間

平成26年4月～6月末

1.4 調査項目

全国油症治療研究班(厚生労働科学研究費補助金による)で、カネミ油症患者の意見を聞きつつ決定した。生活習慣、健康状態や悩み・治療状況、これまでにかかったことのある病気・症状などの項目を調査した。

1.5 調査結果の活用

調査結果については、アンケートに基づく調査の医学的・科学的解釈の限界に留意しつつ、全国油症治療研究班(厚生労働科学研究費補助金による)において、過去の検診結果等と併せてより詳細な解析を行い、翌年度以降の健康実態調査項目などカネミ油症に関する調査研究に活用される予定である。

1.6 調査の実施状況

各都道府県で把握している1,651人の認定患者のうち、死亡が確認された者、従前から油症に関する連絡を拒否している者及び所在不明の者等を除いた1,437人から回答を得た。

以下の報告は、本調査に回答があった1,437人についてとりまとめたものである。

「割合」の計算において使用する分母は、表中に記載しているNの値とする。

2 調査結果

2.1 調査回答者の属性について

回答者の性別は、男性687人、女性750人であった。回答者の平均年齢（回答時点での申告年齢）は63.7歳（男62.4歳、女64.9歳）となっている。

男性は、「55～59歳」の者が16.9%と最も多く、次いで、「50～54歳」が16.6%、「60～64歳」が12.2%等の順であった。

女性は、「50～54歳」の者が16.0%と最も多く、次いで、「55～59歳」が14.1%、「60～64歳」が12.0%等の順であった。

各集団の男女比及び年齢階級については、表1-1、1-2、図1-1のとおりである。

表1-1 回答者の男女比

	回答者(N=1437)	
	件数	割合
男	687	47.8%
女	750	52.2%
計	1,437	100.0%

図1-1 回答者数及び年齢階級別回答者の割合




表1-2 回答者数及び年齢階級別回答者の割合

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
～34歳	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%
35歳～39歳	4	0.6%	2	0.3%	6	0.4%
40歳～44歳	26	3.8%	20	2.7%	46	3.2%
45歳～49歳	79	11.5%	67	8.9%	146	10.2%
50歳～54歳	114	16.6%	120	16.0%	234	16.3%
55歳～59歳	116	16.9%	106	14.1%	222	15.4%
60歳～64歳	84	12.2%	90	12.0%	174	12.1%
65歳～69歳	58	8.4%	69	9.2%	127	8.8%
70歳～74歳	53	7.7%	60	8.0%	113	7.9%
75歳～79歳	57	8.3%	72	9.6%	129	9.0%
80歳～84歳	56	8.2%	68	9.1%	124	8.6%
85歳～89歳	30	4.4%	49	6.5%	79	5.5%
90歳～	10	1.5%	26	3.5%	36	2.5%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

2.2 生活習慣について


2.2.1 1日の歩行時間について

農作業・家事などを含め1日の平均的な歩行時間についてみると、「90分以上」と回答した者が31.2%（男 30.0%、女 32.4%）と最も多く、次いで、「30分～60分未満」25.7%（男 26.8%、女 24.8%）、「30分未満」23.9%（男 25.0%、女 22.9%）、「60分～90分未満」18.2%（男 17.8%、女 18.5%）の順となっている。（表2-1、図2-1）

表2-1 1日の歩行時間

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
90分以上	206	30.0%	243	32.4%	449	31.2%
60分～90分未満	122	17.8%	139	18.5%	261	18.2%
30分～60分未満	184	26.8%	186	24.8%	370	25.7%
30分未満	172	25.0%	172	22.9%	344	23.9%
未回答	3	0.4%	10	1.3%	13	0.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図2-1 1日の歩行時間




2.2.2 運動（スポーツ）頻度

ウォーキング、ジョギング、体操も含めた運動（スポーツ）頻度をみると、「ほとんどしていない」と回答した者が47.9%（男 43.7%、女 52.4%）と最も多く、次いで「週2～4回程度」が17.7%（男 17.3%、女 18.2%）、「ほぼ毎日」が14.6%（男 16.0%、女 13.5%）、「週1回程度」が14.6%（男 16.6%、女 13.0%）、「月1回程度」が4.2%（男 5.7%、女 2.8%）の順となっている。（表2-2、図2-2）

表2-2 運動（スポーツ）頻度

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ほぼ毎日	110	16.0%	100	13.5%	210	14.6%
週2～4回程度	119	17.3%	135	18.2%	254	17.7%
週1回程度	114	16.6%	96	13.0%	210	14.6%
月1回程度	39	5.7%	21	2.8%	60	4.2%
ほとんどしていない	300	43.7%	388	52.4%	688	47.9%
未回答	5	0.7%	10	1.4%	15	1.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図2-2 運動（スポーツ）頻度




2.2.3 飲酒頻度

飲酒頻度をみると、男性では「ほぼ毎日飲む」と回答した者が32.2%と最も多く、女性では「飲まない」と回答した者が69.2%と最も多かった。（表2-3-1、図2-3-1）

表2-3-1 飲酒頻度

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ほぼ毎日	221	32.2%	41	5.5%	262	18.2%
週3～5回程度	95	13.8%	41	5.5%	136	9.5%
週1～2回程度	73	10.6%	47	6.3%	120	8.4%
月1～3回程度	45	6.6%	39	5.2%	84	5.8%
年1～10回程度	38	5.5%	48	6.4%	86	6.0%
飲まない	207	30.1%	519	69.2%	726	50.5%
未回答	8	1.2%	15	2.0%	23	1.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図2-3-1 飲酒頻度




飲酒をすると回答した688人の1日の飲酒量（ビール大瓶換算）についてみると、男性では「1～2本未満」が42.8%と最も多く、女性では「0.5～1本未満」が53.2%と最も多かった。全体では、「1～2本未満」が36.8%と最も多く（男 42.8%、女 23.6%）、次いで「0.5～1本未満」が33.4%（男 24.4%、女 53.2%）等の順となっている。（表2-3-2、図2-3-2）

表2-3-2 飲酒量

	男性(N=472)		女性(N=216)		計(N=688)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0.5本未満	11	2.3%	14	6.5%	25	3.6%
0.5～1本未満	115	24.4%	115	53.2%	230	33.4%
1～2本	202	42.8%	51	23.6%	253	36.8%
2～3本	98	20.8%	15	6.9%	113	16.4%
3～4本	22	4.7%	5	2.3%	27	3.9%
4～5本	5	1.1%	2	0.9%	7	1.0%
5～10本	9	1.9%	0	0.0%	9	1.3%
10本以上	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
未回答	13	2.8%	16	7.4%	29	4.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	472	100.0%	216	100.0%	688	100.0%

図2-3-2 飲酒量



2.2.4 喫煙状況


喫煙状況についてみると、男性・女性ともに「吸わない」と回答した者が最も多かった(男 38.7%、女 85.6%、全体63.2%)。

(表2-4-1、図2-4-1)

表2-4-1 喫煙状況

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
吸う	238	34.6%	63	8.4%	301	20.9%
やめた	180	26.2%	25	3.3%	205	14.3%
吸わない	266	38.7%	642	85.6%	908	63.2%
未回答	3	0.4%	20	2.7%	23	1.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図2-4-1 喫煙状況




たばこを吸うと回答した301人の喫煙年数をみると、男性・女性ともに「30年～40年未満」が最も多く(男 35.7%、女34.9%、全体 35.5%)、次いで「40年以上」(男 29.0%、女 14.3%、全体 25.9%)、「20年～30年未満」(男 23.1%、女 33.3%、全体25.2%)等の順となっている。(表2-4-2、図2-4-2)

表2-4-2 喫煙状況 (喫煙者 喫煙年数)

	男性(N=238)		女性(N=63)		計(N=301)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～2年未満	5	2.1%	0	0.0%	5	1.7%
2年～3年未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3年～5年未満	2	0.8%	0	0.0%	2	0.7%
5年～10年未満	0	0.0%	1	1.6%	1	0.3%
10年～20年未満	6	2.5%	5	7.9%	11	3.7%
20年～30年未満	55	23.1%	21	33.3%	76	25.2%
30年～40年未満	85	35.7%	22	34.9%	107	35.5%
40年以上	69	29.0%	9	14.3%	78	25.9%
未回答	16	6.7%	5	7.9%	21	7.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	238	100.0%	63	100.0%	301	100.0%

図2-4-2 喫煙状況 (喫煙者 喫煙年数)




たばこを吸うと回答した301人の1日の平均喫煙本数をみると、男性では「20本～30本未満」が57.1%と最も多く、女性は「10本～20本未満」が50.8%と最も多かった。（表2-4-3、図2-4-3）

表2-4-3 喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）

	男性(N=238)		女性(N=63)		計(N=301)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1～5本未満	3	1.3%	3	4.8%	6	2.0%
5本～10本未満	13	5.5%	7	11.1%	20	6.6%
10本～20本未満	56	23.5%	32	50.8%	88	29.2%
20本～30本未満	136	57.1%	18	28.6%	154	51.2%
30本～40本未満	19	8.0%	1	1.6%	20	6.6%
40本以上	9	3.8%	2	3.2%	11	3.7%
未回答	2	0.8%	0	0.0%	2	0.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	238	100.0%	63	100.0%	301	100.0%

図2-4-3 喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）




たばこをやめたと回答した205人の喫煙年数をみると、男性では「20～30年未満」が24.4%と最も多く、女性では「10～20年未満」が20.0%と最も多かった。（表2-4-4、図2-4-4）

表2-4-4 喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）

	男性(N=180)		女性(N=25)		計(N=205)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～2年未満	2	1.1%	1	4.0%	3	1.5%
2年～3年未満	1	0.6%	1	4.0%	2	1.0%
3年～5年未満	2	1.1%	1	4.0%	3	1.5%
5年～10年未満	10	5.6%	3	12.0%	13	6.3%
10年～20年未満	31	17.2%	5	20.0%	36	17.6%
20年～30年未満	44	24.4%	3	12.0%	47	22.9%
30年～40年未満	37	20.6%	4	16.0%	41	20.0%
40年以上	32	17.8%	3	12.0%	35	17.1%
未回答	21	11.7%	4	16.0%	25	12.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	180	100.0%	25	100.0%	205	100.0%

図2-4-4 喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）




たばこをやめたと回答した205人の過去の喫煙本数をみると、男性・女性ともに「20本～30本未満」と回答した者が最も多く(男 49.4%、女 36.0%、全体 47.8%)、次いで「10本～20本未満」と回答した者が多かった(男 13.9%、女 36.0%、全体 16.6%)。(表2-4-5、図2-4-5)

表2-4-5 喫煙状況 (卒煙者 喫煙本数)

	男性(N=180)		女性(N=25)		計(N=205)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1～5本未満	2	1.1%	0	0.0%	2	1.0%
5本～10本未満	5	2.8%	3	12.0%	8	3.9%
10本～20本未満	25	13.9%	9	36.0%	34	16.6%
20本～30本未満	89	49.4%	9	36.0%	98	47.8%
30本～40本未満	20	11.1%	0	0.0%	20	9.8%
40本以上	23	12.8%	1	4.0%	24	11.7%
未回答	16	8.9%	3	12.0%	19	9.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	180	100.0%	25	100.0%	205	100.0%

図2-4-5 喫煙状況 (卒煙者 喫煙本数)




たばこをやめたと回答した205人が何年前に卒煙したかについてみると、男性・女性ともに「5年～10年未満」前にやめたと回答した者が最も多く男 23.3%、女 24.0%、全体 23.4%）、次いで「10年～15年未満」（男 17.2%、女 8.0%、全体 16.1%）、「30年以上」（男 18.3%、女 0.0%、全体 16.1%）等の順となっている。（表2-4-6、図2-4-6）

表2-4-6 喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）

	男性(N=180)		女性(N=25)		計(N=205)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1年未満	1	0.6%	1	4.0%	2	1.0%
1年～2年未満	5	2.8%	2	8.0%	7	3.4%
2年～3年未満	5	2.8%	4	16.0%	9	4.4%
3年～4年未満	12	6.7%	2	8.0%	14	6.8%
4年～5年未満	11	6.1%	2	8.0%	13	6.3%
5年～10年未満	42	23.3%	6	24.0%	48	23.4%
10年～15年未満	31	17.2%	2	8.0%	33	16.1%
15年～20年未満	11	6.1%	2	8.0%	13	6.3%
20年～30年未満	26	14.4%	3	12.0%	29	14.1%
30年以上	33	18.3%	0	0.0%	33	16.1%
未回答	3	1.7%	1	4.0%	4	2.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	180	100.0%	25	100.0%	205	100.0%

図2-4-6 喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）




2.2.5 睡眠時間

睡眠時間についてみると、「6 時間以上7 時間未満」と回答した者が35.0%（男 37.0%、女 33.2%）と最も多く、次いで「5 時間以上6 時間未満」が25.2%（男 22.3%、女 27.9%）7 時間以上8 時間未満が17.4%（男 18.7%、女 16.3%）等の順となっている。（表 2-5、図 2-5）

表 2-5 睡眠時間

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
9時間以上	28	4.1%	32	4.3%	60	4.2%
8時間以上9時間未満	84	12.2%	60	8.0%	144	10.0%
7時間以上8時間未満	128	18.7%	122	16.3%	250	17.4%
6時間以上7時間未満	254	37.0%	249	33.2%	503	35.0%
5時間以上6時間未満	153	22.3%	209	27.9%	362	25.2%
5時間未満	38	5.5%	69	9.2%	107	7.4%
未回答	2	0.1%	9	1.2%	11	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図 2-5 睡眠時間




2.2.6 労働時間

労働時間についてみると、「4 時間未満」と回答した者が30.3%と最も多く（男 27.7%、女 32.8%）、次いで「10 時間以上」が13.4%（男 15.7%、女 11.2%）、「8 時間以上～9 時間未満」が13.0%（男 17.8%、女 8.7%）等の順となっている。（表2-6、図2-6）

表2-6 労働時間

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
10時間以上	108	15.7%	84	11.2%	192	13.4%
9時間以上10時間未満	94	13.7%	67	8.9%	161	11.2%
8時間以上9時間未満	122	17.8%	65	8.7%	187	13.0%
7時間以上8時間未満	61	8.9%	58	7.7%	119	8.3%
6時間以上7時間未満	37	5.4%	67	8.9%	104	7.2%
5時間以上6時間未満	29	4.2%	66	8.8%	95	6.6%
4時間以上5時間未満	34	4.9%	86	11.5%	120	8.4%
4時間未満	190	27.7%	246	32.8%	436	30.3%
未回答	12	1.7%	11	1.5%	23	1.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図2-6 労働時間




2.2.7 野菜摂取量

野菜摂取量についてみると、「70g 以上 140g 未満」と回答した者が 31.5%と最も多く（男 36.2%、女 27.2%）、次いで「140g 以上 210g 未満」が 22.4%（男 20.8%、女 23.9%）、「210g 以上 270g 未満」が 14.5%（男 11.2%、女 17.5%）等の順となっている。（表 2-7、図 2-7）

表 2-7 野菜摂取量

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
70g未満	155	22.6%	103	13.7%	258	18.0%
70g以上140g未満	249	36.2%	204	27.2%	453	31.5%
140g以上210g未満	143	20.8%	179	23.9%	322	22.4%
210g以上270g未満	77	11.2%	131	17.5%	208	14.5%
270g以上350g未満	35	5.1%	72	9.6%	107	7.4%
350g以上	23	3.3%	46	6.1%	69	4.8%
未回答	5	0.7%	15	2.0%	20	1.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図 2-7 野菜摂取量




2.2.8 果物類摂取量

果物摂取量についてみると、「50g未満」と回答した者が45.6%と最も多く（男56.6%、女35.5%）、次いで「50g以上100g未満」が27.8%（男21.5%、女33.5%）、「100g以上150g未満」が17.5%（男15.4%、女19.5%）等の順となっている。（表2-8、図2-8）

表2-8 果物類摂取

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
50g未満	389	56.6%	266	35.5%	655	45.6%
50g以上100g未満	148	21.5%	251	33.5%	399	27.8%
100g以上150g未満	106	15.4%	146	19.5%	252	17.5%
150g以上	39	5.7%	72	9.6%	111	7.7%
未回答	5	0.7%	15	2.0%	20	1.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図2-8 果物類摂取




2.2.9 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬

常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬の有無についてみると、「ある」と回答したものは28.8%（男 22.6%、女 34.5%）となっている。（表2-9-1、図2-9-1）

表2-9-1 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	155	22.6%	259	34.5%	414	28.8%
ない	527	76.7%	474	63.2%	1001	69.7%
未回答	5	0.7%	17	2.3%	22	1.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図2-9-1 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬



また、サプリメント・健康食品・漢方薬を常用していると回答した375人のうち、362人から706品目について、具体的な品目名および効果について回答があった。

そのうち、10人以上の患者が常用していると回答した上位8品目の効果についてみると、「不快症状が改善したと思う」との回答が54件、「特にはっきりとした効果があるとは思わない」が93件、「その他」が30件であった。（表2-9-2）

表2-9-2 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬（上位品目）

	男性			女性			小計			計
	効果あり	効果なし	その他	効果あり	効果なし	その他	効果あり	効果なし	その他	
グルコサミン	7	6	3	5	12	3	12	18	6	36
黒酢	1	6	0	5	19	1	6	25	1	32
青汁	5	2	1	6	8	5	11	10	6	27
ブルーベリー	5	4	3	5	5	1	10	9	4	23
ビタミンC	2	6	1	2	5	4	4	11	5	20
カルシウム	2	3	0	1	7	1	3	10	1	14
クロレラ	1	1	3	3	4	1	4	5	4	13
ビタミンE	0	3	1	4	2	2	4	5	3	12
合計	23	31	12	31	62	18	54	93	30	177

2.3 健康・悩み・ストレスについて


2.3.1 日常生活での悩みやストレスの有無

日常生活での悩みやストレスの有無について、「ある」と回答した者が1,142人（79.5%）（男 511人（74.4%）、女 631人（84.1%））となっている。（表3-1、図3-1）

表3-1 日常生活での悩みやストレス

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	511	74.4%	631	84.1%	1142	79.5%
ない	170	24.7%	111	14.8%	281	19.6%
未回答	6	0.9%	8	1.1%	14	1.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図3-1 日常生活での悩みやストレス



日常生活での悩みやストレスが「ある」と回答した1,142人（男 511人、女 631人）を対象に、悩みやストレスの原因を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した者が56.1%と最も多く（男 51.9%、女 59.6%）、次いで「収入・家計・借金等」38.2%（男 39.7%、女 36.9%）、「自分の仕事」34.2%（男 45.2%、女 25.4%）、「家族の病気や介護」32.5%（男 24.9%、女 38.7%）、「生きがいに关すること」20.8%（男 19.6%、女 21.9%）等の順であった。（表3-2）

表3-2 悩みやストレスの原因（複数回答）

	男性(N=511)		女性(N=631)		計(N=1142)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
家族との人間関係	85	16.6%	151	23.9%	236	20.7%
家族以外との人間関係	117	22.9%	158	25.0%	275	24.1%
恋愛・性に関すること	12	2.3%	8	1.3%	20	1.8%
結婚	15	2.9%	7	1.1%	22	1.9%
離婚	8	1.6%	6	1.0%	14	1.2%
いじめ、セクハラ	3	0.6%	7	1.1%	10	0.9%
生きがいに关すること	100	19.6%	138	21.9%	238	20.8%
自由にできる時間がない	50	9.8%	58	9.2%	108	9.5%
収入・家計・借金等	203	39.7%	233	36.9%	436	38.2%
自分の病気や介護	265	51.9%	376	59.6%	641	56.1%
家族の病気や介護	127	24.9%	244	38.7%	371	32.5%
妊娠・出産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
育児	2	0.4%	7	1.1%	9	0.8%
家事	25	4.9%	101	16.0%	126	11.0%
自分の学業・受験・進学	3	0.6%	6	1.0%	9	0.8%
子どもの教育	41	8.0%	40	6.3%	81	7.1%
自分の仕事	231	45.2%	160	25.4%	391	34.2%
家族の仕事	46	9.0%	86	13.6%	132	11.6%
住まいや生活環境	42	8.2%	82	13.0%	124	10.9%
その他	21	4.1%	42	6.7%	63	5.5%
わからない	8	1.6%	9	1.4%	17	1.5%
未回答	1	0.2%	3	0.5%	4	0.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

また、上記の悩みやストレスの原因のうち、最も気になる原因を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した者が32.6%と最も多く（男 29.2%、女 35.3%）、次いで「自分の仕事」12.1%（男 18.0%、女 7.3%）、「家族の病気や介護」11.7%（男 8.6%、女 14.3%）、「収入・家計・借金等」11.0%（男 13.5%、女 9.0%）等の順であった。（表3-3）

表3-3 悩みやストレスの最も気になる原因

	男性(N=511)		女性(N=631)		計(N=1142)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
家族との人間関係	16	3.1%	29	4.6%	45	3.9%
家族以外との人間関係	25	4.9%	31	4.9%	56	4.9%
恋愛・性に関すること	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
結婚	3	0.6%	1	0.2%	4	0.4%
離婚	2	0.4%	1	0.2%	3	0.3%
いじめ、セクハラ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
生きがいに関すること	19	3.7%	10	1.6%	29	2.5%
自由にできる時間がない	6	1.2%	4	0.6%	10	0.9%
収入・家計・借金等	69	13.5%	57	9.0%	126	11.0%
自分の病気や介護	149	29.2%	223	35.3%	372	32.6%
家族の病気や介護	44	8.6%	90	14.3%	134	11.7%
妊娠・出産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
育児	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
家事	2	0.4%	5	0.8%	7	0.6%
自分の学業・受験・進学	1	0.2%	1	0.2%	2	0.2%
子どもの教育	6	1.2%	9	1.4%	15	1.3%
自分の仕事	92	18.0%	46	7.3%	138	12.1%
家族の仕事	5	1.0%	13	2.1%	18	1.6%
住まいや生活環境	6	1.2%	12	1.9%	18	1.6%
その他	9	1.8%	16	2.5%	25	2.2%
わからない	7	1.4%	9	1.4%	16	1.4%
未回答	39	7.6%	48	7.6%	87	7.6%
不詳	11	2.2%	25	4.0%	36	3.2%
計	511	100.0%	631	100.0%	1142	100.0%

2.4 介護や日常生活動作の状況について


2.4.1 病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況

病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況についてみると、5.2%（男 3.9%、女 6.4%）の者が入院中もしくは入所中であった。（表 4-1、図 4-1）

表 4-1 病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	27	3.9%	48	6.4%	75	5.2%
いいえ	657	95.6%	694	92.5%	1351	94.0%
未回答	3	0.4%	8	1.1%	11	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図 4-1 病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況




2.4.2 要介護認定の状況

要介護認定の状況についてみると、40歳未満の回答者を除いた1,431人（男 683人、女 748人）のうち、175人（12.2%）（男 53人、女 122人）の者が要介護認定を受けていた。（表4-2-1、図4-2-1）

表4-2-1 要介護認定の状況（40歳未満の回答者は除く）

	男性(N=683)		女性(N=748)		計(N=1431)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
受けている	53	7.8%	122	16.3%	175	12.2%
受けていない	607	88.9%	599	80.1%	1206	84.3%
未回答	23	3.4%	27	3.6%	50	3.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	683	100.0%	748	100.0%	1431	100.0%

図4-2-1 要介護認定の状況（40歳未満の回答者は除く）




要介護認定を受けている175人の調査日時点の要介護度の分布は、「要支援1」が22.3%（男 20.8%、女 23.0%）、「要介護1」が16.6%（男 17.0%、女 16.4%）等の順となっている。（表4-2-2、図4-2-2）

表4-2-2 要介護認定を受けている場合の要介護度の状況

	男性(N=53)		女性(N=122)		計(N=175)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
要支援1	11	20.8%	28	23.0%	39	22.3%
要支援2	8	15.1%	12	9.8%	20	11.4%
要介護1	9	17.0%	20	16.4%	29	16.6%
要介護2	5	9.4%	15	12.3%	20	11.4%
要介護3	8	15.1%	17	13.9%	25	14.3%
要介護4	3	5.7%	7	5.7%	10	5.7%
要介護5	6	11.3%	12	9.8%	18	10.3%
未回答	3	5.7%	11	9.0%	14	8.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	53	100.0%	122	100.0%	175	100.0%

表4-2-2 要介護認定を受けている場合の要介護度の状況



要介護認定を受けている175人について、介護が必要となった原因についてみると、「脳血管疾患」が27.4%（男 41.5%、女 21.3%）と最も多く、次いで「心臓疾患」が15.4%（男 7.5%、女 18.9%）、「関節疾患」14.9%（男 9.4%、女 17.2%）等の順となっている。（表4-2-3）

表4-2-3 要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因（複数回答）

	男性(N=53)		女性(N=122)		計(N=175)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳血管疾患	22	41.5%	26	21.3%	48	27.4%
心臓疾患	4	7.5%	23	18.9%	27	15.4%
がん	3	5.7%	6	4.9%	9	5.1%
呼吸器疾患	5	9.4%	6	4.9%	11	6.3%
関節疾患	5	9.4%	21	17.2%	26	14.9%
認知症	6	11.3%	16	13.1%	22	12.6%
パーキンソン病	2	3.8%	2	1.6%	4	2.3%
糖尿病	2	3.8%	1	0.8%	3	1.7%
視覚・聴覚障害	1	1.9%	5	4.1%	6	3.4%
骨折・転倒	0	0.0%	8	6.6%	8	4.6%
脊髄損傷	1	1.9%	1	0.8%	2	1.1%
高齢による衰弱	1	1.9%	3	2.5%	4	2.3%
その他	0	0.0%	2	1.6%	2	1.1%
わからない	0	0.0%	1	0.8%	1	0.6%
未回答	1	1.9%	1	0.8%	2	1.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

要介護認定を受けている175人について、要介護認定を受けた原因のうち、主たる原因については、男性では「脳血管疾患」が15名（28.3%）と最も多く、女性では「認知症」が20名（16.4%）と最も多かった。（表4-2-4）

表4-2-4 要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因

	男性(N=53)		女性(N=122)		計(N=175)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳血管疾患	15	28.3%	12	9.8%	27	15.4%
心臓疾患	1	1.9%	6	4.9%	7	4.0%
がん	0	0.0%	1	0.8%	1	0.6%
呼吸器疾患	0	0.0%	1	0.8%	1	0.6%
関節疾患	3	5.7%	16	13.1%	19	10.9%
認知症	4	7.5%	20	16.4%	24	13.7%
パーキンソン病	2	3.8%	4	3.3%	6	3.4%
糖尿病	1	1.9%	3	2.5%	4	2.3%
視覚・聴覚障害	1	1.9%	3	2.5%	4	2.3%
骨折・転倒	1	1.9%	11	9.0%	12	6.9%
脊髄損傷	5	9.4%	2	1.6%	7	4.0%
高齢による衰弱	5	9.4%	10	8.2%	15	8.6%
その他	4	7.5%	5	4.1%	9	5.1%
わからない	2	3.8%	1	0.8%	3	1.7%
未回答	7	13.2%	21	17.2%	28	16.0%
不詳	2	3.8%	6	4.9%	8	4.6%
計	53	100.0%	122	100.0%	175	100.0%

2.4.3 介助なしでできること

介助なしで行うことができるものについてみると、全ての項目において約 70%以上の者が「できる」と回答した。(表 4-3)

表 4-3 介助なしでできること (複数回答)

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
洗顔	568	82.7%	610	81.3%	1178	82.0%
口腔清拭	568	82.7%	609	81.2%	1177	81.9%
身体的清拭	553	80.5%	583	77.7%	1136	79.1%
洗髪	550	80.1%	571	76.1%	1121	78.0%
着替	555	80.8%	593	79.1%	1148	79.9%
入浴	549	79.9%	577	76.9%	1126	78.4%
体位交換・起居	563	82.0%	611	81.5%	1174	81.7%
排泄	563	82.0%	605	80.7%	1168	81.3%
食事の準備・後始末	560	81.5%	518	69.1%	1078	75.0%
食事	568	82.7%	615	82.0%	1183	82.3%
服薬	559	81.4%	601	80.1%	1160	80.7%
散歩	534	77.7%	557	74.3%	1091	75.9%
掃除	521	75.8%	552	73.6%	1073	74.7%
洗濯	519	75.5%	564	75.2%	1083	75.4%
買い物	514	74.8%	531	70.8%	1045	72.7%
日常会話	560	81.5%	613	81.7%	1173	81.6%
未回答	103	15.0%	103	13.7%	206	14.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.5 この1年間の治療状況について


2.5.1 現在の受診頻度について

現在の受診頻度についてみると、「毎月1～3 回程度」が45.0%と最も多く（男 42.4%、女 47.3%）、次いで「数か月に1 回程度」が26.6%（男 27.8%、女 25.5%）等の順となっている。（表5-1、図5-1）

表5-1 受診頻度

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院中	17	2.5%	19	2.5%	36	2.5%
毎週1回以上	45	6.6%	82	10.9%	127	8.8%
毎月1～3回程度	291	42.4%	355	47.3%	646	45.0%
数か月に1回程度	191	27.8%	191	25.5%	382	26.6%
受診していない	122	17.8%	82	10.9%	204	14.2%
未回答	21	3.1%	21	2.8%	42	2.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図5-1 受診頻度



2.5.2 この1年間の治療の内容について

この1年間の治療の内容をみると、「外来で治療を受けた」と回答した者が75.2%と最も多く（男 71.2%、女 78.8%）、次いで「入院した」が11.9%（男 11.5%、女 12.3%）等の順となっている。（表5-2）

表5-2 この1年間の治療の内容（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
手術を受けた	64	9.3%	63	8.4%	127	8.8%
入院した	79	11.5%	92	12.3%	171	11.9%
外来で治療を受けた	489	71.2%	591	78.8%	1080	75.2%
未回答	157	22.9%	124	16.5%	281	19.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

また、手術の内容について、記述式で145件の回答があり、白内障の手術（19件）と回答した者が最も多く、次いで大腸ポリープの切除手術（18件）、鼠径ヘルニア（5件）、ヘルニア（3件）、股関節手術（3件）、骨折（3件）となっている。


2.5.3 油症検診の受診について

この一年間の油症検診の受診についてみると、「はい」と回答した者は45.7%（男 46.3%、女 45.2%）であった。（表5-3-1、図5-3-1）

表5-3-1 この一年間に油症検診を受診したか

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	318	46.3%	339	45.2%	657	45.7%
いいえ	362	52.7%	402	53.6%	764	53.2%
未回答	7	1.0%	9	1.2%	16	1.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図5-3-1 この一年間に油症検診を受診したか




2.5.4 油症検診に関する案内を受けたか

油症検診を受診していない764人のうち、油症検診の案内を受けたという者は76.3%（男76.2%、女76.4%）であった。
 （表5-3-2、図5-3-2）

表5-3-2 油症検診の案内を受けたか

	男性(N=362)		女性(N=402)		計(N=764)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	276	76.2%	307	76.4%	583	76.3%
いいえ	73	20.2%	84	20.9%	157	20.5%
未回答	13	3.6%	11	2.7%	24	3.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	362	100.0%	402	100.0%	764	100.0%

図5-3-2 油症検診の案内を受けたか




2.5.5 油症検診に関する案内があれば受診するか

油症検診に関する案内を受けていない157人のうち、検診に関する案内があれば受診するか質問したところ「はい」と答えた者は36.9%（男39.7%、女34.5%）であった。（表5-3-2、図5-3-2）

表5-3-3 検診に関する案内があれば受診するか

	男性(N=73)		女性(N=84)		計(N=157)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	29	39.7%	29	34.5%	58	36.9%
いいえ	42	57.5%	53	63.1%	95	60.5%
未回答	2	2.7%	2	2.4%	4	2.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	73	100.0%	84	100.0%	157	100.0%

図5-3-3 検診に関する案内があれば受診するか



2.6 油症患者受療券（油証券）の使用状況について


2.6.1 油証券の保有状況

油証券を保有しているか質問したところ、「はい」と答えたのは63.3%（男61.3%、女65.1%）であった。（表6-1、図6-1）

表6-1 カネミ倉庫が発行している油身証券を持っていますか

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	421	61.3%	488	65.1%	909	63.3%
いいえ	261	38.0%	255	34.0%	516	35.9%
未回答	5	0.7%	7	0.9%	12	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図6-1 カネミ倉庫が発行している油身証券を持っていますか




2.6.2 油証券の使用について

油証券の使用についてみると、29.5%（男 30.4%、女 28.7%）の者が油証券を使用していた。（表6-2、図6-2）

表6-2 油証券を使用しているか

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	209	30.4%	215	28.7%	424	29.5%
いいえ	469	68.3%	518	69.1%	987	68.7%
未回答	9	1.3%	17	2.3%	26	1.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図6-2 油証券を使用しているか




2.6.3 油証券を使用せずに受診したことがあるか

この1年間、油証券を使用せずに受診したことがあるかを質問したところ、70.1%（男 67.1%、女 72.8%）の者が「はい」と回答した。（表6-3、図6-3）

表6-3 この1年間で、油証券を使用せずに受診したことがあるか

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	461	67.1%	546	72.8%	1007	70.1%
いいえ	208	30.3%	183	24.4%	391	27.2%
未回答	18	2.6%	21	2.8%	39	2.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

図6-3 この1年間で、油証券を使用せずに受診したことがあるか




この1年間、油証券を使用せずに受診したことがある1,007人に油証券の使用を希望する医療機関があるか質問したところ、263人(26.1%) (男121人(26.2%)、女142人(26.0%))が「はい」と回答した。(表6-4、図6-4)

表6-4 油証券の使用を希望する医療機関があるか

	男性(N=461)		女性(N=546)		計(N=1007)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	121	26.2%	142	26.0%	263	26.1%
いいえ	322	69.8%	375	68.7%	697	69.2%
未回答	18	3.9%	29	5.3%	47	4.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	461	100.0%	546	100.0%	1007	100.0%

図6-4 油証券の使用を希望する医療機関があるか



油証券の使用を希望する医療機関と受診頻度を質問したところ、354カ所(※)の回答があり、受診頻度は入院中が3.2%、毎週1回以上が7.0%、毎月1~3回程度が33.5%、数ヶ月に1回程度が36.0%、受診していないが8.6%、未回答が11.8%であった。(※一部、既に油証券が使用可能な医療機関を含む)

2.7 これまでにかかったことのある病気（今かかっている病気・症状も含む）について

2.7.1 悪性腫瘍（がん）について

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるかについてみると、10.4%（男 10.5%、女 10.4%）が「はい」と回答した。（表 7-1-1）

表 7-1-1 悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるか

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	72	10.5%	78	10.4%	150	10.4%
いいえ	607	88.4%	660	88.0%	1267	88.2%
未回答	8	1.2%	12	1.6%	20	1.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	750	100.0%	1437	100.0%

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあると回答した150 人に、具体的な病名を記述式で質問したところ、206 件の回答が寄せられた。大腸がん（26 件）が最も多く、次いで胃がん(22 件)、肺がん（16 件）、前立腺がん（15 件）、乳がん（15 件）等の順となっている。（表 7-1-2）

表 7-1-2 悪性腫瘍（がん）の種類と治療歴

	過去に治療したことがない	過去に治療したことがある	現在治療中	その他	治療歴未回答	計
大腸がん	3	13	7	2	1	26
胃がん	1	10	8	1	2	22
肺がん	0	7	6	3	0	16
前立腺がん	0	5	9	0	1	15
乳がん	0	8	7	0	0	15
その他	5	51	34	5	2	97

2.7.2 脳・精神・神経の病気・症状について

脳・精神・神経の病気について、これまでにかかったことがある病気をみると、男女ともに「頭痛」と回答した者が最も多く46.8%（男 35.8%、女 56.9%）であった。次いで、「もの忘れ」が28.3%（男 25.9%、女 30.5%）、「頭重」が24.3%（男 18.6%、女 29.5%）等の順となっている。（表7-2-1）

表7-2-1 脳・精神・神経の病気・症状
これまでにかかったことのあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳腫瘍	1	0.1%	6	0.8%	7	0.5%
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	12	1.7%	15	2.0%	27	1.9%
脳梗塞	51	7.4%	38	5.1%	89	6.2%
頭痛	246	35.8%	427	56.9%	673	46.8%
頭重	128	18.6%	221	29.5%	349	24.3%
神経痛	147	21.4%	194	25.9%	341	23.7%
知的障害	1	0.1%	7	0.9%	8	0.6%
躁うつ病	38	5.5%	65	8.7%	103	7.2%
統合失調症	13	1.9%	20	2.7%	33	2.3%
幻覚	16	2.3%	35	4.7%	51	3.5%
認知症	25	3.6%	58	7.7%	83	5.8%
もの忘れ	178	25.9%	229	30.5%	407	28.3%
かっとなりやすい・短気	114	16.6%	90	12.0%	204	14.2%
その他	28	4.1%	43	5.7%	71	4.9%
病気・症状は特にない	216	31.4%	126	16.8%	342	23.8%
未回答	54	7.9%	55	7.3%	109	7.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

脳・精神・神経の病気について、医師の診断をうけたことがある病気をみると、男女とも「頭痛」と回答した者が最も多く10.8%（男 6.8%、女 14.4%）であった。次いで「神経痛」が7.9%（男 6.6%、女 9.1%）、「脳梗塞」が4.5%（男 5.4%、女 3.7%）等の順番となっている。（表7-2-2）

表7-2-2 脳・精神・神経の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳腫瘍	1	0.1%	5	0.7%	6	0.4%
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	8	1.2%	11	1.5%	19	1.3%
脳梗塞	37	5.4%	28	3.7%	65	4.5%
頭痛	47	6.8%	108	14.4%	155	10.8%
頭重	20	2.9%	39	5.2%	59	4.1%
神経痛	45	6.6%	68	9.1%	113	7.9%
知的障害	1	0.1%	3	0.4%	4	0.3%
躁うつ病	19	2.8%	30	4.0%	49	3.4%
統合失調症	11	1.6%	13	1.7%	24	1.7%
幻覚	4	0.6%	11	1.5%	15	1.0%
認知症	11	1.6%	35	4.7%	46	3.2%
もの忘れ	10	1.5%	18	2.4%	28	1.9%
かっとなりやすい・短気	3	0.4%	5	0.7%	8	0.6%
その他	11	1.6%	20	2.7%	31	2.2%
病気・症状は特にない	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.3 自律神経系の病気・症状について

自律神経系の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男女とも「不眠」が最も多く29.3%（男 19.8%、女 38.0%）であった。次いで、「自律神経失調症」が17.7%（男 10.0%、女 24.8%）、「起立性低血圧」が14.0%（男 10.5%、女 17.2%）等の順となっている。（表7-3-1）

表7-3-1 自律神経系の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	72	10.5%	129	17.2%	201	14.0%
過敏性腸症候群	65	9.5%	98	13.1%	163	11.3%
多汗症	42	6.1%	67	8.9%	109	7.6%
汗が出にくい	24	3.5%	43	5.7%	67	4.7%
不眠	136	19.8%	285	38.0%	421	29.3%
不安神経症	40	5.8%	80	10.7%	120	8.4%
自律神経失調症	69	10.0%	186	24.8%	255	17.7%
その他	12	1.7%	13	1.7%	25	1.7%
病気・症状は特にない	337	49.1%	225	30.0%	562	39.1%
未回答	78	11.4%	72	9.6%	150	10.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

自律神経系の病気・症状について、医師の診断をうけたことがある病気をみると、男女とも「不眠」が最も多く9.7%（男 5.2%、女 13.9%）であった。次いで「自律神経失調症」が8.5%（男 3.8%、女 12.8%）、「過敏性腸症候群」が3.5%（男 2.8%、女 4.3%）等の順番となっている。（表7-3-2）

表7-3-2 自律神経系の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	10	1.5%	30	4.0%	40	2.8%
過敏性腸症候群	19	2.8%	32	4.3%	51	3.5%
多汗症	4	0.6%	4	0.5%	8	0.6%
汗が出にくい	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%
不眠	36	5.2%	104	13.9%	140	9.7%
不安神経症	15	2.2%	29	3.9%	44	3.1%
自律神経失調症	26	3.8%	96	12.8%	122	8.5%
その他	1	0.1%	3	0.4%	4	0.3%
病気・症状は特にない	2	0.3%	0	0.0%	2	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.4 眼の病気・症状について

眼の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男女とも「乱視」が最も多く32.2%（男 32.0%、女 32.4%）、次いで「近視」が32.1%（男 33.3%、女 30.9%）、「眼脂過多」が27.3%（男 25.3%、女 29.1%）等の順となっている。（表7-4-1）

表7-4-1 眼の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多	174	25.3%	218	29.1%	392	27.3%
瞼板線からのチーズ様分泌物	50	7.3%	63	8.4%	113	7.9%
結膜(白目)の色素沈着	28	4.1%	57	7.6%	85	5.9%
白内障	134	19.5%	214	28.5%	348	24.2%
緑内障	29	4.2%	42	5.6%	71	4.9%
近視	229	33.3%	232	30.9%	461	32.1%
遠視	137	19.9%	159	21.2%	296	20.6%
乱視	220	32.0%	243	32.4%	463	32.2%
弱視	17	2.5%	35	4.7%	52	3.6%
その他	88	12.8%	97	12.9%	185	12.9%
病気・症状は特にない	130	18.9%	101	13.5%	231	16.1%
未回答	30	4.4%	40	5.3%	70	4.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

眼の病気・症状について、医師の診断をうけたことがある病気をみると、男女とも「白内障」が最も多く16.5%（男 13.0%、女 19.7%）、次いで「乱視」10.2%（男 7.0%、女 13.1%）、「近視」10.0%（男 6.3%、女 13.3%）等の順となっている。（表7-4-2）

表7-4-2 眼の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多	46	6.7%	66	8.8%	112	7.8%
瞼板線からのチーズ様分泌物	19	2.8%	20	2.7%	39	2.7%
結膜(白目)の色素沈着	8	1.2%	19	2.5%	27	1.9%
白内障	89	13.0%	148	19.7%	237	16.5%
緑内障	24	3.5%	28	3.7%	52	3.6%
近視	43	6.3%	100	13.3%	143	10.0%
遠視	14	2.0%	47	6.3%	61	4.2%
乱視	48	7.0%	98	13.1%	146	10.2%
弱視	1	0.1%	9	1.2%	10	0.7%
その他	49	7.1%	51	6.8%	100	7.0%
病気・症状は特にない	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.5 口の中の病気・症状について

口の中の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「虫歯になりやすい」が最も多く42.7%（男 42.6%、女 42.8%）、次いで「歯周病」が42.5%（男 44.0%、女 41.2%）、「口内炎になりやすい」が35.8%（男 29.7%、女 41.3%）等の順となっている。（表7-5-1）

表7-5-1 口の中の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
舌がん	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
歯牙形成不全	9	1.3%	8	1.1%	17	1.2%
歯周病	302	44.0%	309	41.2%	611	42.5%
歯肉炎	166	24.2%	219	29.2%	385	26.8%
顎関節症	35	5.1%	84	11.2%	119	8.3%
味覚異常	24	3.5%	38	5.1%	62	4.3%
歯肉の色素沈着	80	11.6%	120	16.0%	200	13.9%
口内炎になりやすい	204	29.7%	310	41.3%	514	35.8%
虫歯になりやすい	293	42.6%	321	42.8%	614	42.7%
歯の知覚過敏	178	25.9%	284	37.9%	462	32.2%
永久歯を早期に失った	96	14.0%	128	17.1%	224	15.6%
その他	24	3.5%	34	4.5%	58	4.0%
病気・症状は特にならない	108	15.7%	91	12.1%	199	13.8%
未回答	31	4.5%	19	2.5%	50	3.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

口の中の病気・症状について、医師の診断をうけたことがある病気をみると、「歯周病」が最も多く19.1%（男 17.6%、女 20.5%）、次いで「虫歯になりやすい」が16.0%（男 15.0%、女 16.9%）、「歯肉炎」が10.0%（男 8.2%、女 11.6%）等の順となっている。（表7-5-2）

表7-5-2 口の中の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
舌がん	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歯牙形成不全	3	0.4%	2	0.3%	5	0.3%
歯周病	121	17.6%	154	20.5%	275	19.1%
歯肉炎	56	8.2%	87	11.6%	143	10.0%
顎関節症	14	2.0%	45	6.0%	59	4.1%
味覚異常	3	0.4%	8	1.1%	11	0.8%
歯肉の色素沈着	15	2.2%	33	4.4%	48	3.3%
口内炎になりやすい	32	4.7%	88	11.7%	120	8.4%
虫歯になりやすい	103	15.0%	127	16.9%	230	16.0%
歯の知覚過敏	38	5.5%	85	11.3%	123	8.6%
永久歯を早期に失った	32	4.7%	46	6.1%	78	5.4%
その他	11	1.6%	14	1.9%	25	1.7%
病気・症状は特にならない	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.6 耳・鼻の病気・症状について

耳・鼻の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「めまい」が最も多く35.3%（男 25.5%、女 44.3%）であった。次いで、「鼻炎を起こしやすい」が25.8%（男 23.7%、女 27.7%）、「中耳炎」が19.3%（男 18.2%、女 20.4%）等の順となっている。（表7-6-1）

表7-6-1 耳・鼻の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	53	7.7%	124	16.5%	177	12.3%
めまい	175	25.5%	332	44.3%	507	35.3%
中耳炎	125	18.2%	153	20.4%	278	19.3%
真珠腫性中耳炎	15	2.2%	15	2.0%	30	2.1%
鼻炎を起こしやすい	163	23.7%	208	27.7%	371	25.8%
難聴	147	21.4%	111	14.8%	258	18.0%
蓄膿症	101	14.7%	105	14.0%	206	14.3%
鼻血がよく出る	80	11.6%	78	10.4%	158	11.0%
鼻血が止まりにくい	18	2.6%	26	3.5%	44	3.1%
その他	34	4.9%	34	4.5%	68	4.7%
病気・症状はとくにない	178	25.9%	138	18.4%	316	22.0%
未回答	28	4.1%	28	3.7%	56	3.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

耳・鼻の病気・症状について、医師の診断を受けたことがある病気をみると、「中耳炎」が最も多く11.5%（男 10.2%、女 12.7%）であった。次いで、「めまい」が10.5%（男 5.4%、女 15.2%）、「鼻炎を起こしやすい」が8.1%（男 6.3%、女 9.9%）等の順となっている。（表7-6-2）

表7-6-2 耳・鼻の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	30	4.4%	75	10.0%	105	7.3%
めまい	37	5.4%	114	15.2%	151	10.5%
中耳炎	70	10.2%	95	12.7%	165	11.5%
真珠腫性中耳炎	11	1.6%	9	1.2%	20	1.4%
鼻炎を起こしやすい	43	6.3%	74	9.9%	117	8.1%
難聴	47	6.8%	51	6.8%	98	6.8%
蓄膿症	51	7.4%	63	8.4%	114	7.9%
鼻血がよく出る	6	0.9%	12	1.6%	18	1.3%
鼻血が止まりにくい	1	0.1%	6	0.8%	7	0.5%
その他	10	1.5%	13	1.7%	23	1.6%
病気・症状はとくにない	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.7 甲状腺の病気・症状について

甲状腺の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「甲状腺機能低下」が最も多く4.7%（男 1.0%、女 8.0%）であった。次いで、「甲状腺腫」が2.4%（男 0.6%、女 4.0%）等の順となっている。（表7-7-1）

表7-7-1 甲状腺の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺がん	1	0.1%	8	1.1%	9	0.6%
甲状腺腫	4	0.6%	30	4.0%	34	2.4%
慢性甲状腺炎	3	0.4%	10	1.3%	13	0.9%
バセドウ病	3	0.4%	19	2.5%	22	1.5%
甲状腺機能低下	7	1.0%	60	8.0%	67	4.7%
その他	6	0.9%	21	2.8%	27	1.9%
病気・症状はとくにない	566	82.4%	516	68.8%	1082	75.3%
未回答	100	14.6%	105	14.0%	205	14.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

甲状腺の病気・症状について、医師の診断をうけたことがある病気をみると、「甲状腺機能低下」が最も多く3.0%（男 0.3%、女 5.5%）であった。次いで、「甲状腺腫」が1.4%（男 0.3%、女 2.4%）、「バセドウ病」が1.3%（男 0.3%、女 2.1%）等の順となっている。（表7-7-2）

表7-7-2 甲状腺の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺がん	1	0.1%	6	0.8%	7	0.5%
甲状腺腫	2	0.3%	18	2.4%	20	1.4%
慢性甲状腺炎	1	0.1%	5	0.7%	6	0.4%
バセドウ病	2	0.3%	16	2.1%	18	1.3%
甲状腺機能低下	2	0.3%	41	5.5%	43	3.0%
その他	0	0.0%	8	1.1%	8	0.6%
病気・症状はとくにない	2	0.3%	4	0.5%	6	0.4%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.8 のど・気管支・肺の病気・症状について

のど・気管支・肺の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「せき」が最も多く46.7%（男 45.7%、女 47.6%）であった。次いで、「たん」が41.2%（男 42.1%、女 40.4%）、「風邪をひきやすい」が36.4%（男 33.8%、女 38.8%）等の順となっている。（表7-8-1）

表7-8-1 のど・気管支・肺の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺がん	10	1.5%	9	1.2%	19	1.3%
肺線維症	2	0.3%	4	0.5%	6	0.4%
無気肺	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%
肺水腫	3	0.4%	7	0.9%	10	0.7%
肺気腫	36	5.2%	3	0.4%	39	2.7%
肺炎	77	11.2%	77	10.3%	154	10.7%
慢性気管支炎	49	7.1%	79	10.5%	128	8.9%
嚔声	57	8.3%	108	14.4%	165	11.5%
呼吸困難	37	5.4%	70	9.3%	107	7.4%
息切れ	179	26.1%	171	22.8%	350	24.4%
風邪をひきやすい	232	33.8%	291	38.8%	523	36.4%
風邪が治りにくい	120	17.5%	224	29.9%	344	23.9%
せき	314	45.7%	357	47.6%	671	46.7%
たん	289	42.1%	303	40.4%	592	41.2%
その他	29	4.2%	29	3.9%	58	4.0%
病気・症状はとくにない	155	22.6%	169	22.5%	324	22.5%
未回答	33	4.8%	30	4.0%	63	4.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

のど・気管支・肺の病気・症状について、医師の診断を受けたことがある病気をみると、「風邪をひきやすい」が最も多く10.6%（男 8.3%、女 12.7%）であった。次いで、「せき」が10.4%（男 7.1%、女 13.3%）、「たん」が8.1%（男 6.4%、女 9.7%）等の順となっている。（表7-8-2）

表7-8-2 のど・気管支・肺の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺がん	8	1.2%	8	1.1%	16	1.1%
肺線維症	2	0.3%	2	0.3%	4	0.3%
無気肺	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
肺水腫	3	0.4%	5	0.7%	8	0.6%
肺気腫	12	1.7%	2	0.3%	14	1.0%
肺炎	53	7.7%	56	7.5%	109	7.6%
慢性気管支炎	29	4.2%	51	6.8%	80	5.6%
嚔声	6	0.9%	12	1.6%	18	1.3%
呼吸困難	14	2.0%	24	3.2%	38	2.6%
息切れ	19	2.8%	24	3.2%	43	3.0%
風邪をひきやすい	57	8.3%	95	12.7%	152	10.6%
風邪が治りにくい	24	3.5%	68	9.1%	92	6.4%
せき	49	7.1%	100	13.3%	149	10.4%
たん	44	6.4%	73	9.7%	117	8.1%
その他	13	1.9%	15	2.0%	28	1.9%
病気・症状はとくにない	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.9 心臓の病気・症状について

心臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「不整脈」が最も多く21.6%（男 21.7%、女 21.6%）であった。次いで、「動悸」が21.1%（男 14.3%、女 27.3%）、「狭心症」が7.4%（男 6.4%、女 8.4%）等の順となっている。（表7-9-1）

表7-9-1 心臓の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	20	2.9%	14	1.9%	34	2.4%
狭心症	44	6.4%	63	8.4%	107	7.4%
心不全	10	1.5%	30	4.0%	40	2.8%
心肥大	34	4.9%	57	7.6%	91	6.3%
不整脈	149	21.7%	162	21.6%	311	21.6%
頻脈	25	3.6%	50	6.7%	75	5.2%
動悸	98	14.3%	205	27.3%	303	21.1%
その他	16	2.3%	22	2.9%	38	2.6%
病気・症状はとくにない	357	52.0%	339	45.2%	696	48.4%
未回答	63	9.2%	65	8.7%	128	8.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

心臓の病気・症状について、医師の診断を受けたことがある病気をみると、「不整脈」が最も多く12.1%（男 10.8%、女 13.3%）であった。次いで、「動悸」が6.9%（男 3.1%、女 10.4%）、「狭心症」が5.8%（男 5.2%、女 6.3%）等の順となっている。（表7-9-2）

表7-9-2 心臓の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）


	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	17	2.5%	10	1.3%	27	1.9%
狭心症	36	5.2%	47	6.3%	83	5.8%
心不全	6	0.9%	20	2.7%	26	1.8%
心肥大	18	2.6%	39	5.2%	57	4.0%
不整脈	74	10.8%	100	13.3%	174	12.1%
頻脈	10	1.5%	30	4.0%	40	2.8%
動悸	21	3.1%	78	10.4%	99	6.9%
その他	6	0.9%	14	1.9%	20	1.4%
病気・症状はとくにない	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

心臓の病気にかかったことがあると回答した613人について、過去・現在の治療状況について質問したところ、「過去に治療したことがある」と回答した者は14.4%（男 13.9%、女 14.7%）、「現在治療中」と回答した者は24.8%（男 24.3%、女 25.1%）であった。（表7-9-2、図7-9-2）

表7-9-3 心臓の病気・症状 過去・現在の治療状況

	男性(N=267)		女性(N=346)		計(N=613)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
過去に治療したことがない	112	41.9%	109	31.5%	221	36.1%
過去に治療したことがある	37	13.9%	51	14.7%	88	14.4%
現在治療中	65	24.3%	87	25.1%	152	24.8%
その他	10	3.7%	14	4.0%	24	3.9%
未回答	43	16.1%	85	24.6%	128	20.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	267	100.0%	346	100.0%	613	100.0%

図7-9-3 心臓の病気・症状 過去・現在の治療状況




現在治療中と回答した152人について、治療方法についてみると、男女ともに「内服薬」が最も多く94.7%（男 90.8%、女 97.7%）であった。（表7-9-3、図7-9-3）

表7-9-4 心臓の病気・症状 治療方法

	男性(N=65)		女性(N=87)		計(N=152)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	6	9.2%	5	5.7%	11	7.2%
内服薬	59	90.8%	85	97.7%	144	94.7%
注射薬	3	4.6%	0	0.0%	3	2.0%
その他	5	7.7%	2	2.3%	7	4.6%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図7-9-4 心臓の病気・症状 治療方法



2.7.10 高血圧や血管の病気・症状について

高血圧や血管の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「高血圧」が最も多く41.2%（男 42.8%、女 39.7%）であった。次いで、「低血圧」が10.0%（男 5.1%、女 14.4%）、「動脈硬化」5.3%（男 4.2%、女 6.3%）等の順となっている。（表7-10-1）

表7-10-1 高血圧や血管の病気・症状

かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1,437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	294	42.8%	298	39.7%	592	41.2%
低血圧	35	5.1%	108	14.4%	143	10.0%
動脈硬化	29	4.2%	47	6.3%	76	5.3%
動脈瘤	16	2.3%	24	3.2%	40	2.8%
静脈炎	5	0.7%	12	1.6%	17	1.2%
静脈瘤	8	1.2%	42	5.6%	50	3.5%
その他	5	0.7%	11	1.5%	16	1.1%
病気・症状はとくにない	295	42.9%	249	33.2%	544	37.9%
未回答	48	7.0%	52	6.9%	100	7.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

高血圧や血管の病気・症状について、医師の診断を受けたことがある病気をみると、「高血圧」が最も多く28.1%（男 28.2%、女 28.0%）であった。次いで「動脈硬化」2.9%（男 2.3%、女 3.5%）、「低血圧」が2.8%（男 1.5%、女 4.0%）等の順となっている。（表7-10-2）

表7-10-2 高血圧や血管の病気・症状

医師の診断を受けたもの（複数回答）


	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	194	28.2%	210	28.0%	404	28.1%
低血圧	10	1.5%	30	4.0%	40	2.8%
動脈硬化	16	2.3%	26	3.5%	42	2.9%
動脈瘤	7	1.0%	11	1.5%	18	1.3%
静脈炎	1	0.1%	3	0.4%	4	0.3%
静脈瘤	4	0.6%	14	1.9%	18	1.3%
その他	2	0.3%	4	0.5%	6	0.4%
病気・症状はとくにない	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

高血圧にかかったことがあると回答した592人について、過去・現在の治療状況について質問したところ、「過去に治療したことがある」と回答した者は7.8%（男 6.5%、女 9.1%）、「現在治療中」と回答した者は79.6%（男 78.9%、女 80.2%）であった。（表7-10-3、図7-10-3）

表7-10-3 高血圧 過去・現在の治療状況

	男性(N=294)		女性(N=298)		計(N=592)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
過去に治療したことがない	38	12.9%	25	8.4%	63	10.6%
過去に治療したことがある	19	6.5%	27	9.1%	46	7.8%
現在治療中	232	78.9%	239	80.2%	471	79.6%
その他	1	0.3%	3	1.0%	4	0.7%
未回答	4	1.4%	4	1.3%	8	1.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	294	100.0%	298	100.0%	592	100.0%

図7-10-3 高血圧 過去・現在の治療状況




現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男 女 ともに「内服薬」が最も多く98.3%（男 98.3%、女 98.3%）であった。（表7-10-4、図7-10-4）

表7-10-4 高血圧 治療方法

	男性(N=232)		女性(N=239)		計(N=471)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	11	4.7%	21	8.8%	32	6.8%
内服薬	228	98.3%	235	98.3%	463	98.3%
その他	3	1.3%	3	1.3%	6	1.3%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図7-10-4 高血圧 治療方法



2.7.11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「肝機能障害」が最も多く10.4%（男 13.1%、女 8.0%）あった。次いで、「胆石症」が7.9%（男 9.3%、女 6.5%）、「その他」3.9%（男 3.6%、女 4.1%）等の順となっている。（表7-11-1）

表7-11-1 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肝臓がん	5	0.7%	1	0.1%	6	0.4%
胆のうがん	2	0.3%	1	0.1%	3	0.2%
B型肝炎	16	2.3%	22	2.9%	38	2.6%
C型肝炎	9	1.3%	20	2.7%	29	2.0%
肝機能障害	90	13.1%	60	8.0%	150	10.4%
胆のう炎	15	2.2%	24	3.2%	39	2.7%
胆石症	64	9.3%	49	6.5%	113	7.9%
黄疸	25	3.6%	20	2.7%	45	3.1%
脾腫	2	0.3%	6	0.8%	8	0.6%
その他	25	3.6%	31	4.1%	56	3.9%
病気・症状はとくにない	431	62.7%	488	65.1%	919	64.0%
未回答	59	8.6%	84	11.2%	143	10.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について、医師の診断を受けたことがある病気をみると、「肝機能障害」が最も多く6.0%（男 6.4%、女 5.6%）であった。次いで、「胆石症」が5.4%（男 5.8%、女 4.9%）、「B型肝炎」1.9%（男 1.7%、女 2.0%）等の順となっている。（表7-11-2）

表7-11-2 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肝臓がん	3	0.4%	1	0.1%	4	0.3%
胆のうがん	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
B型肝炎	12	1.7%	15	2.0%	27	1.9%
C型肝炎	4	0.6%	13	1.7%	17	1.2%
肝機能障害	44	6.4%	42	5.6%	86	6.0%
胆のう炎	7	1.0%	18	2.4%	25	1.7%
胆石症	40	5.8%	37	4.9%	77	5.4%
黄疸	17	2.5%	6	0.8%	23	1.6%
脾腫	0	0.0%	2	0.3%	2	0.1%
その他	11	1.6%	14	1.9%	25	1.7%
病気・症状はとくにない	2	0.3%	3	0.4%	5	0.3%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.12 すい臓の病気・症状について

すい臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「糖尿病」が最も多く11.1%（男 14.1%、女 8.3%）であった。次いで、「すい炎」2.6%（男 1.3%、女 3.9%）、「すい臓がん」0.3%（男 0.4%、女 0.1%）等の順となっている。（表7-12-1）

表7-12-1 すい臓の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい臓がん	3	0.4%	1	0.1%	4	0.3%
すい炎	9	1.3%	29	3.9%	38	2.6%
糖尿病	97	14.1%	62	8.3%	159	11.1%
その他	8	1.2%	7	0.9%	15	1.0%
病気・症状はとくにない	495	72.1%	562	74.9%	1057	73.6%
未回答	81	11.8%	96	12.8%	177	12.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

すい臓の病気・症状について、医師の診断をうけたことがある病気をみると、「糖尿病」が最も多く7.2%（男 8.6%、女 5.9%）であった。次いで、「すい炎」が1.7%（男 0.9%、女 2.5%）等の順となっている。（表7-12-2）

表7-12-2 すい臓の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）


	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい臓がん	2	0.3%	1	0.1%	3	0.2%
すい炎	6	0.9%	19	2.5%	25	1.7%
糖尿病	59	8.6%	44	5.9%	103	7.2%
その他	2	0.3%	3	0.4%	5	0.3%
病気・症状はとくにない	2	0.3%	3	0.4%	5	0.3%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

糖尿病にかかったことがあると回答した159人について、過去・現在の治療状況について質問したところ、「過去に治療したことがある」と回答した者は6.9%（男 6.2%、女 8.1%）、「現在治療中」と回答した者は86.2%（男 84.5%、女 88.7%）であった。（表7-12-3、図7-12-3）

図7-12-3 糖尿病 過去・現在の治療状況

	男性(N=97)		女性(N=62)		計(N=159)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
過去に治療したことがない	6	6.2%	1	1.6%	7	4.4%
過去に治療したことがある	6	6.2%	5	8.1%	11	6.9%
現在治療中	82	84.5%	55	88.7%	137	86.2%
その他	3	3.1%	0	0.0%	3	1.9%
未回答	0	0.0%	1	1.6%	1	0.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	97	100.0%	62	100.0%	159	100.0%

図7-12-3 糖尿病 過去・現在の治療状況




現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男女ともに「内服薬」が最も多く90.5%（男 91.5%、女 89.1%）であった。（表7-12-4）

表7-12-4 糖尿病 治療方法

	男性(N=82)		女性(N=55)		計(N=137)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	11	13.4%	13	23.6%	24	17.5%
内服薬	75	91.5%	49	89.1%	124	90.5%
インスリン	12	14.6%	7	12.7%	19	13.9%
その他	1	1.2%	1	1.8%	2	1.5%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図7-12-4 糖尿病 治療方法



2.7.13 腎臓・膀胱の病気・症状について

腎臓・膀胱の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「膀胱炎」が最も多く21.7%（男 4.5%、女 37.5%）であった。次いで、「血尿」が12.1%（男 8.4%、女 15.5%）、「蛋白尿」9.1%（男 7.9%、女 10.3%）等の順となっている。（表7-13-1）

表7-13-1 腎臓・膀胱の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎がん	5	0.7%	2	0.3%	7	0.5%
膀胱がん	10	1.5%	2	0.3%	12	0.8%
腎炎	22	3.2%	57	7.6%	79	5.5%
膀胱炎	31	4.5%	281	37.5%	312	21.7%
腎結石	36	5.2%	15	2.0%	51	3.5%
尿管結石	74	10.8%	22	2.9%	96	6.7%
膀胱結石	16	2.3%	6	0.8%	22	1.5%
血尿	58	8.4%	116	15.5%	174	12.1%
蛋白尿	54	7.9%	77	10.3%	131	9.1%
その他	24	3.5%	28	3.7%	52	3.6%
病気・症状はとくにない	409	59.5%	302	40.3%	711	49.5%
未回答	61	8.9%	62	8.3%	123	8.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

腎臓・膀胱の病気・症状について、医師の診断をうけたことがある病気をみると、「膀胱炎」が最も多く16.0%（男 3.1%、女 27.9%）であった。次いで、「血尿」が7.1%（男 4.5%、女 9.5%）、「尿管結石」4.6%（男 7.1%、女 2.3%）等の順となっている。（表7-13-2）

表7-13-2 腎臓・膀胱の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎がん	4	0.6%	1	0.1%	5	0.3%
膀胱がん	8	1.2%	2	0.3%	10	0.7%
腎炎	18	2.6%	40	5.3%	58	4.0%
膀胱炎	21	3.1%	209	27.9%	230	16.0%
腎結石	23	3.3%	12	1.6%	35	2.4%
尿管結石	49	7.1%	17	2.3%	66	4.6%
膀胱結石	8	1.2%	4	0.5%	12	0.8%
血尿	31	4.5%	71	9.5%	102	7.1%
蛋白尿	24	3.5%	41	5.5%	65	4.5%
その他	5	0.7%	14	1.9%	19	1.3%
病気・症状はとくにない	3	0.4%	1	0.1%	4	0.3%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状について

食道・胃・腸・肛門の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「便秘」が最も多く43.1%（男 33.8%、女 51.6%）であった。次いで、「下痢」が38.9%（男 41.0%、女 36.9%）、「腹痛」32.5%（男 29.4%、女 35.3%）等の順となっている。（表7-14-1）

表7-14-1 食道・胃・腸・肛門の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食道がん	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%
胃がん	16	2.3%	8	1.1%	24	1.7%
大腸がん	20	2.9%	14	1.9%	34	2.4%
大腸ポリープ	123	17.9%	86	11.5%	209	14.5%
慢性胃炎	70	10.2%	120	16.0%	190	13.2%
胃潰瘍	139	20.2%	81	10.8%	220	15.3%
十二指腸潰瘍	99	14.4%	40	5.3%	139	9.7%
下痢	282	41.0%	277	36.9%	559	38.9%
便秘	232	33.8%	387	51.6%	619	43.1%
腹部膨満感	115	16.7%	178	23.7%	293	20.4%
痔疾	215	31.3%	186	24.8%	401	27.9%
腹痛	202	29.4%	265	35.3%	467	32.5%
その他	24	3.5%	41	5.5%	65	4.5%
病気・症状はとくにない	127	18.5%	117	15.6%	244	17.0%
未回答	33	4.8%	39	5.2%	72	5.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

食道・胃・腸・肛門の病気・症状について、医師の診断を受けたことがある病気をみると、「胃潰瘍」が最も多く10.4%（男 13.8%、女 7.3%）であった。次いで、「大腸ポリープ」が10.3%（男 12.7%、女 8.1%）、「痔疾」9.7%（男 10.2%、女 9.3%）等の順となっている。（表7-14-2）

表7-14-2 食道・胃・腸・肛門の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食道がん	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
胃がん	11	1.6%	8	1.1%	19	1.3%
大腸がん	12	1.7%	12	1.6%	24	1.7%
大腸ポリープ	87	12.7%	61	8.1%	148	10.3%
慢性胃炎	46	6.7%	76	10.1%	122	8.5%
胃潰瘍	95	13.8%	55	7.3%	150	10.4%
十二指腸潰瘍	61	8.9%	28	3.7%	89	6.2%
下痢	39	5.7%	63	8.4%	102	7.1%
便秘	39	5.7%	100	13.3%	139	9.7%
腹部膨満感	15	2.2%	38	5.1%	53	3.7%
痔疾	70	10.2%	70	9.3%	140	9.7%
腹痛	36	5.2%	65	8.7%	101	7.0%
その他	16	2.3%	22	2.9%	38	2.6%
病気・症状はとくにない	2	0.3%	0	0.0%	2	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.15 血液・リンパの病気・症状について

血液・リンパの病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「貧血」が最も多く21.0%（男 10.9%、女 30.3%）であった。次いで、「脂質異常症」が18.7%（男 17.3%、女 20.0%）、「リンパ節の腫大」2.6%（男 1.6%、女 3.5%）等の順となっている。（表7-15-1）

表7-15-1 血液・リンパの病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
白血病	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
悪性リンパ腫	4	0.6%	5	0.7%	9	0.6%
脂質異常症	119	17.3%	150	20.0%	269	18.7%
貧血	75	10.9%	227	30.3%	302	21.0%
リンパ節の腫大	11	1.6%	26	3.5%	37	2.6%
その他	4	0.6%	9	1.2%	13	0.9%
病気・症状はとくにない	423	61.6%	325	43.3%	748	52.1%
未回答	72	10.5%	81	10.8%	153	10.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

血液・リンパの病気・症状について、医師の診断を受けたことがある病気をみると、「脂質異常症」が最も多く12.2%（男 9.9%、女 14.3%）であった。次いで、「貧血」が9.2%（男 3.2%、女 14.7%）、「リンパ節の腫大」1.3%（男 1.2%、女 1.5%）等の順となっている。（表7-15-2）

表7-15-2 血液・リンパの病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）


	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
白血病	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
悪性リンパ腫	3	0.4%	2	0.3%	5	0.3%
脂質異常症	68	9.9%	107	14.3%	175	12.2%
貧血	22	3.2%	110	14.7%	132	9.2%
リンパ節の腫大	8	1.2%	11	1.5%	19	1.3%
その他	4	0.6%	5	0.7%	9	0.6%
病気・症状はとくにない	2	0.3%	3	0.4%	5	0.3%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

脂質異常症にかかったことがあると回答した269人について、過去・現在の治療状況について質問したところ、「過去に治療したことがある」と回答した者は13.0%（男 11.8%、女 14.0%）、「現在治療中」と回答した者は58.4%（男 56.3%、女 60.0%）であった。（表7-15-3、図7-15-3）

表7-15-3 脂質異常症（高脂血症） 過去・現在の治療状況

	男性(N=119)		女性(N=150)		計(N=269)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
過去に治療したことがない	36	30.3%	34	22.7%	70	26.0%
過去に治療したことがある	14	11.8%	21	14.0%	35	13.0%
現在治療中	67	56.3%	90	60.0%	157	58.4%
その他	1	0.8%	4	2.7%	5	1.9%
未回答	1	0.8%	1	0.7%	2	0.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	119	100.0%	150	100.0%	269	100.0%

図7-15-3 脂質異常症（高脂血症） 過去・現在の治療状況




現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男 女 ともに「内服薬」が最も多く93.0%（男 95.5%、女 91.1%）であった。（表7-15-4、図7-15-4）

表7-15-4 脂質異常症（高脂血症） 治療方法

	男性(N=67)		女性(N=90)		計(N=157)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	4	6.0%	12	13.3%	16	10.2%
内服薬	64	95.5%	82	91.1%	146	93.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図7-15-4 脂質異常症（高脂血症） 治療方法



2.7.16 前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状について（男性のみ）

男性がこれまでにかかったことがある前立腺・男性機能に関する病気・症状をみると、「前立腺肥大」が最も多く11.8%であった。次いで、「インポテンツ」が4.8%、「前立腺がん」2.9%等の順となっている。（表7-16-1）

表7-16-1 前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状
かかったことがあるもの(複数回答)

	男性(N=687)	
	件数	割合
前立腺がん	20	2.9%
前立腺肥大	81	11.8%
男性不妊	6	0.9%
インポテンツ	33	4.8%
その他	22	3.2%
病気・症状はとくにない	463	67.4%
未回答	76	11.1%
不詳	0	0.0%

男性が医師の診断を受けたことがある前立腺・男性機能に関する病気・症状をみると、「前立腺肥大」が最も多く8.0%であった。次いで、「前立腺がん」が2.3%、「その他」1.0%等の順となっている。（表7-16-2）

表7-16-2 前立腺・男性昨日に関する病気の病気・症状
医師の診断を受けたもの(複数回答)

	男性(N=687)	
	件数	割合
前立腺がん	16	2.3%
前立腺肥大	55	8.0%
男性不妊	3	0.4%
インポテンツ	3	0.4%
その他	7	1.0%
病気・症状はとくにない	2	0.3%
未回答	0	0.0%
不詳	0	0.0%

2.7.17 子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について（女性のみ）

女性がこれまでかかったことがある子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状をみると、「子宮筋腫」が最も多く18.3%であった。次いで「月経困難症」が17.7%、「月経不順」が14.7%等の順となっている。（表7-17-1）

表7-17-1 子宮・卵巣・婦人科系の病気
かかったことがあるもの（複数回答）

	女性(N=750)	
	件数	割合
子宮がん	16	2.1%
卵巣がん	8	1.1%
乳がん	18	2.4%
子宮内膜症	61	8.1%
子宮筋腫	137	18.3%
卵巣のう腫	41	5.5%
月経困難症	133	17.7%
不正出血	79	10.5%
月経不順	110	14.7%
過多月経	101	13.5%
過少月経	28	3.7%
その他	38	5.1%
病気・症状はとくにない	286	38.1%
未回答	82	10.9%
不詳	0	0.0%

女性が医師の診断をうけたことがある子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状をみると、「子宮筋腫」が最も多く14.4%であった。次いで「子宮内膜症」が6.5%、「不正出血」が6.0%等の順となっている。（表7-17-2）

表7-17-2 子宮・卵巣・婦人科系の病気
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	女性(N=750)	
	件数	割合
子宮がん	11	1.5%
卵巣がん	5	0.7%
乳がん	14	1.9%
子宮内膜症	49	6.5%
子宮筋腫	108	14.4%
卵巣のう腫	34	4.5%
月経困難症	25	3.3%
不正出血	45	6.0%
月経不順	25	3.3%
過多月経	27	3.6%
過少月経	5	0.7%
その他	21	2.8%
病気・症状はとくにない	0	0.0%
未回答	0	0.0%
不詳	0	0.0%

2.7.18 月経・妊娠・出産に関することについて（女性のみ）

初経「あり」と回答した696人の平均年齢は、13.8歳であった。（表7-18-1）

表7-18-1 初経のあり・なし

	女性(N=750)		
	件数	割合	平均年齢
あり	696	92.8%	13.8
なし	4	0.5%	-
未回答	50	6.7%	
不詳	0	0.0%	
計	750	100.0%	-

閉経「あり」と回答した574人の平均年齢は、49.3歳であった。（表7-18-2）

表7-18-2 閉経のあり・なし

	女性(N=750)		
	件数	割合	平均年齢
あり	574	55.1%	49.3
なし	104	13.9%	-
未回答	72	31.1%	
不詳	0	0.0%	
計	750	100.0%	-

不妊症についてみると、4.5%が「あり」と回答した。（表7-18-3）

表7-18-3 不妊症

	女性(N=750)	
	件数	割合
あり	34	4.5%
なし	457	60.9%
未回答	259	34.5%
不詳	0	0.0%
計	750	100.0%

妊娠回数についてみると、「2回」と回答した者が28.3%と最も多く、次いで「3回」が23.2%、「4回」が11.5%等の順となっている。（表7-18-4）

表7-18-4 妊娠回数

	女性(N=750)	
	件数	割合
0	82	10.9%
1	55	7.3%
2	212	28.3%
3	174	23.2%
4	86	11.5%
5	46	6.1%
6	19	2.5%
7	13	1.7%
8	9	1.2%
9	2	0.3%
10	1	0.1%
11回以上	3	0.4%
未回答	48	6.4%
不詳	0	0.0%
計	750	100.0%

記載のあった出産等を集計してみると、「正常分娩」が60.8%で、「人工流産」が12.8%等の順となっている。(表7-18-5)

表7-18-5 出産等の状況(複数回答)

	女性(N=1915)	
	件数	割合
正常分娩	1165	60.8%
帝王切開	82	4.3%
早産	40	2.1%
死産	27	1.4%
自然流産	116	6.1%
人工流産	245	12.8%
その他	41	2.1%
未回答	174	9.1%
不詳	0	0.0%

記載のあった妊娠中の状況を集計してみると、「とくになし」が77.1%で最も多い。次いで、「切迫流産」が8.5%、「その他」6.9%等の順となっている。(表7-18-6)

表7-18-6 妊娠中の状況(複数回答)

	女性(N=1915)	
	件数	割合
とくになし	1093	77.1%
切迫流産	120	8.5%
切迫早産	39	2.8%
妊娠中毒症	81	5.7%
その他	98	6.9%
未回答	468	33.0%
不詳	0	0.0%

記載のあった出産時の出血量を集計してみると、「小」が29.2%で最も多い。次いで、「中」19.5%、「多」6.3%の順となっている。(表7-18-7)

表7-18-7 出産時の出血量

	女性(N=1885)	
	件数	割合
小	551	29.2%
中	367	19.5%
多	118	6.3%
未回答	849	45.0%
不詳	0	0.0%
計	1885	100.0%

記載のあった新生児の状況を集計してみると、「とくになし」が64.0%と最も多い。次いで、「その他」が6.0%、「低出生体重児」が2.5%等の順となっている。（表7-18-8）

表7-18-8 新生児の状況（複数回答）

	女性(N=1915)	
	件数	割合
とくになし	1226	64.0%
低出生体重児	47	2.5%
先天異常	18	0.9%
奇形	9	0.5%
その他	114	6.0%
未回答	479	25.0%
不詳	0	0.0%

2.7.19 骨・関節の病気・症状について

骨・関節の病気・症状について、これまでかかったことがある病気を見ると、「腰痛」が最も多く68.1%（男 66.8%、女 69.2%）であった。次いで、「肩こり」が60.5%（男 51.2%、女 68.9%）、「関節痛」39.3%（男 32.0%、女 46.0%）等の順となっている。（表7-19-1）

表7-19-1 骨・関節の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨肉腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
今まで骨折したことがある	186	27.1%	181	24.1%	367	25.5%
過去1年間に骨折	13	1.9%	36	4.8%	49	3.4%
椎間板ヘルニア	108	15.7%	61	8.1%	169	11.8%
骨粗しょう症	21	3.1%	162	21.6%	183	12.7%
骨の変形	38	5.5%	135	18.0%	173	12.0%
ガングリオン	32	4.7%	94	12.5%	126	8.8%
痛風	83	12.1%	18	2.4%	101	7.0%
関節痛	220	32.0%	345	46.0%	565	39.3%
骨痛	36	5.2%	106	14.1%	142	9.9%
肩こり	352	51.2%	517	68.9%	869	60.5%
腰痛	459	66.8%	519	69.2%	978	68.1%
その他	21	3.1%	31	4.1%	52	3.6%
病気・症状はとくにない	82	11.9%	49	6.5%	131	9.1%
未回答	30	4.4%	17	2.3%	47	3.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

骨・関節の病気・症状について、医師の診断をうけたことがある病気を見ると、「腰痛」が最も多く23.2%（男 23.1%、女 23.2%）であった。次いで、「今まで骨折したことがある」が14.7%（男 13.7%、女 15.6%）、「関節痛」13.4%（男 8.9%、女 17.5%）等の順となっている。（表7-19-2）

表7-19-2 骨・関節の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）


	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨肉腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
今まで骨折したことがある	94	13.7%	117	15.6%	211	14.7%
過去1年間に骨折	8	1.2%	18	2.4%	26	1.8%
椎間板ヘルニア	73	10.6%	46	6.1%	119	8.3%
骨粗しょう症	12	1.7%	108	14.4%	120	8.4%
骨の変形	16	2.3%	62	8.3%	78	5.4%
ガングリオン	16	2.3%	58	7.7%	74	5.1%
痛風	53	7.7%	11	1.5%	64	4.5%
関節痛	61	8.9%	131	17.5%	192	13.4%
骨痛	7	1.0%	30	4.0%	37	2.6%
肩こり	49	7.1%	107	14.3%	156	10.9%
腰痛	159	23.1%	174	23.2%	333	23.2%
その他	12	1.7%	19	2.5%	31	2.2%
病気・症状はとくにない	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

骨粗しょう症にかかったことがあると回答した183人について、過去・現在の治療状況について質問したところ、「過去に治療したことがある」と回答した者は16.9%（男 19.0%、女 16.7%）、「現在治療中」と回答した者は63.9%（男 33.3%、女 67.9%）であった。（表7-19-3、図7-19-3）

表7-19-3 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況

	男性(N=21)		女性(N=162)		計(N=183)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
過去に治療したことがない	8	38.1%	22	13.6%	30	16.4%
過去に治療したことがある	4	19.0%	27	16.7%	31	16.9%
現在治療中	7	33.3%	110	67.9%	117	63.9%
その他	1	4.8%	0	0.0%	1	0.5%
未回答	1	4.8%	3	1.9%	4	2.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	21	100.0%	162	100.0%	183	100.0%

図7-19-3 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況




現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男 女 ともに「内服薬」が最も多く94.9%（男 85.7%、女 95.5%）であった。（表7-19-4、図7-19-4）

表7-19-4 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法

	男性(N=7)		女性(N=110)		計(N=117)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	1	14.3%	10	9.1%	11	9.4%
内服薬	6	85.7%	105	95.5%	111	94.9%
注射薬	1	14.3%	22	20.0%	23	19.7%
その他	0	0.0%	2	1.8%	2	1.7%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図7-19-4 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法



2.7.20 皮膚・爪の病気・症状について

皮膚・爪の病気・症状について、これまでかかったことがある病気を見ると、「皮膚の掻痒」が最も多く52.8%（男 52.7%、女 52.9%）であった。次いで、「湿疹がしやすい」が40.1%（男 37.1%、女 42.8%）、「爪の変形」37.6%（男 37.3%、女 37.9%）等の順となっている。（表7-20-1）

表7-20-1 皮膚・爪の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
皮膚がん	2	0.3%	7	0.9%	9	0.6%
ざ瘡	184	26.8%	195	26.0%	379	26.4%
毛孔の開大・面疱	98	14.3%	146	19.5%	244	17.0%
色素沈着	114	16.6%	170	22.7%	284	19.8%
爪の変形	256	37.3%	284	37.9%	540	37.6%
粉瘤	93	13.5%	110	14.7%	203	14.1%
粘液嚢腫	11	1.6%	23	3.1%	34	2.4%
掌蹠膿疱症	24	3.5%	24	3.2%	48	3.3%
湿疹がしやすい	255	37.1%	321	42.8%	576	40.1%
皮膚の掻痒	362	52.7%	397	52.9%	759	52.8%
乾燥肌	176	25.6%	236	31.5%	412	28.7%
脱毛	87	12.7%	99	13.2%	186	12.9%
白斑	26	3.8%	34	4.5%	60	4.2%
紫斑	55	8.0%	129	17.2%	184	12.8%
その他	28	4.1%	40	5.3%	68	4.7%
病気・症状はとくにない	100	14.6%	95	12.7%	195	13.6%
未回答	33	4.8%	34	4.5%	67	4.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

皮膚・爪の病気・症状について、医師の診断をうけたことがある病気を見ると、「皮膚の掻痒」が最も多く13.5%（男 12.5%、女 14.4%）であった。次いで、「湿疹がしやすい」が11.7%（男 9.9%、女 13.3%）、「粉瘤」6.1%（男 6.0%、女 6.1%）等の順となっている。（表7-20-2）

表7-20-2 皮膚・爪の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
皮膚がん	2	0.3%	6	0.8%	8	0.6%
ざ瘡	30	4.4%	46	6.1%	76	5.3%
毛孔の開大・面疱	20	2.9%	31	4.1%	51	3.5%
色素沈着	22	3.2%	43	5.7%	65	4.5%
爪の変形	33	4.8%	53	7.1%	86	6.0%
粉瘤	41	6.0%	46	6.1%	87	6.1%
粘液嚢腫	3	0.4%	11	1.5%	14	1.0%
掌蹠膿疱症	11	1.6%	13	1.7%	24	1.7%
湿疹がしやすい	68	9.9%	100	13.3%	168	11.7%
皮膚の掻痒	86	12.5%	108	14.4%	194	13.5%
乾燥肌	26	3.8%	26	3.5%	52	3.6%
脱毛	12	1.7%	13	1.7%	25	1.7%
白斑	2	0.3%	9	1.2%	11	0.8%
紫斑	13	1.9%	11	1.5%	24	1.7%
その他	10	1.5%	14	1.9%	24	1.7%
病気・症状はとくにない	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.21 アレルギー疾患について

アレルギー疾患について、これまでかかったことがある病気をみると、「花粉症」が最も多く29.6%（男 27.4%、女 31.6%）であった。次いで「蕁麻疹」が23.8%（男 16.7%、女 30.3%）、「アレルギー性鼻炎」21.9%（男 17.5%、女 26.0%）等の順となっている。（表7-21-1）

表7-21-1 アレルギー疾患の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	35	5.1%	48	6.4%	83	5.8%
アレルギー性鼻炎	120	17.5%	195	26.0%	315	21.9%
花粉症	188	27.4%	237	31.6%	425	29.6%
喘息	67	9.8%	91	12.1%	158	11.0%
蕁麻疹	115	16.7%	227	30.3%	342	23.8%
食物アレルギー	44	6.4%	70	9.3%	114	7.9%
薬物アレルギー	35	5.1%	91	12.1%	126	8.8%
その他	11	1.6%	23	3.1%	34	2.4%
病気・症状はとくにない	272	39.6%	211	28.1%	483	33.6%
未回答	53	7.7%	57	7.6%	110	7.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

アレルギー疾患について、医師の診断をうけたことがある病気をみると、「蕁麻疹」が最も多く11.3%（男 7.6%、女 14.8%）であった。次いで「花粉症」が10.9%（男 8.4%、女 13.2%）、「アレルギー性鼻炎」10.6%（男 7.4%、女 13.6%）等の順となっている。（表7-21-2）

表7-21-2 アレルギー疾患の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	19	2.8%	17	2.3%	36	2.5%
アレルギー性鼻炎	51	7.4%	102	13.6%	153	10.6%
花粉症	58	8.4%	99	13.2%	157	10.9%
喘息	37	5.4%	50	6.7%	87	6.1%
蕁麻疹	52	7.6%	111	14.8%	163	11.3%
食物アレルギー	14	2.0%	31	4.1%	45	3.1%
薬物アレルギー	13	1.9%	48	6.4%	61	4.2%
その他	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%
病気・症状はとくにない	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.7.22 膠原病について

膠原病について、これまでかかったことがある病気をみると、「関節リウマチ」が最も多く4.2%（男 1.9%、女 6.3%）であった。（表7-22-1）

表7-22-1 膠原病
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	13	1.9%	47	6.3%	60	4.2%
全身性エリテマトーデス	0	0.0%	2	0.3%	2	0.1%
強皮症	0	0.0%	5	0.7%	5	0.3%
皮膚筋炎	0	0.0%	3	0.4%	3	0.2%
シェーグレン症候群	0	0.0%	7	0.9%	7	0.5%
ベーチェット病	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
その他	3	0.4%	13	1.7%	16	1.1%
病気・症状はとくにない	545	79.3%	542	72.3%	1087	75.6%
未回答	125	18.2%	141	18.8%	266	18.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

膠原病について、医師の診断をうけたことがある病気をみると、「関節リウマチ」が最も多く2.4%（男 1.3%、女 3.5%）であった。（表7-22-2）

表7-22-2 膠原病
医師の診断を受けたもの（複数回答）


	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	9	1.3%	26	3.5%	35	2.4%
全身性エリテマトーデス	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%
強皮症	0	0.0%	4	0.5%	4	0.3%
皮膚筋炎	0	0.0%	3	0.4%	3	0.2%
シェーグレン症候群	0	0.0%	6	0.8%	6	0.4%
ベーチェット病	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
その他	2	0.3%	5	0.7%	7	0.5%
病気・症状はとくにない	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

膠原病にかかったことがあると回答した84人について、過去・現在の治療状況について質問したところ、「過去に治療したことがある」と回答した者は20.2%（男 11.8%、女 22.4%）、「現在治療中」と回答した者は38.1%（男 41.2%、女 37.3%）であった。（表7-22-3、図7-22-3）

表7-22-3 膠原病 過去・現在の治療状況

	男性(N=17)		女性(N=67)		計(N=84)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
過去に治療したことがない	3	17.6%	7	10.4%	10	11.9%
過去に治療したことがある	2	11.8%	15	22.4%	17	20.2%
現在治療中	7	41.2%	25	37.3%	32	38.1%
その他	1	5.9%	3	4.5%	4	4.8%
未回答	4	23.5%	17	25.4%	21	25.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	17	100.0%	67	100.0%	84	100.0%

図7-22-3 膠原病 過去・現在の治療状況




現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男 女 ともに「内服薬」が最も多く90.6%（男 100.0%、女 88.0%）であった。（表7-22-4、図7-22-4）

表7-22-4 膠原病 治療方法

	男性(N=7)		女性(N=25)		計(N=32)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	2	8.0%	2	6.3%
内服薬	7	100.0%	22	88.0%	29	90.6%
注射薬	0	0.0%	4	16.0%	4	12.5%
その他	0	0.0%	2	8.0%	2	6.3%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図7-22-4 膠原病 治療方法



2.7.23 その他の病気・症状について

その他の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「手足のしびれ」が最も多く53.4%（男 50.8%、女 55.9%）であった。次いで「全身倦怠感」が53.0%（男 47.2%、女 58.3%）、「手足に痛みがある」39.2%（男 31.6%、女 46.3%）等の順となっている。（表 7-23-1）

表 7-23-1 その他の病気・症状
かかったことがあるもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感	324	47.2%	437	58.3%	761	53.0%
手足のしびれ	349	50.8%	419	55.9%	768	53.4%
体がつる	215	31.3%	240	32.0%	455	31.7%
のどがつる	20	2.9%	42	5.6%	62	4.3%
筋肉の痛み	190	27.7%	231	30.8%	421	29.3%
体がむくむ	121	17.6%	257	34.3%	378	26.3%
日光に当たると顔が腫れたり 湿疹ができたりする	40	5.8%	118	15.7%	158	11.0%
指が腫れる	71	10.3%	178	23.7%	249	17.3%
全身に痛みがある	59	8.6%	112	14.9%	171	11.9%
手足に痛みがある	217	31.6%	347	46.3%	564	39.2%
その他	21	3.1%	36	4.8%	57	4.0%
病気・症状はとくにない	118	17.2%	91	12.1%	209	14.5%
未回答	42	6.1%	34	4.5%	76	5.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

その他の病気・症状について、医師の診断をうけたことがある病気をみると、「手足のしびれ」が最も多く12.0%（男 11.1%、女 12.9%）であった。次いで「手足に痛みがある」が9.3%（男 7.0%、女 11.3%）、「全身倦怠感」8.0%（男 5.1%、女 10.7%）等の順となっている。（表 7-23-2）

表 7-23-2 その他の病気・症状
医師の診断を受けたもの（複数回答）

	男性(N=687)		女性(N=750)		計(N=1437)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感	35	5.1%	80	10.7%	115	8.0%
手足のしびれ	76	11.1%	97	12.9%	173	12.0%
体がつる	21	3.1%	34	4.5%	55	3.8%
のどがつる	3	0.4%	4	0.5%	7	0.5%
筋肉の痛み	32	4.7%	55	7.3%	87	6.1%
体がむくむ	8	1.2%	48	6.4%	56	3.9%
日光に当たると顔が腫れたり 湿疹ができたりする	5	0.7%	32	4.3%	37	2.6%
指が腫れる	11	1.6%	35	4.7%	46	3.2%
全身に痛みがある	14	2.0%	21	2.8%	35	2.4%
手足に痛みがある	48	7.0%	85	11.3%	133	9.3%
その他	4	0.6%	10	1.3%	14	1.0%
病気・症状はとくにない	0	0.0%	2	0.3%	2	0.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.8 調査票の自由記入欄について

本調査では、「これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に研究してもらいたいこと、要望など」について自由記入欄を設けたところ、306人から回答があった。いずれも、回答いただいた一人一人の貴重なご意見ではあるが、個人情報を含む内容もあり、また、公表にあたっての認識が一人一人異なることから、本報告書には主な内容を記載するにとどめることとした。

<自由記載欄の主な記入内容>

○自分、家族の健康に関する不安、生活上のストレス等について (235件)

子供の顔のぶつぶつが小学校後半から治らない

風邪をひきやすい

毎日、薬を飲み、薬の種類も増えて不安で憂鬱

癌にならないか不安

幼少の時から人目をさけて性格も暗くなりがち

○職業（仕事）に関する苦勞について (7件)

うつ病を発症して、会社に行きたくても行けない状態が続いている

自律神経失調症で仕事に集中出来ず失職した

病気のせいで仕事が思うようにいかず不安になる

ストレスがかかると酷く疲れる。仕事も思うようにできない

体がきつく、思うように動かないので働けない

○経済的な苦勞について (6件)

体がだるくて仕事に行けず収入が少なく困っている

タクシー代の負担が医療費よりも負担が大きい

○治療法の研究開発への要望、期待 (29件)

体の痛みを少しでも和らげる薬を開発してほしい

残留性の高いダイオキシンを早く体内から出す研究に取り組んでほしい

早く油症に効く薬を開発してほしい

子供の影響について研究・調査をしてほしい

次の世代に遺伝しないための研究をしてほしい

○病院、医師、検診に関する要望 (12件)

油症の検診は平日は行っているが日曜・祭日にも行ってほしい

医者がカネミ油症への理解がなく、たいした治療をしてもらえない

医者に「カネミ油症と因果関係がない」と言われて以来、油症券を出すのが怖い

受療券契約を整骨院、整形外科、針治療などお願したい

一人一人が掛かる医療機関は多岐に渡るので、全ての医療機関で油症券を使えるようにしてほしい

○行政機関に対する要望 (28件)

健康調査をこれからも続けてほしい

子供が油症検診を受けるが認定されない

アンケート内容を回答するのも疲れるので、もっと簡単な内容にしてほしい

昨年受けた油症検診の結果について連絡がこない、不信感がある

症状が酷くなり仕事が続けられない人に対して対策を講じてほしい

○カネミ倉庫に対する要望（5 件）

老人介護施設に入る場合、カネミ倉庫は費用負担をしてほしい

カネミ倉庫から年5 万円の給付金を一度ももらっていない

治療費の補償をカネミ倉庫にも認めてほしい

病気の未認定期間に対する補償を考えてほしい

歯のインプラントを半分でいいから補助を出してほしい

○その他（35 件）

献血の被害者は今後どのようにすればよいかわからない

差別や偏見の目で見られたくないから油証券の存在を世間に知られたくないし、病院にかかりたくない

別表 調査結果の性・年齢（5歳階級）別集計表

別表 1

1 日の歩行時間、性、年齢（5 歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	30分未満	30分～ 60分未満	60分～ 90分未満	90分以上	未回答	不詳
総数	1437	449	261	370	344	13	0
30～34歳	1	0	1	0	0	0	0
35～39	6	3	2	0	1	0	0
40～44	46	18	15	5	7	1	0
45～49	146	55	28	38	24	1	0
50～54	234	85	42	69	37	1	0
55～59	222	82	41	55	44	0	0
60～64	174	67	31	43	31	2	0
65～69	127	35	25	47	20	0	0
70～74	113	35	15	37	25	1	0
75～79	129	38	31	32	27	1	0
80～84	124	21	21	25	55	2	0
85～89	79	10	5	16	45	3	0
90歳以上	36	0	4	3	28	1	0
男	687	206	122	184	172	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	3	1	0	0	0	0
40～44	26	10	9	2	5	0	0
45～49	79	30	11	21	17	0	0
50～54	114	41	14	32	27	0	0
55～59	116	37	26	30	23	0	0
60～64	84	27	11	26	19	1	0
65～69	58	18	8	21	11	0	0
70～74	53	13	11	17	11	1	0
75～79	57	14	16	13	14	0	0
80～84	56	7	11	15	23	0	0
85～89	30	6	2	5	16	1	0
90歳以上	10	0	2	2	6	0	0
女	750	243	139	186	172	10	0
30～34歳	1	0	1	0	0	0	0
35～39	2	0	1	0	1	0	0
40～44	20	8	6	3	2	1	0
45～49	67	25	17	17	7	1	0
50～54	120	44	28	37	10	1	0
55～59	106	45	15	25	21	0	0
60～64	90	40	20	17	12	1	0
65～69	69	17	17	26	9	0	0
70～74	60	22	4	20	14	0	0
75～79	72	24	15	19	13	1	0
80～84	68	14	10	10	32	2	0
85～89	49	4	3	11	29	2	0
90歳以上	26	0	2	1	22	1	0

別表 2

運動（スポーツ）頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	ほぼ毎日	週2~4回程 度	週1回程度	月1回程度	ほとんどして いない	未回答	不詳
総数	1437	210	254	210	60	688	15	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	6	1	1	1	0	3	0	0
40 ~ 44	46	4	4	12	3	23	0	0
45 ~ 49	146	17	21	20	8	80	0	0
50 ~ 54	234	20	32	32	16	132	2	0
55 ~ 59	222	26	34	40	14	107	1	0
60 ~ 64	174	21	36	32	9	74	2	0
65 ~ 69	127	23	31	16	3	53	1	0
70 ~ 74	113	26	31	19	1	36	0	0
75 ~ 79	129	35	22	19	5	45	3	0
80 ~ 84	124	22	26	12	1	59	4	0
85 ~ 89	79	11	15	6	0	46	1	0
90歳以上	36	4	1	1	0	29	1	0
男	687	110	119	114	39	300	5	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	1	1	1	0	1	0	0
40 ~ 44	26	3	3	7	2	11	0	0
45 ~ 49	79	8	10	13	5	43	0	0
50 ~ 54	114	13	9	22	10	59	1	0
55 ~ 59	116	13	16	20	9	57	1	0
60 ~ 64	84	8	19	15	7	34	1	0
65 ~ 69	58	12	14	6	1	25	0	0
70 ~ 74	53	12	14	12	1	14	0	0
75 ~ 79	57	21	10	7	3	15	1	0
80 ~ 84	56	11	14	7	1	22	1	0
85 ~ 89	30	4	8	4	0	14	0	0
90歳以上	10	4	1	0	0	5	0	0
女	750	100	135	96	21	388	10	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	2	0	0
40 ~ 44	20	1	1	5	1	12	0	0
45 ~ 49	67	9	11	7	3	37	0	0
50 ~ 54	120	7	23	10	6	73	1	0
55 ~ 59	106	13	18	20	5	50	0	0
60 ~ 64	90	13	17	17	2	40	1	0
65 ~ 69	69	11	17	10	2	28	1	0
70 ~ 74	60	14	17	7	0	22	0	0
75 ~ 79	72	14	12	12	2	30	2	0
80 ~ 84	68	11	12	5	0	37	3	0
85 ~ 89	49	7	7	2	0	32	1	0
90歳以上	26	0	0	1	0	24	1	0

別表 3

飲酒頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	ほぼ毎日	週3~5回 程度	週1~2回程 度	月1~3回 程度	年1~10回 程度	飲まない	未回答	不詳
総数	1437	262	136	120	84	86	726	23	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	6	1	2	0	1	1	1	0	0
40 ~ 44	46	10	4	7	5	8	10	2	0
45 ~ 49	146	36	17	22	11	12	47	1	0
50 ~ 54	234	54	27	26	14	18	92	1	0
55 ~ 59	222	48	30	20	17	16	91	1	0
60 ~ 64	174	28	23	14	11	9	88	1	0
65 ~ 69	127	32	12	5	5	10	62	1	0
70 ~ 74	113	18	7	10	6	4	67	1	0
75 ~ 79	129	18	7	6	6	1	84	1	0
80 ~ 84	124	10	7	4	6	5	88	1	0
85 ~ 89	79	5	0	6	2	2	61	3	0
90歳以上	36	2	0	0	0	0	34	0	0
男	687	221	95	73	45	38	207	8	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	0	2	0	1	0	1	0	0
40 ~ 44	26	9	2	3	2	5	4	1	0
45 ~ 49	79	30	12	11	5	5	15	1	0
50 ~ 54	114	42	17	17	4	7	26	1	0
55 ~ 59	116	40	23	13	9	7	24	0	0
60 ~ 64	84	23	17	9	6	4	25	0	0
65 ~ 69	58	27	6	2	3	4	16	0	0
70 ~ 74	53	17	5	5	4	3	19	0	0
75 ~ 79	57	17	5	6	4	0	22	3	0
80 ~ 84	56	10	6	2	5	1	31	1	0
85 ~ 89	30	5	0	5	2	2	15	1	0
90歳以上	10	1	0	0	0	0	9	0	0
女	750	41	41	47	39	48	519	15	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	2	1	0	0	0	1	0	0	0
40 ~ 44	20	1	2	4	3	3	6	1	0
45 ~ 49	67	6	5	11	6	7	32	0	0
50 ~ 54	120	12	10	9	10	11	66	2	0
55 ~ 59	106	8	7	7	8	9	67	0	0
60 ~ 64	90	5	6	5	5	5	63	1	0
65 ~ 69	69	5	6	3	2	6	46	1	0
70 ~ 74	60	1	2	5	2	1	48	1	0
75 ~ 79	72	1	2	0	2	1	62	4	0
80 ~ 84	68	0	1	2	1	4	57	3	0
85 ~ 89	49	0	0	1	0	0	46	2	0
90歳以上	26	1	0	0	0	0	25	0	0

別表 4

飲酒量（ビール大瓶換算）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	0.5本 未満	0.5~1本 未満	1~2本 未満	2~3本 未満	3~4本 未満	4~5本 未満	5~10本 未満	10本 以上	未回答	不 詳
総数	694	25	230	253	113	27	7	9	1	29	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	5	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	34	0	12	13	5	1	1	0	0	2	0
45 ~ 49	98	1	34	27	18	8	2	2	1	5	0
50 ~ 54	141	6	50	44	27	8	1	3	0	2	0
55 ~ 59	131	2	30	61	25	7	0	2	0	4	0
60 ~ 64	86	1	36	31	15	1	1	1	0	0	0
65 ~ 69	64	2	23	21	13	1	0	1	0	3	0
70 ~ 74	45	2	14	15	7	1	0	0	0	6	0
75 ~ 79	39	1	9	24	1	0	0	0	0	4	0
80 ~ 84	33	5	13	11	1	0	2	0	0	1	0
85 ~ 89	16	4	8	3	0	0	0	0	0	1	0
90歳以上	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
男	476	11	115	202	98	22	5	9	1	13	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	21	0	4	11	3	1	1	0	0	1	0
45 ~ 49	63	0	18	19	15	6	1	2	1	1	0
50 ~ 54	88	1	22	29	25	6	1	3	0	1	0
55 ~ 59	92	1	12	47	21	7	0	2	0	2	0
60 ~ 64	59	0	14	29	14	1	0	1	0	0	0
65 ~ 69	42	1	13	17	10	0	0	1	0	0	0
70 ~ 74	34	1	10	11	7	1	0	0	0	4	0
75 ~ 79	33	1	6	23	1	0	0	0	0	2	0
80 ~ 84	25	1	9	11	1	0	2	0	0	1	0
85 ~ 89	15	4	7	3	0	0	0	0	0	1	0
90歳以上	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	218	14	115	51	15	5	2	0	0	16	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	13	0	8	2	2	0	0	0	0	1	0
45 ~ 49	35	1	16	8	3	2	1	0	0	4	0
50 ~ 54	53	5	28	15	2	2	0	0	0	1	0
55 ~ 59	39	1	18	14	4	0	0	0	0	2	0
60 ~ 64	27	1	22	2	1	0	1	0	0	0	0
65 ~ 69	22	1	10	4	3	1	0	0	0	3	0
70 ~ 74	11	1	4	4	0	0	0	0	0	2	0
75 ~ 79	6	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0
80 ~ 84	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

別表 5

喫煙状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	吸う	やめた	吸わない	未回答	不詳
総数	1437	301	205	908	23	0
30～34歳	1	0	1	0	0	0
35～39	6	2	1	3	0	0
40～44	46	19	9	18	0	0
45～49	146	55	21	69	1	0
50～54	234	66	21	146	1	0
55～59	222	61	36	124	1	0
60～64	174	40	25	109	0	0
65～69	127	23	27	74	3	0
70～74	113	16	16	74	7	0
75～79	129	10	16	98	5	0
80～84	124	7	16	98	3	0
85～89	79	1	13	64	1	0
90歳以上	36	1	3	31	1	0
男	687	238	180	266	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	4	1	1	2	0	0
40～44	26	14	6	6	0	0
45～49	79	42	16	21	0	0
50～54	114	53	19	42	0	0
55～59	116	50	32	34	0	0
60～64	84	30	23	31	0	0
65～69	58	18	22	18	0	0
70～74	53	14	16	22	1	0
75～79	57	9	16	30	2	0
80～84	56	5	16	35	0	0
85～89	30	1	11	18	0	0
90歳以上	10	1	2	7	0	0
女	750	63	25	642	20	0
30～34歳	1	0	1	0	0	0
35～39	2	1	0	1	0	0
40～44	20	5	3	12	0	0
45～49	67	13	5	48	1	0
50～54	120	13	2	104	1	0
55～59	106	11	4	90	1	0
60～64	90	10	2	78	0	0
65～69	69	5	5	56	3	0
70～74	60	2	0	52	6	0
75～79	72	1	0	68	3	0
80～84	68	2	0	63	3	0
85～89	49	0	2	46	1	0
90歳以上	26	0	1	24	1	0

別表 6

喫煙状況（喫煙者 喫煙年数）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	0～2年 未満	2年～3年 未満	3年～5年 未満	5年～10 年未満	10年～20 年未満	20年～30 年未満	30年～40 年未満	40年以上	未回答	不詳
総数	524	5	0	2	224	11	76	107	78	21	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	5	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0
40～44	19	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0
45～49	92	1	0	0	37	2	39	10	0	3	0
50～54	66	2	0	1	0	2	8	48	0	5	0
55～59	127	0	0	1	66	4	4	37	13	2	0
60～64	40	1	0	0	0	1	2	7	26	3	0
65～69	63	0	0	0	40	0	1	4	15	3	0
70～74	16	0	0	0	0	0	2	1	12	1	0
75～79	58	0	0	0	48	1	1	0	7	1	0
80～84	7	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0
85～89	30	0	0	0	29	0	0	0	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
男	461	5	0	2	223	6	55	85	69	16	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
40～44	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
45～49	79	1	0	0	37	2	28	10	0	1	0
50～54	53	2	0	1	0	1	7	38	0	4	0
55～59	116	0	0	1	66	2	3	29	13	2	0
60～64	30	1	0	0	0	0	0	6	22	1	0
65～69	58	0	0	0	40	0	0	2	13	3	0
70～74	14	0	0	0	0	0	2	0	11	1	0
75～79	57	0	0	0	48	1	1	0	6	1	0
80～84	5	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
85～89	30	0	0	0	29	0	0	0	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
女	63	0	0	0	1	5	21	22	9	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
45～49	13	0	0	0	0	0	11	0	0	2	0
50～54	13	0	0	0	0	1	1	10	0	1	0
55～59	11	0	0	0	0	2	1	8	0	0	0
60～64	10	0	0	0	0	1	2	1	4	2	0
65～69	5	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
70～74	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
75～79	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
80～84	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7

喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	1~5本未 満	5本~10本 未満	10本~20 本未満	20本~30 本未満	30本~40 本未満	40本以上	未回答	不 詳
総 数	301	6	20	88	154	20	11	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	1	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	19	0	0	6	12	1	0	0	0
45 ~ 49	55	1	1	16	32	4	1	0	0
50 ~ 54	66	2	6	13	32	8	5	0	0
55 ~ 59	61	0	3	17	36	2	2	1	0
60 ~ 64	40	1	2	12	21	2	2	0	0
65 ~ 69	23	1	1	6	12	2	1	0	0
70 ~ 74	16	0	2	10	3	1	0	0	0
75 ~ 79	10	0	2	1	6	0	0	1	0
80 ~ 84	7	1	1	5	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0	0
男	238	3	13	56	136	19	9	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	14	0	0	3	10	1	0	0	0
45 ~ 49	42	0	1	9	27	4	1	0	0
50 ~ 54	53	1	3	8	31	7	3	0	0
55 ~ 59	50	0	2	10	33	2	2	1	0
60 ~ 64	30	0	0	8	18	2	2	0	0
65 ~ 69	18	1	1	4	9	2	1	0	0
70 ~ 74	14	0	1	9	3	1	0	0	0
75 ~ 79	9	0	2	1	5	0	0	1	0
80 ~ 84	5	1	1	3	0	0	0	0	0
85 ~ 89	1	0	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0	0
女	63	3	7	32	18	1	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ~ 44	5	0	0	3	2	0	0	0	0
45 ~ 49	13	1	0	7	5	0	0	0	0
50 ~ 54	13	1	3	5	1	1	2	0	0
55 ~ 59	11	0	1	7	3	0	0	0	0
60 ~ 64	10	1	2	4	3	0	0	0	0
65 ~ 69	5	0	0	2	3	0	0	0	0
70 ~ 74	2	0	1	1	0	0	0	0	0
75 ~ 79	1	0	0	0	1	0	0	0	0
80 ~ 84	2	0	0	2	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8

喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	0~2年未 満	2年~3年 未満	3年~5年 未満	5年~10年 未満	10年~20 年未満	20年~30 年未満	30年~40 年未満	40年以上	未回答	不 詳
総 数	205	3	2	3	13	36	47	41	35	25	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
35 ~ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	9	0	0	0	1	2	4	0	0	2	0
45 ~ 49	21	0	1	0	2	9	8	1	0	0	0
50 ~ 54	21	0	0	1	1	0	12	5	0	2	0
55 ~ 59	36	0	0	1	5	9	8	12	0	1	0
60 ~ 64	25	1	0	0	2	4	6	5	5	2	0
65 ~ 69	27	1	1	1	1	6	2	4	10	1	0
70 ~ 74	16	0	0	0	0	3	3	3	5	2	0
75 ~ 79	16	0	0	0	0	2	1	4	4	5	0
80 ~ 84	16	0	0	0	0	0	3	4	3	6	0
85 ~ 89	13	0	0	0	0	1	0	2	7	3	0
90 歳 以 上	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
男	180	2	1	2	10	31	44	37	32	21	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	6	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
45 ~ 49	16	0	1	0	1	6	8	0	0	0	0
50 ~ 54	19	0	0	0	1	0	12	4	0	2	0
55 ~ 59	32	0	0	1	5	8	6	11	0	1	0
60 ~ 64	23	1	0	0	2	4	5	5	4	2	0
65 ~ 69	22	1	0	1	0	5	2	3	9	1	0
70 ~ 74	16	0	0	0	0	3	3	3	5	2	0
75 ~ 79	16	0	0	0	0	2	1	4	4	5	0
80 ~ 84	16	0	0	0	0	0	3	4	3	6	0
85 ~ 89	11	0	0	0	0	1	0	2	6	2	0
90 歳 以 上	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
女	25	1	1	1	3	5	3	4	3	4	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
45 ~ 49	5	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0
50 ~ 54	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
55 ~ 59	4	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
60 ~ 64	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
65 ~ 69	5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
90 歳 以 上	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9

喫煙状況（卒煙者 喫煙本数）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	1～5本未 満	5本～10本 未満	10本～20 本未満	20本～30 本未満	30本～40 本未満	40本以上	未回答	不 詳
総 数	205	2	8	34	98	20	24	19	0
30 ～ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35 ～ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	9	0	0	3	0	2	2	2	0
45 ～ 49	21	0	1	6	9	3	2	0	0
50 ～ 54	21	0	0	2	12	2	3	2	0
55 ～ 59	36	0	4	7	17	3	4	1	0
60 ～ 64	25	0	1	3	14	2	3	2	0
65 ～ 69	27	1	1	4	14	3	4	0	0
70 ～ 74	16	0	0	0	9	3	2	2	0
75 ～ 79	16	0	0	3	7	0	2	4	0
80 ～ 84	16	0	1	3	6	1	1	4	0
85 ～ 89	13	1	0	1	9	0	1	1	0
90 歳 以 上	3	0	0	2	0	1	0	0	0
男	180	2	5	25	89	20	23	16	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	6	0	0	2	0	2	2	0	0
45 ～ 49	16	0	1	3	7	3	2	0	0
50 ～ 54	19	0	0	2	10	2	3	2	0
55 ～ 59	32	0	2	5	17	3	4	1	0
60 ～ 64	23	0	0	3	13	2	3	2	0
65 ～ 69	22	1	1	2	11	3	4	0	0
70 ～ 74	16	0	0	0	9	3	2	2	0
75 ～ 79	16	0	0	3	7	0	2	4	0
80 ～ 84	16	0	1	3	6	1	1	4	0
85 ～ 89	11	1	0	1	8	0	0	1	0
90 歳 以 上	2	0	0	1	0	1	0	0	0
女	25	0	3	9	9	0	1	3	0
30 ～ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	1	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	1	0	0	0	2	0
45 ～ 49	5	0	0	3	2	0	0	0	0
50 ～ 54	2	0	0	0	2	0	0	0	0
55 ～ 59	4	0	2	2	0	0	0	0	0
60 ～ 64	2	0	1	0	1	0	0	0	0
65 ～ 69	5	0	0	2	3	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	2	0	0	0	1	0	1	0	0
90 歳 以 上	1	0	0	1	0	0	0	0	0

別表 10

喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	1年未満	1年～2年 未満	2年～3年 未満	3年～4年 未満	4年～5年 未満	5年～10年 未満	10年～15 年未満	15年～20 年未満	20年～30 年未満	30年以上	未回答	不詳
総数	205	2	7	9	14	13	48	33	13	29	33	4	0
30～34歳	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40～44	9	0	1	0	2	2	3	1	0	0	0	0	0
45～49	21	1	0	2	1	1	8	5	1	1	0	1	0
50～54	21	0	1	1	3	1	9	3	1	2	0	0	0
55～59	36	0	0	1	4	5	7	6	2	6	5	0	0
60～64	25	1	2	1	1	1	4	7	4	2	2	0	0
65～69	27	0	2	3	0	2	5	3	1	4	6	1	0
70～74	16	0	1	1	0	0	4	3	1	1	4	1	0
75～79	16	0	0	0	1	0	1	2	1	6	4	1	0
80～84	16	0	0	0	1	0	2	1	1	3	8	0	0
85～89	13	0	0	0	1	0	3	2	0	4	3	0	0
90歳以上	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
男	180	1	5	5	12	11	42	31	11	26	33	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40～44	6	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0
45～49	16	0	0	2	1	0	7	4	1	0	0	1	0
50～54	19	0	1	0	3	1	9	3	1	1	0	0	0
55～59	32	0	0	0	4	4	6	6	1	6	5	0	0
60～64	23	1	1	1	1	1	3	7	4	2	2	0	0
65～69	22	0	1	1	0	2	5	3	1	3	6	0	0
70～74	16	0	1	1	0	0	4	3	1	1	4	1	0
75～79	16	0	0	0	1	0	1	2	1	6	4	1	0
80～84	16	0	0	0	1	0	2	1	1	3	8	0	0
85～89	11	0	0	0	0	0	2	2	0	4	3	0	0
90歳以上	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
女	25	1	2	4	2	2	6	2	2	3	0	1	0
30～34歳	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
45～49	5	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
50～54	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
55～59	4	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
60～64	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65～69	5	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

別表 1 1

睡眠時間、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	5時間未満	5時間以上 6時間未満	6時間以上 7時間未満	7時間以上 8時間未満	8時間以上 9時間未満	9時間以上	未回答	不詳
総数	1437	60	144	250	503	362	107	11	0
30～34歳	1	0	0	0	0	1	0	0	0
35～39	6	0	1	1	2	1	1	0	0
40～44	46	2	2	9	17	14	2	0	0
45～49	146	2	9	16	59	50	10	0	0
50～54	234	3	8	33	87	86	16	1	0
55～59	222	5	12	34	97	62	12	0	0
60～64	174	4	10	32	74	41	13	0	0
65～69	127	3	14	28	37	36	9	0	0
70～74	113	3	15	25	43	14	12	1	0
75～79	129	5	21	28	40	23	9	3	0
80～84	124	12	24	25	29	20	11	3	0
85～89	79	11	18	16	14	12	7	1	0
90歳以上	36	10	10	3	4	2	5	2	0
男	687	28	84	128	254	153	38	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	0	0	1	1	1	1	0	0
40～44	26	2	1	5	8	10	0	0	0
45～49	79	1	5	12	32	25	4	0	0
50～54	114	0	4	23	48	29	10	0	0
55～59	116	3	10	16	54	28	5	0	0
60～64	84	2	6	17	39	12	8	0	0
65～69	58	1	7	15	20	13	2	0	0
70～74	53	3	7	11	22	8	2	0	0
75～79	57	2	17	10	15	11	0	2	0
80～84	56	6	14	12	10	10	4	0	0
85～89	30	4	9	6	4	6	1	0	0
90歳以上	10	4	4	0	1	0	1	0	0
女	750	32	60	122	249	209	69	9	0
30～34歳	1	0	0	0	0	1	0	0	0
35～39	2	0	1	0	1	0	0	0	0
40～44	20	0	1	4	9	4	2	0	0
45～49	67	1	4	4	27	25	6	0	0
50～54	120	3	4	10	39	57	6	1	0
55～59	106	2	2	18	43	34	7	0	0
60～64	90	2	4	15	35	29	5	0	0
65～69	69	2	7	13	17	23	7	0	0
70～74	60	0	8	14	21	6	10	1	0
75～79	72	3	4	18	25	12	9	1	0
80～84	68	6	10	13	19	10	7	3	0
85～89	49	7	9	10	10	6	6	1	0
90歳以上	26	6	6	3	3	2	4	2	0

別表 1 2

労働時間、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	10時間以上	9時間以上 10時間未満	8時間以上 9時間未満	7時間以上 8時間未満	6時間以上 7時間未満	5時間以上 6時間未満	4時間以上 5時間未満	4時間未満	未回答	不詳
総数	1437	192	161	187	119	104	95	120	436	23	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	6	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	46	11	6	17	1	1	3	0	6	0	0
45 ~ 49	146	42	33	28	15	10	3	4	10	0	0
50 ~ 54	234	46	49	49	28	15	12	9	23	0	0
55 ~ 59	222	46	38	48	23	19	10	12	26	0	0
60 ~ 64	174	26	21	19	26	12	11	22	36	0	0
65 ~ 69	127	9	7	11	6	15	16	28	33	0	0
70 ~ 74	113	4	1	5	7	15	12	14	51	0	0
75 ~ 79	129	3	3	6	10	9	17	15	63	0	0
80 ~ 84	124	2	2	2	2	6	6	11	89	0	0
85 ~ 89	79	1	0	0	0	2	3	5	66	0	0
90歳以上	36	0	0	0	0	0	2	0	32	0	0
男	687	108	94	122	61	37	29	34	190	12	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	26	7	3	13	1	0	0	0	2	0	0
45 ~ 49	79	25	21	18	8	2	1	0	3	1	0
50 ~ 54	114	22	29	34	12	2	3	1	9	2	0
55 ~ 59	116	28	23	30	16	6	3	1	9	0	0
60 ~ 64	84	15	10	12	16	5	4	4	18	0	0
65 ~ 69	58	6	5	9	3	6	3	11	14	1	0
70 ~ 74	53	2	1	2	3	9	3	4	25	4	0
75 ~ 79	57	0	1	2	2	4	6	5	35	2	0
80 ~ 84	56	1	1	0	0	2	2	5	45	0	0
85 ~ 89	30	0	0	0	0	1	2	3	22	2	0
90歳以上	10	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0
女	750	84	67	65	58	67	66	86	246	11	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	20	4	3	4	0	1	3	0	4	1	0
45 ~ 49	67	17	12	10	7	8	2	4	7	0	0
50 ~ 54	120	24	20	15	16	13	9	8	14	1	0
55 ~ 59	106	18	15	18	7	13	7	11	17	0	0
60 ~ 64	90	11	11	7	10	7	7	18	18	1	0
65 ~ 69	69	3	2	2	3	9	13	17	19	1	0
70 ~ 74	60	2	0	3	4	6	9	10	26	0	0
75 ~ 79	72	3	2	4	8	5	11	10	28	1	0
80 ~ 84	68	1	1	2	2	4	4	6	44	4	0
85 ~ 89	49	1	0	0	0	1	1	2	44	0	0
90歳以上	26	0	0	0	0	0	0	0	24	2	0

別表 1 3

一日平均野菜摂取量、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	70g未満	70g以上140g 未満	140g以上 210g未満	210g以上 270g未満	270g以上 350g未満	350g以上	未回答	不詳
総数	1437	258	453	322	208	107	69	20	0
30～34歳	1	0	0	1	0	0	0	0	0
35～39	6	1	1	3	0	0	1	0	0
40～44	46	12	19	10	1	4	0	0	0
45～49	146	30	51	35	17	9	4	0	0
50～54	234	44	86	60	24	13	5	2	0
55～59	222	38	83	53	25	10	12	1	0
60～64	174	26	56	38	33	13	7	1	0
65～69	127	17	34	33	26	7	6	4	0
70～74	113	20	25	28	16	12	12	0	0
75～79	129	19	34	20	27	20	6	3	0
80～84	124	27	33	20	22	10	9	3	0
85～89	79	20	17	17	14	5	5	1	0
90歳以上	36	4	14	4	3	4	2	5	0
男	687	155	249	143	77	35	23	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	0	1	2	0	0	1	0	0
40～44	26	7	9	6	1	3	0	0	0
45～49	79	22	33	14	7	3	0	0	0
50～54	114	26	47	25	8	4	3	1	0
55～59	116	29	48	21	10	3	4	1	0
60～64	84	20	30	17	12	4	1	0	0
65～69	58	7	22	16	10	1	0	2	0
70～74	53	12	15	11	8	3	4	0	0
75～79	57	9	14	11	12	8	2	1	0
80～84	56	17	16	11	4	4	4	0	0
85～89	30	6	9	7	4	2	2	0	0
90歳以上	10	0	5	2	1	0	2	0	0
女	750	103	204	179	131	72	46	15	0
30～34歳	1	0	0	1	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	1	0	0	0	0	0
40～44	20	5	10	4	0	1	0	0	0
45～49	67	8	18	21	10	6	4	0	0
50～54	120	18	39	35	16	9	2	1	0
55～59	106	9	35	32	15	7	8	0	0
60～64	90	6	26	21	21	9	6	1	0
65～69	69	10	12	17	16	6	6	2	0
70～74	60	8	10	17	8	9	8	0	0
75～79	72	10	20	9	15	12	4	2	0
80～84	68	10	17	9	18	6	5	3	0
85～89	49	14	8	10	10	3	3	1	0
90歳以上	26	4	9	2	2	4	0	5	0

別表 1 4

一日平均果物類摂取量、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	50g未満	50g以上 100g未満	100g以上 150g未満	150g以上	未回答	不詳
総数	1437	655	399	252	111	20	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	6	2	3	0	1	0	0
40 ~ 44	46	36	5	4	0	1	0
45 ~ 49	146	87	40	15	4	0	0
50 ~ 54	234	136	58	28	11	1	0
55 ~ 59	222	113	70	28	11	0	0
60 ~ 64	174	70	43	38	19	4	0
65 ~ 69	127	45	38	29	11	4	0
70 ~ 74	113	40	37	26	10	0	0
75 ~ 79	129	35	38	38	16	2	0
80 ~ 84	124	43	36	26	16	3	0
85 ~ 89	79	30	23	15	9	2	0
90歳以上	36	18	8	5	2	3	0
男	687	389	148	106	39	5	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	1	2	0	1	0	0
40 ~ 44	26	20	2	4	0	0	0
45 ~ 49	79	58	12	8	1	0	0
50 ~ 54	114	78	21	10	5	0	0
55 ~ 59	116	74	28	12	2	0	0
60 ~ 64	84	50	13	16	4	1	0
65 ~ 69	58	28	12	11	5	2	0
70 ~ 74	53	24	17	10	2	0	0
75 ~ 79	57	17	14	17	8	1	0
80 ~ 84	56	23	16	11	5	1	0
85 ~ 89	30	12	9	5	4	0	0
90歳以上	10	4	2	2	2	0	0
女	750	266	251	146	72	15	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	2	1	1	0	0	0	0
40 ~ 44	20	16	3	0	0	1	0
45 ~ 49	67	29	28	7	3	0	0
50 ~ 54	120	58	37	18	6	1	0
55 ~ 59	106	39	42	16	9	0	0
60 ~ 64	90	20	30	22	15	3	0
65 ~ 69	69	17	26	18	6	2	0
70 ~ 74	60	16	20	16	8	0	0
75 ~ 79	72	18	24	21	8	1	0
80 ~ 84	68	20	20	15	11	2	0
85 ~ 89	49	18	14	10	5	2	0
90歳以上	26	14	6	3	0	3	0

別表 1 5

常用しているサプリメント、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1437	414	1001	22	0
30 ~ 34歳	1	1	0	0	0
35 ~ 39	6	0	6	0	0
40 ~ 44	46	9	36	1	0
45 ~ 49	146	41	103	2	0
50 ~ 54	234	52	180	2	0
55 ~ 59	222	60	160	2	0
60 ~ 64	174	51	121	2	0
65 ~ 69	127	46	81	0	0
70 ~ 74	113	38	72	3	0
75 ~ 79	129	47	78	4	0
80 ~ 84	124	41	78	5	0
85 ~ 89	79	21	58	0	0
90歳以上	36	7	28	1	0
男	687	155	527	5	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	0	4	0	0
40 ~ 44	26	4	22	0	0
45 ~ 49	79	14	64	1	0
50 ~ 54	114	16	97	1	0
55 ~ 59	116	23	92	1	0
60 ~ 64	84	17	66	1	0
65 ~ 69	58	16	42	0	0
70 ~ 74	53	17	35	1	0
75 ~ 79	57	17	40	0	0
80 ~ 84	56	19	37	0	0
85 ~ 89	30	8	22	0	0
90歳以上	10	4	6	0	0
女	750	259	474	17	0
30 ~ 34歳	1	1	0	0	0
35 ~ 39	2	0	2	0	0
40 ~ 44	20	5	14	1	0
45 ~ 49	67	27	39	1	0
50 ~ 54	120	36	83	1	0
55 ~ 59	106	37	68	1	0
60 ~ 64	90	34	55	1	0
65 ~ 69	69	30	39	0	0
70 ~ 74	60	21	37	2	0
75 ~ 79	72	30	38	4	0
80 ~ 84	68	22	41	5	0
85 ~ 89	49	13	36	0	0
90歳以上	26	3	22	1	0

別表 1 6

日常生活での悩みやストレス、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1437	1142	281	14	0
30～34歳	1	1	0	0	0
35～39	6	5	1	0	0
40～44	46	38	8	0	0
45～49	146	119	27	0	0
50～54	234	198	36	0	0
55～59	222	188	33	1	0
60～64	174	134	37	3	0
65～69	127	96	30	1	0
70～74	113	76	35	2	0
75～79	129	100	27	2	0
80～84	124	95	26	3	0
85～89	79	65	13	1	0
90歳以上	36	27	8	1	0
男	687	511	170	6	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	4	3	1	0	0
40～44	26	18	8	0	0
45～49	79	62	17	0	0
50～54	114	91	23	0	0
55～59	116	98	17	1	0
60～64	84	56	26	2	0
65～69	58	38	19	1	0
70～74	53	35	17	1	0
75～79	57	39	18	0	0
80～84	56	40	15	1	0
85～89	30	24	6	0	0
90歳以上	10	7	3	0	0
女	750	631	111	8	0
30～34歳	1	1	0	0	0
35～39	2	2	0	0	0
40～44	20	20	0	0	0
45～49	67	57	10	0	0
50～54	120	107	13	0	0
55～59	106	90	16	0	0
60～64	90	78	11	1	0
65～69	69	58	11	0	0
70～74	60	41	18	1	0
75～79	72	61	9	2	0
80～84	68	55	11	2	0
85～89	49	41	7	1	0
90歳以上	26	20	5	1	0

別表 17

悩みやストレスの原因（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	家族との 人間関係	家族以外 との人間 関係	恋愛・性 に関する こと	結婚	離婚	いじめ、セ クシュア ル・ハラス メント	生きがい に関する こと	自由にで きる時間 がない	収入・家 計・借金 等	自分の病 気や介護	家族の病 気や介護	妊娠・出 産	育児	家事	自分の学 業・受験・ 進学	子どもの 教育	自分の仕 事	家族の仕 事	住まいや 生活環境	その他	わからな い	未回答	不詳
総数	3327	236	275	20	22	14	10	238	108	436	641	371	0	9	126	9	81	391	132	124	63	17	4	0
30～34歳	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	15	1	1	1	1	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0
40～44	100	4	5	0	0	1	0	5	6	16	14	3	0	4	3	0	16	23	0	0	0	0	0	0
45～49	387	21	37	8	7	4	0	18	17	56	39	30	0	2	13	3	25	81	13	8	4	0	1	0
50～54	634	45	55	3	6	2	1	39	21	86	80	64	0	1	20	6	25	106	35	26	12	1	0	0
55～59	607	40	58	1	3	1	4	45	25	94	84	65	0	0	15	0	10	97	31	23	10	1	0	0
60～64	416	27	37	3	3	1	2	30	11	62	82	53	0	1	18	0	1	49	13	13	10	0	0	0
65～69	284	25	22	3	1	1	0	33	11	43	58	30	0	1	13	0	2	13	11	12	5	0	0	0
70～74	187	14	12	0	0	2	1	14	2	26	51	25	0	0	9	0	0	7	11	6	6	1	0	0
75～79	271	26	23	0	0	1	1	18	8	29	77	42	0	0	10	0	1	4	9	14	6	1	1	0
80～84	242	24	16	1	0	0	1	22	5	11	80	31	0	0	14	0	0	7	7	11	6	4	2	0
85～89	129	6	7	0	1	1	0	8	2	7	51	20	0	0	9	0	0	2	1	6	3	5	0	0
90歳以上	51	3	2	0	0	0	0	5	0	3	21	5	0	0	2	0	0	0	1	4	1	4	0	0
男	1405	85	117	12	15	8	3	100	50	203	265	127	0	2	25	3	41	231	46	42	21	8	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	11	0	1	1	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
40～44	49	2	4	0	0	1	0	2	4	8	4	0	0	0	0	0	8	16	0	0	0	0	0	0
45～49	189	10	18	4	5	2	0	10	11	30	21	10	0	1	4	1	10	49	3	0	0	0	0	0
50～54	258	16	17	2	5	2	0	17	8	42	37	21	0	0	2	2	11	57	7	10	1	1	0	0
55～59	304	11	34	1	2	1	2	20	15	47	41	23	0	0	5	0	9	60	16	12	4	1	0	0
60～64	162	8	11	2	2	1	0	14	3	30	34	12	0	1	3	0	1	30	5	3	2	0	0	0
65～69	103	8	7	1	0	0	0	15	4	18	19	9	0	0	3	0	2	8	4	4	1	0	0	0
70～74	81	9	7	0	0	1	0	5	1	12	20	10	0	0	0	0	0	4	4	3	4	1	0	0
75～79	90	7	7	0	0	0	0	7	2	10	30	15	0	0	2	0	0	1	2	2	4	1	0	0
80～84	103	12	8	1	0	0	1	7	1	4	33	15	0	0	4	0	0	4	5	3	3	1	1	0
85～89	43	2	3	0	0	0	0	2	1	0	17	8	0	0	2	0	0	0	0	3	2	3	0	0
90歳以上	12	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
女	1922	151	158	8	7	6	7	138	58	233	376	244	0	7	101	6	40	160	86	82	42	9	3	0
30～34歳	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40～44	51	2	1	0	0	0	0	3	2	8	10	3	0	4	3	0	8	7	0	0	0	0	0	0
45～49	198	11	19	4	2	2	0	8	6	26	18	20	0	1	9	2	15	32	10	8	4	0	1	0
50～54	376	29	38	1	1	0	1	22	13	44	43	43	0	1	18	4	14	49	28	16	11	0	0	0
55～59	303	29	24	0	1	0	2	25	10	47	43	42	0	0	10	0	1	37	15	11	6	0	0	0
60～64	254	19	26	1	1	0	2	16	8	32	48	41	0	0	15	0	0	19	8	10	8	0	0	0
65～69	181	17	15	2	1	1	0	18	7	25	39	21	0	1	10	0	0	5	7	8	4	0	0	0
70～74	106	5	5	0	0	1	1	9	1	14	31	15	0	0	9	0	0	3	7	3	2	0	0	0
75～79	181	19	16	0	0	1	1	11	6	19	47	27	0	0	8	0	1	3	7	12	2	0	1	0
80～84	139	12	8	0	0	0	0	15	4	7	47	16	0	0	10	0	0	3	2	8	3	3	1	0
85～89	86	4	4	0	1	1	0	6	1	7	34	12	0	0	7	0	0	2	1	3	1	2	0	0
90歳以上	39	3	2	0	0	0	0	4	0	2	15	2	0	0	2	0	0	0	1	3	1	4	0	0

別表18

悩みやストレスの最も気になる原因、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	家族との 人間関係	家族以外 との人間 関係	恋愛・性に 関すること	結婚	離婚	いじめ、セ クシュア ル・ハラス メント	生きがい に関する こと	自由にで きる時間 がない	収入・家 計・借金等	自分の病 気や介護	家族の病 気や介護	妊娠・出産	育児	家事	自分の学 業・受験・ 進学	子どもの 教育	自分の仕 事	家族の仕 事	住まいや 生活環境	その他	わからない	未回答	不 詳
総数	1106	45	56	0	4	3	0	29	10	126	372	134	0	1	7	2	15	138	18	18	25	16	87	0
30～34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
40～44	38	1	2	0	0	1	0	0	1	4	9	1	0	0	0	0	3	12	0	0	0	0	3	0
45～49	119	3	4	0	1	1	0	3	1	17	19	10	0	1	0	0	5	35	3	0	1	0	12	0
50～54	198	11	9	0	2	0	0	6	2	21	37	24	0	0	2	2	5	36	5	9	5	1	16	0
55～59	188	7	15	0	0	0	0	5	3	31	38	26	0	0	1	0	0	32	3	3	2	1	17	0
60～64	134	6	7	0	0	0	0	3	1	24	37	22	0	0	1	0	1	16	1	0	4	0	5	0
65～69	96	4	4	0	0	0	0	8	2	12	34	14	0	0	1	0	1	1	3	0	2	0	8	0
70～74	76	4	6	0	0	1	0	2	0	5	30	6	0	0	1	0	0	1	2	1	4	1	7	0
75～79	100	6	3	0	0	0	0	2	0	12	52	13	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	4	0
80～84	95	1	2	0	0	0	0	0	0	0	58	8	0	0	1	0	0	1	1	3	4	3	9	0
85～89	65	1	3	0	1	0	0	0	0	0	39	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0
90歳以上	27	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
男	500	16	25	0	3	2	0	19	6	69	149	44	0	0	2	1	6	92	5	6	9	7	39	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
40～44	18	0	2	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	0
45～49	62	2	1	0	1	0	0	2	1	7	11	2	0	0	0	0	2	24	0	0	0	0	8	1
50～54	91	3	3	0	2	0	0	4	2	11	18	9	0	0	0	1	2	21	1	4	0	1	7	2
55～59	98	0	9	0	0	0	0	3	1	20	19	9	0	0	1	0	0	24	2	0	1	1	8	0
60～64	56	3	1	0	0	0	0	2	1	14	16	4	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	4	1
65～69	38	1	2	0	0	0	0	5	1	7	13	4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
70～74	35	3	4	0	0	1	0	2	0	5	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2
75～79	39	2	1	0	0	0	0	1	0	3	20	4	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	1
80～84	40	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	4	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	4	2
85～89	24	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0
90歳以上	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
女	606	29	31	0	1	1	0	10	4	57	223	90	0	1	5	1	9	46	13	12	16	9	48	0
30～34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35～39	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	20	1	0	0	0	0	0	0	1	2	7	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	2	1
45～49	57	1	3	0	0	1	0	1	0	10	8	8	0	1	0	0	3	11	3	0	1	0	4	2
50～54	107	8	6	0	0	0	0	2	0	10	19	15	0	0	2	1	3	15	4	5	5	0	9	3
55～59	90	7	6	0	0	0	0	2	2	11	19	17	0	0	0	0	0	8	1	3	1	0	9	4
60～64	78	3	6	0	0	0	0	1	0	10	21	18	0	0	1	0	0	7	1	0	4	0	1	5
65～69	58	3	2	0	0	0	0	3	1	5	21	10	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	7	1
70～74	41	1	2	0	0	0	0	0	0	0	21	3	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	5	3
75～79	61	4	2	0	0	0	0	1	0	9	32	9	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0
80～84	55	0	1	0	0	0	0	0	0	0	35	4	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	5	2
85～89	41	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
90歳以上	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0

別表 19

病院、診療所への入院、または介護保険施設への入所状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	75	1351	11	0
30～34歳	1	0	1	0	0
35～39	6	0	6	0	0
40～44	46	0	46	0	0
45～49	146	1	145	0	0
50～54	234	5	229	0	0
55～59	222	1	221	0	0
60～64	174	5	166	3	0
65～69	127	4	123	0	0
70～74	113	2	108	3	0
75～79	129	6	123	0	0
80～84	124	19	104	1	0
85～89	79	18	59	2	0
90歳以上	36	14	20	2	0
男	687	27	657	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	4	0	4	0	0
40～44	26	0	26	0	0
45～49	79	1	78	0	0
50～54	114	4	110	0	0
55～59	116	1	115	0	0
60～64	84	3	80	1	0
65～69	58	3	55	0	0
70～74	53	1	51	1	0
75～79	57	2	55	0	0
80～84	56	6	50	0	0
85～89	30	4	25	1	0
90歳以上	10	2	8	0	0
女	750	48	694	8	0
30～34歳	1	0	1	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	20	0	20	0	0
45～49	67	0	67	0	0
50～54	120	1	119	0	0
55～59	106	0	106	0	0
60～64	90	2	86	2	0
65～69	69	1	68	0	0
70～74	60	1	57	2	0
75～79	72	4	68	0	0
80～84	68	13	54	1	0
85～89	49	14	34	1	0
90歳以上	26	12	12	2	0

別表 20

要介護認定の状況（40歳未満の回答者は除く）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	受けている	受けていない	未回答	不詳
総数	1431	175	1206	50	0
30～34歳	1	0	1	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	46	0	42	4	0
45～49	146	0	140	6	0
50～54	234	2	217	15	0
55～59	222	2	215	5	0
60～64	174	4	166	4	0
65～69	127	4	120	3	0
70～74	113	10	96	7	0
75～79	129	22	107	0	0
80～84	124	52	70	2	0
85～89	79	51	26	2	0
90歳以上	36	28	6	2	0
男	683	53	607	23	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	26	0	25	1	0
45～49	79	0	75	4	0
50～54	114	2	104	8	0
55～59	116	1	113	2	0
60～64	84	2	81	1	0
65～69	58	0	57	1	0
70～74	53	5	46	2	0
75～79	57	9	48	0	0
80～84	56	16	39	1	0
85～89	30	12	16	2	0
90歳以上	10	6	3	1	0
女	748	122	599	27	0
30～34歳	1	0	1	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	20	0	17	3	0
45～49	67	0	65	2	0
50～54	120	0	113	7	0
55～59	106	1	102	3	0
60～64	90	2	85	3	0
65～69	69	4	63	2	0
70～74	60	5	50	5	0
75～79	72	13	59	0	0
80～84	68	36	31	1	0
85～89	49	39	10	0	0
90歳以上	26	22	3	1	0

別表 2 1

要介護認定を受けている場合の要介護度の状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	未回答	不詳
総数	175	39	20	29	20	25	10	18	14	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0
55～59	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
60～64	4	0	0	0	0	2	1	0	1	0
65～69	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0
70～74	10	3	2	1	1	1	0	1	1	0
75～79	22	7	2	7	0	2	0	2	2	0
80～84	52	17	3	7	8	4	3	5	5	0
85～89	51	8	9	8	7	9	3	4	3	0
90歳以上	28	2	1	6	4	7	3	5	0	0
男	53	11	8	9	5	8	3	6	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0
55～59	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
60～64	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	5	2	2	0	0	1	0	0	0	0
75～79	9	3	1	3	0	1	0	1	0	0
80～84	16	5	1	3	1	2	1	2	1	0
85～89	12	1	3	1	3	3	0	1	0	0
90歳以上	6	0	0	2	1	1	1	1	0	0
女	122	28	12	20	15	17	7	12	11	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
65～69	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0
70～74	5	1	0	1	1	0	0	1	1	0
75～79	13	4	1	4	0	1	0	1	2	0
80～84	36	12	2	4	7	2	2	3	4	0
85～89	39	7	6	7	4	6	3	3	3	0
90歳以上	22	2	1	4	3	6	2	4	0	0

別表 2 2

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	脳血管疾 患	心臓疾患	がん	呼吸器疾 患	関節疾患	認知症	パーキン ソン病	糖尿病	視覚・聴 覚障害	骨折・転 倒	脊髄損傷	高齢によ る衰弱	その他	わからな い	未回答	不詳
総数	175	48	27	9	11	26	22	4	3	6	8	2	4	2	1	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	4	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	4	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	10	4	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75～79	22	7	2	2	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
80～84	52	15	7	3	4	5	7	1	1	3	2	1	1	1	0	1	0
85～89	51	11	13	0	2	9	6	0	1	1	3	1	2	1	0	1	0
90歳以上	28	9	2	1	1	7	4	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0
男	53	22	4	3	5	5	6	2	2	1	0	1	1	0	0	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	9	4	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	16	6	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
85～89	12	5	2	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
90歳以上	6	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	122	26	23	6	6	21	16	2	1	5	8	1	3	2	1	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	4	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70～74	5	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75～79	13	3	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
80～84	36	9	6	2	3	4	5	0	0	3	2	0	1	1	0	0	0
85～89	39	6	11	0	1	9	4	0	1	0	3	1	1	1	0	1	0
90歳以上	22	7	2	0	1	5	3	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0

別表 2 3

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	脳血管 疾患	心臓疾 患	がん	呼吸器 疾患	関節疾 患	認知症	パーキ ンソン病	糖尿病	視覚・聴 覚障害	骨折・転 倒	脊髄損 傷	高齢によ る衰弱	その他	わからな い	未回答	不詳
総数	167	27	7	1	1	19	24	6	4	4	12	7	15	9	3	28	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
60～64	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
70～74	10	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0
75～79	22	2	1	0	0	2	5	2	0	1	1	2	0	0	1	5	0
80～84	52	8	1	1	1	5	6	1	0	1	5	3	4	4	1	10	0
85～89	51	7	4	0	0	3	9	2	2	0	3	0	8	4	1	4	0
90歳以上	28	7	0	0	0	5	3	0	1	1	3	1	3	0	0	3	0
男	51	15	1	0	0	3	4	2	1	1	1	5	5	4	2	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
60～64	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
75～79	9	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	2	0
80～84	16	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	2	2	1	2	1
85～89	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1
90歳以上	6	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
女	116	12	6	1	1	16	20	4	3	3	11	2	10	5	1	21	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65～69	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
70～74	5	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
75～79	13	0	1	0	0	2	4	1	0	1	0	0	0	0	1	3	0
80～84	36	5	1	1	1	5	4	0	0	1	5	1	2	2	0	8	0
85～89	39	2	3	0	0	3	9	2	2	0	3	0	5	3	0	4	3
90歳以上	22	5	0	0	0	4	2	0	1	0	3	0	3	0	0	3	1

別表 2 4

介助なしでできること（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	洗顔	口腔清 拭	身体の 清拭	洗髪	着替	入浴	体位交 換・起 居	排泄	食事の 準備・ 後始末	食事	服薬	散歩	掃除	洗濯	買い物	日常会 話	未回答	不詳
総数	18361	1178	1177	1177	1121	1148	1126	1174	1168	1078	1183	1160	1091	1073	1083	1045	1173	206	0
30～34歳	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
35～39	66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0
40～44	466	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	18	0
45～49	1837	113	113	113	113	113	113	113	113	112	113	113	113	112	112	112	113	33	0
50～54	2996	186	186	186	185	184	184	184	185	184	185	184	183	185	184	181	184	46	0
55～59	2828	177	176	176	174	176	174	174	174	171	175	174	172	172	173	171	175	44	0
60～64	2266	142	144	144	138	138	140	141	141	137	143	143	138	134	136	136	141	30	0
65～69	1840	114	114	114	114	115	114	117	116	113	116	116	112	113	115	112	115	10	0
70～74	1595	103	103	103	99	101	100	101	103	92	103	102	96	95	92	92	102	8	0
75～79	1809	119	119	119	117	119	115	117	116	105	119	116	102	105	103	96	116	6	0
80～84	1521	103	103	103	90	98	93	105	103	82	104	97	90	79	82	78	103	8	0
85～89	854	66	63	63	45	54	48	66	63	41	68	62	41	37	43	28	65	1	0
90歳以上	267	22	23	23	13	17	12	23	21	8	24	20	11	8	10	6	26	0	0
男	8880	568	568	568	550	555	549	563	563	518	568	559	534	521	519	514	560	103	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
40～44	296	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	8	0
45～49	960	59	59	59	59	59	59	59	59	58	59	59	59	58	58	58	59	20	0
50～54	1379	86	86	86	85	84	84	84	85	84	85	84	84	85	84	83	84	26	0
55～59	1527	96	95	95	94	95	94	95	95	92	95	94	94	93	93	93	95	19	0
60～64	1099	68	69	69	67	68	68	68	69	67	69	69	67	65	66	67	68	15	0
65～69	847	53	53	53	53	53	53	53	53	52	53	52	52	52	52	52	53	5	0
70～74	765	50	50	50	47	49	48	49	50	43	50	49	46	46	43	44	49	2	0
75～79	751	51	51	51	50	51	48	50	49	39	51	51	40	40	38	37	49	5	0
80～84	777	52	52	52	49	49	49	52	51	42	52	48	48	43	43	44	51	0	0
85～89	345	26	26	26	19	20	20	26	25	16	26	27	18	15	17	12	25	1	0
90歳以上	100	7	7	7	7	7	6	7	7	5	8	6	6	4	5	4	7	0	0
女	9481	610	609	609	571	593	577	611	605	560	615	601	557	552	564	531	613	103	0
30～34歳	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
35～39	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
40～44	170	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
45～49	877	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	13	0
50～54	1617	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	98	100	20	0
55～59	1301	81	81	81	80	81	80	79	79	79	80	80	78	79	80	78	80	25	0
60～64	1167	74	75	75	71	70	72	73	72	70	74	74	71	69	70	69	73	15	0
65～69	993	61	61	61	61	62	61	64	63	61	63	64	60	61	63	60	62	5	0
70～74	830	53	53	53	52	52	52	52	53	49	53	53	50	49	49	48	53	6	0
75～79	1058	68	68	68	67	68	67	67	67	66	68	65	62	65	65	59	67	1	0
80～84	744	51	51	51	41	49	44	53	52	40	52	49	42	36	39	34	52	8	0
85～89	509	40	37	37	26	34	28	40	38	25	42	35	23	22	26	16	40	0	0
90歳以上	167	15	16	16	6	10	6	16	14	3	16	14	5	4	5	2	19	0	0

別表 2 5

受診頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	入院中	毎週1回以上	毎月1~3回程度	数か月に1回程度	受診していない	未回答	不詳
総数	1437	36	127	646	382	204	42	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	1	0	0	0
35 ~ 39	6	0	0	3	1	2	0	0
40 ~ 44	46	0	4	11	18	11	2	0
45 ~ 49	146	1	9	38	51	45	2	0
50 ~ 54	234	3	11	76	86	53	5	0
55 ~ 59	222	0	10	84	70	53	5	0
60 ~ 64	174	2	9	80	59	18	6	0
65 ~ 69	127	2	12	66	31	9	7	0
70 ~ 74	113	2	11	66	24	7	3	0
75 ~ 79	129	2	23	80	18	3	3	0
80 ~ 84	124	14	21	68	13	2	6	0
85 ~ 89	79	4	13	53	5	1	3	0
90歳以上	36	6	4	21	5	0	0	0
男	687	17	45	291	191	122	21	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	0	0	3	0	1	0	0
40 ~ 44	26	0	1	6	12	5	2	0
45 ~ 49	79	1	2	21	25	28	2	0
50 ~ 54	114	2	3	36	39	31	3	0
55 ~ 59	116	0	4	42	32	34	4	0
60 ~ 64	84	2	1	37	29	11	4	0
65 ~ 69	58	1	3	28	18	5	3	0
70 ~ 74	53	1	5	30	12	5	0	0
75 ~ 79	57	2	10	34	11	0	0	0
80 ~ 84	56	4	8	34	8	1	1	0
85 ~ 89	30	2	7	14	4	1	2	0
90歳以上	10	2	1	6	1	0	0	0
女	750	19	82	355	191	82	21	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	1	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	1	1	0	0
40 ~ 44	20	0	3	5	6	6	0	0
45 ~ 49	67	0	7	17	26	17	0	0
50 ~ 54	120	1	8	40	47	22	2	0
55 ~ 59	106	0	6	42	38	19	1	0
60 ~ 64	90	0	8	43	30	7	2	0
65 ~ 69	69	1	9	38	13	4	4	0
70 ~ 74	60	1	6	36	12	2	3	0
75 ~ 79	72	0	13	46	7	3	3	0
80 ~ 84	68	10	13	34	5	1	5	0
85 ~ 89	49	2	6	39	1	0	1	0
90歳以上	26	4	3	15	4	0	0	0

別表 2 6

この1年間の治療の内容（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	手術を受けた	入院した	外来で治療を受けた	未回答	不詳
総数	1659	127	171	1080	281	0
30～34歳	1	0	0	1	0	0
35～39歳	7	1	0	4	2	0
40～44歳	49	1	2	29	17	0
45～49歳	158	9	6	103	40	0
50～54歳	251	10	13	168	60	0
55～59歳	243	14	13	161	55	0
60～64歳	195	13	13	135	34	0
65～69歳	150	14	15	100	21	0
70～74歳	135	11	17	89	18	0
75～79歳	163	22	22	103	16	0
80～84歳	157	19	33	92	13	0
85～89歳	107	11	27	67	2	0
90歳以上	43	2	10	28	3	0
男	789	64	79	489	157	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39歳	5	1	0	3	1	0
40～44歳	29	1	2	19	7	0
45～49歳	85	4	3	53	25	0
50～54歳	125	7	9	73	36	0
55～59歳	126	6	6	81	33	0
60～64歳	90	5	5	59	21	0
65～69歳	67	6	6	46	9	0
70～74歳	63	4	10	39	10	0
75～79歳	77	14	11	44	8	0
80～84歳	71	9	15	42	5	0
85～89歳	41	6	12	22	1	0
90歳以上	10	1	0	8	1	0
女	870	63	92	591	124	0
30～34歳	1	0	0	1	0	0
35～39歳	2	0	0	1	1	0
40～44歳	20	0	0	10	10	0
45～49歳	73	5	3	50	15	0
50～54歳	126	3	4	95	24	0
55～59歳	117	8	7	80	22	0
60～64歳	105	8	8	76	13	0
65～69歳	83	8	9	54	12	0
70～74歳	72	7	7	50	8	0
75～79歳	86	8	11	59	8	0
80～84歳	86	10	18	50	8	0
85～89歳	66	5	15	45	1	0
90歳以上	33	1	10	20	2	0

別表 2 7

油症検診を受診したか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	657	764	16	0
30～34歳	1	1	0	0	0
35～39	6	2	4	0	0
40～44	46	14	31	1	0
45～49	146	58	88	0	0
50～54	234	68	164	2	0
55～59	222	82	138	2	0
60～64	174	89	83	2	0
65～69	127	70	54	3	0
70～74	113	80	32	1	0
75～79	129	86	41	2	0
80～84	124	65	57	2	0
85～89	79	35	44	0	0
90歳以上	36	7	28	1	0
男	687	318	362	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	4	2	2	0	0
40～44	26	7	18	1	0
45～49	79	31	48	0	0
50～54	114	32	81	1	0
55～59	116	43	72	1	0
60～64	84	39	44	1	0
65～69	58	35	21	2	0
70～74	53	41	12	0	0
75～79	57	38	18	1	0
80～84	56	29	27	0	0
85～89	30	16	14	0	0
90歳以上	10	5	5	0	0
女	750	339	402	9	0
30～34歳	1	1	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	20	7	13	0	0
45～49	67	27	40	0	0
50～54	120	36	83	1	0
55～59	106	39	66	1	0
60～64	90	50	39	1	0
65～69	69	35	33	1	0
70～74	60	39	20	1	0
75～79	72	48	23	1	0
80～84	68	36	30	2	0
85～89	49	19	30	0	0
90歳以上	26	2	23	1	0

別表 28

油症検診に関する案内を受けましたか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	764	583	157	24	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	4	2	2	0	0
40～44	31	20	10	1	0
45～49	88	60	26	2	0
50～54	164	120	36	8	0
55～59	138	107	26	5	0
60～64	83	61	21	1	0
65～69	54	46	7	1	0
70～74	32	28	3	1	0
75～79	41	31	9	1	0
80～84	57	47	8	2	0
85～89	44	37	5	2	0
90歳以上	28	24	4	0	0
男	362	276	73	13	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	2	0	0	0
40～44	18	9	8	1	0
45～49	48	36	10	2	0
50～54	81	62	14	5	0
55～59	72	53	16	3	0
60～64	44	32	12	0	0
65～69	21	19	2	0	0
70～74	12	11	1	0	0
75～79	18	13	5	0	0
80～84	27	22	4	1	0
85～89	14	12	1	1	0
90歳以上	5	5	0	0	0
女	402	307	84	11	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	13	11	2	0	0
45～49	40	24	16	0	0
50～54	83	58	22	3	0
55～59	66	54	10	2	0
60～64	39	29	9	1	0
65～69	33	27	5	1	0
70～74	20	17	2	1	0
75～79	23	18	4	1	0
80～84	30	25	4	1	0
85～89	30	25	4	1	0
90歳以上	23	19	4	0	0

別表 29

油症検診に関する案内があれば受診するか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	157	58	95	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	10	5	5	0	0
45～49	26	9	17	0	0
50～54	36	11	24	1	0
55～59	26	11	14	1	0
60～64	21	12	9	0	0
65～69	7	1	5	1	0
70～74	3	2	1	0	0
75～79	9	3	6	0	0
80～84	8	2	5	1	0
85～89	5	0	5	0	0
90歳以上	4	2	2	0	0
男	73	29	42	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	8	4	4	0	0
45～49	10	4	6	0	0
50～54	14	2	11	1	0
55～59	16	8	7	1	0
60～64	12	7	5	0	0
65～69	2	0	2	0	0
70～74	1	1	0	0	0
75～79	5	2	3	0	0
80～84	4	1	3	0	0
85～89	1	0	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
女	84	29	53	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	2	1	1	0	0
45～49	16	5	11	0	0
50～54	22	9	13	0	0
55～59	10	3	7	0	0
60～64	9	5	4	0	0
65～69	5	1	3	1	0
70～74	2	1	1	0	0
75～79	4	1	3	0	0
80～84	4	1	2	1	0
85～89	4	0	4	0	0
90歳以上	4	2	2	0	0

別表 30

油証券を持っているか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	909	516	12	0
30～34歳	1	1	0	0	0
35～39	6	4	2	0	0
40～44	46	23	23	0	0
45～49	146	88	58	0	0
50～54	234	142	91	1	0
55～59	222	135	86	1	0
60～64	174	105	65	4	0
65～69	127	80	45	2	0
70～74	113	76	37	0	0
75～79	129	98	29	2	0
80～84	124	87	35	2	0
85～89	79	49	30	0	0
90歳以上	36	21	15	0	0
男	687	421	261	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	4	2	2	0	0
40～44	26	11	15	0	0
45～49	79	44	35	0	0
50～54	114	72	42	0	0
55～59	116	69	46	1	0
60～64	84	44	39	1	0
65～69	58	37	19	2	0
70～74	53	34	19	0	0
75～79	57	43	13	1	0
80～84	56	42	14	0	0
85～89	30	15	15	0	0
90歳以上	10	8	2	0	0
女	750	488	255	7	0
30～34歳	1	1	0	0	0
35～39	2	2	0	0	0
40～44	20	12	8	0	0
45～49	67	44	23	0	0
50～54	120	70	49	1	0
55～59	106	66	40	0	0
60～64	90	61	26	3	0
65～69	69	43	26	0	0
70～74	60	42	18	0	0
75～79	72	55	16	1	0
80～84	68	45	21	2	0
85～89	49	34	15	0	0
90歳以上	26	13	13	0	0

別表 3 1

油証券を使用しているか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	424	987	26	0
30 ~ 34歳	1	0	1	0	0
35 ~ 39	6	3	3	0	0
40 ~ 44	46	9	36	1	0
45 ~ 49	146	27	119	0	0
50 ~ 54	234	52	180	2	0
55 ~ 59	222	49	169	4	0
60 ~ 64	174	48	123	3	0
65 ~ 69	127	43	76	8	0
70 ~ 74	113	48	64	1	0
75 ~ 79	129	62	66	1	0
80 ~ 84	124	44	77	3	0
85 ~ 89	79	27	50	2	0
90歳以上	36	12	23	1	0
男	687	209	469	9	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	1	3	0	0
40 ~ 44	26	2	24	0	0
45 ~ 49	79	16	63	0	0
50 ~ 54	114	30	83	1	0
55 ~ 59	116	30	85	1	0
60 ~ 64	84	24	58	2	0
65 ~ 69	58	24	30	4	0
70 ~ 74	53	24	29	0	0
75 ~ 79	57	23	34	0	0
80 ~ 84	56	22	33	1	0
85 ~ 89	30	9	21	0	0
90歳以上	10	4	6	0	0
女	750	215	518	17	0
30 ~ 34歳	1	0	1	0	0
35 ~ 39	2	2	0	0	0
40 ~ 44	20	7	12	1	0
45 ~ 49	67	11	56	0	0
50 ~ 54	120	22	97	1	0
55 ~ 59	106	19	84	3	0
60 ~ 64	90	24	65	1	0
65 ~ 69	69	19	46	4	0
70 ~ 74	60	24	35	1	0
75 ~ 79	72	39	32	1	0
80 ~ 84	68	22	44	2	0
85 ~ 89	49	18	29	2	0
90歳以上	26	8	17	1	0

別表 3 2

この1年間で、油症券を使用せずに受診したことがあるか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1437	1007	391	39	0
30～34歳	1	1	0	0	0
35～39	6	4	2	0	0
40～44	46	31	15	0	0
45～49	146	101	42	3	0
50～54	234	170	59	5	0
55～59	222	152	62	8	0
60～64	174	120	50	4	0
65～69	127	83	37	7	0
70～74	113	79	32	2	0
75～79	129	88	36	5	0
80～84	124	89	31	4	0
85～89	79	64	15	0	0
90歳以上	36	25	10	1	0
男	687	461	208	18	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	4	3	1	0	0
40～44	26	18	8	0	0
45～49	79	51	25	3	0
50～54	114	77	34	3	0
55～59	116	73	39	4	0
60～64	84	56	26	2	0
65～69	58	34	22	2	0
70～74	53	35	17	1	0
75～79	57	41	15	1	0
80～84	56	41	13	2	0
85～89	30	24	6	0	0
90歳以上	10	8	2	0	0
女	750	546	183	21	0
30～34歳	1	1	0	0	0
35～39	2	1	1	0	0
40～44	20	13	7	0	0
45～49	67	50	17	0	0
50～54	120	93	25	2	0
55～59	106	79	23	4	0
60～64	90	64	24	2	0
65～69	69	49	15	5	0
70～74	60	44	15	1	0
75～79	72	47	21	4	0
80～84	68	48	18	2	0
85～89	49	40	9	0	0
90歳以上	26	17	8	1	0

別表 3 3

油証券の使用を希望する医療機関があるか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1007	263	697	47	0
30～34歳	1	0	1	0	0
35～39	4	1	2	1	0
40～44	31	6	23	2	0
45～49	101	18	78	5	0
50～54	170	41	124	5	0
55～59	152	32	115	5	0
60～64	120	35	78	7	0
65～69	83	26	51	6	0
70～74	79	22	51	6	0
75～79	88	32	53	3	0
80～84	89	23	61	5	0
85～89	64	20	43	1	0
90歳以上	25	7	17	1	0
男	461	121	322	18	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	3	1	1	1	0
40～44	18	2	16	0	0
45～49	51	11	39	1	0
50～54	77	22	51	4	0
55～59	73	17	54	2	0
60～64	56	11	42	3	0
65～69	34	12	20	2	0
70～74	35	9	23	3	0
75～79	41	14	25	2	0
80～84	41	11	30	0	0
85～89	24	8	16	0	0
90歳以上	8	3	5	0	0
女	546	142	375	29	0
30～34歳	1	0	1	0	0
35～39	1	0	1	0	0
40～44	13	4	7	2	0
45～49	50	7	39	4	0
50～54	93	19	73	1	0
55～59	79	15	61	3	0
60～64	64	24	36	4	0
65～69	49	14	31	4	0
70～74	44	13	28	3	0
75～79	47	18	28	1	0
80～84	48	12	31	5	0
85～89	40	12	27	1	0
90歳以上	17	4	12	1	0

別表 3 4

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1437	150	1267	20	0
30 ~ 34歳	1	1	0	0	0
35 ~ 39	6	0	6	0	0
40 ~ 44	46	0	45	1	0
45 ~ 49	146	6	138	2	0
50 ~ 54	234	10	220	4	0
55 ~ 59	222	12	210	0	0
60 ~ 64	174	18	154	2	0
65 ~ 69	127	19	108	0	0
70 ~ 74	113	18	92	3	0
75 ~ 79	129	20	106	3	0
80 ~ 84	124	23	98	3	0
85 ~ 89	79	9	69	1	0
90歳以上	36	14	21	1	0
男	687	72	607	8	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	0	4	0	0
40 ~ 44	26	0	25	1	0
45 ~ 49	79	2	76	1	0
50 ~ 54	114	6	106	2	0
55 ~ 59	116	3	113	0	0
60 ~ 64	84	11	71	2	0
65 ~ 69	58	6	52	0	0
70 ~ 74	53	11	42	0	0
75 ~ 79	57	11	45	1	0
80 ~ 84	56	14	42	0	0
85 ~ 89	30	5	24	1	0
90歳以上	10	3	7	0	0
女	750	78	660	12	0
30 ~ 34歳	1	1	0	0	0
35 ~ 39	2	0	2	0	0
40 ~ 44	20	0	20	0	0
45 ~ 49	67	4	62	1	0
50 ~ 54	120	4	114	2	0
55 ~ 59	106	9	97	0	0
60 ~ 64	90	7	83	0	0
65 ~ 69	69	13	56	0	0
70 ~ 74	60	7	50	3	0
75 ~ 79	72	9	61	2	0
80 ~ 84	68	9	56	3	0
85 ~ 89	49	4	45	0	0
90歳以上	26	11	14	1	0

別表 3 5

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	脳腫瘍	脳卒中・脳 出血・くも 膜下出血	脳梗塞	頭痛	頭重(頭が 重い)	神経痛	知的障害	躁うつ病	統合失調 症	幻覚	認知症	もの忘れ	かっとなり やすい・短 気	その他	病気・症状 は特にな い	未回答	不 詳
総 数	2897	7	27	89	673	349	341	8	103	33	51	83	407	204	71	342	109	0
30 ~ 34歳	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35 ~ 39	8	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
40 ~ 44	77	0	1	1	23	10	7	0	3	1	1	0	3	8	2	13	4	0
45 ~ 49	253	1	0	1	71	26	29	0	13	2	2	0	20	19	6	50	13	0
50 ~ 54	385	0	1	2	117	44	37	0	15	5	4	0	35	24	11	72	18	0
55 ~ 59	417	1	0	2	110	51	42	3	18	5	4	1	56	36	12	64	12	0
60 ~ 64	320	1	1	6	70	46	40	1	9	5	7	2	34	19	8	49	22	0
65 ~ 69	263	2	2	12	58	39	32	0	12	4	3	1	37	18	6	29	8	0
70 ~ 74	240	1	3	7	50	29	30	1	7	3	2	8	45	22	4	20	8	0
75 ~ 79	294	1	3	14	57	37	39	1	11	3	3	11	51	21	10	19	13	0
80 ~ 84	322	0	7	17	62	34	45	1	8	2	6	25	65	21	7	16	6	0
85 ~ 89	215	0	4	18	32	26	28	1	4	1	9	22	44	13	4	7	2	0
90 歳 以上	99	0	5	9	17	6	10	0	3	2	10	13	16	2	1	3	2	0
男	1268	1	12	51	246	128	147	1	38	13	16	25	178	114	28	216	54	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
40 ~ 44	47	0	1	1	10	6	5	0	1	1	1	0	1	7	2	9	2	0
45 ~ 49	127	1	0	1	28	11	16	0	5	1	1	0	9	9	3	35	7	0
50 ~ 54	180	0	1	2	48	16	19	0	6	2	2	0	19	11	4	41	9	0
55 ~ 59	197	0	0	1	42	15	18	1	8	2	2	0	32	22	4	44	6	0
60 ~ 64	142	0	0	4	22	15	21	0	3	4	3	0	15	8	2	30	15	0
65 ~ 69	107	0	1	6	20	15	11	0	3	1	1	0	16	10	1	20	2	0
70 ~ 74	111	0	2	6	18	12	12	0	1	1	0	4	21	15	3	13	3	0
75 ~ 79	117	0	0	11	17	11	16	0	5	0	0	5	23	11	4	8	6	0
80 ~ 84	147	0	2	9	26	17	18	0	5	1	3	9	27	14	3	12	1	0
85 ~ 89	71	0	4	8	9	8	10	0	1	0	2	4	13	6	2	3	1	0
90 歳 以上	17	0	1	2	3	2	0	0	0	0	1	3	2	1	0	1	1	0
女	1629	6	15	38	427	221	194	7	65	20	35	58	229	90	43	126	55	0
30 ~ 34歳	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35 ~ 39	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ~ 44	30	0	0	0	13	4	2	0	2	0	0	0	2	1	0	4	2	0
45 ~ 49	126	0	0	0	43	15	13	0	8	1	1	0	11	10	3	15	6	0
50 ~ 54	205	0	0	0	69	28	18	0	9	3	2	0	16	13	7	31	9	0
55 ~ 59	220	1	0	1	68	36	24	2	10	3	2	1	24	14	8	20	6	0
60 ~ 64	178	1	1	2	48	31	19	1	6	1	4	2	19	11	6	19	7	0
65 ~ 69	156	2	1	6	38	24	21	0	9	3	2	1	21	8	5	9	6	0
70 ~ 74	129	1	1	1	32	17	18	1	6	2	2	4	24	7	1	7	5	0
75 ~ 79	177	1	3	3	40	26	23	1	6	3	3	6	28	10	6	11	7	0
80 ~ 84	175	0	5	8	36	17	27	1	3	1	3	16	38	7	4	4	5	0
85 ~ 89	144	0	0	10	23	18	18	1	3	1	7	18	31	7	2	4	1	0
90 歳 以上	82	0	4	7	14	4	10	0	3	2	9	10	14	1	1	2	1	0

別表 3 6

自律神経系の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	起立性低血 圧	過敏性腸症 候群	多汗症	汗が出にく い	不眠	不安神経症	自律神経失 調症	その他	病気・症状 は特にならない	未回答	不 詳
総 数	2073	201	163	109	67	421	120	255	25	562	150	0
30 ~ 34歳	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
35 ~ 39	7	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2	0
40 ~ 44	62	6	6	5	1	7	4	8	2	19	4	0
45 ~ 49	203	22	13	6	8	27	10	25	3	73	16	0
50 ~ 54	319	29	21	16	13	57	21	35	0	103	24	0
55 ~ 59	315	30	26	20	6	62	19	40	3	93	16	0
60 ~ 64	254	20	27	9	9	49	11	34	3	71	21	0
65 ~ 69	186	19	15	8	9	42	8	27	4	40	14	0
70 ~ 74	160	14	15	9	6	39	7	17	2	37	14	0
75 ~ 79	190	16	8	14	4	45	11	25	1	50	16	0
80 ~ 84	206	27	18	17	4	51	14	25	2	36	12	0
85 ~ 89	118	11	11	4	3	29	10	13	4	27	6	0
90 歳 以上	51	7	3	0	4	11	5	5	1	10	5	0
男	875	72	65	42	24	136	40	69	12	337	78	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	5	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0
40 ~ 44	32	2	4	5	0	2	3	2	0	13	1	0
45 ~ 49	93	8	6	1	1	12	2	8	1	45	9	0
50 ~ 54	145	9	7	8	7	26	9	9	0	58	12	0
55 ~ 59	154	12	12	10	2	27	9	15	2	57	8	0
60 ~ 64	103	4	8	3	3	13	3	9	1	44	15	0
65 ~ 69	68	6	5	2	2	8	2	6	3	28	6	0
70 ~ 74	62	6	4	2	3	8	1	3	1	27	7	0
75 ~ 79	69	6	2	2	2	12	2	4	0	31	8	0
80 ~ 84	89	15	11	6	1	18	6	8	1	19	4	0
85 ~ 89	40	2	5	2	1	7	2	4	2	11	4	0
90 歳 以上	15	2	1	0	2	2	1	1	1	3	2	0
女	1198	129	98	67	43	285	80	186	13	225	72	0
30 ~ 34歳	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40 ~ 44	30	4	2	0	1	5	1	6	2	6	3	0
45 ~ 49	110	14	7	5	7	15	8	17	2	28	7	0
50 ~ 54	174	20	14	8	6	31	12	26	0	45	12	0
55 ~ 59	161	18	14	10	4	35	10	25	1	36	8	0
60 ~ 64	151	16	19	6	6	36	8	25	2	27	6	0
65 ~ 69	118	13	10	6	7	34	6	21	1	12	8	0
70 ~ 74	98	8	11	7	3	31	6	14	1	10	7	0
75 ~ 79	121	10	6	12	2	33	9	21	1	19	8	0
80 ~ 84	117	12	7	11	3	33	8	17	1	17	8	0
85 ~ 89	78	9	6	2	2	22	8	9	2	16	2	0
90 歳 以上	36	5	2	0	2	9	4	4	0	7	3	0

別表 3 7

眼の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	眼脂過多	瞼板線か らのチー ズ様分泌 物	結膜(白 目)の色素 沈着	白内障	緑内障	近視	遠視	乱視	弱視	その他	病気・症状 は特にな い	未回答	不詳
総数	2767	392	113	85	348	71	461	296	463	52	185	231	70	0
30～34歳	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35～39	10	2	0	0	0	0	3	1	2	0	0	1	1	0
40～44	65	7	2	2	4	0	16	4	13	0	5	10	2	0
45～49	234	24	5	5	1	1	66	18	50	3	19	35	7	0
50～54	412	50	9	16	6	4	106	40	83	4	28	52	14	0
55～59	413	58	13	12	13	5	94	52	76	5	34	47	4	0
60～64	328	49	15	10	15	5	58	39	65	6	26	26	14	0
65～69	264	47	16	11	27	5	31	39	48	2	21	11	6	0
70～74	226	34	14	8	50	7	29	21	35	3	8	8	9	0
75～79	271	42	12	8	82	17	14	25	29	7	16	13	6	0
80～84	293	47	20	11	72	9	22	32	38	10	15	14	3	0
85～89	182	24	4	1	54	14	18	21	18	7	10	10	1	0
90歳以上	67	8	3	1	23	4	3	4	6	5	3	4	3	0
男	1266	174	50	28	134	29	229	137	220	17	88	130	30	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	8	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	0
40～44	42	5	1	1	3	0	10	2	10	0	3	6	1	0
45～49	125	16	3	3	0	0	31	9	24	1	9	23	6	0
50～54	189	23	1	4	3	2	49	19	41	1	12	28	6	0
55～59	217	30	7	6	8	3	51	26	36	2	20	27	1	0
60～64	149	18	9	2	6	2	25	20	28	3	10	16	10	0
65～69	98	20	3	1	8	2	13	13	21	1	10	6	0	0
70～74	104	14	6	3	19	5	17	11	15	2	3	7	2	0
75～79	116	18	8	3	29	5	7	12	16	2	6	7	3	0
80～84	133	22	9	5	30	5	13	16	16	2	7	8	0	0
85～89	68	6	2	0	22	4	10	8	9	1	5	1	0	0
90歳以上	17	0	1	0	6	1	0	0	3	2	3	1	0	0
女	1501	218	63	57	214	42	232	159	243	35	97	101	40	0
30～34歳	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
40～44	23	2	1	1	1	0	6	2	3	0	2	4	1	0
45～49	109	8	2	2	1	1	35	9	26	2	10	12	1	0
50～54	223	27	8	12	3	2	57	21	42	3	16	24	8	0
55～59	196	28	6	6	5	2	43	26	40	3	14	20	3	0
60～64	179	31	6	8	9	3	33	19	37	3	16	10	4	0
65～69	166	27	13	10	19	3	18	26	27	1	11	5	6	0
70～74	122	20	8	5	31	2	12	10	20	1	5	1	7	0
75～79	155	24	4	5	53	12	7	13	13	5	10	6	3	0
80～84	160	25	11	6	42	4	9	16	22	8	8	6	3	0
85～89	114	18	2	1	32	10	8	13	9	6	5	9	1	0
90歳以上	50	8	2	1	17	3	3	4	3	3	0	3	3	0

別表 3 8

口の中の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	舌がん	歯牙形成不全	歯周病	歯肉炎	顎関節症	味覚異常	歯肉の色素沈着	口内炎になりやすい	虫歯になりやすい	歯の知覚過敏	永久歯を早期に失った	その他	病気・症状は特にない	未回答	不詳
総数	3516	1	17	611	385	119	62	200	514	614	462	224	58	199	50	0
30～34歳	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
35～39歳	10	0	0	2	1	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0
40～44歳	97	0	0	13	11	6	1	3	11	26	17	3	0	4	2	0
45～49歳	330	0	5	40	30	20	5	15	56	59	48	11	6	31	4	0
50～54歳	600	0	9	92	67	28	4	36	79	127	94	25	8	24	7	0
55～59歳	569	0	2	105	68	24	4	29	77	109	82	23	11	35	0	0
60～64歳	437	0	0	73	39	15	7	24	58	86	66	28	6	22	13	0
65～69歳	330	0	0	67	33	7	6	25	55	48	50	23	6	7	3	0
70～74歳	290	0	1	59	33	6	4	21	46	39	33	22	3	17	6	0
75～79歳	319	1	0	63	37	3	9	17	55	48	31	26	5	19	5	0
80～84歳	311	0	0	57	39	6	13	19	49	44	24	34	8	16	2	0
85～89歳	153	0	0	32	20	3	6	7	15	20	9	18	4	15	4	0
90歳以上	66	0	0	8	7	1	2	3	9	5	6	11	1	9	4	0
男	1551	1	9	302	166	35	24	80	204	293	178	96	24	108	31	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	8	0	0	2	1	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0
40～44歳	53	0	0	8	7	2	0	3	6	14	8	1	0	3	1	0
45～49歳	163	0	4	19	14	4	0	6	33	34	16	7	4	19	3	0
50～54歳	271	0	3	45	30	9	4	13	35	60	41	14	1	13	3	0
55～59歳	275	0	1	61	32	8	0	12	33	56	34	11	3	24	0	0
60～64歳	189	0	0	39	13	5	2	10	23	36	25	12	3	11	10	0
65～69歳	142	0	0	31	16	2	3	9	20	24	18	12	2	4	1	0
70～74歳	122	0	1	23	12	1	2	10	14	22	14	9	2	9	3	0
75～79歳	130	1	0	32	14	1	4	7	17	21	8	8	2	11	4	0
80～84歳	129	0	0	26	17	1	8	8	17	18	9	13	6	6	0	0
85～89歳	55	0	0	15	9	1	1	2	1	6	4	5	1	6	4	0
90歳以上	14	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	4	0	2	2	0
女	1965	0	8	309	219	84	38	120	310	321	284	128	34	91	19	0
30～34歳	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
35～39歳	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40～44歳	44	0	0	5	4	4	1	0	5	12	9	2	0	1	1	0
45～49歳	167	0	1	21	16	16	5	9	23	25	32	4	2	12	1	0
50～54歳	329	0	6	47	37	19	0	23	44	67	53	11	7	11	4	0
55～59歳	294	0	1	44	36	16	4	17	44	53	48	12	8	11	0	0
60～64歳	248	0	0	34	26	10	5	14	35	50	41	16	3	11	3	0
65～69歳	188	0	0	36	17	5	3	16	35	24	32	11	4	3	2	0
70～74歳	168	0	0	36	21	5	2	11	32	17	19	13	1	8	3	0
75～79歳	189	0	0	31	23	2	5	10	38	27	23	18	3	8	1	0
80～84歳	182	0	0	31	22	5	5	11	32	26	15	21	2	10	2	0
85～89歳	98	0	0	17	11	2	5	5	14	14	5	13	3	9	0	0
90歳以上	52	0	0	7	6	0	2	3	7	4	6	7	1	7	2	0

別表 3 9

耳・鼻の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	メニエール 病	めまい	中耳炎	真珠腫性中 耳炎	鼻炎を起こ しやすい	難聴	蓄膿症	鼻血がよく 出る	鼻血が止ま りにくい	その他	病気・症状 はとくにない	未回答	不 詳
総数	2469	177	507	278	30	371	258	206	158	44	68	316	56	0
30 ~ 34歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	9	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	2	1	0
40 ~ 44	64	2	12	11	1	10	4	5	4	1	0	12	2	0
45 ~ 49	248	12	39	49	4	38	18	22	17	2	8	33	6	0
50 ~ 54	388	19	79	57	6	72	26	30	25	6	9	51	8	0
55 ~ 59	384	17	70	57	3	60	34	39	28	4	14	57	1	0
60 ~ 64	312	23	60	28	5	47	32	36	19	7	12	31	12	0
65 ~ 69	203	23	43	15	1	36	20	12	13	2	3	30	5	0
70 ~ 74	198	18	45	14	5	27	25	13	14	4	5	23	5	0
75 ~ 79	227	26	55	23	1	28	22	17	14	6	8	22	5	0
80 ~ 84	233	20	56	13	2	32	38	16	13	6	5	24	8	0
85 ~ 89	151	11	33	8	2	18	27	14	10	5	4	19	0	0
90歳以上	51	6	14	2	0	1	12	1	0	0	0	12	3	0
男	1117	53	175	125	15	163	147	101	80	18	34	178	28	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	7	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	1	0
40 ~ 44	37	1	5	7	1	3	4	4	3	1	0	7	1	0
45 ~ 49	128	1	13	30	4	16	10	14	9	1	5	20	5	0
50 ~ 54	179	4	24	29	6	31	19	10	15	3	4	31	3	0
55 ~ 59	184	5	25	24	1	27	24	20	14	1	6	37	0	0
60 ~ 64	145	8	25	8	1	20	17	20	11	4	5	17	9	0
65 ~ 69	82	10	12	4	0	15	8	4	4	0	2	21	2	0
70 ~ 74	95	7	20	8	1	12	14	6	8	3	4	10	2	0
75 ~ 79	94	6	15	7	1	13	15	9	8	2	4	13	1	0
80 ~ 84	103	9	23	4	0	15	21	9	4	1	4	10	3	0
85 ~ 89	48	1	10	2	0	9	12	3	3	1	0	7	0	0
90歳以上	15	1	3	1	0	0	3	1	0	0	0	5	1	0
女	1352	124	332	153	15	208	111	105	78	26	34	138	28	0
30 ~ 34歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40 ~ 44	27	1	7	4	0	7	0	1	1	0	0	5	1	0
45 ~ 49	120	11	26	19	0	22	8	8	8	1	3	13	1	0
50 ~ 54	209	15	55	28	0	41	7	20	10	3	5	20	5	0
55 ~ 59	200	12	45	33	2	33	10	19	14	3	8	20	1	0
60 ~ 64	167	15	35	20	4	27	15	16	8	3	7	14	3	0
65 ~ 69	121	13	31	11	1	21	12	8	9	2	1	9	3	0
70 ~ 74	103	11	25	6	4	15	11	7	6	1	1	13	3	0
75 ~ 79	133	20	40	16	0	15	7	8	6	4	4	9	4	0
80 ~ 84	130	11	33	9	2	17	17	7	9	5	1	14	5	0
85 ~ 89	103	10	23	6	2	9	15	11	7	4	4	12	0	0
90歳以上	36	5	11	1	0	1	9	0	0	0	0	7	2	0

別表 4 0

甲状腺の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	甲状腺がん	甲状腺腫	慢性甲状腺 炎	バセドウ病	甲状腺機能 低下	その他	病気・症状 はとくにない	未回答	不 詳
総数	1459	9	34	13	22	67	27	1082	205	0
30 ~ 34歳	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
35 ~ 39	6	0	0	0	0	0	0	5	1	0
40 ~ 44	46	0	0	0	0	0	1	32	13	0
45 ~ 49	146	0	2	2	2	2	1	117	20	0
50 ~ 54	234	0	3	1	2	1	5	193	29	0
55 ~ 59	225	1	7	3	2	10	6	178	18	0
60 ~ 64	176	0	5	2	7	8	3	127	24	0
65 ~ 69	128	0	2	0	3	10	3	88	22	0
70 ~ 74	118	4	4	2	2	9	1	74	22	0
75 ~ 79	133	1	3	0	1	10	2	94	22	0
80 ~ 84	128	1	6	0	2	9	4	84	22	0
85 ~ 89	81	0	1	2	1	6	1	64	6	0
90歳以上	36	2	0	1	0	1	0	26	6	0
男	690	1	4	3	3	7	6	566	100	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0
40 ~ 44	26	0	0	0	0	0	0	21	5	0
45 ~ 49	79	0	1	0	0	0	0	66	12	0
50 ~ 54	114	0	0	0	0	0	2	95	17	0
55 ~ 59	117	0	2	1	1	1	1	103	8	0
60 ~ 64	84	0	0	1	1	1	1	66	14	0
65 ~ 69	58	0	1	0	0	1	0	49	7	0
70 ~ 74	54	0	0	1	0	1	0	40	12	0
75 ~ 79	58	0	0	0	1	2	0	46	9	0
80 ~ 84	56	1	0	0	0	0	2	43	10	0
85 ~ 89	30	0	0	0	0	1	0	26	3	0
90歳以上	10	0	0	0	0	0	0	8	2	0
女	769	8	30	10	19	60	21	516	105	0
30 ~ 34歳	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40 ~ 44	20	0	0	0	0	0	1	11	8	0
45 ~ 49	67	0	1	2	2	2	1	51	8	0
50 ~ 54	120	0	3	1	2	1	3	98	12	0
55 ~ 59	108	1	5	2	1	9	5	75	10	0
60 ~ 64	92	0	5	1	6	7	2	61	10	0
65 ~ 69	70	0	1	0	3	9	3	39	15	0
70 ~ 74	64	4	4	1	2	8	1	34	10	0
75 ~ 79	75	1	3	0	0	8	2	48	13	0
80 ~ 84	72	0	6	0	2	9	2	41	12	0
85 ~ 89	51	0	1	2	1	5	1	38	3	0
90歳以上	26	2	0	1	0	1	0	18	4	0

別表 4 1

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	肺がん	肺線維症	無気肺	肺水腫	肺炎	慢性気管 支炎	咳声	呼吸困難	息切れ	風邪をひ きやすい	風邪が治 りにくい	せき	たん	その他	病気・症状 はとくに ない	未回答	不 詳	
総数	3540	19	6	3	10	39	154	128	165	107	350	523	344	671	592	58	308	63	0
30～34歳	7	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
35～39	11	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	1	2	0	0	1	0	0
40～44	90	0	0	0	0	0	6	2	2	2	6	16	8	17	12	3	11	5	0
45～49	327	1	0	0	0	1	15	14	11	11	26	44	27	67	50	9	42	9	0
50～54	531	0	0	0	0	4	21	17	21	15	47	81	55	105	91	6	60	8	0
55～59	525	3	2	1	0	8	17	19	21	11	55	80	50	94	91	12	58	3	0
60～64	407	2	0	1	2	6	14	12	24	8	40	56	42	75	66	4	44	11	0
65～69	316	2	1	0	1	4	10	13	13	8	36	50	29	59	58	5	23	4	0
70～74	309	2	0	0	1	4	9	9	17	9	28	46	31	72	63	5	7	6	0
75～79	365	2	0	0	1	2	16	18	22	13	37	55	42	66	59	3	24	5	0
80～84	361	4	0	1	1	5	21	15	21	13	43	52	35	61	62	6	14	7	0
85～89	214	1	2	0	3	5	14	6	10	9	24	31	18	40	29	5	15	2	0
90歳以上	77	1	1	0	1	0	9	3	2	7	7	7	5	14	8	0	10	2	0
男	1617	10	2	1	3	36	77	49	57	37	179	232	120	314	289	29	149	33	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	9	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	1	0	0	1	0	0
40～44	55	0	0	0	0	0	4	1	1	1	4	12	5	11	7	3	3	3	0
45～49	181	1	0	0	0	1	7	8	7	2	16	24	13	40	30	6	19	7	0
50～54	231	0	0	0	0	4	10	4	5	6	24	35	19	45	42	4	30	3	0
55～59	271	1	0	0	0	8	11	8	8	4	37	39	22	45	46	7	33	2	0
60～64	188	2	0	1	1	5	6	3	9	4	22	22	12	36	34	1	22	8	0
65～69	133	1	1	0	0	4	6	7	3	3	21	19	7	23	22	1	13	2	0
70～74	142	1	0	0	1	4	5	3	6	4	13	20	10	35	32	3	4	1	0
75～79	138	1	0	0	0	2	4	5	7	2	15	20	12	27	28	1	12	2	0
80～84	169	2	0	0	0	4	13	8	9	6	17	25	15	28	30	3	6	3	0
85～89	84	1	1	0	1	4	7	1	1	4	8	12	4	19	15	0	5	1	0
90歳以上	16	0	0	0	0	0	3	1	0	1	2	1	0	4	2	0	2	0	0
女	1923	9	4	2	7	3	77	79	108	70	171	291	224	357	303	29	159	30	0
30～34歳	7	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
35～39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
40～44	35	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	4	3	6	5	0	8	2	0
45～49	146	0	0	0	0	0	8	6	4	9	10	20	14	27	20	3	23	2	0
50～54	300	0	0	0	0	0	11	13	16	9	23	46	36	60	49	2	30	5	0
55～59	254	2	2	1	0	0	6	11	13	7	18	41	28	49	45	5	25	1	0
60～64	219	0	0	0	1	1	8	9	15	4	18	34	30	39	32	3	22	3	0
65～69	183	1	0	0	1	0	4	6	10	5	15	31	22	36	36	4	10	2	0
70～74	167	1	0	0	0	0	4	6	11	5	15	26	21	37	31	2	3	5	0
75～79	227	1	0	0	1	0	12	13	15	11	22	35	30	39	31	2	12	3	0
80～84	192	2	0	1	1	1	8	7	12	7	26	27	20	33	32	3	8	4	0
85～89	130	0	1	0	2	1	7	5	9	5	16	19	14	21	14	5	10	1	0
90歳以上	61	1	1	0	1	0	6	2	2	6	5	6	5	10	6	0	8	2	0

別表 4 2

心臓の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	心筋梗塞	狭心症	心不全	心肥大	不整脈	頻脈	動悸	その他	病気・症状 はとくにない	未回答	不詳
総数	1823	34	107	40	91	311	75	303	38	696	128	0
30 ~ 34歳	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35 ~ 39	7	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	0
40 ~ 44	52	0	1	0	0	5	2	5	5	28	6	0
45 ~ 49	157	0	0	1	3	24	1	19	2	90	17	0
50 ~ 54	259	3	4	1	13	23	12	38	4	144	17	0
55 ~ 59	259	4	9	2	4	49	10	52	2	119	8	0
60 ~ 64	217	2	8	2	19	35	10	34	6	81	20	0
65 ~ 69	162	1	11	4	8	28	7	32	4	57	10	0
70 ~ 74	161	3	14	4	7	34	8	31	2	43	15	0
75 ~ 79	177	7	15	3	15	32	10	30	4	53	8	0
80 ~ 84	192	6	20	9	14	44	8	35	4	33	19	0
85 ~ 89	129	6	17	10	7	25	6	20	5	31	2	0
90歳以上	49	2	7	4	1	11	1	5	0	13	5	0
男	816	20	44	10	34	149	25	98	16	357	63	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	5	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0
40 ~ 44	30	0	1	0	0	3	1	2	4	15	4	0
45 ~ 49	81	0	0	1	1	13	0	8	0	47	11	0
50 ~ 54	127	3	3	1	10	14	5	11	3	71	6	0
55 ~ 59	138	3	6	1	2	27	7	23	2	64	3	0
60 ~ 64	97	2	3	0	7	13	4	10	1	45	12	0
65 ~ 69	68	1	4	2	2	13	1	13	2	27	3	0
70 ~ 74	75	3	8	3	2	17	2	13	0	22	5	0
75 ~ 79	69	3	4	0	6	15	1	4	3	29	4	0
80 ~ 84	77	2	9	1	3	22	3	10	1	16	10	0
85 ~ 89	39	3	5	1	1	9	1	3	0	14	2	0
90歳以上	10	0	1	0	0	2	0	0	0	5	2	0
女	1007	14	63	30	57	162	50	205	22	339	65	0
30 ~ 34歳	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40 ~ 44	22	0	0	0	0	2	1	3	1	13	2	0
45 ~ 49	76	0	0	0	2	11	1	11	2	43	6	0
50 ~ 54	132	0	1	0	3	9	7	27	1	73	11	0
55 ~ 59	121	1	3	1	2	22	3	29	0	55	5	0
60 ~ 64	120	0	5	2	12	22	6	24	5	36	8	0
65 ~ 69	94	0	7	2	6	15	6	19	2	30	7	0
70 ~ 74	86	0	6	1	5	17	6	18	2	21	10	0
75 ~ 79	108	4	11	3	9	17	9	26	1	24	4	0
80 ~ 84	115	4	11	8	11	22	5	25	3	17	9	0
85 ~ 89	90	3	12	9	6	16	5	17	5	17	0	0
90歳以上	39	2	6	4	1	9	1	5	0	8	3	0

別表 4 3

心臓の病気・症状 過去・現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	過去に治療し たことがない	過去に治療し たことがある	現在治療中	その他	未回答	不詳
総数	613	221	88	152	24	128	0
30～34歳	1	1	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	1	0	0	0
40～44	12	3	2	0	2	5	0
45～49	39	24	5	4	1	5	0
50～54	73	43	6	6	1	17	0
55～59	95	41	12	14	2	26	0
60～64	73	27	9	13	5	19	0
65～69	60	19	10	12	2	17	0
70～74	55	13	7	21	2	12	0
75～79	68	19	12	23	2	12	0
80～84	72	20	12	29	3	8	0
85～89	46	9	6	24	3	4	0
90歳以上	18	2	7	5	1	3	0
男	267	112	37	65	10	43	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	1	0	0	0
40～44	7	2	2	0	1	2	0
45～49	21	13	3	1	0	4	0
50～54	37	20	3	5	1	8	0
55～59	49	24	7	9	1	8	0
60～64	27	14	3	6	0	4	0
65～69	28	11	4	6	2	5	0
70～74	26	5	3	13	1	4	0
75～79	24	8	3	7	0	6	0
80～84	30	9	7	10	2	2	0
85～89	14	5	1	6	2	0	0
90歳以上	3	1	1	1	0	0	0
女	346	109	51	87	14	85	0
30～34歳	1	1	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	1	3	0
45～49	18	11	2	3	1	1	0
50～54	36	23	3	1	0	9	0
55～59	46	17	5	5	1	18	0
60～64	46	13	6	7	5	15	0
65～69	32	8	6	6	0	12	0
70～74	29	8	4	8	1	8	0
75～79	44	11	9	16	2	6	0
80～84	42	11	5	19	1	6	0
85～89	32	4	5	18	1	4	0
90歳以上	15	1	6	4	1	3	0

別表 4 4

心臓の病気・症状 治療方法、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	食事または運 動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不 詳
総 数	165	11	144	3	7	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	1	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	5	1	3	0	1	0	0
50 ~ 54	6	0	6	0	0	0	0
55 ~ 59	16	0	14	2	0	0	0
60 ~ 64	13	0	12	0	1	0	0
65 ~ 69	12	1	10	0	1	0	0
70 ~ 74	23	3	20	0	0	0	0
75 ~ 79	25	2	23	0	0	0	0
80 ~ 84	31	1	28	1	1	0	0
85 ~ 89	28	3	23	0	2	0	0
90 歳 以 上	5	0	4	0	1	0	0
男	73	6	59	3	5	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	1	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	0	0	1	0	0
50 ~ 54	5	0	5	0	0	0	0
55 ~ 59	11	0	9	2	0	0	0
60 ~ 64	6	0	5	0	1	0	0
65 ~ 69	6	0	5	0	1	0	0
70 ~ 74	15	3	12	0	0	0	0
75 ~ 79	9	2	7	0	0	0	0
80 ~ 84	12	1	10	1	0	0	0
85 ~ 89	6	0	5	0	1	0	0
90 歳 以 上	1	0	0	0	1	0	0
女	92	5	85	0	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	4	1	3	0	0	0	0
50 ~ 54	1	0	1	0	0	0	0
55 ~ 59	5	0	5	0	0	0	0
60 ~ 64	7	0	7	0	0	0	0
65 ~ 69	6	1	5	0	0	0	0
70 ~ 74	8	0	8	0	0	0	0
75 ~ 79	16	0	16	0	0	0	0
80 ~ 84	19	0	18	0	1	0	0
85 ~ 89	22	3	18	0	1	0	0
90 歳 以 上	4	0	4	0	0	0	0

表 4 5

高血圧や血管の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	高血圧	低血圧	動脈硬化	動脈瘤	静脈炎	静脈瘤	その他	病気・症状 はとくにな い	未回答	不 詳
総数	1578	592	143	76	40	17	50	16	544	100	0
30 ~ 34歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	6	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
40 ~ 44	46	5	6	0	0	0	2	0	26	7	0
45 ~ 49	150	24	22	1	1	0	3	2	83	14	0
50 ~ 54	240	55	35	1	4	0	3	1	122	19	0
55 ~ 59	229	76	23	4	1	0	11	2	102	10	0
60 ~ 64	189	70	13	12	5	0	5	2	68	14	0
65 ~ 69	142	63	6	8	5	4	4	1	39	12	0
70 ~ 74	141	71	6	14	6	3	6	2	27	6	0
75 ~ 79	149	80	12	13	5	5	3	1	26	4	0
80 ~ 84	147	74	8	13	7	3	8	3	23	8	0
85 ~ 89	99	51	9	9	4	2	4	2	17	1	0
90歳以上	39	23	2	1	2	0	1	0	6	4	0
男	735	294	35	29	16	5	8	5	295	48	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
40 ~ 44	26	3	1	0	0	0	1	0	17	4	0
45 ~ 49	80	15	6	0	1	0	0	0	48	10	0
50 ~ 54	117	34	7	1	2	0	0	0	65	8	0
55 ~ 59	119	46	7	2	0	0	2	0	57	5	0
60 ~ 64	91	43	0	7	0	0	0	1	32	8	0
65 ~ 69	58	32	0	0	0	1	0	0	22	3	0
70 ~ 74	64	35	1	7	1	1	2	1	14	2	0
75 ~ 79	60	31	3	3	3	1	1	0	16	2	0
80 ~ 84	66	32	5	5	5	0	1	2	12	4	0
85 ~ 89	39	16	4	4	3	2	1	1	8	0	0
90歳以上	11	7	1	0	1	0	0	0	1	1	0
女	843	298	108	47	24	12	42	11	249	52	0
30 ~ 34歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40 ~ 44	20	2	5	0	0	0	1	0	9	3	0
45 ~ 49	70	9	16	1	0	0	3	2	35	4	0
50 ~ 54	123	21	28	0	2	0	3	1	57	11	0
55 ~ 59	110	30	16	2	1	0	9	2	45	5	0
60 ~ 64	98	27	13	5	5	0	5	1	36	6	0
65 ~ 69	84	31	6	8	5	3	4	1	17	9	0
70 ~ 74	77	36	5	7	5	2	4	1	13	4	0
75 ~ 79	89	49	9	10	2	4	2	1	10	2	0
80 ~ 84	81	42	3	8	2	3	7	1	11	4	0
85 ~ 89	60	35	5	5	1	0	3	1	9	1	0
90歳以上	28	16	1	1	1	0	1	0	5	3	0

別表 4 6

高血圧 過去・現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	過去に治療し たことがない	過去に治療し たことがある	現在治療中	その他	未回答	不詳
総数	592	63	46	471	4	8	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	5	2	1	2	0	0	0
45 ~ 49	24	11	2	11	0	0	0
50 ~ 54	55	7	9	37	1	1	0
55 ~ 59	76	19	3	52	0	2	0
60 ~ 64	70	10	7	52	0	1	0
65 ~ 69	63	2	5	55	1	0	0
70 ~ 74	71	5	0	63	1	2	0
75 ~ 79	80	2	3	74	0	1	0
80 ~ 84	74	4	6	63	0	1	0
85 ~ 89	51	1	5	45	0	0	0
90歳以上	23	0	5	17	1	0	0
男	294	38	19	232	1	4	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	3	1	1	1	0	0	0
45 ~ 49	15	9	1	5	0	0	0
50 ~ 54	34	6	4	23	0	1	0
55 ~ 59	46	12	2	30	0	2	0
60 ~ 64	43	6	3	34	0	0	0
65 ~ 69	32	0	4	28	0	0	0
70 ~ 74	35	1	0	34	0	0	0
75 ~ 79	31	1	0	30	0	0	0
80 ~ 84	32	2	1	28	0	1	0
85 ~ 89	16	0	2	14	0	0	0
90歳以上	7	0	1	5	1	0	0
女	298	25	27	239	3	4	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	2	1	0	1	0	0	0
45 ~ 49	9	2	1	6	0	0	0
50 ~ 54	21	1	5	14	1	0	0
55 ~ 59	30	7	1	22	0	0	0
60 ~ 64	27	4	4	18	0	1	0
65 ~ 69	31	2	1	27	1	0	0
70 ~ 74	36	4	0	29	1	2	0
75 ~ 79	49	1	3	44	0	1	0
80 ~ 84	42	2	5	35	0	0	0
85 ~ 89	35	1	3	31	0	0	0
90歳以上	16	0	4	12	0	0	0

別表 4 7

高血圧 治療方法、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	食事または運動 療法のみ	内服薬	その他	未回答	不詳
総数	501	32	463	6	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	2	0	2	0	0	0
45 ~ 49	11	0	11	0	0	0
50 ~ 54	39	4	35	0	0	0
55 ~ 59	52	3	49	0	0	0
60 ~ 64	53	0	52	1	0	0
65 ~ 69	57	2	54	1	0	0
70 ~ 74	68	5	62	1	0	0
75 ~ 79	83	7	74	2	0	0
80 ~ 84	71	8	62	1	0	0
85 ~ 89	48	3	45	0	0	0
90歳以上	17	0	17	0	0	0
男	242	11	228	3	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	1	0	0	0
45 ~ 49	5	0	5	0	0	0
50 ~ 54	23	1	22	0	0	0
55 ~ 59	30	2	28	0	0	0
60 ~ 64	34	0	34	0	0	0
65 ~ 69	29	1	27	1	0	0
70 ~ 74	37	2	34	1	0	0
75 ~ 79	32	2	30	0	0	0
80 ~ 84	32	3	28	1	0	0
85 ~ 89	14	0	14	0	0	0
90歳以上	5	0	5	0	0	0
女	259	21	235	3	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	1	0	1	0	0	0
45 ~ 49	6	0	6	0	0	0
50 ~ 54	16	3	13	0	0	0
55 ~ 59	22	1	21	0	0	0
60 ~ 64	19	0	18	1	0	0
65 ~ 69	28	1	27	0	0	0
70 ~ 74	31	3	28	0	0	0
75 ~ 79	51	5	44	2	0	0
80 ~ 84	39	5	34	0	0	0
85 ~ 89	34	3	31	0	0	0
90歳以上	12	0	12	0	0	0

別表 4 8

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	肝臓がん	胆のうがん	B型肝炎	C型肝炎	肝機能障害	胆のう炎	胆石症	黄疸	脾腫	その他	病気・症状 はとくにな い	未回答	不 詳
総 数	1549	6	3	38	29	150	39	113	45	8	56	919	143	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0
40 ~ 44	48	0	0	3	0	4	1	3	2	0	2	28	5	0
45 ~ 49	150	0	0	1	0	16	1	6	5	0	7	102	12	0
50 ~ 54	249	0	0	5	5	23	3	10	4	2	7	171	19	0
55 ~ 59	229	0	0	5	1	21	3	11	4	0	10	161	13	0
60 ~ 64	190	0	0	7	8	22	6	15	7	2	8	92	23	0
65 ~ 69	136	3	1	2	4	16	2	9	3	0	4	76	16	0
70 ~ 74	124	0	0	4	3	15	3	10	4	0	4	65	16	0
75 ~ 79	140	1	1	6	4	12	4	13	1	2	5	78	13	0
80 ~ 84	152	2	0	4	3	15	11	22	11	2	6	61	15	0
85 ~ 89	87	0	1	1	1	4	4	10	3	0	3	54	6	0
90 歳 以上	37	0	0	0	0	2	1	3	1	0	0	26	4	0
男	743	5	2	16	9	90	15	64	25	2	25	431	59	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0
40 ~ 44	27	0	0	0	0	4	0	0	1	0	2	18	2	0
45 ~ 49	81	0	0	0	0	9	1	4	2	0	4	55	6	0
50 ~ 54	122	0	0	4	1	15	1	4	4	1	1	83	8	0
55 ~ 59	121	0	0	2	0	14	0	7	4	0	6	81	7	0
60 ~ 64	90	0	0	2	3	11	2	11	3	0	3	42	13	0
65 ~ 69	64	3	1	2	2	9	1	5	1	0	2	36	2	0
70 ~ 74	60	0	0	2	1	10	3	6	2	0	1	28	7	0
75 ~ 79	62	1	1	2	1	6	2	9	0	0	1	33	6	0
80 ~ 84	70	1	0	2	1	9	5	11	6	1	3	27	4	0
85 ~ 89	31	0	0	0	0	2	0	4	1	0	2	20	2	0
90 歳 以上	11	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	6	1	0
女	806	1	1	22	20	60	24	49	20	6	31	488	84	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40 ~ 44	21	0	0	3	0	0	1	3	1	0	0	10	3	0
45 ~ 49	69	0	0	1	0	7	0	2	3	0	3	47	6	0
50 ~ 54	127	0	0	1	4	8	2	6	0	1	6	88	11	0
55 ~ 59	108	0	0	3	1	7	3	4	0	0	4	80	6	0
60 ~ 64	100	0	0	5	5	11	4	4	4	2	5	50	10	0
65 ~ 69	72	0	0	0	2	7	1	4	2	0	2	40	14	0
70 ~ 74	64	0	0	2	2	5	0	4	2	0	3	37	9	0
75 ~ 79	78	0	0	4	3	6	2	4	1	2	4	45	7	0
80 ~ 84	82	1	0	2	2	6	6	11	5	1	3	34	11	0
85 ~ 89	56	0	1	1	1	2	4	6	2	0	1	34	4	0
90 歳 以上	26	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	20	3	0

別表 4 9

すい臓の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階級	総数	すい臓がん	すい炎	糖尿病	その他	病気・症状は とくにない	未回答	不詳
総数	1450	4	38	159	15	1057	177	0
30～34歳	1	0	0	0	0	1	0	0
35～39	6	0	0	1	0	4	1	0
40～44	46	0	0	0	0	38	8	0
45～49	147	0	6	5	1	117	18	0
50～54	234	0	5	16	3	188	22	0
55～59	222	0	7	18	2	180	15	0
60～64	177	1	4	19	3	127	23	0
65～69	130	1	4	19	1	89	16	0
70～74	114	0	4	12	0	79	19	0
75～79	130	2	1	25	2	81	19	0
80～84	127	0	4	31	3	65	24	0
85～89	80	0	3	8	0	63	6	0
90歳以上	36	0	0	5	0	25	6	0
男	693	3	9	97	8	495	81	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	0	0	1	0	2	1	0
40～44	26	0	0	0	0	22	4	0
45～49	79	0	2	2	1	64	10	0
50～54	114	0	1	13	1	88	11	0
55～59	116	0	2	12	1	92	9	0
60～64	86	1	2	13	2	54	14	0
65～69	60	1	1	13	1	42	2	0
70～74	53	0	1	8	0	35	9	0
75～79	57	1	0	14	0	35	7	0
80～84	58	0	0	16	2	30	10	0
85～89	30	0	0	4	0	24	2	0
90歳以上	10	0	0	1	0	7	2	0
女	757	1	29	62	7	562	96	0
30～34歳	1	0	0	0	0	1	0	0
35～39	2	0	0	0	0	2	0	0
40～44	20	0	0	0	0	16	4	0
45～49	68	0	4	3	0	53	8	0
50～54	120	0	4	3	2	100	11	0
55～59	106	0	5	6	1	88	6	0
60～64	91	0	2	6	1	73	9	0
65～69	70	0	3	6	0	47	14	0
70～74	61	0	3	4	0	44	10	0
75～79	73	1	1	11	2	46	12	0
80～84	69	0	4	15	1	35	14	0
85～89	50	0	3	4	0	39	4	0
90歳以上	26	0	0	4	0	18	4	0

別表50

糖尿病 過去・現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	過去に治療し たことがない	過去に治療し たことがある	現在治療中	その他	未回答	不詳
総数	159	7	11	137	3	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	0	0	5	0	0	0
50～54	16	0	1	14	1	0	0
55～59	18	2	1	15	0	0	0
60～64	19	3	1	15	0	0	0
65～69	19	1	1	17	0	0	0
70～74	12	0	0	11	1	0	0
75～79	25	0	2	22	1	0	0
80～84	31	1	3	26	0	1	0
85～89	8	0	0	8	0	0	0
90歳以上	5	0	2	3	0	0	0
男	97	6	6	82	3	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	2	0	0	0
50～54	13	0	1	11	1	0	0
55～59	12	1	0	11	0	0	0
60～64	13	3	1	9	0	0	0
65～69	13	1	1	11	0	0	0
70～74	8	0	0	7	1	0	0
75～79	14	0	1	12	1	0	0
80～84	16	1	2	13	0	0	0
85～89	4	0	0	4	0	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	0
女	62	1	5	55	0	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	3	0	0	3	0	0	0
50～54	3	0	0	3	0	0	0
55～59	6	1	1	4	0	0	0
60～64	6	0	0	6	0	0	0
65～69	6	0	0	6	0	0	0
70～74	4	0	0	4	0	0	0
75～79	11	0	1	10	0	0	0
80～84	15	0	1	13	0	1	0
85～89	4	0	0	4	0	0	0
90歳以上	4	0	2	2	0	0	0

別表 5 1

糖尿病 治療方法、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	食事または運 動療法のみ	内服薬	インスリン	その他	未回答	不 詳
総 数	169	24	124	19	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	1	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	9	2	5	2	0	0	0
50 ~ 54	16	2	13	1	0	0	0
55 ~ 59	18	2	14	2	0	0	0
60 ~ 64	19	0	14	4	1	0	0
65 ~ 69	19	3	14	2	0	0	0
70 ~ 74	15	2	11	2	0	0	0
75 ~ 79	27	8	19	0	0	0	0
80 ~ 84	34	5	23	5	1	0	0
85 ~ 89	8	0	7	1	0	0	0
90 歳 以上	3	0	3	0	0	0	0
男	99	11	75	12	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	1	0	1	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	2	0	2	0	0	0	0
50 ~ 54	12	1	10	1	0	0	0
55 ~ 59	13	0	11	2	0	0	0
60 ~ 64	11	0	8	2	1	0	0
65 ~ 69	12	1	9	2	0	0	0
70 ~ 74	10	2	7	1	0	0	0
75 ~ 79	15	5	10	0	0	0	0
80 ~ 84	18	2	12	4	0	0	0
85 ~ 89	4	0	4	0	0	0	0
90 歳 以上	1	0	1	0	0	0	0
女	70	13	49	7	1	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	7	2	3	2	0	0	0
50 ~ 54	4	1	3	0	0	0	0
55 ~ 59	5	2	3	0	0	0	0
60 ~ 64	8	0	6	2	0	0	0
65 ~ 69	7	2	5	0	0	0	0
70 ~ 74	5	0	4	1	0	0	0
75 ~ 79	12	3	9	0	0	0	0
80 ~ 84	16	3	11	1	1	0	0
85 ~ 89	4	0	3	1	0	0	0
90 歳 以上	2	0	2	0	0	0	0

別表 5 2

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	腎がん	膀胱がん	腎炎	膀胱炎	腎結石	尿管結石	膀胱結石	血尿	蛋白尿	その他	病気・症状はとくにない	未回答	不詳
総数	1770	7	12	79	312	51	96	22	174	131	52	711	123	0
30～34歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0
40～44	54	0	0	2	7	2	6	1	3	5	1	23	4	0
45～49	180	0	1	7	24	6	11	3	15	12	6	84	11	0
50～54	280	1	1	11	52	9	14	3	21	23	7	122	16	0
55～59	277	1	1	11	46	5	10	2	28	23	12	125	13	0
60～64	232	0	1	12	43	8	15	3	30	23	6	73	18	0
65～69	150	0	1	6	28	3	5	0	16	11	5	63	12	0
70～74	146	0	0	8	23	8	9	4	17	8	3	50	16	0
75～79	156	3	3	7	31	5	8	2	14	9	2	60	12	0
80～84	160	1	0	9	38	5	15	2	20	11	6	45	8	0
85～89	89	1	2	6	13	0	2	1	8	6	4	41	5	0
90歳以上	39	0	2	0	6	0	1	1	2	0	0	21	6	0
男	800	5	10	22	31	36	74	16	58	54	24	409	61	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
40～44	31	0	0	0	2	2	5	1	3	2	1	13	2	0
45～49	93	0	1	0	4	6	11	3	6	4	2	47	9	0
50～54	132	1	1	4	2	7	12	3	8	10	2	75	7	0
55～59	131	0	1	3	6	2	6	2	7	8	7	82	7	0
60～64	105	0	1	5	3	5	8	1	9	11	2	48	12	0
65～69	62	0	1	2	3	1	4	0	3	7	2	36	3	0
70～74	64	0	0	1	2	6	8	3	6	2	1	26	9	0
75～79	63	2	3	3	1	3	5	1	3	3	1	33	5	0
80～84	73	1	0	3	7	4	13	1	9	6	3	25	1	0
85～89	31	1	0	1	1	0	1	1	3	1	3	17	2	0
90歳以上	11	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	5	2	0
女	970	2	2	57	281	15	22	6	116	77	28	302	62	0
30～34歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40～44	23	0	0	2	5	0	1	0	0	3	0	10	2	0
45～49	87	0	0	7	20	0	0	0	9	8	4	37	2	0
50～54	148	0	0	7	50	2	2	0	13	13	5	47	9	0
55～59	146	1	0	8	40	3	4	0	21	15	5	43	6	0
60～64	127	0	0	7	40	3	7	2	21	12	4	25	6	0
65～69	88	0	0	4	25	2	1	0	13	4	3	27	9	0
70～74	82	0	0	7	21	2	1	1	11	6	2	24	7	0
75～79	93	1	0	4	30	2	3	1	11	6	1	27	7	0
80～84	87	0	0	6	31	1	2	1	11	5	3	20	7	0
85～89	58	0	2	5	12	0	1	0	5	5	1	24	3	0
90歳以上	28	0	0	0	6	0	0	1	1	0	0	16	4	0

別表 5 3

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	食道がん	胃がん	大腸がん	大腸ポリープ	慢性胃炎	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	下痢	便秘	腹部膨満感	痔疾	腹痛	その他	病気・症状はとくにない	未回答	不詳
総数	3116	3	24	34	209	190	220	139	559	619	293	401	202	24	127	72	0
30～34歳	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
35～39	12	0	0	0	1	1	2	1	2	2	0	0	2	0	0	1	0
40～44	102	0	0	0	3	5	6	5	16	17	11	7	16	3	12	1	0
45～49	313	0	0	0	5	7	15	15	57	48	30	37	47	12	32	8	0
50～54	543	0	3	2	16	35	35	21	103	83	49	44	85	5	52	10	0
55～59	592	0	1	3	25	35	43	25	100	93	46	76	89	13	39	4	0
60～64	426	0	3	6	25	22	23	19	65	65	40	57	51	6	30	14	0
65～69	353	0	1	7	35	20	25	11	52	57	32	49	37	5	16	6	0
70～74	269	1	3	1	24	14	19	9	38	53	15	32	29	4	16	11	0
75～79	309	1	6	6	27	17	17	10	41	62	23	32	36	4	19	8	0
80～84	337	0	2	4	34	18	20	16	44	66	29	38	39	7	14	6	0
85～89	197	1	3	2	9	9	9	4	31	55	13	19	25	5	11	1	0
90歳以上	83	0	2	3	5	7	6	3	9	17	5	10	10	1	3	2	0
男	1698	1	16	20	123	70	139	99	282	232	115	215	202	24	127	33	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	9	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0
40～44	52	0	0	0	1	3	5	4	9	5	3	4	7	2	8	1	0
45～49	160	0	0	0	3	3	12	10	30	16	10	22	24	6	19	5	0
50～54	239	0	2	2	14	9	24	15	48	22	15	25	28	3	28	4	0
55～59	322	0	0	1	17	14	29	20	57	43	24	42	44	5	24	2	0
60～64	216	0	3	4	17	9	17	16	30	25	17	32	24	1	11	10	0
65～69	157	0	1	4	17	5	14	7	25	23	11	25	13	0	10	2	0
70～74	127	1	2	0	13	5	12	6	21	21	7	15	12	1	8	3	0
75～79	135	0	3	4	15	6	8	7	19	20	9	18	14	1	7	4	0
80～84	163	0	2	3	19	9	9	10	25	29	11	16	18	3	8	1	0
85～89	94	0	2	1	6	4	4	1	14	24	7	12	14	2	3	0	0
90歳以上	24	0	1	1	0	2	3	2	3	4	1	4	2	0	1	0	0
女	1418	2	8	14	86	120	81	40	277	387	178	186	186	1	0	39	0
30～34歳	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
35～39	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
40～44	50	0	0	0	2	2	1	1	7	12	8	3	9	1	4	0	0
45～49	153	0	0	0	2	4	3	5	27	32	20	15	23	6	13	3	0
50～54	304	0	1	0	2	26	11	6	55	61	34	19	57	2	24	6	0
55～59	270	0	1	2	8	21	14	5	43	50	22	34	45	8	15	2	0
60～64	210	0	0	2	8	13	6	3	35	40	23	25	27	5	19	4	0
65～69	196	0	0	3	18	15	11	4	27	34	21	24	24	5	6	4	0
70～74	142	0	1	1	11	9	7	3	17	32	8	17	17	3	8	8	0
75～79	174	1	3	2	12	11	9	3	22	42	14	14	22	3	12	4	0
80～84	174	0	0	1	15	9	11	6	19	37	18	22	21	4	6	5	0
85～89	103	1	1	1	3	5	5	3	17	31	6	7	11	3	8	1	0
90歳以上	59	0	1	2	5	5	3	1	6	13	4	6	8	1	2	2	0

別表5 4

血液・リンパの病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	白血病	悪性リンパ 腫	脂質異常症	貧血	リンパ節の 腫大	その他	病気・症状 はとくにない	未回答	不 詳
総 数	1533	2	9	269	302	37	13	748	153	0
30 ～ 34歳	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
35 ～ 39	6	0	0	0	0	0	0	4	2	0
40 ～ 44	46	0	0	2	12	0	0	28	4	0
45 ～ 49	155	0	0	19	38	5	3	75	15	0
50 ～ 54	248	0	0	42	61	5	1	124	15	0
55 ～ 59	237	0	0	40	47	7	3	126	14	0
60 ～ 64	191	0	3	46	31	6	2	84	19	0
65 ～ 69	136	1	2	26	22	3	0	67	15	0
70 ～ 74	125	0	2	33	21	2	0	49	18	0
75 ～ 79	135	0	1	27	19	2	2	65	19	0
80 ～ 84	132	0	1	21	23	3	2	63	19	0
85 ～ 89	84	0	0	9	20	2	0	46	7	0
90 歳以上	36	0	0	4	7	2	0	17	6	0
男	709	1	4	119	75	11	4	423	72	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0
40 ～ 44	26	0	0	2	0	0	0	21	3	0
45 ～ 49	82	0	0	12	7	3	1	50	9	0
50 ～ 54	118	0	0	20	15	2	0	75	6	0
55 ～ 59	117	0	0	20	9	3	0	78	7	0
60 ～ 64	86	0	1	17	7	1	0	48	12	0
65 ～ 69	59	1	0	10	7	0	0	38	3	0
70 ～ 74	58	0	1	16	7	0	0	25	9	0
75 ～ 79	59	0	1	7	8	0	2	33	8	0
80 ～ 84	58	0	1	8	10	0	1	30	8	0
85 ～ 89	32	0	0	5	5	1	0	18	3	0
90 歳以上	10	0	0	2	0	1	0	5	2	0
女	824	1	5	150	227	26	9	325	81	0
30 ～ 34歳	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40 ～ 44	20	0	0	0	12	0	0	7	1	0
45 ～ 49	73	0	0	7	31	2	2	25	6	0
50 ～ 54	130	0	0	22	46	3	1	49	9	0
55 ～ 59	120	0	0	20	38	4	3	48	7	0
60 ～ 64	105	0	2	29	24	5	2	36	7	0
65 ～ 69	77	0	2	16	15	3	0	29	12	0
70 ～ 74	67	0	1	17	14	2	0	24	9	0
75 ～ 79	76	0	0	20	11	2	0	32	11	0
80 ～ 84	74	0	0	13	13	3	1	33	11	0
85 ～ 89	52	0	0	4	15	1	0	28	4	0
90 歳以上	26	0	0	2	7	1	0	12	4	0

別表 5 5

脂質異常症（高脂血症） 過去・現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	過去に治療 したことがな い	過去に治療 したことがあ る	現在治療中	その他	未回答	不 詳
総 数	269	70	35	157	5	2	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	2	1	0	0	1	0	0
45 ~ 49	19	8	2	9	0	0	0
50 ~ 54	42	15	7	19	1	0	0
55 ~ 59	40	11	8	19	2	0	0
60 ~ 64	46	15	0	31	0	0	0
65 ~ 69	26	3	4	16	1	2	0
70 ~ 74	33	9	3	21	0	0	0
75 ~ 79	27	3	5	19	0	0	0
80 ~ 84	21	3	3	15	0	0	0
85 ~ 89	9	2	2	5	0	0	0
90 歳 以上	4	0	1	3	0	0	0
男	119	36	14	67	1	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	2	1	0	0	1	0	0
45 ~ 49	12	6	1	5	0	0	0
50 ~ 54	20	7	3	10	0	0	0
55 ~ 59	20	6	4	10	0	0	0
60 ~ 64	17	5	0	12	0	0	0
65 ~ 69	10	1	3	5	0	1	0
70 ~ 74	16	6	0	10	0	0	0
75 ~ 79	7	2	0	5	0	0	0
80 ~ 84	8	1	1	6	0	0	0
85 ~ 89	5	1	1	3	0	0	0
90 歳 以上	2	0	1	1	0	0	0
女	150	34	21	90	4	1	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	7	2	1	4	0	0	0
50 ~ 54	22	8	4	9	1	0	0
55 ~ 59	20	5	4	9	2	0	0
60 ~ 64	29	10	0	19	0	0	0
65 ~ 69	16	2	1	11	1	1	0
70 ~ 74	17	3	3	11	0	0	0
75 ~ 79	20	1	5	14	0	0	0
80 ~ 84	13	2	2	9	0	0	0
85 ~ 89	4	1	1	2	0	0	0
90 歳 以上	2	0	0	2	0	0	0

別表 5 6

脂質異常症（高脂血症） 治療方法、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	食事または 運動療法の み	内服薬	その他	未回答	不詳
総数	162	16	146	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	9	1	8	0	0	0
50 ~ 54	20	3	17	0	0	0
55 ~ 59	20	3	17	0	0	0
60 ~ 64	32	3	29	0	0	0
65 ~ 69	16	1	15	0	0	0
70 ~ 74	21	3	18	0	0	0
75 ~ 79	21	2	19	0	0	0
80 ~ 84	15	0	15	0	0	0
85 ~ 89	5	0	5	0	0	0
90歳以上	3	0	3	0	0	0
男	68	4	64	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	5	0	5	0	0	0
50 ~ 54	10	0	10	0	0	0
55 ~ 59	11	2	9	0	0	0
60 ~ 64	12	1	11	0	0	0
65 ~ 69	5	0	5	0	0	0
70 ~ 74	10	1	9	0	0	0
75 ~ 79	5	0	5	0	0	0
80 ~ 84	6	0	6	0	0	0
85 ~ 89	3	0	3	0	0	0
90歳以上	1	0	1	0	0	0
女	94	12	82	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	4	1	3	0	0	0
50 ~ 54	10	3	7	0	0	0
55 ~ 59	9	1	8	0	0	0
60 ~ 64	20	2	18	0	0	0
65 ~ 69	11	1	10	0	0	0
70 ~ 74	11	2	9	0	0	0
75 ~ 79	16	2	14	0	0	0
80 ~ 84	9	0	9	0	0	0
85 ~ 89	2	0	2	0	0	0
90歳以上	2	0	2	0	0	0

別表 5 7

前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状(複数回答)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	前立腺が ん	前立腺肥 大	男性不妊	インポテン ツ	その他	病気・症状 はとくにな い	未回答	不 詳
総 数	701	20	81	6	33	22	463	76	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	0	0	0	1	0	1	2	0
40 ~ 44	26	0	0	0	0	0	22	4	0
45 ~ 49	80	0	3	1	0	3	63	10	0
50 ~ 54	114	0	2	1	4	2	94	11	0
55 ~ 59	117	0	10	2	5	6	85	9	0
60 ~ 64	87	3	8	1	6	2	54	13	0
65 ~ 69	59	1	9	0	3	1	43	2	0
70 ~ 74	55	4	8	1	5	2	29	6	0
75 ~ 79	58	5	10	0	5	1	30	7	0
80 ~ 84	61	5	20	0	2	2	23	9	0
85 ~ 89	30	1	8	0	1	2	16	2	0
90 歳 以上	10	1	3	0	1	1	3	1	0
男	701	20	81	6	33	22	463	76	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	0	0	0	1	0	1	2	0
40 ~ 44	26	0	0	0	0	0	22	4	0
45 ~ 49	80	0	3	1	0	3	63	10	0
50 ~ 54	114	0	2	1	4	2	94	11	0
55 ~ 59	117	0	10	2	5	6	85	9	0
60 ~ 64	87	3	8	1	6	2	54	13	0
65 ~ 69	59	1	9	0	3	1	43	2	0
70 ~ 74	55	4	8	1	5	2	29	6	0
75 ~ 79	58	5	10	0	5	1	30	7	0
80 ~ 84	61	5	20	0	2	2	23	9	0
85 ~ 89	30	1	8	0	1	2	16	2	0
90 歳 以上	10	1	3	0	1	1	3	1	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 5 8

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	子宮がん	卵巣がん	乳がん	子宮内膜 症	子宮筋腫	卵巣のう 腫	月経困難 症	不正出血	月経不順	過多月経	過少月経	その他	病気・症 状はとくに ない	未回答	不 詳
総 数	668	16	8	18	61	137	41	133	79	110	101	28	38	286	82	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40 ~ 44	19	0	0	0	2	2	0	5	4	4	3	1	1	6	1	0
45 ~ 49	64	2	1	2	8	14	3	21	16	13	11	2	6	18	3	0
50 ~ 54	110	1	1	1	14	27	8	33	17	27	22	5	8	30	10	0
55 ~ 59	103	2	2	3	13	26	10	26	7	21	21	5	5	34	3	0
60 ~ 64	85	2	1	4	8	19	8	15	14	17	14	3	8	37	5	0
65 ~ 69	58	2	2	4	5	13	2	16	7	13	14	5	3	18	11	0
70 ~ 74	47	2	0	0	2	9	1	8	5	5	9	1	2	26	13	0
75 ~ 79	62	3	1	1	5	11	3	6	4	3	5	4	2	36	10	0
80 ~ 84	55	0	0	3	2	7	4	1	1	2	1	2	1	36	13	0
85 ~ 89	45	0	0	0	2	6	2	2	3	3	1	0	2	31	4	0
90 歳以上	17	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	12	9	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	668	16	8	18	61	137	41	133	79	110	101	28	38	286	82	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40 ~ 44	19	0	0	0	2	2	0	5	4	4	3	1	1	6	1	0
45 ~ 49	64	2	1	2	8	14	3	21	16	13	11	2	6	18	3	0
50 ~ 54	110	1	1	1	14	27	8	33	17	27	22	5	8	30	10	0
55 ~ 59	103	2	2	3	13	26	10	26	7	21	21	5	5	34	3	0
60 ~ 64	85	2	1	4	8	19	8	15	14	17	14	3	8	37	5	0
65 ~ 69	58	2	2	4	5	13	2	16	7	13	14	5	3	18	11	0
70 ~ 74	47	2	0	0	2	9	1	8	5	5	9	1	2	26	13	0
75 ~ 79	62	3	1	1	5	11	3	6	4	3	5	4	2	36	10	0
80 ~ 84	55	0	0	3	2	7	4	1	1	2	1	2	1	36	13	0
85 ~ 89	45	0	0	0	2	6	2	2	3	3	1	0	2	31	4	0
90 歳以上	17	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	12	9	0

別表 5 9

初経のあり・なし、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	750	696	4	50	0
30～34歳	1	1	0	0	0
35～39	2	2	0	0	0
40～44	20	20	0	0	0
45～49	67	64	1	2	0
50～54	120	114	2	4	0
55～59	106	103	0	3	0
60～64	90	86	0	4	0
65～69	69	67	0	2	0
70～74	60	55	0	5	0
75～79	72	65	0	7	0
80～84	68	58	0	10	0
85～89	49	42	1	6	0
90歳以上	26	19	0	7	0
男	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
女	750	696	4	50	0
30～34歳	1	1	0	0	0
35～39	2	2	0	0	0
40～44	20	20	0	0	0
45～49	67	64	1	2	0
50～54	120	114	2	4	0
55～59	106	103	0	3	0
60～64	90	86	0	4	0
65～69	69	67	0	2	0
70～74	60	55	0	5	0
75～79	72	65	0	7	0
80～84	68	58	0	10	0
85～89	49	42	1	6	0
90歳以上	26	19	0	7	0

別表60

閉経のあり・なし、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	517	574	104	72	0
30～34歳	0	1	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	13	2	13	5	0
45～49	56	8	50	9	0
50～54	97	74	37	9	0
55～59	78	102	2	2	0
60～64	70	88	0	2	0
65～69	37	63	0	6	0
70～74	35	54	0	6	0
75～79	47	65	0	7	0
80～84	36	58	0	10	0
85～89	32	41	0	8	0
90歳以上	14	18	0	8	0
男	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
女	517	574	104	72	0
30～34歳	0	1	0	0	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	13	2	13	5	0
45～49	56	8	50	9	0
50～54	97	74	37	9	0
55～59	78	102	2	2	0
60～64	70	88	0	2	0
65～69	37	63	0	6	0
70～74	35	54	0	6	0
75～79	47	65	0	7	0
80～84	36	58	0	10	0
85～89	32	41	0	8	0
90歳以上	14	18	0	8	0

別表 6 1

不妊症、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	491	34	457	259	0
30～34歳	0	0	0	1	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	15	2	13	5	0
45～49	54	5	49	13	0
50～54	90	8	82	30	0
55～59	72	4	68	34	0
60～64	60	6	54	30	0
65～69	32	1	31	37	0
70～74	34	3	31	26	0
75～79	45	1	44	27	0
80～84	39	2	37	29	0
85～89	36	2	34	13	0
90歳以上	12	0	12	14	0
男	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
女	491	34	457	259	0
30～34歳	0	0	0	1	0
35～39	2	0	2	0	0
40～44	15	2	13	5	0
45～49	54	5	49	13	0
50～54	90	8	82	30	0
55～59	72	4	68	34	0
60～64	60	6	54	30	0
65～69	32	1	31	37	0
70～74	34	3	31	26	0
75～79	45	1	44	27	0
80～84	39	2	37	29	0
85～89	36	2	34	13	0
90歳以上	12	0	12	14	0

別表 6 2

妊娠回数、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回以上	未回答	不詳
総数	750	82	55	212	174	86	46	19	13	9	2	1	3	48	0
30～34歳	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	20	2	2	5	6	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0
45～49	67	14	8	18	13	5	5	0	1	0	0	0	0	3	0
50～54	120	20	13	40	29	12	3	0	0	0	0	0	0	3	0
55～59	106	17	11	30	30	10	1	1	0	1	0	0	0	5	0
60～64	90	11	7	32	21	8	2	2	0	0	0	0	0	7	0
65～69	69	4	6	28	12	7	6	0	1	0	0	0	0	5	0
70～74	60	5	2	14	15	9	4	1	2	2	0	0	0	6	0
75～79	72	2	4	17	17	10	7	5	1	1	0	1	1	6	0
80～84	68	2	0	15	13	11	10	2	4	2	0	0	0	9	0
85～89	49	1	1	12	11	8	1	7	3	1	1	0	2	1	0
90歳以上	26	2	1	1	7	3	6	1	0	1	1	0	0	3	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	750	82	55	212	174	86	46	19	13	9	2	1	3	48	0
30～34歳	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	20	2	2	5	6	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0
45～49	67	14	8	18	13	5	5	0	1	0	0	0	0	3	0
50～54	120	20	13	40	29	12	3	0	0	0	0	0	0	3	0
55～59	106	17	11	30	30	10	1	1	0	1	0	0	0	5	0
60～64	90	11	7	32	21	8	2	2	0	0	0	0	0	7	0
65～69	69	4	6	28	12	7	6	0	1	0	0	0	0	5	0
70～74	60	5	2	14	15	9	4	1	2	2	0	0	0	6	0
75～79	72	2	4	17	17	10	7	5	1	1	0	1	1	6	0
80～84	68	2	0	15	13	11	10	2	4	2	0	0	0	9	0
85～89	49	1	1	12	11	8	1	7	3	1	1	0	2	1	0
90歳以上	26	2	1	1	7	3	6	1	0	1	1	0	0	3	0

別表 6 3

出産等の状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	正常分娩	帝王切開	早産	死産	自然流産	人工流産	その他	未回答	不詳
総数	1889	1166	69	40	28	119	221	42	204	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ~ 44	57	20	11	0	0	6	7	1	12	0
45 ~ 49	135	81	13	1	1	10	15	4	10	0
50 ~ 54	244	156	12	7	5	21	19	3	21	0
55 ~ 59	220	131	15	5	3	13	27	6	20	0
60 ~ 64	188	115	8	3	1	14	20	10	17	0
65 ~ 69	163	104	3	6	3	10	24	5	8	0
70 ~ 74	166	91	4	5	3	5	32	6	20	0
75 ~ 79	223	145	3	6	5	18	26	3	17	0
80 ~ 84	217	152	0	3	5	16	20	1	20	0
85 ~ 89	186	120	0	4	0	5	18	2	37	0
90歳以上	86	48	0	0	2	0	13	1	22	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ~ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ~ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1889	1166	69	40	28	119	221	42	204	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ~ 44	57	20	11	0	0	6	7	1	12	0
45 ~ 49	135	81	13	1	1	10	15	4	10	0
50 ~ 54	244	156	12	7	5	21	19	3	21	0
55 ~ 59	220	131	15	5	3	13	27	6	20	0
60 ~ 64	188	115	8	3	1	14	20	10	17	0
65 ~ 69	163	104	3	6	3	10	24	5	8	0
70 ~ 74	166	91	4	5	3	5	32	6	20	0
75 ~ 79	223	145	3	6	5	18	26	3	17	0
80 ~ 84	217	152	0	3	5	16	20	1	20	0
85 ~ 89	186	120	0	4	0	5	18	2	37	0
90歳以上	86	48	0	0	2	0	13	1	22	0

別表 6 4

出産時の出血量、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	小	中	多	未回答	不詳
総数	1885	551	367	118	849	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	4	3	0	0	1	0
40～44	57	11	10	9	27	0
45～49	135	38	36	13	48	0
50～54	243	81	67	16	79	0
55～59	219	69	40	11	99	0
60～64	188	65	38	8	77	0
65～69	163	47	34	11	71	0
70～74	165	31	46	13	75	0
75～79	222	69	43	18	92	0
80～84	217	72	32	11	102	0
85～89	186	53	21	7	105	0
90歳以上	86	12	0	1	73	0
男	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
女	1885	551	367	118	849	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	4	3	0	0	1	0
40～44	57	11	10	9	27	0
45～49	135	38	36	13	48	0
50～54	243	81	67	16	79	0
55～59	219	69	40	11	99	0
60～64	188	65	38	8	77	0
65～69	163	47	34	11	71	0
70～74	165	31	46	13	75	0
75～79	222	69	43	18	92	0
80～84	217	72	32	11	102	0
85～89	186	53	21	7	105	0
90歳以上	86	12	0	1	73	0

別表 6 5

妊娠中の状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	とくになし	切迫流産	切迫早産	妊娠中毒症	その他	未回答	不詳
総数	1899	1093	120	39	81	98	468	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	2	0	1	0	0	1	0
40～44	57	22	8	1	3	1	22	0
45～49	144	70	14	5	9	13	33	0
50～54	245	136	19	11	13	16	50	0
55～59	220	135	21	8	13	12	31	0
60～64	189	94	15	1	15	15	49	0
65～69	164	82	12	3	13	15	39	0
70～74	165	91	13	2	3	7	49	0
75～79	222	146	12	3	8	6	47	0
80～84	217	141	3	2	0	8	63	0
85～89	186	113	3	2	1	4	63	0
90歳以上	86	61	0	0	3	1	21	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1899	1093	120	39	81	98	468	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	2	0	1	0	0	1	0
40～44	57	22	8	1	3	1	22	0
45～49	144	70	14	5	9	13	33	0
50～54	245	136	19	11	13	16	50	0
55～59	220	135	21	8	13	12	31	0
60～64	189	94	15	1	15	15	49	0
65～69	164	82	12	3	13	15	39	0
70～74	165	91	13	2	3	7	49	0
75～79	222	146	12	3	8	6	47	0
80～84	217	141	3	2	0	8	63	0
85～89	186	113	3	2	1	4	63	0
90歳以上	86	61	0	0	3	1	21	0

別表 6 6

新生児の状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	とくになし	低出生体重児	先天異常	奇形	その他	未回答	不詳
総数	1893	1226	47	18	9	114	479	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	3	0	0	0	0	1	0
40～44	57	32	1	0	0	3	21	0
45～49	135	91	4	4	0	5	31	0
50～54	243	166	6	2	0	13	56	0
55～59	220	160	4	1	1	9	45	0
60～64	188	120	7	1	1	12	47	0
65～69	164	79	5	2	1	22	55	0
70～74	170	79	8	7	3	18	55	0
75～79	222	144	5	1	0	15	57	0
80～84	218	142	5	0	0	12	59	0
85～89	186	135	1	0	3	2	45	0
90歳以上	86	75	1	0	0	3	7	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1893	1226	47	18	9	114	479	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4	3	0	0	0	0	1	0
40～44	57	32	1	0	0	3	21	0
45～49	135	91	4	4	0	5	31	0
50～54	243	166	6	2	0	13	56	0
55～59	220	160	4	1	1	9	45	0
60～64	188	120	7	1	1	12	47	0
65～69	164	79	5	2	1	22	55	0
70～74	170	79	8	7	3	18	55	0
75～79	222	144	5	1	0	15	57	0
80～84	218	142	5	0	0	12	59	0
85～89	186	135	1	0	3	2	45	0
90歳以上	86	75	1	0	0	3	7	0

別表 6 7

骨・関節の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	骨肉腫	今まで骨 折したことが ある	過去1年 間に骨折	椎間板へ ルニア	骨粗しょう 症	骨の変形	ガングリ オン	痛風	関節痛	骨痛	肩こり	腰痛	その他	病気・症 状はとくに ない	未回答	不詳
総数	3952	0	367	49	169	183	173	126	101	565	142	869	978	52	131	47	0
30～34歳	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
35～39	13	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	3	5	0	0	0	0
40～44	101	0	9	0	6	1	2	2	1	13	3	24	32	1	7	0	0
45～49	340	0	32	2	17	0	5	13	8	38	6	93	100	4	15	7	0
50～54	568	0	54	5	25	5	17	18	14	74	17	149	153	8	24	5	0
55～59	550	0	42	1	22	8	13	26	21	81	17	133	148	6	28	4	0
60～64	489	0	46	6	22	15	22	21	13	64	17	115	123	3	12	10	0
65～69	360	0	31	8	18	21	14	11	9	53	15	77	85	4	12	2	0
70～74	342	0	24	5	13	28	18	13	8	51	16	63	78	7	12	6	0
75～79	412	0	30	3	16	32	27	9	11	71	18	81	90	8	8	8	0
80～84	419	0	54	10	17	33	25	10	10	63	17	74	89	9	5	3	0
85～89	255	0	27	7	11	29	22	3	5	38	12	39	54	2	6	0	0
90歳以上	98	0	17	2	0	11	7	0	1	16	3	17	20	0	2	2	0
男	1681	0	186	13	108	21	38	32	83	220	36	352	459	21	82	30	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	9	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0
40～44	57	0	8	0	5	0	1	0	1	8	2	9	18	1	4	0	0
45～49	183	0	25	2	13	0	2	3	7	17	1	42	54	2	9	6	0
50～54	263	0	34	1	17	1	5	6	13	29	6	60	75	2	13	1	0
55～59	265	0	27	0	14	2	5	9	18	32	5	57	75	0	17	4	0
60～64	215	0	21	1	13	3	4	6	12	26	3	50	59	1	7	9	0
65～69	137	0	14	0	9	1	2	3	8	18	2	32	36	2	8	2	0
70～74	143	0	10	2	8	4	3	2	6	22	6	26	36	5	10	3	0
75～79	150	0	11	3	9	3	4	1	9	27	6	30	37	2	5	3	0
80～84	161	0	22	3	10	6	4	1	5	27	3	30	40	5	4	1	0
85～89	78	0	10	1	8	1	6	1	4	8	2	11	22	1	3	0	0
90歳以上	20	0	3	0	0	0	2	0	0	4	0	4	4	0	2	1	0
女	2271	0	181	36	61	162	135	94	18	345	106	517	519	31	49	17	0
30～34歳	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
35～39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
40～44	44	0	1	0	1	1	1	2	0	5	1	15	14	0	3	0	0
45～49	157	0	7	0	4	0	3	10	1	21	5	51	46	2	6	1	0
50～54	305	0	20	4	8	4	12	12	1	45	11	89	78	6	11	4	0
55～59	285	0	15	1	8	6	8	17	3	49	12	76	73	6	11	0	0
60～64	274	0	25	5	9	12	18	15	1	38	14	65	64	2	5	1	0
65～69	223	0	17	8	9	20	12	8	1	35	13	45	49	2	4	0	0
70～74	199	0	14	3	5	24	15	11	2	29	10	37	42	2	2	3	0
75～79	262	0	19	0	7	29	23	8	2	44	12	51	53	6	3	5	0
80～84	258	0	32	7	7	27	21	9	5	36	14	44	49	4	1	2	0
85～89	177	0	17	6	3	28	16	2	1	30	10	28	32	1	3	0	0
90歳以上	78	0	14	2	0	11	5	0	1	12	3	13	16	0	0	1	0

別表 6 8

骨粗しょう症 過去・現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	過去に治療し たことがない	過去に治療し たことがある	現在治療中	その他	未回答	不詳
総数	183	30	31	117	1	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	1	1	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	5	1	1	3	0	0	0
55～59歳	8	1	2	4	1	0	0
60～64歳	15	3	2	9	0	1	0
65～69歳	21	6	3	10	0	2	0
70～74歳	28	5	2	21	0	0	0
75～79歳	32	5	5	22	0	0	0
80～84歳	33	4	9	19	0	1	0
85～89歳	29	1	5	23	0	0	0
90歳以上	11	3	2	6	0	0	0
男	21	8	4	7	1	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	1	1	0	0	0	0	0
55～59歳	2	0	1	0	1	0	0
60～64歳	3	1	0	1	0	1	0
65～69歳	1	0	1	0	0	0	0
70～74歳	4	2	0	2	0	0	0
75～79歳	3	1	1	1	0	0	0
80～84歳	6	2	1	3	0	0	0
85～89歳	1	1	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
女	162	22	27	110	0	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	1	1	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	4	0	1	3	0	0	0
55～59歳	6	1	1	4	0	0	0
60～64歳	12	2	2	8	0	0	0
65～69歳	20	6	2	10	0	2	0
70～74歳	24	3	2	19	0	0	0
75～79歳	29	4	4	21	0	0	0
80～84歳	27	2	8	16	0	1	0
85～89歳	28	0	5	23	0	0	0
90歳以上	11	3	2	6	0	0	0

別表 6 9

骨粗しょう症 治療方法、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	食事または 運動療法の み	内服薬	注射薬	その他	未回答	不 詳
総 数	147	11	111	23	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	3	0	3	0	0	0	0
55 ~ 59	4	0	4	0	0	0	0
60 ~ 64	11	1	8	1	1	0	0
65 ~ 69	17	2	10	5	0	0	0
70 ~ 74	25	3	20	2	0	0	0
75 ~ 79	31	4	20	6	1	0	0
80 ~ 84	22	0	18	4	0	0	0
85 ~ 89	27	1	22	4	0	0	0
90 歳 以 上	7	0	6	1	0	0	0
男	8	1	6	1	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	0	0	0	0	0	0	0
60 ~ 64	1	1	0	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	3	0	2	1	0	0	0
75 ~ 79	1	0	1	0	0	0	0
80 ~ 84	3	0	3	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以 上	0	0	0	0	0	0	0
女	139	10	105	22	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	3	0	3	0	0	0	0
55 ~ 59	4	0	4	0	0	0	0
60 ~ 64	10	0	8	1	1	0	0
65 ~ 69	17	2	10	5	0	0	0
70 ~ 74	22	3	18	1	0	0	0
75 ~ 79	30	4	19	6	1	0	0
80 ~ 84	19	0	15	4	0	0	0
85 ~ 89	27	1	22	4	0	0	0
90 歳 以 上	7	0	6	1	0	0	0

別表 7 0

皮膚・爪の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	皮膚が ん	ざ瘡	毛孔の 開大・面 疱	色素沈 着	爪の変 形	粉瘤	粘液囊 腫	掌蹠膿 疱症	湿疹が できやす い	皮膚の 掻痒	乾燥肌	脱毛	白斑	紫斑	その他	病気・症 状はとく にない	未回答	不 詳
総 数	4248	9	379	244	284	540	203	34	48	576	759	412	186	60	184	68	195	67	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	11	0	1	0	2	3	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	104	0	8	0	5	14	3	0	2	16	19	18	5	0	2	3	5	4	0
45 ~ 49	358	0	46	19	24	39	17	0	2	53	57	31	13	1	12	12	24	8	0
50 ~ 54	661	1	71	47	43	81	24	1	10	84	108	76	22	10	23	11	40	9	0
55 ~ 59	655	0	69	39	44	73	31	9	5	98	108	67	33	10	22	13	32	2	0
60 ~ 64	547	0	49	40	33	63	29	4	9	73	95	56	27	9	16	8	22	14	0
65 ~ 69	386	1	39	27	30	50	21	4	6	46	70	26	16	4	20	5	15	6	0
70 ~ 74	401	0	30	24	30	57	26	5	4	56	72	32	20	5	21	4	9	6	0
75 ~ 79	416	1	30	22	27	58	19	3	2	58	80	44	14	9	24	2	14	9	0
80 ~ 84	409	3	29	16	26	55	22	6	6	59	81	32	22	8	21	6	13	4	0
85 ~ 89	215	1	5	7	12	31	7	1	1	26	49	24	12	4	17	4	13	1	0
90歳以上	84	2	2	3	8	16	3	1	1	5	19	4	2	0	6	0	8	4	0
男	1904	2	184	98	114	256	93	11	24	255	362	176	87	26	55	28	100	33	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	6	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	60	0	4	0	3	8	2	0	2	10	13	11	1	0	0	0	4	2	0
45 ~ 49	181	0	24	8	12	21	10	0	2	23	29	15	10	1	5	5	12	4	0
50 ~ 54	284	0	30	18	14	40	12	1	6	36	46	26	13	4	8	5	21	4	0
55 ~ 59	336	0	38	18	23	40	15	5	4	50	57	33	18	5	4	4	20	2	0
60 ~ 64	252	0	25	15	12	29	16	2	5	33	48	27	12	2	3	4	12	7	0
65 ~ 69	155	0	19	11	10	22	7	0	2	18	34	9	8	0	3	2	6	4	0
70 ~ 74	175	0	15	9	14	23	9	2	0	25	35	14	8	3	6	3	7	2	0
75 ~ 79	180	0	13	7	11	24	10	1	1	25	40	17	5	4	11	1	6	4	0
80 ~ 84	184	2	14	9	10	29	9	0	2	25	37	16	8	6	6	4	5	2	0
85 ~ 89	75	0	2	3	4	13	2	0	0	8	17	7	4	1	9	0	5	0	0
90歳以上	16	0	0	0	0	5	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	2	2	0
女	2344	7	195	146	170	284	110	23	24	321	397	236	99	34	129	40	95	34	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	5	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	44	0	4	0	2	6	1	0	0	6	6	7	4	0	2	3	1	2	0
45 ~ 49	177	0	22	11	12	18	7	0	0	30	28	16	3	0	7	7	12	4	0
50 ~ 54	377	1	41	29	29	41	12	0	4	48	62	50	9	6	15	6	19	5	0
55 ~ 59	319	0	31	21	21	33	16	4	1	48	51	34	15	5	18	9	12	0	0
60 ~ 64	295	0	24	25	21	34	13	2	4	40	47	29	15	7	13	4	10	7	0
65 ~ 69	231	1	20	16	20	28	14	4	4	28	36	17	8	4	17	3	9	2	0
70 ~ 74	226	0	15	15	16	34	17	3	4	31	37	18	12	2	15	1	2	4	0
75 ~ 79	236	1	17	15	16	34	9	2	1	33	40	27	9	5	13	1	8	5	0
80 ~ 84	225	1	15	7	16	26	13	6	4	34	44	16	14	2	15	2	8	2	0
85 ~ 89	140	1	3	4	8	18	5	1	1	18	32	17	8	3	8	4	8	1	0
90歳以上	68	2	2	3	8	11	3	1	1	4	14	3	2	0	6	0	6	2	0

別表 7 1

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	アトピー性 皮膚炎	アレルギー 性鼻炎	花粉症	喘息	蕁麻疹	食物アレル ギー	薬物アレル ギー	その他	病気・症状 はとくにない	未回答	不詳
総数	2190	83	315	425	158	342	114	126	34	483	110	0
30～34歳	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35～39	7	0	0	2	1	0	1	0	0	1	2	0
40～44	67	5	10	14	2	9	2	2	0	16	7	0
45～49	240	14	42	54	17	45	11	14	2	33	8	0
50～54	380	14	74	90	28	63	18	16	4	64	9	0
55～59	358	12	55	72	23	60	18	21	8	77	12	0
60～64	264	9	40	52	17	44	16	18	6	48	14	0
65～69	193	7	21	43	10	33	11	12	2	44	10	0
70～74	165	7	18	29	12	20	10	12	7	38	12	0
75～79	185	4	22	30	20	24	8	11	1	54	11	0
80～84	187	9	21	25	17	22	10	14	4	47	18	0
85～89	101	1	11	10	6	18	6	3	0	43	3	0
90歳以上	42	1	1	4	5	4	2	3	0	18	4	0
男	940	35	120	188	67	115	44	35	11	272	53	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0
40～44	37	3	4	7	2	6	1	1	0	11	2	0
45～49	122	6	21	24	9	24	4	5	1	23	5	0
50～54	162	6	28	46	12	18	8	4	0	37	3	0
55～59	161	6	21	27	13	23	8	8	2	45	8	0
60～64	117	5	15	24	8	16	6	3	2	28	10	0
65～69	74	2	4	17	2	10	4	4	0	29	2	0
70～74	69	1	5	14	6	6	2	4	4	23	4	0
75～79	70	2	6	10	7	3	2	4	1	30	5	0
80～84	77	3	11	14	7	5	3	2	1	23	8	0
85～89	34	0	4	2	1	3	4	0	0	18	2	0
90歳以上	12	1	1	1	0	1	1	0	0	5	2	0
女	1250	48	195	237	91	227	70	91	23	211	57	0
30～34歳	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35～39	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
40～44	30	2	6	7	0	3	1	1	0	5	5	0
45～49	118	8	21	30	8	21	7	9	1	10	3	0
50～54	218	8	46	44	16	45	10	12	4	27	6	0
55～59	197	6	34	45	10	37	10	13	6	32	4	0
60～64	147	4	25	28	9	28	10	15	4	20	4	0
65～69	119	5	17	26	8	23	7	8	2	15	8	0
70～74	96	6	13	15	6	14	8	8	3	15	8	0
75～79	115	2	16	20	13	21	6	7	0	24	6	0
80～84	110	6	10	11	10	17	7	12	3	24	10	0
85～89	67	1	7	8	5	15	2	3	0	25	1	0
90歳以上	30	0	0	3	5	3	1	3	0	13	2	0

別表 7 2

膠原病（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	関節リウマチ	全身性エリ テマトーデス	強皮症	皮膚筋炎	シエーグレン 症候群	ベーチェット 病	その他	病氣・症状は とくにない	未回答	不 詳
総 数	1448	60	2	5	3	7	2	16	1087	266	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	6	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0
40 ~ 44	46	0	0	0	0	0	0	0	34	12	0
45 ~ 49	148	3	1	0	0	2	0	1	116	25	0
50 ~ 54	234	6	0	0	0	0	1	2	180	45	0
55 ~ 59	225	9	1	1	1	3	1	1	177	31	0
60 ~ 64	174	8	0	0	0	0	0	1	131	34	0
65 ~ 69	127	6	0	0	0	0	0	4	95	22	0
70 ~ 74	113	5	0	0	0	0	0	1	80	27	0
75 ~ 79	130	7	0	1	0	1	0	4	93	24	0
80 ~ 84	128	6	0	2	2	1	0	1	87	29	0
85 ~ 89	79	6	0	0	0	0	0	1	62	10	0
90 歳 以上	37	4	0	1	0	0	0	0	27	5	0
男	687	13	0	0	0	0	1	3	545	125	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
40 ~ 44	26	0	0	0	0	0	0	0	21	5	0
45 ~ 49	79	0	0	0	0	0	0	1	65	13	0
50 ~ 54	114	1	0	0	0	0	0	0	88	25	0
55 ~ 59	116	2	0	0	0	0	1	0	97	16	0
60 ~ 64	84	3	0	0	0	0	0	0	63	18	0
65 ~ 69	58	1	0	0	0	0	0	1	49	7	0
70 ~ 74	53	2	0	0	0	0	0	0	41	10	0
75 ~ 79	57	1	0	0	0	0	0	1	45	10	0
80 ~ 84	56	2	0	0	0	0	0	0	42	12	0
85 ~ 89	30	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0
90 歳 以上	10	1	0	0	0	0	0	0	7	2	0
女	761	47	2	5	3	7	1	13	542	141	0
30 ~ 34歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35 ~ 39	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40 ~ 44	20	0	0	0	0	0	0	0	13	7	0
45 ~ 49	69	3	1	0	0	2	0	0	51	12	0
50 ~ 54	120	5	0	0	0	0	1	2	92	20	0
55 ~ 59	109	7	1	1	1	3	0	1	80	15	0
60 ~ 64	90	5	0	0	0	0	0	1	68	16	0
65 ~ 69	69	5	0	0	0	0	0	3	46	15	0
70 ~ 74	60	3	0	0	0	0	0	1	39	17	0
75 ~ 79	73	6	0	1	0	1	0	3	48	14	0
80 ~ 84	72	4	0	2	2	1	0	1	45	17	0
85 ~ 89	49	6	0	0	0	0	0	1	37	5	0
90 歳 以上	27	3	0	1	0	0	0	0	20	3	0

別表 7 3

膠原病（複数回答） 過去・現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	過去に治療し たことがない	過去に治療し たことがある	現在治療中	その他	未回答	不詳
総数	84	10	17	32	4	21	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	5	0	2	2	1	0	0
50 ~ 54	9	1	1	2	1	4	0
55 ~ 59	14	1	1	7	1	4	0
60 ~ 64	9	2	2	5	0	0	0
65 ~ 69	10	3	3	1	0	3	0
70 ~ 74	6	0	2	3	0	1	0
75 ~ 79	12	2	3	5	1	1	0
80 ~ 84	8	1	1	3	0	3	0
85 ~ 89	7	0	2	2	0	3	0
90歳以上	4	0	0	2	0	2	0
男	17	3	2	7	1	4	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	1	0	0	0	1	0	0
50 ~ 54	1	0	0	0	0	1	0
55 ~ 59	3	1	0	1	0	1	0
60 ~ 64	3	1	0	2	0	0	0
65 ~ 69	2	1	0	0	0	1	0
70 ~ 74	2	0	1	1	0	0	0
75 ~ 79	2	0	1	1	0	0	0
80 ~ 84	2	0	0	1	0	1	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	0
女	67	7	15	25	3	17	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	4	0	2	2	0	0	0
50 ~ 54	8	1	1	2	1	3	0
55 ~ 59	11	0	1	6	1	3	0
60 ~ 64	6	1	2	3	0	0	0
65 ~ 69	8	2	3	1	0	2	0
70 ~ 74	4	0	1	2	0	1	0
75 ~ 79	10	2	2	4	1	1	0
80 ~ 84	6	1	1	2	0	2	0
85 ~ 89	7	0	2	2	0	3	0
90歳以上	3	0	0	1	0	2	0

別表 7 4

膠原病（複数回答） 治療方法、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	食事または運 動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総数	37	2	29	4	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	3	0	2	1	0	0	0
50 ~ 54	2	0	1	0	1	0	0
55 ~ 59	8	1	6	1	0	0	0
60 ~ 64	5	0	5	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0	0
70 ~ 74	3	0	3	0	0	0	0
75 ~ 79	7	1	5	1	0	0	0
80 ~ 84	3	0	2	0	1	0	0
85 ~ 89	3	0	2	1	0	0	0
90歳以上	2	0	2	0	0	0	0
男	7	0	7	0	0	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ~ 54	0	0	0	0	0	0	0
55 ~ 59	1	0	1	0	0	0	0
60 ~ 64	2	0	2	0	0	0	0
65 ~ 69	0	0	0	0	0	0	0
70 ~ 74	1	0	1	0	0	0	0
75 ~ 79	1	0	1	0	0	0	0
80 ~ 84	1	0	1	0	0	0	0
85 ~ 89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	1	0	0	0	0
女	30	2	22	4	2	0	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ~ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ~ 49	3	0	2	1	0	0	0
50 ~ 54	2	0	1	0	1	0	0
55 ~ 59	7	1	5	1	0	0	0
60 ~ 64	3	0	3	0	0	0	0
65 ~ 69	1	0	1	0	0	0	0
70 ~ 74	2	0	2	0	0	0	0
75 ~ 79	6	1	4	1	0	0	0
80 ~ 84	2	0	1	0	1	0	0
85 ~ 89	3	0	2	1	0	0	0
90歳以上	1	0	1	0	0	0	0

別表 7 5

その他の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階級	総数	全身倦 怠感	手足の しびれ	体がつ る	のどが つる	筋肉の 痛み	体がむく む	日光に 当たると 顔が腫 れたり湿 疹がで きたりす る	指が腫 れる	全身に 痛みが ある	手足に 痛みが ある	その他	病気・症 状はとく にない	未回答	不 詳
総 数	4329	761	768	455	62	421	378	158	249	171	564	57	209	76	0
30 ~ 34歳	9	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
35 ~ 39	21	5	3	3	0	2	1	0	0	1	4	1	1	0	0
40 ~ 44	98	19	20	7	4	9	6	5	3	2	6	1	10	6	0
45 ~ 49	336	62	53	39	3	27	34	14	15	9	31	5	37	7	0
50 ~ 54	620	128	113	59	7	47	54	24	36	21	69	11	42	9	0
55 ~ 59	674	123	119	75	7	66	56	37	44	24	75	4	35	9	0
60 ~ 64	511	97	91	55	5	44	46	13	38	15	64	7	20	16	0
65 ~ 69	394	71	75	50	5	37	31	16	20	9	54	4	16	6	0
70 ~ 74	380	57	69	53	5	48	29	10	23	13	54	5	11	3	0
75 ~ 79	471	67	84	48	9	51	39	14	26	26	75	9	14	9	0
80 ~ 84	457	70	74	42	8	49	46	18	28	30	67	5	14	6	0
85 ~ 89	267	43	46	20	7	32	26	6	9	15	50	4	6	3	0
90 歳 以上	91	18	20	3	1	8	9	1	6	5	15	0	3	2	0
男	1787	324	349	215	20	190	121	40	71	59	217	21	118	42	0
30 ~ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ~ 39	17	4	3	3	0	1	0	0	0	1	4	1	0	0	0
40 ~ 44	50	9	12	5	2	5	2	2	0	0	3	1	7	2	0
45 ~ 49	163	32	30	25	3	11	11	3	5	3	14	3	18	5	0
50 ~ 54	256	54	53	24	3	21	14	6	11	9	28	4	25	4	0
55 ~ 59	307	58	58	41	2	34	20	9	18	10	30	1	20	6	0
60 ~ 64	235	44	44	28	2	20	18	6	15	5	28	2	12	11	0
65 ~ 69	158	28	33	21	1	18	10	4	5	1	22	1	11	3	0
70 ~ 74	149	22	30	26	1	22	8	3	4	6	17	3	6	1	0
75 ~ 79	169	25	33	15	3	20	15	2	4	8	27	4	7	6	0
80 ~ 84	178	30	32	18	2	21	15	5	6	10	29	1	7	2	0
85 ~ 89	89	14	17	9	1	15	7	0	2	6	13	0	3	2	0
90 歳 以上	16	4	4	0	0	2	1	0	1	0	2	0	2	0	0
女	2542	437	419	240	42	231	257	118	178	112	347	36	91	34	0
30 ~ 34歳	9	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
35 ~ 39	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
40 ~ 44	48	10	8	2	2	4	4	3	3	2	3	0	3	4	0
45 ~ 49	173	30	23	14	0	16	23	11	10	6	17	2	19	2	0
50 ~ 54	364	74	60	35	4	26	40	18	25	12	41	7	17	5	0
55 ~ 59	367	65	61	34	5	32	36	28	26	14	45	3	15	3	0
60 ~ 64	276	53	47	27	3	24	28	7	23	10	36	5	8	5	0
65 ~ 69	236	43	42	29	4	19	21	12	15	8	32	3	5	3	0
70 ~ 74	231	35	39	27	4	26	21	7	19	7	37	2	5	2	0
75 ~ 79	302	42	51	33	6	31	24	12	22	18	48	5	7	3	0
80 ~ 84	279	40	42	24	6	28	31	13	22	20	38	4	7	4	0
85 ~ 89	178	29	29	11	6	17	19	6	7	9	37	4	3	1	0
90 歳 以上	75	14	16	3	1	6	8	1	5	5	13	0	1	2	0

健康実態調査 調査票

平成26年4月

厚生労働省

- -

回 答 欄

●ご本人について記入してください。

(1) 氏名等をご記入ください。

フリガナ				性別	男性 ・ 女性
氏 名					
生年月日	明治・大正・昭和		年	月	日 (現在： 歳)
身 長	cm	体 重	Kg		
お住まいの住所	都道 府県		市区 町村		
電話番号					

(2) この調査にご記入いただくのはご本人ですか？

ア. はい イ. いいえ

イ. いいえ と答えた方（本調査票の記入者がご本人でない場合）は、以下をご記入ください。

フリガナ

記入者名： _____（ご本人との関係： _____）

① ご本人が記入できなかった理由について教えてください。

[_____]

② 記入に際し、ご本人の情報などをどのように確認したか教えてください。

以下のいずれかに○をつけてください。

- | | |
|------------------|--------------------|
| ア. 本人に直接会って聞き取った | エ. 家族に電話で聞き取った |
| イ. 本人に電話で聞き取った | オ. 自分が知っている範囲で記入した |
| ウ. 家族に直接会って聞き取った | カ. その他（ _____ ） |

- (3) 今後、記入いただいた内容の確認などのために、電話・携帯電話・FAX・電子メール・郵送で直接連絡を取らせていただくことがあります。
連絡方法の希望について以下のいずれかに○をつけてください。

ア. 直接連絡して良い。※アの場合は、住所及び電話番号は記載不要です。

イ. 記入したが、連絡先は別のところにしてほしい。

ウ. 代理記入者（前のページの設問（2））に連絡してほしい。

ア. イ. ウ. いずれの場合も、以下の連絡先にご記入ください。

連絡先

フリガナ	
氏名	
郵便番号	
住所	
電話番号	
携帯電話番号	
FAX番号	
電子メールアドレス	@
連絡方法	ア. 電話 ウ. FAX 才. 郵送 イ. 携帯電話 エ. 電子メール

問1 生活習慣について

該当するものに○をつけてください。

(1) 1日平均どのくらい歩きますか？（農作業・家事など日常動作を含めます）

- | | |
|----------------|----------------|
| ア. 90分以上 | ウ. 30分以上～60分未満 |
| イ. 60分以上～90分未満 | エ. 30分未満 |

(2) 運動（スポーツ）をどのくらいしますか？（ウォーキング、ジョギング、体操も含めます）

- | | |
|------------|--------------|
| ア. ほぼ毎日 | エ. 月1回程度 |
| イ. 週2～4回程度 | オ. ほとんどしていない |
| ウ. 週1回程度 | |

(3) お酒をどのくらい飲みますか？

- | | |
|------------|-------------|
| ア. ほぼ毎日 | エ. 月1～3回程度 |
| イ. 週3～5回程度 | オ. 年1～10回程度 |
| ウ. 週1～2回程度 | カ. 飲まない |

飲む と答えた方におうかがいします。

1日に飲む量を教えてください。

⇒ ビール大びんに換算して※1 本くらい

※1 換算方法	ビール大びん
ビール小びん1本	0.5本
ビール中びん1本	0.8本
日本酒1合（180ml）	1本
ウイスキーダブル1杯	1本
焼酎の水割り（お湯割り）1.5杯	1本

(4) タバコをどのくらい吸いますか？

- ア. 吸う ⇒ 約 年間、1日に約 本吸っている
- イ. やめた ⇒ 約 年間、1日に約 本吸っていたが、 年前やめた
- ウ. 吸わない

(5) 睡眠時間はどのくらいですか？

- | | |
|----------------|----------------|
| ア. 9時間以上 | エ. 6時間以上～7時間未満 |
| イ. 8時間以上～9時間未満 | オ. 5時間以上～6時間未満 |
| ウ. 7時間以上～8時間未満 | カ. 5時間未満 |

(6) 1日の労働時間はどのくらいですか？（家事なども含みます）

- | | |
|-----------------|----------------|
| ア. 10時間以上 | オ. 6時間以上～7時間未満 |
| イ. 9時間以上～10時間未満 | カ. 5時間以上～6時間未満 |
| ウ. 8時間以上～9時間未満 | キ. 4時間以上～5時間未満 |
| エ. 7時間以上～8時間未満 | ク. 4時間未満 |

(7) 一日平均どれくらいの量の野菜類を食べますか？（最近1ヶ月間の平均を回答して下さい）

ア. 70g未満（1つ未満）	エ. 210g以上270g未満（3～4つ）
イ. 70g以上140g未満（1～2つ）	オ. 270g以上350g未満（4～5つ）
ウ. 140g以上210g未満（2～3つ）	カ. 350g以上（5つ以上）

1つ分 =  =  =  =  =  =  = 

野菜サラダ きゅうりとわかめの酢の物 具たくさん味噌汁 ほうれん草のお浸し ひじきの煮物 煮豆 きのこソテー

※ 1つ分は約70g

(8) 一日平均どれくらいの量の果物類を食べますか？（最近1ヶ月間の平均を回答して下さい）

ア. 50g未満	ウ. 100g以上150g未満
イ. 50g以上100g未満	エ. 150g以上

1つ分 =  =  =  =  =  = 

みかん1個 りんご半分 かき1個 梨半分 ぶどう半房 桃1個

※ 1つ分は約100g

(9) 常用しているサプリメント、健康食品あるいは漢方薬がありますか？

- ア. ある イ. ない

ア. ある と答えた方におうかがいします。

常用※1しているサプリメント、健康食品あるいは漢方薬の名称と摂取の効果を教えてください。

※1 長期間（1年間以上）、定期的（週1回以上）に摂取しているものを記載して下さい。

	ア し 不 快 と 思 う 改 善	イ と し は 思 わ な い	ウ 特 に は 果 が き り と あ る	ウ そ の 他
例. 名称： 鉄分サプリメント	ア	イ	①	ウ
1. 名称：	ア	イ	ウ	ウ
2. 名称：	ア	イ	ウ	ウ
3. 名称：	ア	イ	ウ	ウ
4. 名称：	ア	イ	ウ	ウ
5. 名称：	ア	イ	ウ	ウ

問2 健康・悩み・ストレスについて

該当するものに○をつけてください。

(1) あなたは現在、日常生活で悩みやストレスがありますか？

ア. ある イ. ない

ア. ある と答えた方におうかがいします。

悩みやストレスの原因としてあてはまるものすべてに○をつけてください。
その中で最も気になる原因の記号を記入してください。

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ア. 家族との人間関係 | シ. 妊娠・出産 |
| イ. 家族以外との人間関係 | ス. 育児 |
| ウ. 恋愛・性に関すること | セ. 家事 |
| エ. 結婚 | ソ. 自分の学業・受験・進学 |
| オ. 離婚 | タ. 子どもの教育 |
| カ. いじめ, セクシュアル・ハラスメント | チ. 自分の仕事 |
| キ. 生きがいに関すること | ツ. 家族の仕事 |
| ク. 自由にできる時間がない | テ. 住まいや生活環境
(公害, 安全及び交通事情を含む) |
| ケ. 収入・家計・借金等 | ト. その他 |
| コ. 自分の病気や介護 | ナ. わからない |
| サ. 家族の病気や介護 | |

⇒ 最も気になる原因は ア～ナ のうち

問3 介護や日常生活動作の状況について

該当するものに○をつけてください。

(1) あなたは病院や診療所に入院、または、^{かいごしせつ}介護施設に入所中ですか？

ア. はい イ. いいえ

(2) 現在^{ようかいごにんてい}要介護認定を受けていますか？

ア. はい イ. いいえ

ア. はい と答えた方におうかがいします。

現在の^{ようかいごと}要介護度の状況をおしえてください。

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ア. ^{ようしえん} 要支援 1 | オ. ^{ようかいご} 要介護 3 |
| イ. ^{ようしえん} 要支援 2 | カ. ^{ようかいご} 要介護 4 |
| ウ. ^{ようかいご} 要介護 1 | キ. ^{ようかいご} 要介護 5 |
| エ. ^{ようかいご} 要介護 2 | |

介護が必要となった原因としてあてはまるものすべてに○をつけてください。
 その中で主な原因である記号を記入してください。

- | | |
|----------------------------------|---|
| ア. ^{のうけつかんしゅかん} 脳血管疾患※1 | ク. ^{とうりょうびょう} 糖尿病※7 |
| イ. ^{しんぞうしゅかん} 心臓疾患※2 | ケ. ^{しかく・ちやうかくしやうがい} 視覚・聴覚障害※8 |
| ウ. ^{がん} がん※3 | コ. ^{こっせつ・てんとう} 骨折・転倒※9 |
| エ. ^{こきゅうきしゅかん} 呼吸器疾患※4 | サ. ^{せきずいそんしやう} 脊髄損傷※10 |
| オ. ^{かんせつしゅかん} 関節疾患※5 | シ. ^{こうれい} 高齢による ^{すいじやく} 衰弱※11 |
| カ. ^{にんちしやう} 認知症※6 | ス. その他 |
| キ. パーキンソン病 | セ. わからない |

⇒ 主な原因は ア～セ のうち

- ※1 ^{のうしゅけつ}脳出血、^{のうこうそく}脳こうそく、^{くもまくしゅけつ}くも膜下出血、^{のうそちゆう}脳卒中、その他の^{のうけつかんしゅかん}脳血管疾患及びその^{こういしやう}後遺症など
- ※2 ^{きやうしんしやう}狭心症、^{しんきんこうそく}心筋こうそく、^{ふせいみやく}不整脈、^{しんきんえん}心筋炎、その他の^{しんぞうしゅかん}心臓疾患
- ※3 すべての^{ぶい}部位の^{あくせいしんせいぶつ}悪性新生物（^{はくちゅうびょう}白血病を含む）及び^{にくしほ}肉腫
- ※4 ^{はいきしゅ}肺気腫、^{はいえん}肺炎、^{きかんしえん}気管支炎、^{きやうまくしゅかん}胸膜疾患など
- ※5 ^{かんせつ}関節リウマチ、^{かんせつえん}関節炎、^{かんせつ}関節の^{へんけい}変形、^{ようつうしやう}腰痛症
- ※6 アルツハイマー病など
- ※7 ^{とうりょうびょう}糖尿病及び^{じんしやう}糖尿病性腎症、^{もうまくしやう}糖尿病性網膜症などの^{がっぺいしやう}合併症
- ※8 ^{りょくないしやう}緑内障、^{もうまく}網膜はくり、^{なんちやう}難聴など
- ※9 屋内外を問わず、何らかの原因で骨折又は転倒したもの
- ※10 ^{せきずい}脊髄の機能が^{きゆう}傷害されたもの
- ※11 特にこれといった病気と診断されていないものの、老いて体の機能が衰弱したもの

(3) 以下の動作の左の空欄に介助なしに自分で行うことができるものすべてに○、介助や支

えがあればできるものすべてに◎、介助や支えがあってもできないものすべてに×をつけてください。

※なお、普段行っていない動作については、行うことを想定して、○○×をご記入下さい。

せんがん 洗顔	しょくじ じゆんび あとしまつ 食事の準備・後始末（調理を含む）
こうくうせいしき 口腔清拭（はみがきなど）	しょくじ 食事
からだ せいしき 身体の清拭（体を拭う）	ふくやく 服薬（薬をのむ）
せんぼつ 洗髪	さんぽ 散歩
きがえ 着替	そうじ 掃除
にゆうよく 入浴	せんたく 洗濯
たいいこうかん ききよ 体位交換・起居（寝返りや体を起こすなど）	かいもの 買い物
はいせつ 排泄（トイレ）	にちじょうかいわ 日常会話

問4 この1年間の治療状況について

該当するものに○をつけてください。

(1) 現在の受診の頻度はどのくらいですか？

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| ア. 入院中 | エ. 数か月に1回程度 |
| イ. 毎週1回以上 | オ. 受診していない |
| ウ. 毎月1～3回程度 | ※治療を受けているすべての病気での受診頻度を総合して記載して下さい。 |

(2) この1年間の治療の内容を教えてください。あつたことすべてに○をつけてください。

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ア. 手術を受けた ⇒ 手術の内容: | <input type="text"/> |
| イ. 入院した | |
| ウ. 外来で治療を受けた | |

(3) 油症検診を受診されましたか。

- | | |
|-------|--------|
| ア. はい | イ. いいえ |
|-------|--------|

イ. いいえ と答えた方におうかがいします。

検診受診に関する案内を受けましたか。

- | | |
|-------|--------|
| ア. はい | イ. いいえ |
|-------|--------|

イ. いいえ と答えた方におうかがいします。

検診に関する案内があれば、受診されますか。

- | | |
|-------|--------|
| ア. はい | イ. いいえ |
|-------|--------|

問5 ユシヨウカンジヤジュリヨウケン ヨシヨウケン 油症患者受療券（油症券）※1の使用状況について
 該当するものに○をつけてください。

(1) (株)カネミ倉庫が発行している油症券を現在持っていますか。

ア. はい イ. いいえ

(2) 油症券を使用していますか？

ア. はい イ. いいえ

(3) この1年間、油症券を使用せずに受診したことがありますか？

ア. はい イ. いいえ

ア. はい と答えた方におうかがいします。

今後、油症券の使用を希望する医療機関（病院、診療所、歯科、調剤薬局）がありますか？

ア. はい イ. いいえ

ア. はい と答えた方におうかがいします。

油症券の使用を希望する医療機関の所在地、医療機関名、受診頻度を教えてください。

1.	市町村名：		医療機関名：	
	受診頻度：	ア. 入院中 イ. 毎週1回以上 ウ. 毎月1～3回程度	エ. 数ヶ月に1回程度 オ. 受診していない	
2.	市町村名：		医療機関名：	
	受診頻度：	ア. 入院中 イ. 毎週1回以上 ウ. 毎月1～3回程度	エ. 数ヶ月に1回程度 オ. 受診していない	
3.	市町村名：		医療機関名：	
	受診頻度：	ア. 入院中 イ. 毎週1回以上 ウ. 毎月1～3回程度	エ. 数ヶ月に1回程度 オ. 受診していない	
4.	市町村名：		医療機関名：	
	受診頻度：	ア. 入院中 イ. 毎週1回以上 ウ. 毎月1～3回程度	エ. 数ヶ月に1回程度 オ. 受診していない	
5.	市町村名：		医療機関名：	
	受診頻度：	ア. 入院中 イ. 毎週1回以上 ウ. 毎月1～3回程度	エ. 数ヶ月に1回程度 オ. 受診していない	

※1 油症患者受療券（油症券）を、カネミ倉庫株式会社と契約している医療機関で提示すると、窓口での利用者負担の支払を要することなく、油症に関連する医療を受けることができます。
 なお、油症券を使わずに、油症に関連する医療を受けた場合には、支払った自己負担分を、カネミ倉庫株式会社に請求できます。また、油症券を持っていない方は、必要な場合は、カネミ倉庫株式会社に改めて交付を請求することもできます。

問6 これまでにかかったことのある病気（今かかっている病気・症状も含む）について

該当するものに○をつけてください。小児期の病気については、ご両親にお聞きになってください。分からないところは、できればかかりつけの医師・歯科医師の先生に確認してください。※書き切れなかった場合や特に心配なことなどは問7に記入して下さい。

(1) 悪性腫瘍（がん）にかかったことがありますか？

ア. ある イ. ない

ア. ある と答えた方におうかがいします。

具体的な診断名と治療歴を教えてください。

	ア なし いた こと と治 療	イ あし 過去 に治 療	ウ 現在 治療 中	エ その 他
例. 診断名： 胃がん	ア	イ	ウ	エ
1. 診断名：	ア	イ	ウ	エ
2. 診断名：	ア	イ	ウ	エ
3. 診断名：	ア	イ	ウ	エ
4. 診断名：	ア	イ	ウ	エ

(2) 脳・精神・神経の病気・症状について、
これまでにかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

脳腫瘍	統合失調症※4
脳卒中・脳出血・くも膜下出血※1	幻覚※5
脳梗塞※2	認知症
頭痛	もの忘れ
頭重（頭が重い）	かっとなりやすい・短気
神経痛	その他
知的障害	病気・症状はとくにない
躁うつ病※3	

※1 脳卒中・脳出血・くも膜下出血… 脳機能が強く障害され、突然に意識障害や失語などの症状が起こる

※2 脳梗塞… 脳の血管が閉塞して精神機能に障害が出る。急性で激烈なものは脳卒中と呼ばれる

※3 躁うつ病… 気分の上がり下がりが過剰で日常生活に支障をきたす。またそれを繰り返す

※4 統合失調症… 幻覚や妄想があり、自分の考えや気持ちがまとめられない状態が長く続く

※5 幻覚… ないものがあるように見えたり、聞こえたりする

(3) 自律神経系の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

きりつせいていけつあつ※1 起立性低血圧	ふあんしんけいしやう※4 不安神経症
かびんせいちょうしやうこうぐん※2 過敏性腸症候群	じりつしんけいしつちやうしやう※5 自律神経失調症
たかんしやう※3 多汗症	その他
あせで 汗が出にくい	びやうき しやうじやう 病気・症状はとくにない
ふみん 不眠	
※1 起立性低血圧… 急に立ち上がったときにめまいや失神が起こる ※2 過敏性腸症候群… 腸の検査で明らかな異常が認めないが、腹痛や腹部の不快感、便秘や下痢が長く続く ※3 多汗症… 日常生活に支障をきたす発汗 ※4 不安神経症… 不安が強すぎて日常生活に支障をきたす ※5 自律神経失調症… いろいろな自覚症状があるのに検査では異常が見つからない	

(4) 眼の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

がんしかた 眼脂過多（めやにが多い）	えんし 遠視
けんぱんせん 瞼板腺（まつげの根元）からのチーズ様分泌物	らんし 乱視
けつまくしろうめ 結膜（白目）の色素沈着	じやくし 弱視
はくないしやう 白内障	その他
りよくないしよ 緑内障	びやうき しやうじやう 病気・症状はとくにない
きんし 近視	

(5) 口の中の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

ぜつ 舌がん	こうないえん 口内炎になりやすい
しがけいせいふぜん 歯牙形成不全（子どもの時に歯が生えなかった）	むしば 虫歯になりやすい
ししゅうびやう 歯周病（歯槽膿漏）	は 歯の知覚過敏（歯がしみる）
しにくえん 歯肉炎（歯ぐきの病気）	えいきゆうし 永久歯（全歯）を早期に失った
がくかんせつしやう 顎関節症（あごの関節の異常）	その他
みかくいじやう 味覚異常	びやうき しやうじやう 病気・症状はとくにない
しにく しきそちんちやく 歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）	

(6) 耳・鼻の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

メニエール病 ^{びよ^ろ※1}	蓄膿症 ^{ちくのうしょう}
めまい	鼻血がよく出る ^{はなぢ}
中耳炎 ^{ちゆうじえん}	鼻血が止まりにくい ^{はなぢ}
真珠腫性中耳炎 ^{しんじゆしゆせいちゆうじえん} ※2	その他
鼻炎を起こしやすい ^{びえん}	病気・症状はとくにない ^{びょうき}
難聴 ^{なんちよう}	
※1 メニエール病… 回転性めまい、耳鳴り、難聴などの症状を繰り返す ※2 真珠腫性中耳炎… 中耳炎を繰り返すうちに起こり、症状は難聴、耳だれ、痛みなど	

(7) 甲状腺の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

甲状腺がん ^{こうじょうせん}	甲状腺機能低下 ^{こうじょうせんきのうていか} ※4
甲状腺腫 ^{こうじょうせんしゆ} ※1	その他
慢性甲状腺炎 ^{まんせいこうじょうせんえん} ※2	病気・症状はとくにない ^{びょうき}
バセドウ病 ^{ばせどうびょう} ※3	
※1 甲状腺腫… 甲状腺がはれる ※2 慢性甲状腺炎… 甲状腺の組織に慢性的炎症が起きる ※3 バセドウ病… 甲状腺ホルモンが過剰に分泌される ※4 甲状腺機能低下… 甲状腺ホルモンの合成及び分泌が低下した状態	

(8) のど・気管支・肺の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

肺がん ^{はい}	呼吸困難 ^{こきゅうこんなん}
肺線維症（慢性間質性肺炎） ^{はいせんいしやう} （慢性間質性肺炎）※1	息切れ ^{いきぎ}
無気肺 ^{むきはい} ※2	風邪を引きやすい ^{かぜ}
肺水腫 ^{はいすいしゆ} ※3	風邪が治りにくい ^{かぜ}
肺気腫 ^{はいきしゆ} ※4	せき
肺炎 ^{はいえん}	たん
慢性気管支炎 ^{まんせいきかんしえん}	その他
嚙声（声がかれる） ^{させい}	病気・症状はとくにない ^{びょうき}
※1 肺線維症… 肺が硬くなる ※2 無気肺… 肺がふくらまない、肺に空気が入らない ※3 肺水腫… 肺内に液体成分がたまる ※4 肺気腫… 長年のタバコで息切れが強くなる	

(9) 心臓の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

心筋梗塞※1	頻脈（心拍数が増加している状態）
狭心症※2	動悸（異常にドキドキする）
心不全※3	その他
心肥大	病気・症状はとくにない
不整脈（脈がとぶ）	
※1 心筋梗塞… 心臓の血管が完全に詰まった状態で、胸が痛い ※2 狭心症… 心臓の血管が狭くなり、胸が痛くなる ※3 心不全… 心臓が弱った状態で息切れ、足のむくみがある	

心臓の病気にかかったことがある方におうかがいします。

過去・現在の治療状況について教えてください。

- | | |
|-----------------|----------|
| ア. 過去に治療したことがない | ウ. 現在治療中 |
| イ. 過去に治療したことがある | エ. その他 |

ウ. 現在治療中の方は治療方法を教えてください。

- | | |
|----------------|--------|
| ア. 食事または運動療法のみ | ウ. 注射薬 |
| イ. 内服薬 | エ. その他 |

(10) 高血圧や血管の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

高血圧	静脈炎
低血圧	静脈瘤
動脈硬化	その他
動脈瘤※1	病気・症状はとくにない
※1 動脈瘤… 動脈の一部が「瘤」＝「こぶ」のように膨らんだ状態	

高血圧にかかったことがある方におうかがいします。

過去・現在の治療状況について教えてください。

- | | |
|-----------------|----------|
| ア. 過去に治療したことがない | ウ. 現在治療中 |
| イ. 過去に治療したことがある | エ. その他 |

ウ. 現在治療中の方は治療方法を教えてください。

- | | |
|----------------|--------|
| ア. 食事または運動療法のみ | ウ. その他 |
| イ. 内服薬 | |

(11) 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

肝臓がん	胆石症
胆のうがん	黄疸
B型肝炎	脾腫（脾臓がはれる）
C型肝炎	その他
肝機能障害	病気・症状はとくにない
胆のう炎	

(12) すい臓の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

すい臓がん	その他
すい炎	病気・症状はとくにない
糖尿病	

糖尿病にかかったことがある方におうかがいします。

過去・現在の治療状況について教えてください。

- | | |
|-----------------|----------|
| ア. 過去に治療したことがない | ウ. 現在治療中 |
| イ. 過去に治療したことがある | エ. その他 |

ウ. 現在治療中の方は治療方法を教えてください。

- | | |
|----------------|----------|
| ア. 食事または運動療法のみ | ウ. インスリン |
| イ. 内服薬 | エ. その他 |

(13) 腎臓・膀胱の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

腎がん	膀胱結石
膀胱がん	血尿
腎炎	蛋白尿
膀胱炎	その他
腎結石	病気・症状はとくにない
尿管結石	

(14) 食道・胃・腸・肛門の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

食道がん	下痢
胃がん	便秘
大腸がん	腹部膨満感（おなかが張る）
大腸ポリープ	痔疾（ぢ）
慢性胃炎	腹痛
胃潰瘍	その他
十二指腸潰瘍	病気・症状はとくにない

(15) 血液・リンパの病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

白血病	リンパ節の腫大（リンパの腫れ）
悪性リンパ腫	その他
脂質異常症（高脂血症）※1	病気・症状はとくにない
貧血	
※1 脂質異常症… 血液中の中性脂肪やコレステロールの値の上昇	

脂質異常症（高脂血症）にかかったことがある方におうかがいします。

過去・現在の治療状況について教えてください。

- ア. 過去に治療したことがない ウ. 現在治療中
 イ. 過去に治療したことがある エ. その他

ウ. 現在治療中の方は治療方法を教えてください。

- ア. 食事または運動療法のみ ウ. その他
 イ. 内服薬

(16) 男性のみ
 ご回答ください。
 前立腺・男性機能に関する病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

前立腺がん	インポテンツ
前立腺肥大	その他
男性不妊（子供ができない）	病気・症状はとくにない

(17) 女性のみ
ご回答ください。

子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について、
これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を
受けたものは◎をつけてください。

子宮がん	不正出血
卵巣がん	月経不順
乳がん	過多月経 (月経が多い)
子宮内膜症	過少月経 (月経が少ない)
子宮筋腫	その他
卵巣のう腫	病気・症状はとくにない
月経困難症 (生理痛)	

(18) 女性のみ
ご回答ください。

月経・妊娠・出産に関することについて、おしえてください。

初経	ア. あり <input type="text"/> 歳	イ. なし
閉経	ア. あり <input type="text"/> 歳	イ. なし
不妊症	ア. あり	イ. なし
妊娠回数	<input type="text"/> 回	

	妊娠中の異常					出産について							新生児の異常						
	ア とく になし	イ 切 迫 流 産	ウ 切 迫 早 産	エ 妊 娠 中 毒 症 ※1	オ そ の 他	ア 正 常 分 娩	イ 帝 王 切 開	ウ 早 産	エ 死 産	オ 自 然 流 産	カ 人 工 流 産	キ 出 産 時 の 出 血 量 ※2	ク そ の 他	イ を し た 方 は 出 産 時 期 を 記 入 し て く だ さ い。	ア と く に な し	イ 低 出 生 体 重 児	ウ 先 天 異 常	エ 奇 形	オ そ の 他
記入例	◎ア	イ	ウ	エ	オ	◎ア	イ	ウ	エ	オ	カ	◎小 中 多	ク	◎昭和・平成 58年12月	◎ア	イ	ウ	エ	オ
1回目の妊娠	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	小 中 多	ク	昭和・平成 年 月	ア	イ	ウ	エ	オ
2回目の妊娠	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	小 中 多	ク	昭和・平成 年 月	ア	イ	ウ	エ	オ
3回目の妊娠	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	小 中 多	ク	昭和・平成 年 月	ア	イ	ウ	エ	オ
4回目の妊娠	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	小 中 多	ク	昭和・平成 年 月	ア	イ	ウ	エ	オ
5回目の妊娠	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	小 中 多	ク	昭和・平成 年 月	ア	イ	ウ	エ	オ
6回目の妊娠	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	小 中 多	ク	昭和・平成 年 月	ア	イ	ウ	エ	オ
7回目の妊娠	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	小 中 多	ク	昭和・平成 年 月	ア	イ	ウ	エ	オ

※1 妊娠中毒症… 現在では妊娠高血圧症候群に名称の変更がなされている
 ※2 出産時の出血量… 母子健康手帳の出産の状態の記録を参考にご記入下さい

(19) 骨・関節の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

骨肉腫※1	痛風
今までに骨折したことがある	関節痛
過去1年間に骨折した	骨痛（骨がうずくような痛み）
椎間板ヘルニア	肩こり
骨粗しょう症	腰痛
骨の変形	その他
ガングリオン※2	病気・症状はとくにない

※1 骨肉腫… 腕や脚の大きな骨を侵す、骨のがん
 ※2 ガングリオン… 関節の周辺に生じるこぶ。こぶの中にゼリー状の液体が詰まっている

骨粗しょう症にかかったことがある方におうかがいします。

過去・現在の治療状況について教えてください。

- | | |
|-----------------|----------|
| ア. 過去に治療したことがない | ウ. 現在治療中 |
| イ. 過去に治療したことがある | エ. その他 |

ウ. 現在治療中の方は治療方法を教えてください。

- | | |
|----------------|--------|
| ア. 食事または運動療法のみ | ウ. 注射薬 |
| イ. 内服薬 | エ. その他 |

(20) 皮膚・爪の病気・症状について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

皮膚がん	湿疹がしやすい
ざ瘡（にきび）	皮膚の掻痒（かゆみ）
毛孔の開大・面皰（毛穴が広がる、黒にきび）	乾燥肌（さめ肌）
色素沈着（肌が黒くなる）	脱毛
爪の変形	白斑
粉瘤（皮膚のふくら）	紫斑（内出血）
粘液嚢腫（関節のふくら）	その他
掌蹠膿疱症※1	病気・症状はとくにない

※1 掌蹠膿疱症… 手のひら（手掌）や足の裏（足蹠）に膿（うみ、膿疱）がたまる病気

(21) アレルギー疾患^{しっかん}について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

アトピー ^{せいひふえん} 性皮膚炎	食物 ^{しょくもつ} アレルギー
アレルギー ^{せいびえん} 性鼻炎	薬物 ^{やくぶつ} アレルギー
花粉 ^{かふんしやう} 症	その他
喘息 ^{ぜんそく}	病気 ^{びやうき} ・症状 ^{しやうじやう} はとくにない
蕁麻疹 ^{じんましん}	

(22) 膠原病^{こうげんびやう}について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

関節 ^{かんせつ} リウマチ	シェーグレン ^{しやうこうりん} 症候群
全身性 ^{ぜんしんせい} エリテマトーデス (SLE)	ベーチェット ^{びやう} 病
強皮 ^{きやうひしやう} 症	その他
皮膚 ^{ひふ} 筋炎 ^{きんえん}	病気 ^{びやうき} ・症状 ^{しやうじやう} はとくにない

膠原病^{こうげんびやう}にかかったことがある方におうかがいします。

過去・現在の治療状況について教えてください。

- | | |
|-----------------|----------|
| ア. 過去に治療したことがない | ウ. 現在治療中 |
| イ. 過去に治療したことがある | エ. その他 |

ウ. 現在治療中の方は治療方法を教えてください。

- | | |
|----------------|--------|
| ア. 食事または運動療法のみ | ウ. 注射薬 |
| イ. 内服薬 | エ. その他 |

(23) その他の病気・症状^{しやうじやう}について、
 これまでかかったことのあるものすべてに○、そのうち医師の診断を受けたものは◎をつけてください。

全身 ^{ぜんしん} 倦怠感 ^{けんたいかん} (体がだるい)	日光 ^{にっこう} に当たると顔 ^{かお} が腫 ^は れたり湿疹 ^{しっしん} ができたりする
手足 ^{てあし} のしびれ	指 ^{ゆび} が腫 ^は れる
体 ^{からだ} がつる	全身 ^{ぜんしん} に痛み ^{いた} みがある
のど ^{のど} がつる	手足 ^{てあし} に痛み ^{いた} みがある
筋肉 ^{きんにく} の痛み ^{いた} み	その他
体 ^{からだ} がむくむ	病気 ^{びやうき} ・症状 ^{しやうじやう} はとくにない

問7 その他のことについて

これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に心配なこと、研究してもらいたいこと、ご要望などを、自由に記入してください。

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。