

表7 脂質異常者(高脂血症有病者)の状況(40歳以上)

平成16年		総数		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
総数	有病者	576	18.6	39	7.5	88	11.4	202	21.6	247	28.6	435	16.6
	上記以外	2514	81.4	479	92.5	684	88.6	734	78.4	617	71.4	2186	83.4
	総数	3090	100.0	518	100.0	772	100.0	936	100.0	864	100.0	2621	100.0
男性	有病者	277	22.1	27	15.9	46	16.2	92	22.7	112	28.4	215	20.7
	上記以外	976	77.9	143	84.1	238	83.8	313	77.3	282	71.6	825	79.3
	総数	1253	100.0	170	100.0	284	100.0	405	100.0	394	100.0	1040	100.0
女性	有病者	299	16.3	12	3.4	42	8.6	110	20.7	135	28.7	220	13.9
	上記以外	1538	83.7	336	96.6	446	91.4	421	79.3	335	71.3	1361	86.1
	総数	1837	100.0	348	100.0	488	100.0	531	100.0	470	100.0	1581	100.0

平成17年		総数		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
総数	有病者	636	20.3	38	7.6	89	12.6	231	24.9	278	27.9	478	18.5
	上記以外	2500	79.7	464	92.4	619	87.4	698	75.1	719	72.1	2109	81.5
	総数	3136	100.0	502	100.0	708	100.0	929	100.0	997	100.0	2587	100.0
男性	有病者	266	20.8	30	17.2	44	17.1	89	22.5	103	22.8	220	21.0
	上記以外	1011	79.2	144	82.8	213	82.9	306	77.5	348	77.2	830	79.0
	総数	1277	100.0	174	100.0	257	100.0	395	100.0	451	100.0	1050	100.0
女性	有病者	370	19.9	8	2.4	45	10.0	142	26.6	175	32.1	258	16.8
	上記以外	1489	80.1	320	97.6	406	90.0	392	73.4	371	67.9	1279	83.2
	総数	1859	100.0	328	100.0	451	100.0	534	100.0	546	100.0	1537	100.0

平成18年		総数		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
総数	有病者	652	19.0	39	6.8	143	16.3	201	21.9	269	25.4	499	17.8
	上記以外	2771	81.0	532	93.2	732	83.7	718	78.1	789	74.6	2312	82.2
	総数	3423	100.0	571	100.0	875	100.0	919	100.0	1058	100.0	2811	100.0
男性	有病者	274	19.2	25	12.0	65	18.5	80	20.5	104	21.8	216	18.6
	上記以外	1153	80.8	184	88.0	286	81.5	311	79.5	372	78.2	946	81.4
	総数	1427	100.0	209	100.0	351	100.0	391	100.0	476	100.0	1162	100.0
女性	有病者	378	18.9	14	3.9	78	14.9	121	22.9	165	28.4	283	17.2
	上記以外	1618	81.1	348	96.1	446	85.1	407	77.1	417	71.6	1366	82.8
	総数	1996	100.0	362	100.0	524	100.0	528	100.0	582	100.0	1649	100.0

▼”脂質異常者(高脂血症有病者)”の判定▼

国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症(高脂血症)の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わない。したがって、本報告における判定は以下の通りとした。

・有病者

HDLコレステロールが40mg/dl未満、若しくはコレステロールを下げる薬を服用している者。