

# 妊娠されている方へ

## 新型インフルエンザワクチンの接種 にあたって

平成21年11月11日 厚生労働省

### 目次

- 妊娠されている方について※
- ワクチンの種類
- 接種できる場所
- 接種スケジュール／接種回数※
- 留意点
- ワクチン接種の流れ

※:平成21年11月11日更新

# 妊娠されている方について

## ○妊娠されている方のワクチン接種について

(平成21年11月11日更新)

- 海外の事例では、妊娠されている方が新型インフルエンザに罹患した場合に、重症化するリスクが高いという報告があり、WHO(世界保健機関)でも妊娠している方をワクチン接種の優先対象としていることなどから、日本でも妊娠されている方々を優先接種の対象としていますが、日本ではそのような重症化の事例は現在報告されていません。(平成21年11月11日現在)

(参考)

- ・米国;妊娠可能年齢の入院症例142例中妊婦約40例(28%)、集中治療室に入院した妊婦100例中死亡例28例。(平成21年8月末)
  - ・豪州;入院女性2,464例中妊婦271例(11%)、妊娠可能年齢の入院症例中妊婦32%。ICU入院女性334例中妊婦42例(13%)、全死亡例183例中妊婦の死亡3例 (平成21年10月9日時点)
  - ・カナダ;入院女性1212例中妊婦96例(8%)、妊娠可能年齢の入院症例中妊婦21%、妊娠可能年齢の女性死亡例14例中妊婦4例(29%) (平成21年10月31日時点)
  - ・日本;入院女性2255例中妊婦20例(1%)、妊娠可能年齢の入院症例中妊婦11%、重症肺炎および急性脳炎、死亡の症例の報告なし(平成21年11月11日時点)
- 妊娠初期にインフルエンザワクチンの接種を受けたことにより流産や先天異常の発生リスクが高くなったという報告は現在のところありません。
  - 予防接種における有益性と危険性を、ご自身の基礎疾患や出産予定日等を踏まえて主治医と相談した上で、接種の適否とその時期を決定するようにしてください。
  - また、新型インフルエンザワクチンは母乳を介してお子様に影響を与えることはないと言われています。

# ワクチンの種類

## ○ 新型インフルエンザワクチンの種類

### ◇保存剤が入っているもの

一つの小びんに複数回分のワクチンが充てんされており、1回毎に接種量を注射器に吸引して接種する種類(バイアル製剤)。季節性インフルエンザワクチンでも同様の保存剤が使用されています。

保存剤:チメロサル※1・・・エチル水銀に由来する防腐剤であり、海外で過去に発達障害との関連性が指摘されましたが、最近の疫学研究ではその関連はないとされています。

又は

2-フェノキシエタノール※2・・・妊娠動物等での催奇形性試験の結果には問題ありませんが、妊婦への使用実績は確認されていません。

### ◇保存剤が入っていないもの

あらかじめ注射器にワクチンが成人1回接種量(0.5ml)充てんされている種類(プレフィルドシリンジ製剤)。

※妊娠されている方は、保存剤の入っていない種類を希望により選択することができます。

保存剤を含む新型インフルエンザワクチンの製造販売業者

※1 (学)北里研究所、(財)阪大微生物病研究会、デンカ生研(株)

※2 (財)化学及血清療法研究所

# 接種できる場所

## ○ 新型インフルエンザワクチンを接種する医療機関

◇新型インフルエンザワクチンは、国と委託契約をした、“受託医療機関”のみ配分されます。

◇受託医療機関は市町村により、広報誌やホームページなどを用いて広報されます。

◇かかりつけ医の産科・産婦人科が受託医療機関でない場合は、市町村の提示するリストから、受託医療機関を探して予約してください。

◇接種に当たっては、母子健康手帳を提示する必要があります。

接種場所 \ ワクチンの種類	バイアル製剤 (保存剤使用)	プレフィルドシリンジ製剤 (保存剤不使用)
内科・小児科など	○	×
産科	○	○

※保存剤の入っていない種類(プレフィルドシリンジ製剤)は妊娠している方が優先して選択できるよう、原則として産科・産婦人科にしか配分されません。一般内科等で同剤を希望される方はご注意ください。

# 接種スケジュール／接種回数


## ○ 新型インフルエンザワクチンの接種開始時期

妊娠している方々への接種開始は11月初旬からと予定されています。

※保存剤の入っていない種類(プレフィルドシリンジ製剤)は11月後半からしか接種できませんので、希望される方はそれまでお待ちください。

※詳細な日程は、都道府県により異なります。

【妊娠されている方の接種スケジュール】



## ○ 接種回数

(平成21年11月11日更新)

妊娠されている方のワクチンの接種は、1回接種です。

# 留意点

## ○ インフルエンザワクチンの効果など

◇インフルエンザワクチンの効果は**完全ではありません**。

- ・ワクチンを接種しても、感染することがあります。
- ・接種した当日から効果があるわけではありません。
- ・効果の発現には個人差(体質・健康状態等)があります

◇ワクチンによる**副反応も起こりえます**。

副反応とはワクチン接種に伴い、ワクチン接種の目的である「免疫の付与」以外の反応が発生した場合、これを副反応と呼びます。

季節性インフルエンザワクチンでは副反応として、局所反応(発赤、腫脹、疼痛等)、全身反応(発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、嘔吐等)がありますが、通常2-3日で消失します。

そのほか、ショック、アナフィラキシー様症状、急性散在性脳脊髄炎、ギランバレー症候群等も重大な副反応としてまれに報告されます。

なお、局所の異常反応や体調の変化、さらに、高熱、けいれん等の副反応を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けてください。

◇ワクチンを接種する方もしない方も、日頃から感染予防に努めることが重要です

**感染の予防; 手洗い・うがい、人混みを避ける、休養と栄養 など**  
**感染拡大の予防; 外出自粛、咳エチケット、マスク着用など**

# ワクチン接種の流れ

妊娠されていて、ワクチン接種を希望される方  
(母子健康手帳)

かかりつけ医(産科)に相談

母子健康手帳

かかりつけ医  
(産科)

受託医療機関  
(産科・内科等)

ワクチンを接種

- ①十分な感染予防  
手洗いの励行、う  
がい、人混みを避  
けるなど
- ②発症した際の対  
応を、家族・主治  
医とともに確認

ワクチンを接種しない／延期