

主要各国の新型インフルエンザワクチン 推奨接種回数

2009年12月8日現在

| 国名 | 推奨接種回数 |
|------|---|
| EU | <p>欧州薬品庁(EMA)が3つのワクチンを承認。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○Pandemrix(GSK:鶏卵培養アジュバント有) 10歳以上(高齢者を含む):1回 ○Focetria(Novartis:鶏卵培養アジュバント有) 9歳~60歳:1回 ○Celvapan(Baxter:細胞培養アジュバント無) 現状では2回(データ収集中) |
| イギリス | <ul style="list-style-type: none"> ○Pandemrix(GSK:鶏卵培養アジュバント有) 6ヶ月~9歳:2回(半分量) 10歳~:1回 免疫不全を合併した10歳以上:2回 ○Celvapan(Baxter:細胞培養アジュバント無) 6ヶ月以上:2回 |
| フランス | <ul style="list-style-type: none"> ○Pandemrix(GSK:鶏卵培養アジュバント有) 10歳以上(高齢者を含む):1回、6ヶ月~10歳未満,免疫不全患者:2回 ○Focetria(Novartis:鶏卵培養アジュバント有) 9歳~60歳:1回、6ヶ月~8歳,60歳以上:2回 ○Panenza(Sanofi アジュバント無) 妊婦,9歳:1回、6ヶ月~8歳,免疫不全患者:2回 |

情報源:各国政府HP,大使館調べ

主要各国の新型インフルエンザワクチン 推奨接種回数

2009年12月8日現在

| 国名 | 推奨接種回数 |
|------|---|
| ドイツ | <ul style="list-style-type: none"> ○Pandemrix(GSK: 鶏卵培養アジュバント有) 生後6か月～9歳: 1回(半分量: 0.25ml) 10歳以上: 1回(0.5ml) |
| イタリア | <ul style="list-style-type: none"> ○Novartis: アジュバント有 10歳～64歳: 1回 生後6ヶ月～9歳の者: 2回(3週間あけて) |
| 米国 | <ul style="list-style-type: none"> ○Medimmune: 経鼻生ワクチン 2-9歳: 2回 10-49歳: 1回 ○Biomedical: 鶏卵培養アジュバント無 18歳以上: 1回 ○Sanofi Pasteur: 鶏卵培養アジュバント無 6ヶ月-3歳: 2回(半分量) 3-9歳: 2回 10歳以上: 1回 ○Novartis : 鶏卵培養アジュバント無 4-9歳: 2回 10歳以上: 1回 ○CSL: 鶏卵培養アジュバント無 6ヶ月-3歳: 2回(半分量) 3-9歳: 2回 10歳以上: 1回 |

主要各国の新型インフルエンザワクチン 推奨接種回数

2009年12月8日現在

| 国名 | 推奨接種回数 |
|-----|---|
| カナダ | <p><u>○AREPANRIX® (GSK:アジュバント有)</u> <u>6ヶ月～3歳未満、3歳以上9歳以下(基礎疾患有り):2回(半分量,21日以上あけて)</u> <u>3歳以上9歳以下(基礎疾患なし):1回(半分量)</u> <u>10歳～64歳(基礎疾患なし)、64歳以上(免疫不全患者):1回(1回量)</u></p> <p><u>○GSK:アジュバント無</u> <u>妊婦:1回(1回量)</u> <u>10歳～64歳:1回(1回量)</u></p> |
| 韓国 | <p><u>3歳以上8歳未満:2回</u> <u>8歳以上:1回</u></p> |
| 中国 | <p>全ての接種対象者:1回</p> |
| 豪州 | <p><u>○Panvax® (CSL:アジュバント無)</u> <u>6ヶ月～10歳未満:2回</u> <u>10歳以上:1回</u></p> |

情報源:各国政府HP,大使館調べ