


IFN-リバビリン投与症例のHbの低下の推移:年齢の順(N=22)

	年齢	前	1 W	2 W	4 W	8 W	12 W	16 W	20 W
1	33	15.9	16.3	15.0	12.9				
2	41	15.2	15.2	14.7					
3	46	17.1	16.5	15.0	12.4				
4	48	16.2	15.9	14.8	11.6	10.9			
5	48	12.3	13.6	12.6	12.3				
6	51	13.3	12.2	11.2	10.7	11.2			
7	52	16.0	16.7	15.6	13.4	12.6	12.7		
8	53	15.7	15.1	12.7	10.8				
9	55	15.3	15.2	13.1	10.2	11.3	11.2		
10	55	14.8	14.4	13.0	10.4				
11	57	13.2	13.9	13.8	11.5	10.5	9.5	9.2	
12	59	15.9	16.4	14.1	12.0				
13	62	13.5	12.8	9.9	9.4	10.9	11.6		
14	62	13.1	14.3	14.5	12.2	11.4	10.7	11.5	
15	62	13.1	14.2	13.2					
16	63	14.8	14.7	13.5	11.7	10.3	9.7		8.1
17	64	13.1	13.4	12.2	9.9	8.9	9.5		
18	66	13.6	15.0	14.4	13.9				
19	67	16.0	15.7	14.4	11.5	11.7	10.5		
20	68	15.8	13.9	11.6	9.5	8.9	8.4		
21	74	14.9	15.1	12.6	9.5				
22	75	13.0	11.8	12.2	8.1	8.0	8.8		

60歳以上

H Yatsubashi, 長崎医療センター

標準的治療困難例に対する治療法の確立に関する研究班  
 リバビリン併用療法治療開始6カ月以上経過症例(n=319)での  
 リバビリン減量及び中止症例の割合



H Yatsubashi, 国立病院長崎医療センター