MRIによる筋の機能評価検査　「症度分類(合算)」

	新ID				病院名	旧ID	年齢	ストックホルム・ワークショップスケール 本人訴え 最も悪い時期 昭和:「1」 平成:「2」			医師確認			症度分類									MRI所見								MRIよりみた末梢神経障害	
									年	月頃	末梢循環障害	末梢神経障害	末梢循環障害	末梢神経障害	VS	VL	NS	NL	初診年	SWS(R)	SWS(N)	備考	side	extensor	supinator	FCU	Interosseous	hypothenar	MA(interosseous)	others		
5	1	1	01	T	徳島	101	67	2	14	1	2	1	0	1	2	3	2	2	14	2→0	3	巧緻性低下、変更N1→3	left	−	−	−	MA±	−	−	−	Ulnar	
6	1	1	02	T	徳島	102	62				0	2	0	2	2	3	3	3	14	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	left	−	−	−	−	−	−	−		
7	1	1	03	T	徳島	104	64				3	2	3	2	3	3	3	3	14	2→2(右)	3	巧緻性低下、変更R3→2、N2→3	left	−	−	−	MA±	high++	−	−	Ulnar	
8	1	1	04	T	徳島	105	62				0	0	0	1	2	2	3	2	15	0	2	変更N1→2	right	−	−	−	−	−	−	−		
9	1	1	05	T	徳島	106	65	2	11		2	2	0	2	1	2	3	2	11	2→0	2		left	−	−	−	−	−	−	−		
10	1	1	06	T	徳島	107	63				0	2	0	2	2	3	3	3	14	0	2		right	−	−	−	−	−	−	thenar high+	Median	
11	1	1	07	T	徳島	108	65				0	1	0	1	2	3	2	2	14	0	2	変更N1→2	left	−	−	−	−	−	−	−		
12	1	1	08	T	徳島	109	65						0	2	1	2	3	2	11	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	left	−	−	−	−	−	−	−		
13	1	1	09	T	徳島	110	54				3	0	2	2	3	3	3	14	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	left	high±	−	−	−	−	−	−	Radial	
14	1	1	10	T	徳島	112	54					0	2	2	3	2	3	14	0	2		right	−	−	−	−	high±	−	−	Ulnar	
15	1	1	11	T	徳島	113	65						2	1	0	3	2	16	0	2		left	high+	−	−	−	−	−	−	Radial	
16	1	1	12	T	徳島	114	55					0	2	2	2	3	2	12	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	right	high+	−	−	−	−	−	thenar high+	Radial	Median
17	1	1	13	T	徳島	115	57					0	2	3	3	2	2	15	0	2		left	−	−	−	−	−	−	−		
18	1	1	14	T	徳島	116	59					0	2	1	1	3	3	16	0	2		right	−	−	−	−	−	−	−		
19	1	1	15	T	徳島	117	52					0	1	1	1	3	1	16	0	2	変更N1→2	right	−	−	−	−	−	−	−		
20	1	1	16	T	徳島	118	56					0	2	1	2	2	2	16	0	1	変更N2→1	right	−	−	−	−	−	−	−		
21	1	1	17	T	徳島	119	54					0	2	1	2	1	2	16	0	2		right	−	−	−	−	−	−	−		
22	1	1	18	T	徳島	120	52				3	1	1	1	3	3	3	2	15	3→1	2	変更N1→2	left	−	−	−	−	−	−	−		
23	1	1	19	T	徳島	121	67						0	2	2	3	3	2	12	0	2		right	−	−	−	−	−	−	−		
24	1	1	20	T	徳島	122	50				2	2	0	2	2	3	2	1	16	3	2	変更R0→3	left	−	−	−	−	−	−	FCR high++	Median	
25	1	1	21	T	徳島	123	64						0	2	2	2	2	3	12	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	left	−	−	−	−	−	−	−		
26	1	1	22	T	徳島	124	64						1	1	1	3	2	15	0	2	変更N1→2	left	−	−	−	−	MA+	−	−	Ulnar	
27	1	1	23	T	徳島	125	65	1	60		2	2	2	2	3	3	2	2	16	2	2		right	−	−	−	−	−	−	−		
28	1	1	24	T	徳島	126	64				2	1	2	1	2	2	1	2	16	2	1		left	−	−	−	−	−	−	−		
29	1	1	25	T	徳島	127	63						1	1	2	1	3	16	0	2	変更N1→2	right	−	−	−	−	−	−	thener high±	Median	
30	1	1	26	T	徳島	128	57	2	12		2		2		2	3	1	3	13	2(左)	2		right	−	−	−	−	−	−	−		
31	1	1	27	T	徳島	129	60				2	2	2	2	3	3	2	3	13	2(左)	2		right	−	−	−	MA+	−	−	−	Ulnar	
32	1	1	28	T	徳島	130	56						1	2	2	2	3	12	0	1		left	−	−	−	−	−	−	FCR high+	Median	
33	1	1	29	I	岩見沢	B−1	64	1	60	11	3	2	3	2	3	3	2	3					right	−	−	−	−	−	−	−		
34	1	1	30	I	岩見沢	B−2	61	2	8	11	3	2	未確認		2	3	3	2	3				left	−	−	−	−	−	−	−		
35	1	1	31	I	岩見沢	B−3	59	2	13	12	2	0	3	0	2	3	2	3					left	−	−	−	−	−	−	−		
36	1	1	32	I	岩見沢	B−4	68	1	56	6	3	3	3	3	3	−	2	−					right	−	−	−	−	−	−	−		
37	1	1	33	I	岩見沢	C−6	67	2	3		2	2	2	2	2	3	2	2					施行せず									
38																																
39																																
40	1	2	01	T	徳島	103	63				0	2	0	2	2	2	2	2	14	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	left	−	−	−	−	−	−	−		
41	1	2	02	T	徳島	111	58	2	14	10	3	1	3	1	3	2	2	2	15	3	2	変更N1→2	left	−	−	−	−	−	−	−		
42	1	2	03	I	岩見沢	B−8	55	1	56		3	2	3	2	2	−	2	−					left	−	−	−	−	−	−	−		
43	1	2	04	I	岩見沢	C−1	64	1	60		3	2	2	2	3	3	2	2					right	−	−	−	−	−	−	−		
44	1	2	05	B	美唄	1	62	1	59	7	0	2	0	2	2	1	2	1					right	−	−	−	−	−	−	−		
45	1	2	06	B	美唄	3	67	1	60		0	2	0	2	2	1	3	2					left	−	T1,T2 high	−	MA++ T1,T2high FS iso	−	−	−	Radial	Ulnar
46	1	2	07	B	美唄	5	60	1	40	10	0	3	0	3	2	1	3	3					left	−	−	−	−	−	−	−		
47	1	2	08	B	美唄	6	67	1	59	12	1	3	1	3	2	1	3	3					left	−	−	−	MA++ T1,T2high FS iso	−	−	flexors MA++T1,T2 high	Ulnar	Median
48	1	2	09	B	美唄	7	62	1	61	8	2	2	0	2	2	1	3	2					left	−	−	−	−	−	−	−		
49	1	2	10	B	美唄	9	63	1	60	1	2	3	0	3	2	1	3	3					right	−	−	−	−	−	−	−		
50	1	2	11	B	美唄	11	61	2	17	1	3	3	3	3	3	3	3	3					right	−	−	−	−	−	−	−		
51	1	2	12	B	美唄	12	69	1	60	9	0	2	0	2	2	1	3	3					right	−	−	−	−	−	−	Thenar T2 high	Median	
52																																
53																																
54	1	3	01	I	岩見沢	C−2	72	2	1		2	2	2	2	3	2	1	0					left	−	−	−	−	−	−	−		
55	1	3	02	I	岩見沢	C−4	72	2	1		2	2	2	2	2	2	2	2					left	−	T1,T2high,fat s	−	−	−	−	−	Radial	
56	1	3	03	I	岩見沢	C−5	77	2	1		2	2	2	2	2	2	2	2					right	−	−	−	−	−	−	−		
57	1	3	04	I	岩見沢	B−6	70	2	10		3	2	3	2	2 or 3	3	2	3					right	−	−	−	−	−	−	−		
58	1	3	05	I	岩見沢	C−3	73	1	56		3	2	3	1	2	1	2	1					right	−	+	−	−	−	−	−		
59	1	3	06	I	岩見沢	C−8	73	1	63		2	2	2	2	3	−	2	−					left	−	−	−	−	−	−	−		
60	1	3	07	B	美唄	2	71	1	62	10	2	3	0	3	2	1	2	1					left	−	−	−	−	−	−	−		
61	1	3	08	B	美唄	4	70	1	61	11	2	3	2	3	3	3	2	2					right	−	T1,T2high	−	MA++ T1,T2high FS iso	−	−	DRUj volar ganglion	Radial	Ulnar
62	1	3	09	B	美唄	8	71	1	60	1	2	2	2	2	2	1	3	2					left	−	−	−	−	−	−	−		
63	1	3	10	B	美唄	10	72	1	61	3	0	2	0	2	2	1	2	1					left	−	−	−	−	−	−	−		
64	1	3	11	B	美唄	13	71				0	2	0	2	2	1	1	1					right	−	−	−	−	−	−	−		
65																																
66																																
67					岩見沢	B−5	66	2	7		3	2	3	2	3	2	3	2					right	−	−	−	−	−	−	−		
68					岩見沢	B−7	64	1	60		3	2	3	2	2	−	2	−					left	−	−	−	−	−	−	−		
69					岩見沢	C−7	64	2	1		2	2	2	2	2	1	2	3					right	−	−	−	T2 high	−	−	−	Ulnar	
70																																
71					(徳島)																												
72					註釈1：SWSの症度は再検討の結果に加え、巧緻性検査の結果を考慮して一部変更した																													
73					註釈2：SWS(R)で、例えば「2→0」の意味は「過去には2であったが現在は0である」ことを表す																													
74					註釈3：585通達にもとずくV・Nの症度分類は直近の診断書(1年以内のもの)を元にして行った																													
75					註釈4：ID 122 は冬期に入ってレイノー現象がしばしば出現しているのでSWS(R)3とした																													
76					註釈5：SWS(R)の(右)は右側のみで発現することを表す　左は左のみ																													