


たばこ依存度の分布



喫煙と健康問題に関する実態調査(1998年)

たばこ事業法 施行規則第36条(注意表示)

別表第1(抜粋)

喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。


喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。

別表第2(抜粋)


人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。

ニコチンパッチなしでの禁煙治療(1年)の実績

ニコチンパッチなしでの禁煙治療成果(禁煙成功率)を個別指導あり・なしで比較した。



ニコチンパッチを使用した禁煙治療の実績



受診した43名中,経過が観察できた30名(男性25名,女性5名,年齢は22~75歳)電話による追跡調査.経過が観察できた30名での2ヵ月・1年後の禁煙維持率はそれぞれ86.3%・56.7% 経過観察できなかったものを禁煙失敗とみなす場合には禁煙維持率は63.2%、39.0%であった。

川井治之, 柴山卓夫, 多田敦彦, 河原伸, 宗田良, 高橋清
ニコチンパッチを使用した禁煙外来患者における禁煙達成に影響する因子の検討
日本呼吸器学会雑誌43(3)144-149 2005