

116 抗パーキンソン剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効番号	剤型区分	剤形	用法	備考	線引き	
1	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドバミン増加作用				レボドパ	116	内-2 内-2	散剤 細粒剤				
			ドバミン増加作用+レボドパ脱炭酸酵素阻害作用				配合剤 レボドパ/塩酸ベンセラジド	116	内-1	錠剤				
			配合剤 レボドパ/カルピドパ	116	内-1	錠剤								
			ドバミン受容体刺激作用	ドバミンD2受容体刺激作用			塩酸タリベキソール	116	内-1	錠剤				
							塩酸フラミベキソール水和物	116	内-1	錠剤				
				ドバミンD1, D2受容体刺激作用			カベルゴリン	116	内-1	錠剤				
							メシル酸ベルゴリド	116	内-1	錠剤				
			フルアドレナリン増加作用				ドロキシドパ	116	内-2 内-1	細粒剤 カセル剤		★パーキンソン病におけるすくみ足、立ちくらの改善		
			B型モノアミン酸化酵素阻害作用				塩酸セレギリン	116	内-1	錠剤		★レボドパ含有製剤との併用療法のみ		
	パーキンソン症候群			ドバミン受容体刺激作用	ドバミンD2受容体刺激作用		麦角アルカロイド系	メシル酸プロモクリプテン	116,249	内-1	錠剤		★産褥性乳汁分泌抑制、乳汁漏出症/高プロラクチン血症性排卵障害/高プロラクチン血症性下垂体腺腫(外科的処置を必要としない場合に限る)/末端肥大症、下垂体性巨人症	
				ドバミン遊離促進作用				塩酸アマンタジン	116,117 119,625	内-2 内-2 内-1	散剤 細粒剤 錠剤		★脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善/(シンメトレル)A型インフルエンザウイルス感染症。ただしパーキンソン病はルシトン、ロティファミンを除く	
				アセチルコリン受容体拮抗作用				塩酸プロメタジン	116,441	内-2 内-2 内-1	散剤 細粒剤 錠剤		★麻酔前投薬、人工(薬物)冬眠/感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽/アレルギー性鼻炎、枯草熱、血管運動性浮腫/皮膚疾患に伴う掻痒(湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症、薬疹、中毒疹)、じんま疹/動揺病	
								塩酸ピロヘプテン	116	内-2 内-1	細粒剤 錠剤			
								塩酸トリヘキシフェニジル	116	内-2 内-2	散剤 細粒剤	局方		
								ピペリデン	116	内-2 内-2	散剤 細粒剤			
								塩酸メチキセン	116	内-2 内-1	散剤 錠剤			
					プロフェナミン	116	内-2 内-1	散剤 錠剤						
				塩酸マザチコール	116	内-2 内-1	散剤 錠剤			★大向精神薬投与によるパーキンソン症候群				
		自発運動抑制作用				塩酸チアプリド	117	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		★パーキンソンニズムに伴うジスキネジア			
2	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドバミン増加作用				レボドパ	116	注-1	注射薬				
			アセチルコリン受容体拮抗作用				塩酸プロメタジン	116,441	注-1	注射薬				
							ピペリデン	116	注-1	注射薬				

117 抗うつ剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	繰引き	
1	抗うつ剤	うつ病・うつ状態	モノアミン再取り込み阻害作用			三環系	塩酸アミトリプチリン	117	内-1	錠剤				
							塩酸イミプラミン	117	内-1	錠剤				
							マレイン酸トリミプラミン	117	内-2 内-1	散剤 錠剤				
							塩酸クロミプラミン	117	内-1	錠剤				
							アモキサピン	117	内-2 内-1	細粒剤 錠剤				
							塩酸ロフェプラミン	117	内-1	錠剤				
							塩酸ドスレピン	117	内-1	錠剤				
							塩酸ノルトリプチリン	117	内-1	錠剤				
			α2-アドレナリン受容体遮断作用 セロトニン受容体遮断作用			四環系	塩酸ミアンセリン	117	内-1	錠剤				
							マレイン酸セチプチリン	117	内-1	錠剤				
			セロトニン再取り込み阻害作用 セロトニン受容体遮断作用			トリアゾロピリジン系	塩酸トラゾドン	117	内-1	錠剤				
							マレイン酸フルボキサミン	117	内-1	錠剤				
			選択的セロトニンの再取り込み阻害作用				塩酸パロキセチン水和物	117	内-1	錠剤				
							塩酸ミルナシبران	117	内-1	錠剤				
セロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害作用														
ドパミン受容体拮抗作用			ベンザミド系	スルピリド	117	内-1 内-2	錠剤 細粒剤							
中枢神経興奮作用				ペモリン	117	内-1	錠剤			★軽症				
				塩酸メチルフェニデート	117	内-2 内-1	散剤 錠剤			★難治性、 遅延性				
2	抗うつ剤	うつ病・うつ状態	モノアミン再取り込み阻害作用			三環系	塩酸アミトリプチリン	117	注-1	注射薬				
							塩酸クロミプラミン	117	注-1	注射薬				

117 精神神経用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き	
1	精神神経用剤	精神分裂病	抗ドパミン作用			フェノチアジン系	ベルフェナジン	117	内-2 内-1 内-1	散剤 錠剤 錠剤		局方		
							マレイン酸ベルフェナジン	117	内-1	錠剤		局方		
							フェンジソ酸ベルフェナジン	117	内-2	散剤				
							マレイン酸プロクロルペラジン	117	内-1	錠剤		局方		
							プロペリシアジン	117	内-2 内-2 内-1 内-4	細粒剤 顆粒剤 錠剤 液剤				
							塩酸クロルプロマジン	117	内-1	錠剤				
							ヒベンズ酸クロルプロマジン	117	内-2 内-2 内-2 内-1	散剤 細粒剤 顆粒剤 錠剤				
							マレイン酸レボメプロマジン	117	内-2 内-2 内-2 内-1	散剤 顆粒剤 細粒剤 錠剤				
							塩酸チオリダジン	117	内-2 内-1	散剤 錠剤				
							マレイン酸トリフロペラジン	117	内-2 内-1	散剤 錠剤				
							フェンジソ酸ペラジン	117	内-2	散剤				
							マレイン酸フルフェナジン	117	内-2 内-1	散剤 錠剤				
							チエピン系	ゾテピン	117	内-2 内-1	細粒剤 錠剤			
							イミノジベンジル系	塩酸クロカブラミン	117	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤			
								塩酸モサブラミン	117	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤			

				マレイン酸カルピプラミン	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
			インドール系	オキシペルチン	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
			ブチロフェノン系	ハロペリドール	117	内-2 内-2 内-2 内-1 内-4	錠剤 細粒剤 顆粒剤 錠剤 液剤		
				ピモジド	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
				スピベロン	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
				塩酸ピパンベロン	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
				チミベロン	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
				プロムペリドール	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
			ベンザミド系	ネモナプリド	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
				塩酸スルトプリド	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
				スルピリド	117	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		★胃・十二指腸潰瘍、うつ病・うつ状
				塩酸モペロン	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
	抗ドパミン作用/ 抗セロトニン作用		ベンズイソキサゾール系	リスベリドン	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		
			チエノベンゾジアゼピン系	オランザピン	117	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		
			ジベンゾチアゼピン系	フマル酸クエチアピン	117	内-1	錠剤		
			ベンズイソチアゾール系	塩酸ペロスピロン水和物	117	内-1	錠剤		
	抗セロトニン作用/ 抗カテコールアミン作用			レセルピン	117	内-2 内-1	錠剤 錠剤		★フェノチアジン系薬物の使用困難な症例 ★高血圧症
精神分裂病の興奮状態、躁病、躁うつ病の躁状態	情動経路の誘発 電位抑制作用			カルバマゼピン	117,113	内-2 内-1	錠剤 錠剤		★てんかん痙攣発作、三叉神経痛

		躁病及び躁うつ病の躁状態	躁状態改善作用			炭酸リチウム	117	内-1	錠剤			
		精神分裂病等における鎮静催眠	抗ドパミン作用+催眠鎮静作用		配合剤	塩酸クロルプロマジン/塩酸プロメタジン/フェノバルビタール	117	内-1	錠剤			
2	精神神経用剤	精神分裂病	抗ドパミン作用		フェノチアジン系	塩酸ベルフェナジン	117	注-1	注射薬			
						塩酸クロルプロマジン	117	注-1	注射薬			
						塩酸レボメプロマジン	117	注-1	注射薬			
						エナント酸フルフェナジン	117	注-1	注射薬			
						デカン酸フルフェナジン	117	注-1	注射薬			
						プチロフェノン系	デカン酸ハロペリドール	117	注-1	注射薬		
							チミペロン	117	注-1	注射薬		
						ベンザミド系	スルピリド	117	注-1	注射薬		★胃・十二指腸潰瘍
	抗セロトニン作用/抗カテコールアミン作用				レセルピン	117	注-1	注射薬		★フェノチアジン系薬物の使用困難な症例 ★高血圧症		

118 総合感冒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区 分	剤形	用法	備考	線引き
1	総合感冒剤	感冒若しくは上気道炎 に伴う諸症状の改善	感冒症状改善作用			配合剤	サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン /マレイン酸クロルフェニラミン	118	内-2 内-2	散剤 顆粒剤			
						配合剤	サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン /マレイン酸クロルフェニラミン	118	内-2 内-4	顆粒剤 シロップ剤			
						配合剤	サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン /メチレンジサリチル酸プロメタジン	118	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤			
						配合剤	サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン /メチレンジサリチル酸プロメタジン	118	内-2	顆粒剤			
						配合剤	ヨウ化イソプロバミド/塩酸フェニルプロパノール アミン/塩酸ジフェニルピラリン	118	内-1	カプセル剤			

119 その他の中枢神経用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・ 構造	成分	薬効分類番号	剤形 区分	剤形	用法	備考	繰引き	
1	その他の中枢神経用薬	脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善	精神活動改善作用				塩酸アマタジン	119,116,117,625	内-2 内-2 内-1	散剤 細粒剤 錠剤		★パーキンソン症候 群、A型インフルエン ザウイルス感染症		
		次の疾患に伴う多動、注意力低下、言語障害、意欲低下の緩解：軽度精神発育遅滞、脳炎後遺症、脳性麻痺	脳内ブドウ糖代謝促進作用				ホバンテン酸カルシウム	119	内-2	散剤				
		高プロラクチン血症性排卵障害、高プロラクチン血症下垂体腺腫(外科的処置を必要としない場合に限る)、乳汁漏出症、産褥性乳汁分泌抑制	下垂体プロラクチン分泌細胞のドパミンD-2受容体刺激作用				テルグリド	119	内-1	錠剤				
		高度肥満症における食事療法及び運動療法の補助	摂食中枢抑制作用				マジンドール	119	内-1	錠剤				
		筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療および病態進展の抑制	神経細胞保護作用				リルゾール	119	内-1	錠剤				
		軽度及び中等度のアルツハイマー型痴呆における痴呆症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ可逆的阻害作用				塩酸ドネベジル	119	内-1	錠剤				
		次の疾患における頭痛・頭重、倦怠感、心悸亢進、発汗等の自律神経症状：自律神経失調症、頭部・頸部損傷、更年期障害・卵巣欠落症状	自律神経緊張不均衡改善作用				トフィソバム	112,123	内-2 内-1	細粒剤 錠剤				
		脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行為、精神興奮、徘徊、せん妄の改善	自発運動抑制作用	抗ドパミン作用				塩酸チアプリド	117	内-2 内-1	細粒剤 錠剤			
2	その他の中枢神経用薬	(1)頭部外傷、くも膜下出血に伴う昏睡、半昏睡を除く遅延性意識障害 (2)脊髄小脳変性症における運動失調の改善	意識障害改善作用/ 自発運動亢進作用				酒石酸プロテレリン	119,722	注-1	注射薬		★下垂体TSH分泌機能検査		
		脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善	フリーラジカル消去作用				エダラボン	119	注-1	注射薬				

121 局所麻酔剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
1	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			塩酸オキシプロカイン	121	内-3	液剤			
							塩酸リドカイン	121	内-3	液剤			
2	局所麻酔剤	局所麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			塩酸プリバカイン	121	注-1	注射薬			
							塩酸ロピバカイン水和物	121	注-1	注射薬		★術後鎮痛物	
							塩酸リドカイン	121	注-1	注射薬			
							塩酸プロカイン	121	注-1	注射薬		局方	
							塩酸テトラカイン	121	注-1	注射薬			
							塩酸メピバカイン	121	注-1	注射薬		局方	
		活動電位伝導抑制作用 +血管収縮作用(効果持続)		配合剤	塩酸リドカイン/エピネフリン	121	注-1	注射薬					
脊椎麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用				塩酸プリバカイン	121	注-1	注射薬				
						塩酸ジブカイン	121	注-1	注射薬		★腰椎麻酔		
						配合剤	塩酸ジブカイン/塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	121	注-1	注射薬		★腰椎麻酔	
3	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			塩酸オキシプロカイン	121	外-1 外-1	液剤 ゼリー			
							塩酸プロカイン	121	外-1	末剤		局方	
							塩酸ジブカイン	121	外-1	末剤		局方	
							リドカイン	121	外-2 外-5	噴霧剤 貼付剤		局方	
							塩酸リドカイン	121	外-1 外-1	液剤 ゼリー			
							塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	121	外-1	末剤			

122 骨格筋弛緩剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・ 構造	成分名	薬効 分類 番号	剤形 区分	剤形	用法	備考	線引き
1	骨格筋弛緩剤	運動器疾患に伴う有痛性痙縮 ／筋緊張状態、痙性麻痺	脊髄反射抑制作用(多シナプ ス反射抑制)				カルバミン酸クロルフェネシン	122	内-1	錠剤			
							クロルゾキサゾン	122	内-1	錠剤			
							フェンプロバメート	122	内-1	錠剤			
							メシル酸ブリジノール	122	内-1	錠剤			
							メトカルバモール	122	内-2	顆粒剤			
							アフロクェロン	124	内-1	錠剤			
							塩酸エペリゾン	124	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤			
							塩酸トルペリゾン	124	内-2 内-1 内-1	顆粒剤 錠剤 カプセル			
							塩酸チザニジン	124	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤			
				痙性麻痺	脊髄反射抑制作用(単シナプ ス反射抑制)	GABA受容体 親和作用				124	内-1	錠剤	
		悪性症候群	筋小胞体からのCaイオン遊離 抑制作用				ダントロレンナトリウム	122	内-1	カプセル 剤			
2	骨格筋弛緩剤	麻酔時の筋弛緩、気管内挿管 時の弛緩	神経終板に対する脱分極作用				塩化スキサメニウム	122	注-1	注射薬		局方	
			神経筋接合部遮断作用				塩化ツボクラリン	122	注-1	注射薬		局方 大重症筋 無力症の 診断	
						臭化ベクロニウム	122	注-1	注射薬				
						臭化パンクロニウム	122	注-1	注射薬				
		運動器疾患に伴う有痛性痙縮	多シナプス性脊髄反射抑制作 用				メシル酸ブリジノール	122	注-1	注射薬			
		麻酔時における悪性高熱症、 悪性症候群	筋小胞体からのCaイオン遊離 抑制作用				ダントロレンナトリウム	122	注-1	注射薬			
		眼瞼けいれん、片側顔面けい れん、痙性斜頸	アセチルコリン放出抑制作用				A型ボツリヌス毒素	122	注-1	注射薬			

123 自律神経剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法備考	線引き		
1	自律神経剤 (β受容体拮抗薬を除く)	慢性胃炎等の消化器機能異常	消化管運動亢進作用	アセチルコリン受容体刺激作用		四級アンモニウム塩	ナバジシル酸アクラトニウム	123	内-1	カプセル剤				
							塩化カルプロニウム	123	内-1	カプセル剤				
							塩化ベタネコール	123	内-2	散剤				
					副交感神経刺激作用				塩化カルニチン	233	内-3	液剤		
		重症筋無力症	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用	四級アンモニウム塩	臭化ジスチグミン	123	内-1	錠剤		局方 ★排尿障害			
						臭化ピリドスチグミン	123	内-1	錠剤					
						塩化アンベノニウム	123	内-1	錠剤					
		慢性胃炎等の消化器機能異常, 重症筋無力症	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用			ネオスチグミン	123	内-2	散剤				
2	自律神経剤 (β受容体拮抗薬を除く)	麻酔後の腸管麻痺/慢性胃炎等の消化器機能異常	消化管運動亢進作用	アセチルコリン受容体刺激作用			塩化アセチルコリン	123	注-1	注射薬				
							塩化カルニチン	233	注-1	注射薬				
		非脱分極性筋弛緩剤による遷延性呼吸抑制に対する拮抗	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用			ネオスチグミン	123	注-1	注射薬	局方			

124 鎮けい剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区 分	剤形	用法	備考	線引き
1	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運動亢進および疼痛／過敏性腸症候群	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびけいれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用 (ムスカリン受容体拮抗作用)			硫酸アトロピン	124	内-2	末剤		局方	
							ロートエキス	124	内-2	散剤		局方	
							臭化メチルオクタロピン	124	内-1	錠剤			
							臭化ブチルスコポラミン	124	内-1	錠剤			
							メチル硫酸N-メチルスコポラミン	124	内-1	錠剤			
							臭化プロピウム	124	内-2	顆粒剤			
								124	内-1	錠剤			
								124	内-1	カプセル剤			
							臭化メチルベニカチウム	124	内-2	散剤			
							エトミドリン	124	内-1	錠剤			
							ヨウ化チエモニウム	124	内-1	錠剤			
							塩酸ピペリドレート	124	内-1	錠剤			
							臭化エチルピベタナート	124	内-1	錠剤			
							臭化チメジウム	124	内-2	細粒剤			
								124	内-1	錠剤			
								124	内-1	カプセル剤			
							臭化バレタメート	123	内-1	錠剤			
							ヨウ化オキサピウム	123	内-2	顆粒剤			
								123	内-1	錠剤			
							塩酸ジサイクロミン	123	内-2	散剤			
123	内-2	顆粒剤											
123	内-1	錠剤											
臭化チキジウム	123	内-2	顆粒剤										
	123	内-1	カプセル剤										
塩化トロスピウム	123	内-1	錠剤										
臭化ブリフィニウム	123	内-1	錠剤										
臭化プロバンテリン	123	内-1	錠剤										
臭化メベンゾラート	123	内-1	錠剤										
		過敏性腸症候群		アセチルコリン拮抗作用 +鎮静作用		配合剤	臭化メベンゾラート／フェノバルビ タール	123	内-1	錠剤			
		胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運動亢進および疼痛	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびけいれん縮緩解作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用			塩酸パバペリン	124	内-2 内-2	末剤 散剤		局方:末剤	

				COMT(catechol-O methyltransferase)阻害作用/Oddi括約筋弛緩作用			フロプロピオン	124	内-2 内-1 内-1	顆粒剤 錠剤 カプセル剤				
		子宮収縮の抑制	子宮平滑筋弛緩作用	β 受容体刺激作用			塩酸イソクスブリン	124,217	内-1	錠剤				
2	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれんおよび疼痛(麻酔前投薬の効能を含む。)	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用(ムスカリン受容体拮抗作用)			硫酸アトロピン	124	注-1 注-2	注射薬 キット			局方	
							臭化水素酸スコポラミン	124	注-1	注射薬			★特発性および脳炎後パーキンソンニズム	
							臭化プリフィニウム	123	注-1	注射薬				
							臭化ブチルスコポラミン	124	注-1	注射薬				
							臭化プロピウム	124	注-1	注射薬				
							臭化エチルピペタナート	124	注-1	注射薬				
							臭化メチルオクタロピン	124	注-1	注射薬				
							ヨウ化チエモニウム	124	注-1	注射薬				
							臭化チメジウム	124	注-1	注射薬				
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			塩酸パパペリン	124	注-1	注射薬		局方		
		子痙	骨格筋弛緩作用	Mgによるアセチルコリン放出抑制作用		配合剤	硫酸マグネシウム/ブドウ糖	124	注-1	注射薬				
3	鎮痙剤	胃・十二指腸等のけいれんおよび疼痛	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用			臭化ブチルスコポラミン	124	外-6	坐剤				

131 眼科用剤

内注 外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き		
1	眼科用剤	緑内障	房水産生抑制作用	炭酸脱水酵素阻害作用 (Na ⁺ 能動輸送抑制作用)			グリセリン	1319	内-3	液剤	1回3ml/kg、1日1~2回				
							ジクロフェナミド	1319	内-1	錠剤	1日50~200mg、1~4分服	局方			
							メゾリミド	1319	内-1	錠剤	1日100~300mg、2~3分服				
							アトラニル酸/アスコルビン酸	1319	内-1	錠剤	1日3~6錠				
							有根ヨウ素製剤	1319	内-1	錠剤	1日0.75~1.5mg、2~3分服				
		眼圧下降作用		好氣的代謝促進作用		カロチノイド	1319	内-1	錠剤	1日10~20mg、2~4分服					
		中心性網膜炎	組織呼吸増加作用			配合剤	アトラニル酸/アスコルビン酸	1319	内-1	錠剤	1日3~6錠				
		網膜色素変性症	暗順応改善作用				有根ヨウ素製剤	1319	内-1	錠剤	1日0.75~1.5mg、2~3分服				
2	眼科用剤	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症	細胞内呼吸阻害作用	レーザ光照射による活性化酸素生成作用			ベルテポロファン	1319	注剤	注射薬	静脈内投与				
3	眼科用剤	結膜炎/角膜炎等	主として一般細菌に作用するもの	細胞壁合成阻害作用			セフェム系	塩酸セフェメノキシム	1317	外-3	点眼剤	溶解後1回1~2滴、1日4回			
							含戒ベニシリン	スルベニシリンナトリウム	1317	外-3	点眼剤	溶解後1回1~2滴、1日3~5回			
							核酸(DNA)合成阻害作用	ニューキノロン系	レボフロキサシン	1319	外-3	点眼剤	1回1滴、1日3回		
									ノルフロキサシン	1319	外-3	点眼剤	1回1滴、1日3回		
									塩酸ロメフロキサシン	1319	外-3	点眼剤	1回1滴、1日3回		
									オフロキサシン	1319	外-3	眼軟膏	1日3回、適量塗布。		
										点眼剤	1回1滴、1日3回				
									ガチフロキサシン水和物	1319	外-3	点眼剤	1回1滴、1日3回 (眼科手術前の無菌化療法の手術前は1回1滴、1日6回)		
							蛋白合成阻害作用	アミノグリコシド系	硫酸ゲンタマイシン	1317	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日3~4回		
									トブラマイシン	1317	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日4~5回		
									硫酸ジベカシン	1317	外-3	点眼剤	1回2滴、1日4回		
									硫酸シゾマイシン	1317	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日3~4回		
									硫酸ミクロノマイシン	1317	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日3~4回		
							マクロライド系	エリスロマイシン	1317	外-3	眼軟膏	1日1~数回、適量塗布。			
								クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	1317	外-3	点眼剤	1日1~数回、適量		
							蛋白合成阻害+細胞膜機能障害作用	配合剤	クロラムフェニコール/コリスチン	1319	外-3	点眼剤	1回2~3滴、1日4~5回		
									ポリマキシン/コリスチン	1319	外-3	眼軟膏	1日数回		
									コリスチン/テトラサイクリン	1319	外-3	点眼剤	溶解後2~3時間ごと2~3滴		
									塩酸ネオテトラサイクリン/硫酸ネオミチンB	1319	外-3	眼軟膏	1日1~4回、適量	特に緑膿菌	
									1319	外-3	眼軟膏	1日3~6回、適量	特に緑膿菌		
蛋白合成阻害+抗炎症作用	配合剤	フラジマイン/メチロプレドニン	1319	外-3	眼軟膏	1日1~数回、適量									
		フラジマイン/リソドール/メチロプレドニン	1319	外-3	眼軟膏	1日1~数回、適量									
										点眼剤	1回1~2滴、1日1~数回点眼。				

					塩酸テトラサイクリン/ヒド'ロコルチ'ン	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日1~数回		
		薬酸合成阻害作用		サルファ剤	スルfoisソキサゾール	1319	外-3	点眼剤	1回2~3滴、1日3~4回		
		結膜粘膜炎層細胞新生促進作用/ 毛細管透過性抑制作用/細菌'ロフ 7-b'阻害作用			硫酸亜鉛	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日3~5回		
	ウイルスに作用するもの	ウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用		アシクロビル	1319	外-3	眼軟膏	1日5回、適量	角膜炎のみ	
					イドクスウリジン	1319	外-3	眼軟膏	1日3~6回、4~8時間ごと	角膜炎のみ	
								点眼剤	1回1~2滴、1~2時間ごと	局方	
	主として真菌に作用するもの	真菌	抗真菌作用		ピマリシン	1317	外-3	眼軟膏	1回適量、1日4~5回		
								点眼剤	1回1~2滴、1日6~8回		
新生児眼漏眼の予防	殺菌作用	組織蛋白凝固沈殿作用			硝酸銀	1319	外-3	点眼剤	クレーデ氏法により点眼。新生児 に対し点眼後生理食塩液で洗浄。	局方	
慢性結膜炎	涙液分泌抑制	結膜/角膜神経麻痺作用、三叉神 経反射弓一過性遮断作用			塩酸ネジブ'ア'ロイ'ン	1313	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日数回		
アレルギー性結膜	抗炎症作用	ヒスタミン'ヒ'ー'遊離抑制作用	抗ヒスタミン作用/抗ロコリン作用		クロモグリク酸ナトリウム	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日4回	春季カタル	
					ベミロラストカリウム	1319	外-3	点眼剤	1回1滴、1日2回		
					トラニラスト	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日4回		
					アシタザノラスト水和物	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日4回		
					アンレキサノクス	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日4回	花粉症、春季カ タル	
			抗ロコリン作用		イブジラスト	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日4回		
		ヒスタミン'ヒ'ー'受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用		フマル酸ケトチフェン	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日4回		
					塩酸レボカバステン	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日4回		
		角膜上皮再生促進作用			グリチルリチン酸ジカリウ ム	1319	外-3	点眼剤	1回2~3滴、1日5~6回		
					アズレン	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日3~5回	急性結膜炎等	
慢性結膜炎	抗炎症作用	角膜上皮再生作用			塩化ビ'チ'ム	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日3~6回		
術後炎症防止等	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制 作用	(非ステロイド作用)	ア'ニ'ン'酸系	ジクロフェナクナトリウム	1319	外-3	点眼剤	眼手術前4回、眼手術後1日3 回、1回1滴	白内障手術時	
				イ'ド'-'酸系	インドメタシン	1319	外-3	点眼剤	眼手術前4回、眼手術後1日3 回、1回1滴	白内障手術時	
結膜炎等の炎症疾患の対症療法	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制 作用	(非ステロイド作用)	ア'ロ'-'酸系	アラ'グ'ロ'ル'ン	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日4回		
					ア'ロ'-'酸系	ア'ロ'-'酸系	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日2回	
		白血球遊走抑制作用/虹彩毛様体 腫膜抑制作用	(ステロイド作用)	ステロイド	メチル安息香酸'キ'チ'グ'ソ'ナ'ト リ'ム	1315	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日3~4回		
					キ'チ'グ'ソ'ナ'ト リ'ム	1315	外-3	眼軟膏			
						1315	外-3	点眼剤	1日1~3回、適量		
					リ'ン'酸'キ'チ'グ'ソ'ナ'ト リ'ム	1315	外-3	点眼剤	1日1~3回、適量		
					リ'ン'酸'キ'チ'グ'ソ'ナ'ト リ'ム	1315	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日3~4回		
					酢酸ヒ'ド'コルチ'ン	1315	外-3	点眼剤	1回1~2滴、1日3~4回		

					酢酸アトロピウム	1315	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日3~4回	
						1315	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日3~4回	
					フルオロトン	1315	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日数回宛	
ビタミンB2欠乏、代謝障害関与の角膜	角膜組織呼吸亢進作用	組織呼吸関与補酵素の酸素消費能増加作用		補酵素型ビタミンB2	フルビドンジンスカハド	1319	外-3	眼軟膏	1回1~2滴, 1日数回	
								点眼剤	1回1~2滴, 1日2~4回	
角膜結膜上皮障害	角膜創傷治癒促進作用	上皮細胞接着・進展促進作用(保水性亢進作用)	アブメチン結合作用		ヒアルロン酸ナトリウム	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日5~6回	
角膜表層の保護	角膜保護作用/乾燥抑制作用/透明性保持作用	結膜嚢内滞留性亢進作用			コンドロイチン硫酸ナトリウム	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日2~4回	
	角膜保護作用/乾燥抑制作用/透明性保持作用+ビタミンB2補給作用	結膜嚢内滞留性亢進作用+角膜へのFDA取込促進作用		配合剤	フルビドンジンスカハドナトリウム/コンドロイチン硫酸ナトリウム	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日3~6回	
表在性充血	末梢血管収縮作用/充血抑制作用	血管平滑筋α受容体刺激作用			硝酸ナフトリウム	1316	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日2~3回	
	末梢血管収縮作用/充血抑制作用+角膜保護作用/乾燥抑制作用/透明性保持作用	血管平滑筋α受容体刺激作用+結膜嚢内滞留性亢進作用			塩酸ナフトリウム/コンドロイチン硫酸ナトリウム	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日2~3回	
診断/治療を目的とする散瞳/調節麻痺	散瞳作用/調節麻痺作用	毛様体筋麻痺作用			硫酸アトロピン	1311	外-3	眼軟膏	1日1~3回適量塗抹のう	長時間作用(眼内炎症抑制)
								点眼剤	1回1~2滴, 1日1~3回	小児視機能訓練時
					トピカスト	1311	外-3	点眼剤	(散瞳)1回1~2滴, 1日1回。(調節麻痺)3~5分おきに2~3回, 1回1滴	短時間作用(調節緊張の治療)
		調節麻痺作用			塩酸シロキシメト	1311	外-3	点眼剤	1日1回1滴又は1滴点眼後5~10分さらに1滴	
		副交感神経遮断作用/散瞳作用/毛様体筋麻痺作用			臭化水素酸ナトリウム	1311	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日1回	局方
		瞳孔散大筋収縮/交感神経α2受容体刺激作用			塩酸フェニラジン	1311	外-3	点眼剤	1回1~2滴	
				配合剤	トピカスト/塩酸フェニラジン	1319	外-3	点眼剤		
洗眼、殺菌・消毒	局所消毒作用				ポリビニルアルコール溶液	1319	外-3	点眼剤		角膜へ入
					ホウ酸	1314	外-3	点眼用末剤	(眼軟膏)1日1~4回。(点眼液)1回1~2滴, 1日3~6回	局方
					ホウ砂	1314	外-3	点眼用末剤	1回1~2滴, 1日3~6回	局方
					アトリン/アミ/エチル/リソ	1319	外-3	点眼剤	適時5~10mLで洗眼。	
涙液の補充				正常涙液類似液	ホウ酸/無機塩類	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日5~6回	
緑内障	房水産生抑制作用/房水流出促進作用	交感神経α2受容体刺激作用			エピネフリン	1311	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1~2回	※132耳鼻咽喉科領域の充血、うっ血
					塩化水素エピネフリン	1311	外-3	点眼剤	1日1~2回, 1回1滴	
					エピネフリンプロドラッグ	1311	外-3	点眼剤	溶解後1回1滴, 1日1~2回	
	房水流出促進作用	交感神経α1受容体遮断作用			塩酸ブナゾシン	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	
		プロスタグランジン受容体刺激作用		代謝型プロスタグランジン系	イブドリン/アトリン	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	
				プロスタグランジンF2α系	アトリン	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	
	房水産生抑制作用	交感神経β受容体遮断作用			ニブラジロール	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	
					塩酸イソプロル	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	