

参考 第1病日から第7病日までの7日間での薬剤投与と臨床症候の発現

参考表 第1病日から第7病日までの7日間での薬剤投与と臨床症候の発現割合（不明を含む）

	n	異常言動	けいれん	熱性 けいれん	意識障害	肺炎 の併発	クループ の併発	中耳炎 の併発	筋炎 の併発
全体	2,846	10.5	0.6	2.6	1.3	1.4	1.7	1.3	1.0
タミフル		ns	ns	ns	ns	***	*	ns	ns
		27	4	7	5	10	10	6	2
7日間投与なし	286	9.4%	1.4%	2.4%	1.7%	3.5%	3.5%	2.1%	0.7%
いずれかの時点で		282	15	66	41	31	39	45	30
投与 #	2,560	11.0%	0.6%	2.6%	1.6%	1.2%	1.5%	1.8%	1.2%
シンメトレル		+	ns	ns	ns	ns	**	ns	ns
		291	17	69	45	40	43	51	32
7日間投与なし	2,745	10.6%	0.6%	2.5%	1.6%	1.5%	1.6%	1.9%	1.2%
いずれかの時点で		18	2	4	1	1	6	0	0
投与 #	101	17.8%	2.0%	4.0%	1.0%	1.0%	5.9%	0.0%	0.0%
7トアマゾン		***	+	*	**	ns	ns	ns	ns
		151	7	36	16	24	24	28	18
7日間投与なし	1,724	8.8%	0.4%	2.1%	0.9%	1.4%	1.4%	1.6%	1.0%
いずれかの時点で		158	12	37	30	17	25	23	14
投与 #	1,122	14.1%	1.1%	3.3%	2.7%	1.5%	2.2%	2.0%	1.2%

: 薬剤投与前に臨床症候が発現したものを含む割合

ns : 有意差なし + : p<0.10 * : p<0.05 ** : p<0.01 *** : p<0.001

参考表 第1病日から第7病日までの7日間での薬剤投与と臨床症候の発現割合（不明は除外）

	n	異常言動	けいれん	熱性 けいれん	意識障害	肺炎 の併発	クループ の併発	中耳炎 の併発	筋炎 の併発
全体	2,846	10.5	0.6	2.6	1.3	1.4	1.7	1.3	1.0
タミフル		ns	ns	ns	ns	***	*	ns	ns
		27	4	7	4	9	10	3	1
7日間投与なし	286	9.4%	1.4%	2.4%	1.4%	3.1%	3.5%	1.0%	0.3%
いずれかの時点で		272	13	66	34	31	38	33	28
投与 #	2,560	10.6%	0.5%	2.6%	1.3%	1.2%	1.5%	1.3%	1.1%
シンメトレル		+	ns	ns	ns	ns	**	ns	ns
		282	15	69	38	39	42	36	29
7日間投与なし	2,745	10.3%	0.5%	2.5%	1.4%	1.4%	1.5%	1.3%	1.1%
いずれかの時点で		17	2	4	0	1	6	0	0
投与 #	101	16.8%	2.0%	4.0%	0.0%	1.0%	5.9%	0.0%	0.0%
7トアマゾン		***	+	*	**	ns	ns	ns	ns
		150	6	36	13	23	23	20	15
7日間投与なし	1,724	8.7%	0.3%	2.1%	0.8%	1.3%	1.3%	1.2%	0.9%
いずれかの時点で		149	11	37	25	17	25	16	14
投与 #	1,122	13.3%	1.0%	3.3%	2.2%	1.5%	2.2%	1.4%	1.2%

: 薬剤投与前に臨床症候が発現したものを含む割合

ns : 有意差なし + : p<0.10 * : p<0.05 ** : p<0.01 *** : p<0.001