

様式7-4

(削除)

様式7-4 保健指導情報

電子の標準様式イメージ（案）【保健指導部分抜粋】

| 項目 | 項目番号 (AからI) | 項目名 | A→B(指導) | | | | A→C(指導) | | | 備考 |
|------|----------------|---------------------------|---------|-----|-----|-----|------------|-----------|------|--|
| | | | ア→イ | ア→ロ | ア→ハ | ア→ニ | 指導項目 番号 | 指導の 回数 | 指導方法 | |
| 1001 | | 健康診断実施者 | | | | 数字 | | | | ※ 専任者等 |
| 1002 | | 健康診断実施施設 | | | | 数字 | | | | |
| 1003 | | 健康診断実施日時 | | | | 年月日 | | | | 1) 1) 健康診断、2) 健康診断の予約、3) 健康診断の結果の通知、4) 健康診断の結果のフォローアップ |
| 1004 | | 健康レポート1 | | | | 20+ | | | | 1) 健康診断、2) 健康診断の結果の通知、3) 健康診断の結果のフォローアップ |
| 1005 | | 健康レポート2 | | | | 20+ | | | | 1) 健康診断、2) 健康診断の結果の通知、3) 健康診断の結果のフォローアップ |
| 1006 | | 健康レポート3 | | | | 20+ | | | | 1) 健康診断、2) 健康診断の結果の通知、3) 健康診断の結果のフォローアップ |
| 1007 | | 健康レポート4(医師) | | | | 20+ | | | | 1) 健康診断、2) 健康診断の結果の通知、3) 健康診断の結果のフォローアップ |
| 1008 | | 健康レポート5(医師) | | | | 20+ | | | | 1) 健康診断、2) 健康診断の結果の通知、3) 健康診断の結果のフォローアップ |
| 1009 | | 健康指導 | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1010 | | 健康指導 | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1011 | | 健康指導時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1012 | | 一日の所要時間(20日間の所要時間) 60分 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1013 | | 健康に必要となる健康指導 回数 | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1014 | | 健康に必要となる健康指導 回数 | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1015 | | 健康指導時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1016 | | 健康指導時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1017 | | 健康指導時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1018 | | 健康指導時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1019 | | 健康指導時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1020 | | 健康指導時間 | | | | 数字 | 分 | | | 0.5時間、1時間、2.5時間 |
| 1021 | | 健康指導時間 | | | | 数字 | 分 | | | 0.5時間、1時間、2.5時間 |
| 1022 | | 健康指導時間 | | | | 数字 | 分 | | | 0.5時間、1時間、2.5時間 |

様式7-5

(削除)

様式7-5 1年間のレセプト合計情報

1年間のレセプト(個別レセプト1から)を全て連結する。

1. 健診データ登録番号

| |
|--|
| |
|--|

2. レセプト合計情報

| | | |
|-------------|--|---|
| レセプト枚数合計 | | 枚 |
| 入院レセプト枚数合計 | | 枚 |
| 外来レセプト枚数合計 | | 枚 |
| 診療日数合計 | | 日 |
| 入院日数合計 | | 日 |
| 外来日数合計 | | 日 |
| 診療点数合計 | | 点 |
| 入院点数合計 | | 点 |
| 外来点数合計 | | 点 |
| レセプト分析病名一覧※ | | |
| | | |
| | | |

※分析病名は別紙2(優先順位に従って)記載のものに限る

3. 個別レセプト

レセプト1

| | | | |
|---------------|--|-----------|-----|
| 診療月 | | ~ | 月 |
| 入院・外来別 | | 入院 or 外来 | |
| (入院の場合:入院年月日) | | 年 | 月 日 |
| 病院・診療所別 | | 病院 or 診療所 | |
| 診療日数 | | 日 | |
| 診療点数 | | 点 | |
| 病名1 | | | |
| 病名1のICD10コード | | | |
| 病名2 | | | |
| 病名2のICD10コード | | | |
| | | | |

レセプト2

| | | | |
|------|--|---|---|
| 診療月 | | ~ | 月 |
| | | | |

レセプト3

| | | | |
|------|--|---|---|
| 診療月 | | ~ | 月 |
| | | | |

※同一診療月でレセプトが複数ある場合は別の個別レセプトに記載

医療保険者における健診・保健指導の評価方法

| | | 今年度 | 昨年度 | 増減 | 備考 |
|---------|--------------------------|-----|-----|----|------------------|
| 1 | 健診対象者数(40-74歳) | | | | |
| 2 | 健診受診者数(人) | | | | |
| 3 | 健診受診率(%) | | | | $= 2 / 1 * 100$ |
| 4 | 評価対象者数(人) | | | | |
| 内臓脂肪症候群 | | | | | |
| 5 | 内臓脂肪症候群該当者数(人) | | | | |
| 6 | 内臓脂肪症候群該当者割合(%) | | | | $= 5 / 4 * 100$ |
| 7 | 内臓脂肪症候群予備群者数(人) | | | | |
| 8 | 内臓脂肪症候群予備群者割合(%) | | | | $= 7 / 4 * 100$ |
| 肥 満 | | | | | |
| 9 | 肥満者の数(人) | | | | |
| 10 | 肥満者の割合(%) | | | | $= 9 / 4 * 100$ |
| 11 | 腹囲のみ基準値以上の者の数(人) | | | | |
| 12 | 腹囲のみ基準値以上の者の割合(%) | | | | $= 11 / 4 * 100$ |
| 13 | 腹囲基準値以上かつBMI25以上の者の数(人) | | | | |
| 14 | 腹囲基準値以上かつBMI25以上の者の割合(%) | | | | $= 13 / 4 * 100$ |
| 15 | BMIのみ25以上の者の数(人) | | | | |
| 16 | BMIのみ25以上の者の割合(%) | | | | $= 15 / 4 * 100$ |
| 高血圧 | | | | | |
| 17 | 血圧を下げる薬服用者の数(人) | | | | |
| 18 | 血圧を下げる薬服用者の割合(%) | | | | $= 17 / 4 * 100$ |
| 19 | 正常高値血圧の者の数(人) | | | | |
| 20 | 正常高値血圧の者の割合(%) | | | | $= 19 / 4 * 100$ |
| 21 | 高血圧症有病者の数(人) | | | | |
| 22 | 高血圧症有病者の割合(%) | | | | $= 21 / 4 * 100$ |

| | | 今年度 | 昨年度 | 増減 | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-----|-----|----|-----------------|
| 高脂血症 | | | | | |
| 23 | コレステロールを下げる薬服用者の数(人) | | | | |
| 24 | コレステロールを下げる薬服用者の割合(%) | | | | = 23 / 4 * 100 |
| 25 | 高脂血症有病者の数(人) | | | | |
| 26 | 高脂血症有病者の割合(%) | | | | = 25 / 4 * 100 |
| 27 | 中性脂肪 150mg/dl 以上の者の数(人) | | | | |
| 28 | 中性脂肪 150mg/dl 以上の者の割合(%) | | | | = 27 / 4 * 100 |
| 29 | HDL-コレステロール 40mg/dl 未満の者の数(人) | | | | |
| 30 | HDL-コレステロール 40mg/dl 未満の者の割合(%) | | | | = 29 / 4 * 100 |
| 31 | LDL-コレステロール 140mg/dl 以上の者の数(人) | | | | |
| 32 | LDL-コレステロール 140mg/dl 以上の者の割合(%) | | | | = 31 / 4 * 100 |
| 糖尿病 | | | | | |
| 33 | インスリン使用・血糖を下げる服用者の数(人) | | | | |
| 34 | インスリン使用・血糖を下げる服用者の割合(%) | | | | = 33 / 4 * 100 |
| 35 | 糖尿病予備群の数(人) | | | | |
| 36 | 糖尿病予備群の割合(%) | | | | = 35 / 4 * 100 |
| 37 | 糖尿病有病者の数(人) | | | | |
| 38 | 糖尿病有病者の割合(%) | | | | = 37 / 4 * 100 |
| 39 | 空腹時血糖の測定している者の数(人) | | | | |
| 40 | 空腹時血糖 110mg/dl 以上の者の数(人) | | | | |
| 41 | 空腹時血糖 110mg/dl 以上の者の割合(%) | | | | = 40 / 39 * 100 |
| 42 | 空腹時血糖 126mg/dl 以上の者の数(人) | | | | |
| 43 | 空腹時血糖 126mg/dl 以上の者の割合(%) | | | | = 42 / 39 * 100 |
| 44 | HbA1c を測定している者の数(人) | | | | |
| 45 | HbA1c 5.5% 以上の者の数(人) | | | | |
| 46 | HbA1c 5.5% 以上の者の割合(%) | | | | = 45 / 44 * 100 |
| 47 | HbA1c 6.1% 以上の者の数(人) | | | | |
| 48 | HbA1c 6.1% 以上の者の割合(%) | | | | = 47 / 44 * 100 |

| | | 今年度 | 昨年度 | 増減 | 備考 |
|------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|-----------------|
| 新規発症者数※1 | | | | | |
| 49 | 4のうち、昨年度も健診を受診し、評価対象者だった者の数(人) | | | | |
| 50 | 49のうち、昨年度内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の数(人) | | | | |
| 51 | 50のうち、今年度内臓脂肪症候群予備群の数(人) | | | | |
| 52 | 50のうち、今年度内臓脂肪症候群予備群の割合(%) | | | | = 51 / 50 * 100 |
| 53 | 50のうち、今年度内臓脂肪症候群該当者の数(人) | | | | |
| 54 | 50のうち、今年度内臓脂肪症候群該当者の割合(%) | | | | = 53 / 50 * 100 |
| 55 | 49のうち、昨年度内臓脂肪症候群予備群の数(人) | | | | |
| 56 | 55のうち、今年度内臓脂肪症候群該当者の数(人) | | | | |
| 57 | 55のうち、今年度内臓脂肪症候群該当者の割合(%) | | | | = 56 / 55 * 100 |
| 58 | 49のうち、昨年度内臓脂肪症候群該当者でなかった者の数(人) | | | | |
| 59 | 内臓脂肪症候群該当者の発生率(%) | | | | =(53+56)/58*100 |
| 内臓脂肪症候群該当者の減少率※2 | | | | | |
| 60 | 49のうち、昨年度内臓脂肪症候群該当者の数(人) | | | | |
| 61 | 60のうち、今年度内臓脂肪症候群予備群の数(人) | | | | |
| 62 | 60のうち、今年度内臓脂肪症候群予備群の割合(%) | | | | = 61 / 60 * 100 |
| 63 | 60のうち、今年度内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の数(人) | | | | |
| 64 | 60のうち、今年度内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の割合(%) | | | | = 63 / 60 * 100 |
| 65 | 内臓脂肪症候群該当者の減少率 | | | | =(61+63)/60*100 |
| 内臓脂肪症候群予備群の減少率 | | | | | |
| 66 | 55のうち、今年度内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の数(人) | | | | |
| 67 | 55のうち、今年度内臓脂肪症候群該当者・予備群でなかった者の割合(%) | | | | = 66 / 55 * 100 |
| 保健指導対象者の減少率 | | | | | |
| 68 | 49のうち、昨年度特定保健指導の対象者数(人) | | | | |
| 69 | 68のうち、今年度特定保健指導対象でなかった者の数(人)※3 | | | | |
| 70 | 特定保健指導対象者の減少率(%) | | | | = 69 / 68 * 100 |
| 71 | 49のうち、特定保健指導受診者の数(人) | | | | |
| 72 | 71のうち、今年度特定保健指導対象でなかった者の数(人)※3 | | | | |
| 73 | 特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率(%) | | | | = 72 / 71 * 100 |

※1 内臓脂肪症候群だけでなく、肥満、糖尿病、高血圧、高脂血症についても同様の評価を実施。

※2 動機づけ支援の受診者、積極的支援の受診者、すべての健診受診者ごとに、集計。

※3 検査結果の改善により、特定保健指導の対象から外れたのみをカウントする(服薬中の者となることにより、特定保健指導の対象から外れたものを除く)。

| | | 今年度 | 昨年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|----------------------------------|-----|-----|----|-----------------|
| 特定保健指導 | | | | | |
| 74 | 特定保健指導対象者数(積極的支援)(人) | | | | |
| 75 | 特定保健指導対象者の割合(積極的支援)(%) | | | | = 74 / 2 * 100 |
| 76 | 特定保健指導受診者数(積極的支援)(人) | | | | |
| 77 | 特定保健指導受診者の割合(積極的支援)(%) | | | | = 76 / 74 * 100 |
| 78 | 特定保健指導終了者数(積極的支援)(人) | | | | |
| 79 | 特定保健指導終了者の割合(積極的支援)(%) | | | | = 78 / 74 * 100 |
| 80 | 78のうち、健診時に腹囲が基準値以上だった者の数(人)※5 | | | | |
| 81 | 78のうち、特定保健指導後腹囲が3cm以上減少した者の数(人) | | | | |
| 82 | 78のうち、特定保健指導後腹囲が3cm以上減少した者の割合(%) | | | | = 81 / 80 * 100 |
| 83 | 特定保健指導対象者数(動機づけ支援)(人) | | | | |
| 84 | 特定保健指導対象者の割合(動機づけ支援)(%) | | | | = 83 / 2 * 100 |
| 85 | 特定保健指導受診者数(動機づけ支援)(人) | | | | |
| 86 | 特定保健指導受診者の割合(動機づけ支援)(%) | | | | = 85 / 83 * 100 |
| 87 | 85のうち、健診時に腹囲が基準値以上だった者の数(人)※5 | | | | |
| 88 | 85のうち、特定保健指導後腹囲が3cm以上減少した者の数(人) | | | | |
| 89 | 85のうち、特定保健指導後腹囲が3cm以上減少した者の割合(%) | | | | = 88 / 87 * 100 |
| 90 | 特定保健指導対象者数(小計)(人) | | | | = 74 + 84 |
| 91 | 特定保健指導終了者数(小計)(人) | | | | = 78 + 85 |
| 92 | 特定保健指導終了者の割合(小計)(%) | | | | = 91 / 90 * 100 |
| 特定保健指導以外の保健事業※6 | | | | | |
| 93 | 2のうち、医療機関受診の必要があると考えられる者の数(人) | | | | |
| 94 | 93のうち、個別に働きかけを行った者の数(人) | | | | |
| 95 | 2のうち、医療機関受診の必要がないと考えられる者の数(人) | | | | |
| 96 | 95のうち、何らかの保健指導を行った者の数(人) | | | | |
| 97 | 生活習慣病のコントロールが良好であると考えられる者の数(人) | | | | |
| 98 | 生活習慣病のコントロールが不良であると考えられる者の数(人) | | | | |
| 99 | 98のうち、かかりつけ医と連携して対応した者の数(人) | | | | |
| 100 | 健診未受診者の数(人) | | | | = 1 - 2 |
| 101 | 100のうち、医療機関を受診していない者の数(人) | | | | |
| 102 | 101のうち、次年度、特定健診を受診した者の数(人) | | | | |

※5 特定保健指導終了時に腹囲を計測した者のみを抽出。

※6 様式6-10参照

都道府県健康増進計画に位置付ける目標項目

| 日頃の生活習慣 | 基準指標 | | データソース |
|----------|--------------|---------------------------|-------------|
| | アウトカム | 予防エネルギー比率 | |
| 境界領域・有病期 | 適切な生活習慣を有する率 | 脂質エネルギー比率 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 野菜摂取量 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 朝食欠食率 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 日常生活における歩数 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 運動習慣のある者の割合 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 睡眠による休養が不足している者の割合 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 喫煙する者の割合 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 多量飲酒者の割合 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | メタボリックシンドロームの概念を知っている人の割合 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 普及啓発による知識浸透率 | 都道府県健康・栄養調査 |
| 日頃の生活習慣 | アウトカム | 肥満者の推定数(成人・小児) | 健康データ |
| | | 高血圧症発症者の推定数 | 健康データ |
| | | 糖尿病発症者の推定数 | 健康データ |
| | | 脂質異常症発症者の推定数 | 健康データ |
| | | 高血圧症発症者の推定数 | 健康データ |
| | | 糖尿病発症者の推定数 | 健康データ |
| | | 脂質異常症発症者の推定数 | 健康データ |
| | | メタボリックシンドローム新規該当者推定数 | 健康データ |
| | | 糖尿病発症者推定数 | 健康データ |
| | | 高血圧症発症者推定数 | 健康データ |
| プロセス | | 健康増進実施率 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 医療機関受診率 | 都道府県健康・栄養調査 |

※塗りつぶした欄は関係者を通じて把握し、位置付ける予定の目標項目
 ●生活習慣病に關するレセプトの把握

【参考】

都道府県健康増進計画に位置付ける目標項目

| 日頃の生活習慣 | 基準指標 | | データソース |
|----------|--------------|------------------------------------|-------------|
| | アウトカム | 予防エネルギー比率 | |
| 境界領域・有病期 | 適切な生活習慣を有する率 | 脂質エネルギー比率 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 野菜摂取量 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 朝食欠食率 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 日常生活における歩数 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 運動習慣のある者の割合 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 睡眠による休養が不足している者の割合 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 喫煙する者の割合 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 多量飲酒者の割合 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概念を知っている人の割合 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 普及啓発による知識浸透率 | 都道府県健康・栄養調査 |
| 日頃の生活習慣 | アウトカム | 肥満者の推定数(成人・小児) | 健康データ |
| | | メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)予備群の推定数 | 健康データ |
| | | 糖尿病予備群の推定数 | 健康データ |
| | | 高血圧症予備群の推定数 | 健康データ |
| | | メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)該当者の推定数 | 健康データ |
| | | 糖尿病有病者の推定数 | 健康データ |
| | | 高血圧症有病者の推定数 | 健康データ |
| | | 高脂血症発症者の推定数 | 健康データ |
| | | メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)新発該当者の推定数 | 健康データ |
| | | 糖尿病発症者の推定数 | 健康データ |
| プロセス | | 健康増進実施率 | 都道府県健康・栄養調査 |
| | | 医療機関受診率 | 都道府県健康・栄養調査 |

【参考】

補強的な診療・保健指導プログラム（糖尿病）

| 生活習慣病 発展段階 | 基準指標 | | データソース |
|---------------|-------|-------|--|
| 重症化・ 合併症 | アウトカム | 疾患受療率 | 患者調査(3年ごと) |
| | | 合併症率 | 患者調査(3年ごと) 社会福祉行政業務報告 |
| | アウトカム | 死亡率 | 日本透析医学会 人口動態統計 |
| | | 健康寿命 | 人口動態統計 都道府県生命表(5年ごと) レセプト 都道府県生命表(5年ごと) レセプト 都道府県生命表(5年ごと) 都道府県生命表(5年ごと) |

(参考)上記に含まれない「健康日本21」代表目標項目のうち、健康指標として都道府県健康増進計画に位置付けるもの

| 基準指標 | | データソース |
|--------|----------|----------------|
| がん | がん検診受診者数 | 国民生活基礎調査(3年ごと) |
| こころの健康 | 自殺者数 | 人口動態統計 |
| 歯の健康 | 8020の人数 | 都道府県健康・栄養調査 |

糖尿病

| 生活習慣病 発展段階 | 基準指標 | | データソース |
|---------------|-------|-------|--|
| 重症化・ 合併症 | アウトカム | 疾患受療率 | 患者調査(3年ごと) |
| | | 合併症率 | 患者調査(3年ごと) 社会福祉行政業務報告 |
| | アウトカム | 死亡率 | 日本透析医学会 人口動態統計 |
| | | 健康寿命 | 人口動態統計 都道府県生命表(5年ごと) レセプト 都道府県生命表(5年ごと) レセプト 都道府県生命表(5年ごと) 都道府県生命表(5年ごと) |

(参考)上記に含まれない「健康日本21」代表目標項目のうち、健康指標として都道府県健康増進計画に位置付けるもの

| 基準指標 | | データソース |
|--------|----------|----------------|
| がん | がん検診受診者数 | 国民生活基礎調査(3年ごと) |
| こころの健康 | 自殺者数 | 人口動態統計 |
| 歯の健康 | 8020の人数 | 歯科疾患実態調査 |

～ 都道府県における分析例 1 ～

～ 都道府県における分析例 1 ～

糖尿病等有病者・予備群の動向(人数)

糖尿病等有病者・予備群の動向(人数)

例:今年度と前年度のHbA1cのデータを用いて、改善、現状維持、悪化の人数を評価。

例:今年度と前年度のHbA1cのデータを用いて、改善、現状維持、悪化の人数を評価。

| HbA1c | 今年度健診情報 | | | | | 合計 |
|---------|---------|---------|------|-------|-----|----|
| | ～5.5 | 5.5～6.1 | 6.1～ | 未受診者数 | 対象外 | |
| 前年度健診情報 | ～5.5 | | | | | |
| | 5.5～6.1 | | | | | |
| | 6.1～ | | | | | |
| | 未受診者数 | | | | | |
| | 対象外 ※ | | | | | |
| | 合計 | | | | | |

| HbA1c | 今年度健診情報 | | | | | 合計 |
|---------|---------|---------|------|-------|-----|----|
| | ～5.5 | 5.5～6.1 | 6.1～ | 未受診者数 | 対象外 | |
| 前年度健診情報 | ～5.5 | | | | | |
| | 5.5～6.1 | | | | | |
| | 6.1～ | | | | | |
| | 未受診者数 | | | | | |
| | 対象外 ※ | | | | | |
| | 合計 | | | | | |

※ 前年度受診していても今年度異動した場合や前年度は別の医療保険者で今年度異動で対象となった場合

※ 前年度受診していても今年度異動した場合や前年度は別の医療保険者で今年度異動で対象となった場合

- 同様に血圧、脂質等の健診結果で動向を分析する(様式を同様に作成)
- 同様に保健指導対象者についても動向を分析する(様式を同様に作成)

- 同様に血圧、脂質等の健診結果で動向を分析する(様式を同様に作成)
- 同様に保健指導対象者についても動向を分析する(様式を同様に作成)

糖尿病等患者の動向(人数等)

糖尿病等患者の動向(人数等)

例:今年度と前年度の糖尿病関連のレセプトデータを用いて、改善、現状維持、悪化の人数(レセプト枚数、レセプト点数など)を評価。

例:今年度と前年度の糖尿病関連のレセプトデータを用いて、改善、現状維持、悪化の人数(レセプト枚数、レセプト点数など)を評価。

| 糖尿病 | 今年度レセプト情報 | | | | | 合計 |
|-----------|-------------|------|-------|----|-----|----|
| | 外来のみ | 入院のみ | 外来・入院 | なし | 対象外 | |
| 前年度レセプト情報 | 外来レセプトのみ | | | | | |
| | 入院レセプトのみ | | | | | |
| | 外来・入院レセプト両方 | | | | | |
| | なし | | | | | |
| | 対象外 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |

| 糖尿病 | 今年度レセプト情報 | | | | | 合計 |
|-----------|-------------|------|-------|----|-----|----|
| | 外来のみ | 入院のみ | 外来・入院 | なし | 対象外 | |
| 前年度レセプト情報 | 外来レセプトのみ | | | | | |
| | 入院レセプトのみ | | | | | |
| | 外来・入院レセプト両方 | | | | | |
| | なし | | | | | |
| | 対象外 | | | | | |
| | 合計 | | | | | |

※ レセプト枚数又は患者数に着目する場合
レセプト点数に着目する場合
レセプト診療日数に着目する場合 に分けて解析。

※ レセプト枚数又は患者数に着目する場合
レセプト点数に着目する場合
レセプト診療日数に着目する場合 に分けて解析。

- 同様に、高血圧、高脂血症、虚血性心疾患、脳卒中等について作成
- 同様に、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)該当者・予備群についても作成

- 同様に、高血圧、高脂血症、虚血性心疾患、脳卒中等について作成
- 同様に、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)該当者・予備群についても作成

～ 都道府県における分析例 2 ～

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）はリスク相互の関連が大きく、年を経るうちにリスク数が増えてくる。一つひとつの要因の増加を見るだけでなく、各個人への要因の集積度がどのように変化していくかも健診・保健指導の成果として重要と考える。そこで、腹囲、血糖、HbA1c、血圧、脂質等について、基準値を超えたもののリスク数について、これらの年度毎の推移を分析する。

| 腹囲、血糖、HbA1c、血圧、脂質などのリスク数 | | 今年度健診情報 | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|-----|----|---------|-------|-----|----|
| | | ～1 | 2～3 | 4～ | データ欠損あり | 未受診者数 | 対象外 | 合計 |
| 前年度健診情報 | ～1 | | | | | | | |
| | 2～3 | | | | | | | |
| | 4～ | | | | | | | |
| | データ欠損あり | | | | | | | |
| | 未受診者数 | | | | | | | |
| | 対象外 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |

レセプト病名で抽出された生活習慣病者の前年度の健診情報で、腹囲、血糖、HbA1c、血圧、脂質等の基準値を超えたもののリスク数との関係を分析する。

| 腹囲、血糖、HbA1c、血圧、脂質などのリスク数 | | 今年度レセプト情報 | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|-----|------|--------|-----|-----------|-----|------|----------|
| | | 糖尿病 | 高血圧 | 高脂血症 | 虚血性心疾患 | 脳卒中 | 左記のいずれもなし | 対象外 | 単純集計 | 重複を除外した数 |
| 前年度健診情報 | ～1 | | | | | | | | | |
| | 2～3 | | | | | | | | | |
| | 4～ | | | | | | | | | |
| | データ欠損あり | | | | | | | | | |
| | 未受診者数 | | | | | | | | | |
| | 対象外 | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | |

～ 都道府県における分析例 2 ～

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）はリスク相互の関連が大きく、年を経るうちにリスク数が増えてくる。一つひとつの要因の増加を見るだけでなく、各個人への要因の集積度がどのように変化していくかも健診・保健指導の成果として重要と考える。そこで、腹囲、血糖、HbA1c、血圧、脂質等について、基準値を超えたもののリスク数について、これらの年度毎の推移を分析する。

| 腹囲、血糖、HbA1c、血圧、脂質などのリスク数 | | 今年度健診情報 | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|-----|----|---------|-------|-----|----|
| | | ～1 | 2～3 | 4～ | データ欠損あり | 未受診者数 | 対象外 | 合計 |
| 前年度健診情報 | ～1 | | | | | | | |
| | 2～3 | | | | | | | |
| | 4～ | | | | | | | |
| | データ欠損あり | | | | | | | |
| | 未受診者数 | | | | | | | |
| | 対象外 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |

レセプト病名で抽出された生活習慣病者の前年度の健診情報で、腹囲、血糖、HbA1c、血圧、脂質等の基準値を超えたもののリスク数との関係を分析する。

| 腹囲、血糖、HbA1c、血圧、脂質などのリスク数 | | 今年度レセプト情報 | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|-----|------|--------|-----|-----------|-----|------|----------|
| | | 糖尿病 | 高血圧 | 高脂血症 | 虚血性心疾患 | 脳卒中 | 左記のいずれもなし | 対象外 | 単純集計 | 重複を除外した数 |
| 前年度健診情報 | ～1 | | | | | | | | | |
| | 2～3 | | | | | | | | | |
| | 4～ | | | | | | | | | |
| | データ欠損あり | | | | | | | | | |
| | 未受診者数 | | | | | | | | | |
| | 対象外 | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | |