

No.	識別番号	性	年齢	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
55	B05001691	男	8■歳	ニトレンジピン フロセミド アロプリノール 塩酸タムスロシン アスピリン ファモチジン 酪酸菌配合剤 エチゾラム	激越 幻覚 錯乱状態	回復 回復 回復	A型インフルエンザのため、晩より塩酸アマンタジン服用。 投与2日目、夜間より不審な行動、幻覚、興奮、錯乱の発現。 投与5日目、本剤投与中止。その後徐々に回復。
56	B05001694	男	■歳	なし	悪夢 幻覚	不明 不明	インフルエンザに対して、塩酸アマンタジンを1回だけ投与。 2ヵ月経過しているが、夜に変な夢や幻覚をみることがある。
57	B05003287		1■歳	セフジトレンピボキシル ソファルコン フマル酸ケトチフェン ブランルカスト水和物	意識レベルの低下 痙攣	回復 回復	A型インフルエンザに対して、塩酸アマンタジン投与開始。 本剤2回目の内服後、約3時間後に意識障害と痙攣出現し、入院。 脳波の検査：正常。 約2ヵ月後、回復。
58	B05006431	女	1■歳	塩酸アンプロキソール アスピリンd-マレイン酸クロ ルフェニラミン アセトアミノフェン	意識レベルの低下 幻覚	回復 回復	A型インフルエンザにて夜から塩酸アマンタジン投与開始。 翌日、20分ほど持続する幻覚、意識障害が出現。本剤投与中止。その後回復。
59	B07000483	男	■歳	クラリスロマイシン 塩酸ツロブテロール ツロブテロール	意識レベル低下 幻覚	回復 回復	A型インフルエンザに対し、塩酸アマンタジンを夕食後服用した1時間後、急に目を覚まし電灯を怖がる。 投与2日目、本剤内服後も同様な症状がみられたため、本剤投与中止。 その後、意識障害、幻覚なし。
60	B07000484	男	■歳	クラリスロマイシン 塩酸ツロブテロール ツロブテロール	意識レベルの低下 痙攣	回復 回復	インフルエンザにて、塩酸アマンタジン投与開始。夕食後本剤服用1時間後、急に泣き出し、びくびく痙攣を起こし、名前を呼んでも反応なし。 投与2日目、朝本剤内服し、1時間後、同様の症状有り、本剤投与中止。 その後、意識障害、痙攣なし。
61	B07001016	男	1■歳	なし	意識消失	不明	A型インフルエンザで、塩酸アマンタジンを5日間服用。 投与終了4日間くらい続けてふわっとわからなくなる。

