

効 能

目の次の症状の緩和：異物感(コロコロ・チクチクする感じ)、なみだ目、結膜充血、目のかゆみ、目やにの多いときの目のかすみ

用法・用量

1回1～2滴、1日4回点眼してください。

[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(一旦レンズをはずしてから点眼してください)
- (5)点眼用にのみ使用してください。

成 分

成分	分量	ほたらき
プラノブ日フェン	0.05%	目の炎症をおさえます。

添加物：ホウ酸、pH調節剤、エデト酸Na、BHT、塩化ベンザルコニウム、
L-メントール、dl-カンフル、ポリソルベート80

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないでください。なお、本剤は光による品質の変化を防ぐため、密栓して、必ず添付の携帯用袋(しゃ光性がある)に入れてください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になりたり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はすみやかに使用してください。(品質保持のため)



目薬をさす時の注意と正しいさし方

注 意

- 容器の先がまぶたやまつ毛にふれると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

正しいさし方

- 手をよく洗い、目に直接指がふれないようにしてください。
- やや上を向いて指で下まぶたをさげ、まぶたの裏側にしずくを落としてください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお問い合わせいたします。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電 話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元
テイカ製薬株式会社
富山県富山市荒川1丁目3番27号


A06-01 6

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目がコロコロ・チクチクする時に

ROHTO CLEAR
【ロートクリア】 眼科薬 13mL


目の炎症による異物感・充血に



炎症原因物質

“プロスタグランジン”の生成を抑制。

パソコンの長時間使用、目の乾燥、コンタクトレンズによる刺激など、目に強い負担をかけ続けると、目の細胞はダメージを受けてしまいます。ダメージを受けた細胞からは炎症原因物質“プロスタグランジン”が生成され、炎症を起こすことで、目がコロコロ・チクチクするような異物感を引き起こしてしまいます。「ロートクリア」は、抗炎症成分プラノプロフェンが炎症の原因物質の生成を抑え、症状を効果的に鎮めます。目のコロコロ・チクチクが気になる時には「ロートクリア」。



18世紀に、日本の医学の振興を目指して翻訳された“解体新書”。その開拓の思想のもとに、ロートは現代人の目の疾患をあらゆる方向から見つめ直しています。現在までに培ってきたノウハウと最新技術で酷使される目に応えたい、その想いを「解眼新書」の文字に託しました。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は、使用しないこと

- (1) 7才未満の小児 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人

相談すること

1. 次の人は、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
(5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、刺激感、異物感、なみだ目、目やに
その他	息苦しさ

(2) 症状が悪化した場合

(3) 目のかすみ改善されない場合(緑内障等の可能性も考えられる)

(4) 3日位使用しても症状がよくなる場合

(5) 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合

効能・効果


目の次の症状の緩和: 異物感(コロコロ・チクチクする感じ)、目のかゆみ、結膜充血、なみだ目、目やにの多いときの目のかすみ

用法・用量

1回1~2滴、1日4回点眼してください。7才未満の小児には使用しないでください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
(3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(一旦レンズはずしてから点眼してください。)
(4) 点眼用にのみ使用してください。
(5) 用法・用量を厳守してください。



成分

プラノプロフェン.....0.05% 添加物として、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、BHT、塩化ベンザルコニウム、*l*-メントール、*dl*-カンフル、ポリソルベート80を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
(4) 他の人と共用しないでください。
(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく早くご使用ください。
(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってご使用ください。
(7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

400557702

【効用】目の次の症状の緩和に効果的。アレルギー性結膜炎、乾燥性角膜炎、結核性角膜炎、なみだ目、目やにの多いときの目のかゆみ。【用法・用量】1回1～2滴、1日4回点眼してください。【成分】(1mL中) プラノプロフェン…0.5mg (添加物) エドット酸ナトリウム、シブチルヒドロキシトリエタン、塩化ベンザルコニウム、β-メントール、ポリソルボン、ポリソルボン80、ホウ砂、pH-カンファル。

●外用が難しいとき、点眼容器を包んでいる透明の袋がはじいたら破れている等、開封された状態がある場合は使用しないでください。

●外箱が割れている、点眼容器を包んでいる透明の袋がはじいたら破れている等、開封された状態がある場合は使用しないでください。


●外用が難しいとき、点眼容器を包んでいる透明の袋がはじいたら破れている等、開封された状態がある場合は使用しないでください。

押しあける **医薬品**

販売名: マイティア アイテクト

消炎成分 プラノプロフェンが効く

スッキリしない目のかゆみ・充血・異物感・なみだ目など目の炎症サインの一つです。マイティアアイテクトは、消炎成分プラノプロフェンを配合し、炎症を抑え、これらの症状の緩和にすぐれた効果を発揮します。



注意 してはいけないこと ●次の人は使用しないでください。7歳未満の小児。妊婦または妊娠していると思われる人。授乳中の人。

●医師・薬剤師にご相談ください 医師の治療を受けている人、本人または家族がアレルギー体質の人、ほろい目の痛みのある人、緑内障の人。

包05-393
703-N

●千寿製薬「お客さまセンター」
(06)6201-8952 9:00～17:00(土日、祭日を除く)
製造販売元 千寿製薬株式会社
大阪府中央区東船場二丁目5番8号

●千寿製薬「お客さまセンター」
(06)6201-8952 9:00～17:00(土日、祭日を除く)
製造販売元 千寿製薬株式会社
大阪府中央区東船場二丁目5番8号

●千寿製薬「お客さまセンター」
(06)6201-8952 9:00～17:00(土日、祭日を除く)
製造販売元 千寿製薬株式会社
大阪府中央区東船場二丁目5番8号

4 987123 144605

目のかゆみ・充血・異物感・なみだ目
マイティア アイテクト
消炎成分 プラノプロフェン配合

**スッキリしない
目のかゆみ・充血
異物感・なみだ目
マイティア アイテクト**
消炎成分 プラノプロフェン配合



使用期限
製造番号

紙箱
携帯袋:PVC
袋:PE

アイリスガードP
医薬品


開封口
フィルムの上から
押しあける

使用前に説明書
を必ず読んでく
ださい。

アイリスガードPは外的刺激による
目の異物感(コロコロ・チクチクする感じ)・
なみだ目などの緩和に効果的です。
目は過度・加齢などにより、外的刺激を受けやすくなります。

外的刺激
紫外線、花粉、
コンタクトレンズなど

有効成分
ブライノプロフェンは
炎症の原因物質の生成
を抑制します。



炎症の原因物質
(プロスタグランジン)
の生成



目の
充血・かゆみ

物の色
黒色です。

異物感
目にもが入って
いないコロコロ
チクチクする感じ

なみだ目
なみだが目から
出る量が多くなる
目づかいが良

年月日
開封

【効能】
目の次の症状の緩和・異物感(コロコロ・チクチクする感じ)・なみだ目・結膜充血・目のかゆみ・目やにの多いときの目のかすみ
【用法・用量】 1回1～2滴、1日4回点眼してください。
*コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(一日1レンズをはずしてから点眼してください)

【注意】 1次の人は使用しないでください。(1)7才未満の小児。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)授乳中の人。2.使用に際しては、説明書をよく読んでください。3.直射日光の当たらない涼しい場所に保管し、密栓して保管してください。(必ず熱々のお湯に浸して入れて保管しないでください)特に目薬庫内や車内温度が高い場合は、必ず密栓して保管してください。

目の異物感・なみだ目・充血・かゆみに
アイリスガードP


15mL

目の異物感・
(コロコロ・チクチクする感じ)

なみだ目・充血・
かゆみに **やさしい
清涼感**

アイリスガードP

眼科用薬 15mL



抗炎症成分 ブライノプロフェン配合

キャップ:SAN
ボトル:PET
中栓:PE
袋:PE,PET
外装フィルム:PE,PP

製造
番号
使用
期限

**アイリス
ガードP**



成分) ブライノプロフェン.....0.05%
添加物: ホウ酸、pH調整剤、エチルアルコール、塩化ベンザルコニウム、
トメントール、dl-α-トール、ポリソルベート80

4 987306 002005

大正製薬(株)お客様センター
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00
(土、日、祭日を除く)

大正製薬株式会社
〒100-8555 東京都千代田区千代田2-4-1
http://www.taisho.co.jp

A06-01

5

11

不正加工防止包装

【効能・効果】目の次の症状の緩和・異物感(コロコロ・チクチクする感じ)、目のかゆみ、結膜充血、なみだ目、目やにの多いときの目のかすみ

【有効成分】プラノプロフェン.....0.05%

【添加物】ホウ酸、エチトロンNa、BHT、酸化ベンザルコニコウム、d-メントール、dl-カンフル、ポリソルベート80

ROHTO

長時間、目を使った後は、目に強い負担をかけず、目には炎症を起こさず、コロコロ・チクチクするおちろな異物感を感じることがあります。「ロートクリア」はこの炎症の原因物質の生成を抑える抗炎症成分、プラノプロフェンを配合。異物感・充血に優れた効果を発揮する目薬です。



ロート製薬株式会社
大阪市生野区箕野1-8-1

各店に在庫がある店舗もございます
東京:03-5442-6020
大阪:06-6758-1230
受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

眼薬 解新

抗炎症成分 プラノプロフェン配合

本品は容器を印刷行ノリムで密封包装してあります。

【用法・用量】1回1~2滴、1日4回点眼してください。

【注 意】●次の人は使用しないでください。7才未満の小児、妊娠または授乳中の人、目やにの多い人、授乳中の人、●使用に際しては、結膜をよよく洗ってください。●直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。●コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(レンズをはずしてから点眼してください。)

【眼科薬】 ROHTO CLEAR **ロートクリア**
目の炎症による異物感(コロコロ・チクチク)に

目がコロコロ・チクチクする時に

抗炎症成分プラノプロフェン配合

【眼科薬】 ROHTO CLEAR **ロートクリア**

Pranopropfen is effective for reddyeyes and inflammation.

13mL 異物感・充血に

紙箱
キャップ 中栓 ボトル

※環境問題に配慮し、携帯袋は採用しておりません。

使用期限 製造番号
2009.06.07A1

4 987241100644

4005 56902

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1917				
Jan 1	Balance forward			
Jan 15	...			
Jan 31	...			
Feb 1	...			
Feb 15	...			
Feb 28	...			
Mar 1	...			
Mar 15	...			
Mar 31	...			
Apr 1	...			
Apr 15	...			
Apr 30	...			
May 1	...			
May 15	...			
May 31	...			
Jun 1	...			
Jun 15	...			
Jun 30	...			
Jul 1	...			
Jul 15	...			
Jul 31	...			
Aug 1	...			
Aug 15	...			
Aug 31	...			
Sep 1	...			
Sep 15	...			
Sep 30	...			
Oct 1	...			
Oct 15	...			
Oct 31	...			
Nov 1	...			
Nov 15	...			
Nov 30	...			
Dec 1	...			
Dec 15	...			
Dec 31	...			