


日本の定期/任意予防接種スケジュール(2008年4月1日施行予定) 2007年8月現在



*1 D:ジフテリア, P:百日咳, T:破傷風を表す。
 *2 同じ期内で麻疹ワクチンまたは風疹ワクチンのいずれか一方を受けた者および麻疹または風疹のいずれか一方に罹患したことのある者、あるいは特に単抗原ワクチンの接種を希望する者以外はMRワクチンを接種。
 *3 60歳以上65歳未満の者であって一定の心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者。
 *4 妊娠中に検査を行い、HBs抗原陽性(HBe抗原陽性、陰性の両方とも)の母親からの出生児は、出生後できるだけ早期及び、生後2ヶ月にHB免疫グロブリン(HBIG)を接種、ただし、HBe抗原陽性の母親から生まれた児の場合は2回目のHBIGを省略しても良い、更に生後2,3,5カ月にHBワクチンを接種する。生後6ヶ月後にHBs抗原及び抗体検査を行い必要に応じて任意の追加接種を行う(健康保険適用)。

0～1歳児の接種スケジュール案:国立感染症研究所感染症情報センター(なお、定期接種はすべて標準的な接種年齢で接種するものとし、任意接種はB型肝炎ワクチンのみ受ける場合と受けない場合を記載していますが、その他のワクチンは受ける場合のスケジュール案となっています。)

(案1:B型肝炎母子感染防止事業としてB型肝炎ワクチンを受ける場合)

| 生・不活化の別 | 月齢(か月) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 不活化 | DPT | | | | ↓ | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | |
| 生 | BCG | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | ポリオ | | | | ↓ | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |
| 生 | 麻疹・風疹混合(MR) | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |
| 生 | (麻疹) | | | | | | | | | | | | | | (↓) | | | | | | | | | | |
| 生 | (風疹) | | | | | | | | | | | | | | (↓) | | | | | | | | | | |
| 不活化 | 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化 | Hib | | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | |
| 不活化 | インフルエンザ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | 水痘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | おたふくかぜ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化 | B型肝炎 | | | ↓ | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(案2:B型肝炎ワクチンを受ける予定がない場合、ポリオワクチンを0歳で2回接種する場合)

| 生・不活化の別 | 月齢(か月) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 不活化 | DPT | | | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | |
| 生 | BCG | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | ポリオ | | | | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| 生 | 麻疹・風疹混合(MR) | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |
| 生 | (麻疹) | | | | | | | | | | | | | | (↓) | | | | | | | | | | |
| 生 | (風疹) | | | | | | | | | | | | | | (↓) | | | | | | | | | | |
| 不活化 | 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化 | Hib | | | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | |
| 不活化 | インフルエンザ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | 水痘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | おたふくかぜ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化 | B型肝炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(案3:B型肝炎ワクチンを受ける予定がない場合、ポリオワクチンを0歳と1歳で接種し、BCGの接種が3か月半の場合)

| 生・不活化の別 | 月齢(か月) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 不活化 | DPT | | | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | |
| 生 | BCG | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | ポリオ | | | | ↓ | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |
| 生 | 麻疹・風疹混合(MR) | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |
| 生 | (麻疹) | | | | | | | | | | | | | | (↓) | | | | | | | | | | |
| 生 | (風疹) | | | | | | | | | | | | | | (↓) | | | | | | | | | | |
| 不活化 | 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化 | Hib | | | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | |
| 不活化 | インフルエンザ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | 水痘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | おたふくかぜ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化 | B型肝炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(案4:B型肝炎ワクチンを受ける予定がない場合、ポリオワクチンを0歳と1歳で接種し、BCGの接種が4か月半の場合)

| 生・不活化の別 | 月齢(か月) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 不活化 | DPT | | | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | |
| 生 | BCG | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | ポリオ | | | | ↓ | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |
| 生 | 麻疹・風疹混合(MR) | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |
| 生 | (麻疹) | | | | | | | | | | | | | | (↓) | | | | | | | | | | |
| 生 | (風疹) | | | | | | | | | | | | | | (↓) | | | | | | | | | | |
| 不活化 | 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化 | Hib | | | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | |
| 不活化 | インフルエンザ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | 水痘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 | おたふくかぜ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化 | B型肝炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------|-----|--|
| 定期接種 | ↓ | 予防接種法に基づく接種として標準的な接種年齢 |
| 定期接種 | (↓) | 予防接種法に基づく接種として標準的な接種スケジュール案 |
| 任意接種 | | 1歳代で既に麻疹ワクチンまたは風疹ワクチンのいずれか一方を受けた者、麻疹または風疹のいずれか一方に罹患したことのある者、特に単抗原ワクチンの接種を希望する者 |
| 任意接種 | | 予防接種法に基づく接種が受けられる年齢 |
| 任意接種 | | やむをえない事情を有する場合は、予防接種法に基づく接種が受けられる年齢 |
| 任意接種 | | 接種年齢 |