

異常な行動が記録されている事例の集計

1. 異常な行動発現症例の背景:年齢

【年齢①】

	症例数	(%)
10歳未満	94	34
10代	144	52
20代	8	3
30代	5	2
40代	5	2
50代	7	3
60代	2	1
70代	6	2
80代	4	1
90代	4	1
小計	279	100
不明	3	
総計	282	

【年齢②】

	症例数	(%)
6歳以下	36	13
7歳から9歳	58	21
10歳から12歳	65	23
13歳から15歳	60	22
16歳から18歳	16	6
19歳以上	44	16
小計	279	100
不明	3	
総計	282	

2. 異常な行動発現症例の背景:性別

	症例数	(%)
女性	75	27
男性	204	73
小計	279	100
不明	3	
総計	282	

異常な行動が記録されている事例の集計

3. 異常な行動発現症例の背景:インフルエンザウイルス型別

	症例数	(%)
A型インフルエンザ	150	53
A&B型インフルエンザ	3	1
B型インフルエンザ	74	26
型不明	45	16
不明	7	2
予防*	3	1
総計	282	100

* 予防症例3例の内訳

- 1) 38℃台の発熱、咽頭炎の記載あり
- 2) インフルエンザ疑いの記載あり
- 3) 鎮咳剤・抗生剤等併用の記載あり

4. 異常な行動発現時期

【年別】

	症例数	(%)
2002	4	1
2003	12	4
2004	10	4
2005	25	9
2006	67	24
2007	160	58
小計	278	100
不明	4	
総計	282	

【シーズン別】

	症例数	(%)
2001-2002シーズン	4	1
2002-2003シーズン	11	4
2003-2004シーズン	11	4
2004-2005シーズン	15	5
2005-2006シーズン	76	27
2006-2007シーズン	161	58
小計	278	100
不明	4	
総計	282	

シーズン; 8月から7月

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計

5. 器官別大分類(SOC)ごとの集計

【年齢①】

SOC(日本語)	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	不明	総計	(%)
胃腸障害		1								1		2	1
肝胆道系障害							1					1	0
呼吸器、胸郭および縦隔障害			1			1						2	1
傷害、中毒および処置合併症		9						1				10	3
神経系障害	8	24		3	1	3		3	1			43	11
腎および尿路障害	1					1						2	1
精神障害	108	162	10	4	3	7	1	7	3	4	3	312	83
全身障害および投与局所様態	1	2			1							4	1
皮膚および皮下組織障害		1		1								2	1
総計	118	199	11	8	5	12	2	11	4	5	3	378	100
(%)	31	53	3	2	1	3	1	3	1	1	1	100	

異常な行動が記録されている事例の集計

【年齢②】

SOC(日本語)	6歳以下	7-9歳	10-12歳	13-15歳	16-18歳	19歳以上	不明	総計	(%)
胃腸障害				1		1		2	1
肝胆道系障害						1		1	0
呼吸器、胸郭および縦隔障害						2		2	1
傷害、中毒および処置合併症			5	2	2	1		10	3
神経系障害	3	5	9	12	2	12		43	11
腎および尿路障害	1					1		2	1
精神障害	42	66	76	64	18	43	3	312	83
全身障害および投与局所様態	1		2			1		4	1
皮膚および皮下組織障害				1		1		2	1
総計	47	71	92	80	22	63	3	378	100
(%)	12	19	24	21	6	17	1	100	

【性別】

SOC(日本語)	女性	男性	不明	総計	(%)
胃腸障害		2		2	1
肝胆道系障害	1			1	0
呼吸器、胸郭および縦隔障害		2		2	1
傷害、中毒および処置合併症	2	7	1	10	3
神経系障害	12	31		43	11
腎および尿路障害		2		2	1
精神障害	79	229	4	312	83
全身障害および投与局所様態		4		4	1
皮膚および皮下組織障害	2			2	1
総計	96	277	5	378	100
(%)	25	73	1	100	

異常な行動が記録されている事例の集計

【インフルエンザウイルス型別】

SOC(日本語)	A型	A&B型	B型	型不明	不明	予防	総計	(%)
胃腸障害	2						2	1
肝胆道系障害				1			1	0
呼吸器、胸郭および縦隔障害	2						2	1
傷害、中毒および処置合併症	6		4				10	3
神経系障害	27		10	4	2		43	11
腎および尿路障害	2						2	1
精神障害	161	3	88	51	6	3	312	83
全身障害および投与局所様態	3			1			4	1
皮膚および皮下組織障害	1		1				2	1
総計	204	3	103	57	8	3	378	100
(%)	54	1	27	15	2	1	100	

【発現時期年別】

SOC(日本語)	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	不明	総計	(%)
胃腸障害				1	1			2	1
肝胆道系障害				1				1	0
呼吸器、胸郭および縦隔障害					1	1		2	1
傷害、中毒および処置合併症			1		3	6		10	3
神経系障害		3	1	5	12	20	2	43	11
腎および尿路障害				1		1		2	1
精神障害	6	13	9	25	70	181	8	312	83
全身障害および投与局所様態		1			3			4	1
皮膚および皮下組織障害						2		2	1
総計	6	17	11	33	90	211	10	378	100
(%)	2	4	3	9	24	56	3	100	

異常な行動が記録されている事例の集計

【発現時期シーズン別】

SOC(日本語)	2001 -2002	2002 -2003	2003 -2004	2004 -2005	2005 -2006	2006 -2007	不明	総計	(%)
胃腸障害				1	1			2	1
肝胆道系障害					1			1	0
呼吸器、胸郭および縦隔障害					1	1		2	1
傷害、中毒および処置合併症			1		3	6		10	3
神経系障害		2	2	5	12	20	2	43	11
腎および尿路障害				1		1		2	1
精神障害	6	13	9	14	80	182	8	312	83
全身障害および投与局所様態		1			3			4	1
皮膚および皮下組織障害						2		2	1
総計	6	16	12	21	101	212	10	378	100
(%)	2	4	3	6	27	56	3	100	

6. 各シーズンごとのインフルエンザ型別集計

V_type	2001 -2002	2002 -2003	2003 -2004	2004 -2005	2005 -2006	2006 -2007	不明	総計	(%)
A型インフルエンザ	1	5	9	8	58	69		150	53
A&B型インフルエンザ						3		3	1
B型インフルエンザ	2	1		4	5	61	1	74	26
型不明		5	1	1	11	24	3	45	16
不明			1	1	2	3		7	2
予防	1			1		1		3	1
総計	4	11	11	15	76	161	4	282	100
(%)	1	4	4	5	27	57	1	100	

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計

7. 主な併用薬剤の内訳

薬効細分類2		集計
解熱鎮痛消炎剤	アニリン系製剤	96
	サリチル酸系製剤	2
	その他の解熱鎮痛消炎剤	17
	フェニル酢酸系製剤	5
	塩基性消炎鎮痛剤	4
計		124
去たん剤	システイン系製剤	62
	その他の去たん剤	27
	ブロムヘキシシン製剤	6
	植物性製剤	2
計		97
鎮咳去たん剤	その他の鎮咳去たん剤	54
	植物性製剤	7
計		61
抗ヒスタミン剤	その他の抗ヒスタミン剤	46
	トリペレナミン系製剤	1
	フェノチアジン系製剤	12
計		59
鎮咳剤	エフェドリン及びマオウ製剤	2
	その他の鎮咳剤	36
	デキストロメトルファン製剤	19
計		57
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オキサセフェム系抗生物質製剤	1
	セフェム系抗生物質製剤	22
	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	1
	ペニシリン系抗生物質製剤	5
計		29
気管支拡張剤	イソプレナリン系製剤	1
	キサンチン系製剤	5
	その他の気管支拡張剤	21
計		27
消化性潰瘍用剤	H ₂ 遮断剤	1
	その他の消化性潰瘍用剤	25
計		26

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計

8. 既往症・合併症

医師記載疾患名	既往症	合併症	計
アトピー性皮膚炎	3	1	4
アレルギー性結膜炎	1	1	2
アレルギー性鼻炎		1	1
ウイルス性下痢症	1		1
ウイルス性筋炎		1	1
ウイルス性発疹症疑い		1	1
うつ状態		1	1
うつ病		2	2
スギ花粉症		1	1
ぜんそく		1	1
てんかん		2	2
異常興奮	1		1
胃潰瘍	1		1
胃癌術後		1	1
一過性心房細動		1	1
咽頭炎		1	1
右単径ヘルニア	1		1
花粉症	1	1	2
過呼吸	1		1
感冒	1		1
感冒性消化不良症		1	1
肝障害		1	1
顔面外傷		1	1
川崎病	1		1
期外収縮		1	1
気管支喘息	3	8	11
急性気管支炎		2	2
急性中耳炎		1	1
強迫性障害		1	1
頸動脈血栓症	1		1
原因不明成長障害		1	1
甲状腺腫大		1	1
高CK血症		1	1
高血圧		3	3
腰部脊椎管狭窄症（術後）	1		1
骨粗鬆症		1	1

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計

医師記載疾患名	既往症	合併症	計
左単径ヘルニア	1		1
細菌感染症(かぜ)		1	1
失明		1	1
上気道炎	1	1	2
腎不全		1	1
睡眠時驚愕症	1		1
睡眠時遊行症	1		1
髄膜炎	1		1
精神遅滞		1	1
川崎病後冠動脈瘤		1	1
脱水症		1	1
知的障害		1	1
虫垂炎	1		1
陳旧性肺結核	1		1
鉄欠乏性贫血		1	1
糖尿病		2	2
糖尿病性右足壊疽		1	1
統合失調症疑い		1	1
洞不全症候群(ペースメーカー留置)		1	1
特発性血小板減少性紫斑病		1	1
突発性心房細動		1	1
認知症		1	1
熱射病	1		1
熱性けいれん	11	1	12
脳炎		1	1
脳梗塞		3	3
肺炎		2	2
肺結核後遺症		1	1
肺結核後遺症に伴う慢性呼吸不全		1	1
不眠症		2	2
不明熱		1	1
副鼻腔炎		2	2
腹痛		1	1
片頭痛(疑)	1		1
便秘	1	1	2
慢性心不全		1	1
慢性腎不全		2	2

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計

医師記載疾患名	既往症	合併症	計
慢性中耳炎		1	1
夢中遊行	1		1
夢遊症	1		1
夜驚症	1		1
溶連菌感染		1	1
抑うつ神経症	1		1
喘息	3	1	4
喘息様気管支炎	1	2	3

9. 異常な行動の発現時刻について

【年齢①】

発現時刻	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
0-3時	5	8	20	20	5	24			30	17
3-6時	1	2	9	9	1	5			11	6
6-9時	1	2	3	3	2	10			6	3
9-12時	3	5	6	6	2	10			11	6
12-15時	12	20	11	11		0			23	13
15-18時	9	15	15	15	3	14			27	15
18-21時	13	22	9	9	5	24			27	15
21-24時	16	27	26	26	3	14			45	25
小計	60	100	99	100	21	100	0		180	100
不明	34		45		20		3		102	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

発現時刻	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
0-3時		0	5	13	9	21	10	22		0	6	25			30	17
3-6時		0	1	3	2	5	6	13	1	11	1	4			11	6
6-9時		0	1	3	1	2	1	2	1	11	2	8			6	3
9-12時	1	5	2	5	2	5	4	9		0	2	8			11	6
12-15時	4	20	8	20	5	12	5	11	1	11		0			23	13
15-18時	4	20	5	13	8	19	4	9	2	22	4	17			27	15
18-21時	6	30	7	18	5	12	4	9		0	5	21			27	15
21-24時	5	25	11	28	10	24	11	24	4	44	4	17			45	25
小計	20	100	40	100	42	100	45	100	9	100	24	100	0		180	100
不明	16		18		23		15		7		20		3		102	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

10. 異常な行動発現時の体温について

【年齢①】

体温	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
発熱持続	37	66	68	72	5	23			110	64
解熱過程	19	34	24	26	14	64			57	33
解熱後		0	2	2	3	14			5	3
小計	56	100	94	100	22	100	0		172	100
不明	38		50		19		3		110	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

体温	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
発熱持続	17	71	20	63	32	74	31	74	4	50	6	26			110	64
解熱過程	7	29	12	38	10	23	10	24	4	50	14	61			57	33
解熱後		0		0	1	2	1	2		0	3	13			5	3
小計	24	100	32	100	43	100	42	100	8	100	23	100	0		172	100
不明	12		26		22		18		8		21		3		110	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

11. 異常行動発現時の体温(前後6時間以内)

0.5℃区切り

異常行動発現時の体温	症例数 (%)	
36℃未満	4	5
36℃以上37℃未満	2	2
37℃以上38℃未満	10	12
38℃以上38.5℃未満	19	22
38.5℃以上39℃未満	15	17
39℃以上39.5℃未満	13	15
39.5℃以上40℃未満	11	13
39℃台	5	6
40℃以上41℃未満	6	7
41℃以上	1	1
小計	86	100
不明	196	
総計	282	

異常な行動が記録されている事例の集計

1℃区切り

異常行動発現時の体温	症例数(%)	
36℃未満	4	5
36℃以上37℃未満	2	2
37℃以上38℃未満	10	12
38℃以上39℃未満	34	40
39℃以上40℃未満	29	34
40℃以上41℃未満	6	7
41℃以上	1	1
小計	86	100
不明	196	
総計	282	

12.異常な行動と覚醒について

【年齢①】

覚醒直後に発現	10歳未満(%)		10代(%)		20代以上(%)		不明(%)		総計(%)	
Yes	25	57	46	58	6	32			77	54
No	19	43	34	43	13	68			66	46
小計	44	100	80	100	19	100	0		143	100
不明	50		64		22		3		139	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

覚醒直後に発現	6歳以下(%)		7歳から9歳以下(%)		10歳から12歳以下(%)		13歳から15歳以下(%)		16歳から18歳以下(%)		19歳以上(%)		不明(%)		総計(%)	
Yes	11	52	14	61	21	60	16	48	7	78	8	36			77	54
No	10	48	9	39	14	40	17	52	2	22	14	64			66	46
小計	21	100	23	100	35	100	33	100	9	100	22	100	0		143	100
不明	15		35		30		27		7		22		3		139	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

13. 異常な行動と就寝について

【年齢①】

就寝中	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	34	61	56	68	6	30		0	96	60
No	22	39	26	32	14	70	1	100	63	40
小計	56	100	82	100	20	100	1	100	159	100
不明	38		62		21		2		123	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

就寝中	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	12	50	22	69	25	66	23	72	7	70	7	32		0	96	60
No	12	50	10	31	13	34	9	28	3	30	15	68	1	100	63	40
小計	24	100	32	100	38	100	32	100	10	100	22	100	1	100	159	100
不明	12		26		27		28		6		22		2		123	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

14. 就寝と覚醒と異常な行動の発現の関係

		覚醒後の発現						総計 (%)	
		Yes (%)		No (%)		不明 (%)			
就寝中	Yes	64	91.4	6	15.0	26	53.1	96	60.4
	No	6	8.6	34	85.0	23	46.9	63	39.6
	小計	70	100.0	40	100.0	49	100.0	159	100.0
	不明	7		26		90		123	
	総計	77		66		139		282	

15. 異常な行動と就寝の時間的な関係について

【年齢①】

就寝から発現	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
直後～1時間	6	40	7	28	1	25			14	32
1<～2時間	3	20	6	24	2	50			11	25
2<～3時間	3	20	4	16	1	25			8	18
3<～4時間	1	7	1	4		0			2	5
4<～5時間	2	13	4	16		0			6	14
6時間<		0	3	12		0			3	7
小計	15	100	25	100	4	100	0		44	100
不明/就寝中でない	79		119		37		3		238	
総計	94		144		41		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

【年齢②】

就眠から発現	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
	1	20	5	50	6	46	1	9	0	0	1	25			14	32
直後～1時間	2	40	1	10	2	15	3	27	1	100	2	50			11	25
1<～2時間	1	20	2	20	1	8	3	27		0	1	25			8	18
2<～3時間		0	1	10		0	1	9		0		0			2	5
3<～4時間	1	20	1	10	2	15	2	18		0		0			6	14
4<～5時間		0		0	2	15	1	9		0		0			3	7
6時間<	5	100	10	100	13	100	11	100	1	100	4	100	0		44	100
小計	31		48		52		49		15		40		3		238	
不明/就寝中でない	36		58		65		60		16		44		3		282	
総計																

16.異常な行動の持続時間について

【年齢①】

回復までの時間	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
≤10分	21	32	35	33	3	10	1	100	60	30
10<～30分	10	15	25	24	3	10		0	38	19
30<～60分	3	5	12	11	2	7		0	17	8
1<～2時間	5	8	9	8		0		0	14	7
2<～3時間	4	6	4	4	3	10		0	11	5
3<～4時間	2	3	4	4		0		0	6	3
4<～5時間	2	3	2	2	1	3		0	5	2
5<～6時間	2	3	2	2		0		0	4	2
6<～24時間	11	17	4	4	4	14		0	19	9
24時間<	2	3	1	1	6	21		0	9	4
未回復	4	6	8	8	7	24		0	19	9
小計	66	100	106	100	29	100	1	100	202	100
不明	28		38		12		2		80	
総計	94		144		41		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

【年齢②】

回復までの時間	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
≤10分	8	30	13	33	15	33	17	35	2	22	4	13	1	100	60	30
10<~30分	4	15	6	15	12	26	9	19	4	44	3	9		0	38	19
30<~60分	1	4	2	5	6	13	5	10	1	11	2	6		0	17	8
1<~2時間	3	11	2	5	5	11	2	4	1	11	1	3		0	14	7
2<~3時間		0	4	10	2	4	2	4		0	3	9		0	11	5
3<~4時間		0	2	5	1	2	2	4	1	11		0		0	6	3
4<~5時間	2	7		0		0	1	2		0	2	6		0	5	2
5<~6時間	1	4	1	3	1	2	1	2		0		0		0	4	2
6<~24時間	5	19	6	15	2	4	2	4		0	4	13		0	19	9
24時間<	2	7		0	1	2		0		0	6	19		0	9	4
未回復	1	4	3	8	1	2	7	15		0	7	22		0	19	9
小計	27	100	39	100	46	100	48	100	9	100	32	100	1	100	202	100
不明	9		19		19		12		7		12		2		80	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

17. 異常な行動発現後と就寝転帰について

【年齢①】

一眠後完全回復	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	41	76	85	84	11	46			137	77
No	13	24	16	16	13	54			42	23
小計	54	100	101	100	24	100	0		179	100
不明	40		43		17		3		103	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

一眠後完全回復	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
No	6	27	7	22	8	18	7	16		0	14	52			42	23
Yes	16	73	25	78	36	82	37	84	10	100	13	48			137	77
小計	22	100	32	100	44	100	44	100	10	100	27	100	0		179	100
不明	14		26		21		16		6		17		3		103	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

18. 異常な行動に関する患者の記憶の関係

【年齢①】

患者の記憶	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	2	5	26	27	13	43			41	25
No	35	95	71	73	17	57			123	75
小計	37	100	97	100	30	100	0		164	100
不明	57		47		11		3		118	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

患者の記憶	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	1	7	1	5	11	26	13	32	2	18	13	39			41	25
No	14	93	21	95	31	74	28	68	9	82	20	61			123	75
小計	15	100	22	100	42	100	41	100	11	100	33	100	0		164	100
不明	21		36		23		19		5		11		3		118	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

19. 異常な行動と光に対する反応の関係

【年齢①】

光に対する反応	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
No	33	97	55	98	14	100			102	98
Yes	1	3	1	2		0			2	2
小計	34	100	56	100	14	100	0		104	100
不明	60		88		27		3		178	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

光に対する反応	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	1	6		0		0	1	4		0		0			2	2
No	15	94	18	100	26	100	22	96	5	100	16	100			102	98
小計	16	100	18	100	26	100	23	100	5	100	16	100	0		104	100
不明	20		40		39		37		11		28		3		178	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

20.異常な行動が発現したタミフル服用回数

【年齢①】

服用回数	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1	51	59	74	56	14	36			139	54
2	27	31	41	31	6	15			74	29
3	2	2	10	8	1	3			13	5
4	5	6	1	1	5	13			11	4
5	1	1	2	2	4	10			7	3
6	1	1	1	1	5	13			7	3
8		0	2	2	2	5			4	2
9		0		0	1	3			1	0
10		0	1	1	1	3			2	1
小計	87	100	132	100	39	100	0		258	100
不明	7		12		2		3		24	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

服用回数	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1	20	59	31	58	33	55	30	54	9	69	16	38			139	54
2	12	35	15	28	21	35	18	32	2	15	6	14			74	29
3		0	2	4	3	5	7	13		0	1	2			13	5
4	2	6	3	6	1	2		0		0	5	12			11	4
5		0	1	2	1	2		0	1	8	4	10			7	3
6		0	1	2	1	2		0		0	5	12			7	3
8		0		0		0		0	1	8	3	7			4	2
9		0		0		0		0		0	1	2			1	0
10		0		0		0	1	2		0	1	2			2	1
小計	34	100	53	100	60	100	56	100	13	100	42	100	0		258	100
不明	2		5		5		4		3		2		3		24	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

21.異常な行動が発現した回数

【年齢①】

再投与再発の有無	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
再現性あり	16	17	12	8	3	7		0	31	11
再現性なし	23	24	29	20	7	17		0	59	21
再現性不明	54	57	103	72	29	71	3	100	189	67
再現性不明 (症状継続のため不明)		0		0	1	2		0	1	0
タミフル投与したか不明		0		0	1	2		0	1	0
服用前から	1	1		0		0		0	1	0
総計	94	100	144	100	41	100	3	100	282	100

【年齢②】

再投与再発の有無	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
再現性あり	9	25	7	12	8	12	3	5	1	6	3	7		0	31	11
再現性なし	6	17	17	29	13	20	10	17	5	31	8	18		0	59	21
再現性不明	20	56	34	59	44	68	47	78	10	63	31	70	3	100	189	67
再現性不明 (症状継続のため不明)		0		0		0		0		0	1	2		0	1	0
タミフル投与したか不明		0		0		0		0		0	1	2		0	1	0
服用前から	1	3		0		0		0		0		0		0	1	0
総計	36	100	58	100	65	100	60	100	16	100	44	100	3	100	282	100

22.異常な行動とインフルエンザ発症からの時間的な関係

【年齢①】

病日	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
0	31	42	40	34	10	27			81	36
1	27	37	46	40	5	14			78	35
2	10	14	19	16	8	22			37	16
3	2	3	3	3	7	19			12	5
4	2	3	4	3	4	11			10	4
5		0	2	2	1	3			3	1
6	1	1	1	1		0			2	1
7		0		0	1	3			1	0
8		0	1	1		0			1	0
9		0		0	1	3			1	0
小計	73	100	116	100	37	100	0		226	100
不明	21		28		4		3		56	
総計	94		144		41		3		282	

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計

【年齢②】

病日	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)	総計 (%)	
0	14	50	17	38	17	35	18	35	5	38	10	25		81	36
1	5	18	22	49	21	44	20	38	4	31	6	15		78	35
2	7	25	3	7	6	13	10	19	2	15	9	23		37	16
3	1	4	1	2	2	4	1	2		0	7	18		12	5
4	1	4	1	2	1	2	1	2	1	8	5	13		10	4
5		0		0	1	2	1	2		0	1	3		3	1
6		0	1	2		0	1	2		0		0		2	1
7		0		0		0		0		0	1	3		1	0
8		0		0		0		0	1	8		0		1	0
9		0		0		0		0		0	1	3		1	0
小計	28	100	45	100	48	100	52	100	13	100	40	100	0	226	100
不明	8		13		17		8		3		4		3	56	
総計	36		58		65		60		16		44		3	282	

23. 服用開始から異常な行動発現までの時間

【年齢①】

異常な行動発現までの時間	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
30分以内	4	10	2	3	1	9			7	6
30分から1時間以内	4	10	4	7	1	9			9	8
1時間から2時間以内	4	10	6	10	2	18			12	11
2時間から3時間以内	4	10	9	16		0			13	12
3時間から4時間以内	5	13	8	14	1	9			14	13
4時間から5時間以内	5	13	3	5		0			8	7
5時間から6時間以内	2	5	1	2		0			3	3
6時間から12時間以内	9	23	15	26	3	27			27	25
12時間から24時間以内	2	5	9	16		0			11	10
24時間から72時間以内		0	1	2	2	18			3	3
72時間から		0		0	1	9			1	1
小計	39	100	58	100	11	100	0		108	100
不明	55		86		30		3		174	
総計	94		144		41		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

【年齢②】

異常な行動発現までの時間	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)	総計 (%)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合		件数	割合
30分以内	2	20	2	7	2	8		0		0	1	8		7	6
30分から1時間以内		0	4	14	3	13		0		0	2	15		9	8
1時間から2時間以内		0	4	14	2	8	3	11	1	25	2	15		12	11
2時間から3時間以内		0	4	14	3	13	5	18	1	25		0		13	12
3時間から4時間以内	4	40	1	3	3	13	4	14		0	2	15		14	13
4時間から5時間以内	1	10	4	14	1	4	2	7		0		0		8	7
5時間から6時間以内	1	10	1	3	1	4		0		0		0		3	3
6時間から12時間以内	2	20	7	24	6	25	8	29	1	25	3	23		27	25
12時間から24時間以内		0	2	7	2	8	6	21	1	25		0		11	10
24時間から72時間以内		0	0	0	1	4		0		0	2	15		3	3
72時間から		0		0		0		0		0	1	8		1	1
小計	10	100	29	100	24	100	28	100	4	100	13	100	0	108	100
不明	26		29		41		32		12		31		3	174	
総計	36		58		65		60		16		44		3	282	

24. 直前の服用から異常な行動発現までの時間

【年齢①】

異常な行動発現までの時間	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)	総計 (%)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合		件数	割合
30分以内	7	15	4	6	1	10		12	9
30分から1時間以内	9	19	7	10	1	10		17	13
1時間から2時間以内	7	15	11	16	1	10		19	15
2時間から3時間以内	5	10	14	20	2	20		21	17
3時間から4時間以内	6	13	10	14	1	10		17	13
4時間から5時間以内	5	10	5	7		0		10	8
5時間から6時間以内	4	8	2	3	1	10		7	6
6時間から12時間以内	5	10	15	22	2	20		22	17
12時間から		0	1	1	1	10		2	2
小計	48	100	69	100	10	100	0	127	100
不明	46		75		31		3	155	
総計	94		144		41		3	282	

異常な行動が記録されている事例の集計

【年齢②】

異常な行動発現までの時間	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)	総計 (%)	
30分以内	2	15	5	14	4	13		0		0	1	8		12	9
30分から1時間以内	3	23	6	17	6	20		0		0	2	17		17	13
1時間から2時間以内		0	7	20	4	13	5	15	2	50	1	8		19	15
2時間から3時間以内		0	5	14	3	10	9	27	2	50	2	17		21	17
3時間から4時間以内	4	31	2	6	3	10	6	18		0	2	17		17	13
4時間から5時間以内	1	8	4	11	2	7	3	9		0		0		10	8
5時間から6時間以内	2	15	2	6	2	7		0		0	1	8		7	6
6時間から12時間以内	1	8	4	11	6	20	9	27		0	2	17		22	17
12時間から		0		0		0	1	3		0	1	8		2	2
小計	13	100	35	100	30	100	33	100	4	100	12	100	0	127	100
不明	23		23		35		27		12		32		3	155	
総計	36		58		65		60		16		44		3	282	

25. 既往について

タミフルを以前に服用があると報告があったもの 11例
 精神神経症状を発現した 6例
 発現せず 5例
 (その他: 兄がタミフル使用時に異常な既往歴あり 1例 (11例には含まれていない))

発熱時に譫妄・異常行動の既往あり 9例
 他剤による副作用既往歴あり 3例
 ウイルス性脳炎の既往歴あり 1例
 睡眠時驚愕症の既往あり 8例

26. 他剤による同様な副作用の既往はあるか

他剤による既往	症例数
はい	8
いいえ	176
不明	98
総計	282

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計

27. 睡眠時驚愕症等既往の有無

睡眠時驚愕症等の既往	症例数
有	13
無	144
不明	125
総計	282

28. 睡眠時驚愕症等の家族歴の有無

睡眠時驚愕症等の家族歴	症例数
有	2
無	123
不明	157
総計	282