

[パターン3] 筆記試験において技能を確認する出題

(医師国家試験の例)

経鼻内視鏡で上気道を観察する順で正しいのはどれか。

- a 声帯 — 舌扁桃 — 軟口蓋 — 喉頭蓋 — 耳管開口部
- b 舌扁桃 — 耳管開口部 — 軟口蓋 — 喉頭蓋 — 声帯
- c 喉頭蓋 — 声帯 — 軟口蓋 — 耳管開口部 — 舌扁桃
- d 軟口蓋 — 耳管開口部 — 舌扁桃 — 声帯 — 喉頭蓋
- e 耳管開口部 — 軟口蓋 — 舌口蓋 — 喉頭蓋 — 声帯

(薬剤師国家試験出題のイメージ)

処方せんに基づいて計量調剤する場合の順序として正しいのはどれか。

- a スパーテルの清拭 — 薬剤の秤量 — 乳鉢・乳棒の清拭 — 混和
- b 薬剤の秤量 — スパーテルの清拭 — 混和 — 乳鉢・乳棒の清拭
- c 乳鉢・乳棒の清拭 — 薬剤の秤量 — スパーテルの清拭 — 混和
- d スパーテルの清拭 — 薬剤の秤量 — 混和 — 乳鉢・乳棒の清拭
- e 薬剤の秤量 — 混和 — スパーテルの清拭 — 乳鉢・乳棒の清拭