

## 血液製剤に関する報告事項について (目次)

- 輸血用血液製剤で HIV 感染が疑われた事例について 3
- 輸血用血液製剤で HBV(B 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 16 年 3 月 22 日報告)について 4
- 輸血用血液製剤で HBV(B 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 16 年 11 月 26 日報告)について 5
- 輸血用血液製剤で HBV(B 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 17 年 1 月 12 日報告)について 7
- 輸血用血液製剤で HBV(B 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 17 年 2 月 4 日報告)について 9
- 輸血用血液製剤で HBV(B 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 17 年 6 月 23 日報告)について 11
- 輸血用血液製剤で HBV(B 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 18 年 4 月 7 日報告)について 12
- 輸血用血液製剤で HBV(B 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 18 年 6 月 5 日報告)について 13
- 輸血用血液製剤で HBV(B 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 19 年 2 月 20 日報告)について 14
- 輸血用血液製剤で HBV(B 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 20 年 1 月 23 日報告)について 15
- 輸血用血液製剤で HBV(B 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 20 年 2 月 8 日報告)について 16
- 輸血用血液製剤で HCV(C 型肝炎ウイルス)感染が疑われた事例(平成 18 年 2 月 15 日報告)について 17
- 輸血用血液製剤で細菌感染が疑われた

事例(平成20年3月10日報告)について	19
※●は今回の新規症例	

○ 平成19年度感染症報告事例のまとめ (平成20年1月報告分以降)について	20
○ 輸血後HEV感染の予防対策(問診・NATの状況)	29

< 参 考 >

・ 血液製剤に関する報告事項について (平成20年4月21日付け血液対策課事務連絡)	34
・ 血液製剤に関する報告事項について(回答) (平成20年4月24日付け日本赤十字社提出資料)	36
・(参考)安全対策業務の流れ	43

## 輸血用血液製剤で HIV 感染が疑われる事例について

### 1. 経緯等

平成15年9月5日、後天性免疫不全症候群発生届にて感染経路として輸血が考えられる HIV 感染者が報告されたとの情報を入手。同日、当該報告医が、同事例について副作用感染症報告を日本赤十字社に提出、これを受けて同社による調査が開始され、その結果が、平成15年10月30日に開催された第95回エイズ動向委員会（委員長：吉倉廣国立感染症研究所長）に報告された。

### 2. 事 例

50歳代の男性で平成15年の3月～7月に赤血球製剤（MAP16単位）の輸血を受けた後、実施した血液検査においてHIV感染を確認（WB検査陽性）。報告医は感染経路として輸血を疑っている。

### 3. 事実関係

#### 1) 輸血された輸血用血液製剤について

- ・当該感染者には、8人の供血者から採血された赤血球製剤（MAP）が8本（保管検体の個別NATはいずれも陰性）投与された。

#### 2) 他の血液製剤への影響について

- ・投与された赤血球製剤の原料血液からは、他に新鮮凍結血漿と血漿分画製剤用の原料血漿が製造されていた。
- ・原料血漿については流通を停止。
- ・新鮮凍結血漿については3本が製造されており、既に他の医療機関で3名の患者に投与されていた。（他に行方不明の製剤はない。）

#### 3) 新鮮凍結血漿の投与を受けた3名について

- ・1名は既に原疾患により死亡
- ・残り2名については輸血後（約6ヵ月後）の抗体検査で陰性。

### 4. エイズ動向委員会での専門家からの意見

記者会見では、「HIVの感染が輸血用血液製剤によるか追求すれば、患者のプライバシーに関わりうるケースである。」との発言があった。

### 5. エイズ動向委員会後の事実経過

1) 健康状態の確認を行っていた2名の受血者は、いずれも感染していなかったことが確認された。

2) 供血者の次回献血での検査については、平成20年4月24日現在、8名中6名が来訪し、感染していなかったことが確認された（平成20年4月24日現在、残る2名のその後来所なし）。

### 6. 今後の対応

当該感染者のプライバシーの最大限尊重を徹底しつつ、引き続き調査を継続するよう指導してまいりたい。

## 輸血用血液製剤で HBV（B 型肝炎ウイルス）感染が疑われた事例 （3 月 2 2 日報告）について

### 1 経緯

平成 1 6 年 3 月 2 2 日及び 3 0 日、日本赤十字社から輸血（人血小板濃厚液及び人赤血球濃厚液）による HBV 感染の疑い事例の報告があった。

### 2 事例

7 0 歳代の女性。原疾患は急性骨髄性白血病。平成 1 5 年 1 0 月 5 日～平成 1 6 年 1 月 2 2 日の間に、輸血を計 1 8 回（人血小板濃厚液 1 0 単位を 1 1 袋分並びに人赤血球濃厚液 1 単位を 3 袋分及び 2 単位を 4 袋分）受ける。

輸血前の血液検査（平成 1 5 年 1 0 月 3 日）では HBs 抗原及び抗体検査（B 型肝炎ウイルスの検査）はいずれも陰性であったが、輸血後の平成 1 6 年 3 月 1 9 日に実施した HBs 抗原検査は陽性、肝機能検査（GOT、GPT 及び LDH）は高値を示す。

患者は 4 月 2 6 日に死亡したことを確認済み。死因は呼吸不全及び腎不全。

### 3 状況

#### （1）輸血された血液製剤について

- 当該患者には、3 7 人の供血者から採血された血小板製剤及び赤血球製剤を輸血。
- 当該製剤に関わる血漿のうち、4 人分由来の 5 本が新鮮凍結血漿（FFP）として医療機関へ供給された（残りは原料血漿）。

#### （2）3 7 人の供血者について

3 7 人の供血者のうち、3 2 人の献血者がその後献血しており、検査は陰性であった。（平成 2 0 年 4 月 2 4 日現在、残る 5 人のその後の来所なし）。

#### （3）供血者の個別 NAT の試験結果

供血者 3 7 人の保管検体について、個別 NAT を実施したところ、全て陰性であった。

#### （4）患者の保管検体の個別 NAT 及び HBs 抗原の試験結果

平成 1 6 年 3 月 1 9 日（輸血後）の医療機関に保管されていた患者検体は個別 NAT 及び HBs 抗原検査はいずれも陽性（輸血前は保管されていなかった）。

#### （5）輸血と HBV 感染との関連

現在のところ、輸血と HBV 感染（当該事例の死亡原因を含む）の因果関係については不明。

### 4 今後の対応

#### （1）当該事例への対応

- 医療機関へ供給した 5 本の新鮮凍結血漿に関して情報提供した医療機関における受血者（患者）5 名の健康状態を確認した結果、輸血後陰性が 2 名、不明が 3 名であった。
- 3 7 人の供血者のうち、その後献血に来ていない 5 人のフォローを行う。

#### （2）血液の安全対策の推進

「輸血医療の安全確保のための総合対策」を着実に実施する。

## 輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われた事例 （11月26日報告）について

### 1. 経緯

平成16年11月26日、日本赤十字社から輸血（新鮮凍結血漿）によるHBV感染の疑い事例で患者が死亡した症例の報告があった。

### 2. 事例

70歳代の男性。原疾患は消化器腫瘍（転移性肝癌を含む。）。平成16年3月12日から15日まで4日間に亘り、プロトロンビン時間延長のため、輸血を（新鮮凍結血漿合計36単位23本）受ける。

輸血前の血液検査（2月28日）では、HBs抗原検査陰性であったが、平成16年10月4日に肝機能検査値異常がみとめられ、黄疸を呈したため、10月8日に検査したところ、HBs抗原陽性、HBs抗体陰性が確認され、急性B型肝炎と診断された。11月17日に右大量胸水を呈した後、呼吸状態悪化により死亡した。また、平成15年5月の手術の際にも新鮮凍結血漿2単位22本、赤血球MAP2単位3本の輸血を受けている。

### 3. 状況

#### (1) 輸血された血液製剤について

- ① 当該患者には平成16年3月の輸血時に23人の供血者から採血された新鮮凍結血漿を輸血。また、平成15年5月に25人の供血者から採血された新鮮凍結血漿及び赤血球MAPを輸血。
- ② 平成16年3月輸血の供血者と同一の供血者に由来し、同時に製造された原料血漿は2本が確保、10本は使用済み、新鮮凍結血漿10本及び赤血球MAP23本は全て医療機関に提供済み。
- ③ 平成15年5月輸血の供血者と同一の供血者に由来し、同時に製造された原料血漿21本は使用済み、新鮮凍結血漿6本及び赤血球MAP22本は全て医療機関に提供済み。

#### (2) 48人の供血者について

- ① 平成16年3月の輸血時の供血者23人のうち、19人が再献血し、再献血時の検査結果は18人がHBV関連検査陰性、1人はHBc抗体はEIA法陽性、HI法陰性、HBs抗体（EIA法）陽性（NAT及びHBs抗原陰性）であった。なお、この1人の献血時のHBc抗体はEIA法で陽性、HBs抗体も陽性であった（平成20年4月24日現在、残る4人のその後の来所なし）。
- ② 平成15年5月の輸血時の供血者25人のうち、21人が再献血し、再献血時の検査結果はHBV関連検査陰性であった（平成20年4月24日現在、残る4人のその後の来所なし）。

#### (3) 供血者個別NATの試験結果

- ① 平成16年3月の輸血時の供血者23人の供血時の保管検体について、個別NATを実施したところ、すべて陰性であった。
- ② 平成15年3月の輸血時の供血者25人の供血時の保管検体について、個別NATを実施したところ、すべて陰性であった。

### 4. 今後の対応

- (1) 供血者48人のうち、8人の再献血・検査に係るフォローを行う。

(2) 血液の安全対策の推進

「輸血医療の安全確保のための総合対策」を着実に実施する。

(3) その他

- ① 受血者の輸血後検体(10月12日)を確保し、再検査したところ、HBs 抗原 (+)、HBs 抗体 (-)、HBc 抗体 (+)、HBV-DNA (+)であった。
- ② 受血者の肝臓については、平成15年に施術され、平成16年10月の腹部CTでは再発が認められておらず、肝臓と肝障害との因果関係はないものと考えられる。

## 輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われた事例 （1月12日報告）について

### 1 経緯

平成17年1月12日、日本赤十字社から輸血（赤血球濃厚液、血小板濃厚液）によるHBV感染の疑い事例で患者が死亡した症例の報告があった。

### 2 事例

60歳代の男性。原疾患は血液疾患。平成16年1月8日から5月25日まで12回にわたり、輸血（赤血球濃厚液合計26単位、血小板濃厚液合計30単位）を受ける。

輸血前の血液検査（1月8日）では、HBs抗原検査陰性であったが、平成16年11月18日に食欲不振のため、検査したところ、HBs抗原陽性が確認され、同22日の採血の検体で、HBs抗原（+）、HBs抗体（-）、HBc抗体（+）、HBV-DNAのNATの（+）も確認された。平成17年1月8日劇症肝炎を呈した後、肝不全により死亡した。

### 3 状況

#### (1) 輸血された血液製剤について

- ① 当該患者には16人の供血者から採血された赤血球濃厚液及び血小板濃厚液を輸血。
- ② 輸血の供血者と同一の供血者に由来し、同時に製造された原料血漿は3本が確保、12本は使用済み、新鮮凍結血漿12本は全て医療機関に提供済み。

#### (2) 16人の供血者について

- ① 輸血時の供血者16人のうち、12人が再献血し、再献血時の検査結果はHBV関連検査（-）であった。（平成20年4月24日現在、残る4人のその後の来所なし）
- ② 供血時保管検体の2人の陽性血から、原料血漿2本、新鮮凍結血漿が2本製造され、原料血漿は使用済み、新鮮凍結血漿も使用済みであった。当該新鮮凍結血漿の受血者2名のうち、1人は輸血後11日目で死亡、もう1人はHBs抗原検査（-）であった。

#### (3) 供血者個別NATの試験結果

- ① 輸血時の供血者16人の供血時の保管検体について、個別NATを実施したところ、2人がNAT（+）であった。
- ② 当該2人は、共に、複数回再献血を行っているが、再献血時にHBV関連検査（-）であり、HBc抗体及びHBc抗体-IgMは（-）、個別NATも共に（-）であった。
- ③ 当該2名の供血時の保管検体のウイルス解析の結果、共に、ゲノタイプCサブタイプadrと推定、また、497番目と498番目の間に12塩基が挿入した極めて特殊な変異株と挿入のない野生株が存在していた。これらは、受血者の血液も同様に挿入のある変異株と挿入のない野生株を有しており、三者のウイルスのシーケンスは完全に一致した。

### 4 今後の対応

#### (1) 血液の安全対策の推進

「輸血医療の安全確保のための総合対策」を着実に実施する。

#### (2) 輸血時の供血者16人のうち、再献血に訪れていない4人について引き続き、調査

する。

(3) その他

- ① 供血時保管検体でNAT（+）となった2名は、その後の再献血の検査がすべて（-）であり、HBc抗体も（-）であり、感染歴があった可能性は低い。
- ② また、発見されたウイルスのシーケンスは稀なものであり、これらが偶然に保管検体2本一致することは考えにくい。
- ③ 当該供血者の血液から同時に製造された新鮮凍結血漿の受血者で感染は発生していない。
- ④ 以上のことから、NAT時に受血者血液が供血者サンプルに混入する等の測定上の誤差が発生した可能性も考えられる。



## 輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われた事例 （2月4日報告）について

### 1 経緯

平成17年2月4日、日本赤十字社から輸血（人赤血球濃厚液）によるHBV感染の疑い事例で患者が死亡した症例の報告があった。

### 2 事例

60歳代の男性。原疾患は悪性腫瘍。平成16年9月8日から11月24日まで、貧血のため、輸血を計9回（人赤血球濃厚液合計14単位）を受ける。

輸血前の血液検査（平成16年8月3日及び9月8日）では、HBs抗原検査陰性であったが（9月8日はHBs抗体及びHBc抗体検査も陰性）、平成16年11月24日の輸血時にHBs抗原検査陽性が確認された（HBs抗体及びHBc抗体検査は陰性）。

平成17年1月26日の輸血施行時に、HBs抗原検査陽性に加え、HBc抗体検査が陽性となり（HBs抗体検査は陰性）、1月31日には黄疸が出現するとともに、肝機能検査で高値を示し、2月2日に劇症肝炎により死亡した。

なお、当該患者の輸血前血液（平成16年9月8日）の保管検体のHBV-NATは陰性で、輸血後血液（平成16年10月21日）はHBV-NATは陽性であった。輸血後血液から検出されたHBVは、ジェノタイプB、サブタイプadw、CP/Pre C領域はe抗原が産生できない変異株であった。HBV-DNA量は $2.9 \times 10^{10}$  Copies/mLであった。

### 3 状況

#### （1）輸血された血液製剤について

- ① 当該患者には9人の供血者から採血された赤血球濃厚液を輸血。
- ② 9人の供血者と同一の供血者に由来し、同時に製造された原料血漿7本及び新鮮凍結血漿2本を確保済み。残りの新鮮凍結血漿2本は医療機関へ供給済みであるが、医療機関への情報提供は実施済み。

#### （2）9人の供血者について

- ① 供血者9人のうち、当該患者の平成16年10月21日採血の輸血後血液がHBV-NAT陽性であったことから、10月21日輸血以前（9月8日～9月10日）の輸血に係る4人の供血者に対して供血者に呼び出しの協力を依頼し、3人は再献血又は再採血済み。
- ② 10月21日輸血以降の供血者について、2人がその後再採血検査済み。
- ③ ①及び②の計5名については、HBV個別NATを含めHBV関連検査は陰性だった。ただし、①の3名のうち、1名はHBc抗体がEIA法のみ陽性、HI法は陰性だった。（平成20年4月24日現在、残る1名のその後の来所なし。）

#### （3）供血者個別NATの試験結果

輸血時の供血者9人の供血時の保管検体について、個別NATを実施したところ、すべて陰性であった。

### 4 今後の対応

（1）9月8日～9月10日輸血の4人の供血者のうち、残る供血者1人の再献血・検査に係るフォローを行う（再採血の依頼中）。

（2）血液の安全対策の推進

「輸血医療の安全確保のための総合対策」を着実に実施する。

(3) その他

悪性腫瘍の治療にプラチナ系抗癌剤等（8月18日）及びテガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム（11月10日）を使用しており、薬剤性の劇症肝炎の疑いも完全には否定できない。

## 輸血用血液製剤で HBV（B 型肝炎ウイルス）感染が疑われた事例 （6 月 23 日報告）について

### 1 経緯

平成 17 年 6 月 23 日、日本赤十字社から輸血（赤血球濃厚液及び新鮮凍結血漿）による HBV 感染の疑い事例で患者が死亡した症例の報告があった。

### 2 事例

50 歳代の男性。原疾患は消化管腫瘍。平成 17 年 2 月 3 日に手術施行のため、赤血球濃厚液合計 8 単位、新鮮凍結血漿合計 30 単位を受ける。

輸血前の血液検査（平成 16 年 12 月）では HBs 抗原検査陰性、輸血後の平成 17 年 4 月 6 日でも HBs 抗原検査陰性であったが、退院時の平成 17 年 4 月 21 日に HBs 抗原検査陽性が確認された。

その後、平成 17 年 6 月 13 日に発熱、全身倦怠感等出現し、肝機能値が高値を示し、6 月 16 日再入院、6 月 20 日には、HBs 抗体、HBc 抗体、HBe 抗原、HBe 抗体のいずれも陽性が確認された。また、同日の HBc の IgM 抗体も陽性であり、劇症肝炎と診断される。

患者は、7 月 3 日に B 型劇症肝炎にて死亡した。

患者の検体の HBV の解析結果は、ジェノタイプ C、サブタイプ a d r であり、CP/Pre Core 領域の塩基配列の解析から PreC 部位には変異はなく、CP（Core Promoter）部位に変異がある CP 変異、PreC 野生株であった。

### 3 状況

#### （1）輸血された血液製剤について

① 当該患者には 20 人の供血者から採血された赤血球濃厚液等を輸血。

② 20 人の供血者と同一の供血者に由来し、同時に製造された原料血漿は 17 本のうち 10 本が確保、新鮮凍結血漿 6 本のうち 3 本は確保済み。15 本の赤血球濃厚液はすべて医療機関へ供給済み。医療機関への情報提供は実施済み。

#### （2）20 人の供血者について

供血者 20 人のうち、15 人が再採血・献血に来場（HBV 関連検査は陰性）。（平成 20 年 4 月 24 日現在、残る 5 名の来訪なし。）

#### （3）供血者個別 NAT の試験結果

輸血時の供血者 20 人の供血時の保管検体について、個別 NAT を実施したところ、すべて陰性であった。

### 4 今後の対応

（1）供血者 5 人の再献血・検査に係るフォローを行う（再採血の依頼中）。

（2）血液の安全対策の推進

「輸血医療の安全確保のための総合対策」を着実に実施する。

## 輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われた 事例（4月7日報告）について

### 1. 経緯

平成18年4月7日、日本赤十字社から輸血（濃厚血小板、赤血球濃厚液）によるHBV感染疑いの症例の報告があったとの報告が、日本赤十字社からあった。

### 2. 事例

患者は、40代の男性で、原疾患は血液腫瘍。平成16年7月から平成17年2月に（濃厚血小板計30単位、赤血球濃厚液計48単位）、平成17年3月から5月に輸血（濃厚血小板計130単位、赤血球濃厚液計18単位）を受ける。

最初の輸血から8ヶ月後の平成17年2月22日にはHBs抗原、HBs抗体、HBc抗体全て陰性だったが、平成18年3月に肝不全となり、4月3日にHBs抗原、HBc抗体についても陽転が確認された。輸血後の平成17年5月23日の保管検体において、HBV-NATは陰性であったが、6月8日の保管検体において、HBV-NATは陽性であった。なお、HCV抗体は輸血前から陽性であった。

その後主治医は、亜急性劇症肝炎と診断。（4月7日 ALT67IU/mL, T-Bil3.57mg/dL, PT-INR2.30）患者は5月19日に肝不全により死亡。

### 3. 感染についての状況

#### (1) 輸血された血液製剤について

- ① 当該患者に投与された血液製剤の供血者数は31人（H16年7月～H17年2月）及び22人（H17年3月～5月）

※被疑製剤の対象をH16年7月まで拡大して調査

- ② 当該供血者と同一の供血者に由来し、同時に製造された原料血漿51本のうち44本使用済みで7本確保済み。新鮮凍結血漿14本はすべて医療機関へ供給済み。

#### (2) 供血者個別NAT

供血者個別NATは53人分全て陰性。

#### (3) 供血者に関する情報

- ① 供血者31人のうち、22人が献血又は事後採血に再来し、21人はHBV関連検査陰性。1名はHBs抗体のみ陽性（平成20年4月24日現在、残る9名の来訪なし）。
- ② 供血者22人のうち、22人すべてが献血又は事後採血に再来し、20人はHBV関連検査陰性。2名はHBc抗体及びHBs抗体陽性。

#### (4) その他

平成17年4月8日、骨髄バンクからの同種骨髄移植を施行。ドナーはHBsAg(-)、HBsAb(-)、HBcAb(-)であった。

### 4. 今後の対応

- (1) 供血者9人の再献血・検査に係るフォローを行う
- (2) 「輸血医療の安全確保のための総合対策」を着実に実施する。

## 輸血用血液製剤で HBV（B 型肝炎ウイルス）感染が疑われた事例 （6 月 5 日報告）について

### 1 経緯

平成 18 年 6 月 5 日、日本赤十字社から輸血（赤血球濃厚液及び新鮮凍結血漿）による HBV 感染の疑い事例で患者が死亡した症例の報告があった。

### 2 事例

80 歳代の男性。原疾患は消化器疾患。平成 17 年 10 月 22 日から 11 月 29 日までの間に赤血球濃厚液合計 18 単位、新鮮凍結血漿合計 36 単位を受ける。

輸血前の血液検査（平成 17 年 8 月 31 日）では HBs 抗原検査陰性、AST 16 及び ALT 12 であった。輸血後の平成 18 年 5 月 2 日に、AST、ALT の上昇がみられ、同月 19 日に HBs 抗原検査陽性であり、AST 683、ALT 693 であった。同患者については、上記の他、次の検体が医療機関に保管されており、それらを検査した結果は次のとおりであった。

輸血前 H17.10.22 HBV-DNA 陰性

輸血後 H17.11.13 HBs 抗原陰性、HBs 抗体陰性、HBc 抗体陰性

輸血後 H17.11.24 HBs 抗原陰性、HBs 抗体 EIA 法陽性／PHA 法陰性、HBc 抗体陰性

輸血後 H17.11.27 HBV-DNA 陰性

輸血後 H18.06.02 HBs 抗原陽性、HBs 抗体陰性、HBc 抗体陽性、HBV-DNA 陽性

その後、平成 18 年 6 月 12 日に死亡。急性肝炎から劇症肝炎に至り、肝不全による死亡と考えるとの担当医の見解である。

### 3 状況

#### （1）輸血された血液製剤について

① 当該患者には 29 人の供血者から採血された赤血球濃厚液等を輸血。

② 29 人の供血者と同一の供血者に由来し、同時に製造された原料血漿は 27 本のうち 11 本が確保、16 本が使用済み。新鮮凍結血漿 8 本のうち 6 本は確保済み、2 本は医療機関へ供給済み。18 本の赤血球濃厚液はすべて医療機関へ供給済み。

#### （2）29 人の供血者について

供血者 29 人のうち、27 人が再採血・献血に来場（27 名の HBV-DNA は全て陰性、そのうち 2 名は HBs 抗体及び HBc 抗体陽性、1 名は HBs 抗体のみ陽性、残る 24 名は HBV 関連検査陰性）。（平成 20 年 4 月 24 日現在、残る 2 名の来訪なし。）

#### （3）供血者個別 NAT の試験結果

輸血時の供血者 29 人の供血時の保管検体について、個別 NAT を実施したところ、すべて陰性であった。

### 4 今後の対応

（1）供血者 2 人の再献血・検査に係るフォローを行う（再採血の依頼中）。

（2）血液の安全対策の推進

「輸血医療の安全確保のための総合対策」を着実に実施する。

## 輸血用血液製剤で HBV（B 型肝炎ウイルス）感染が疑われた事例 （2 月 2 0 日報告）について

### 1 経緯

平成 1 9 年 2 月 2 0 日、日本赤十字社から輸血（赤血球濃厚液）による HBV 感染の疑い事例で患者が死亡した症例の報告があった。

### 2 事例

6 0 歳代の男性。原疾患は消化器腫瘍。平成 1 8 年 8 月 3 日に、輸血（赤血球濃厚液合計 4 単位 3 本）を受ける。

輸血前の血液検査（平成 1 8 年 7 月 1 1 日）では HBs 抗原検査陰性であったが、輸血後の平成 1 8 年 9 月 2 6 日に、HBs 抗原検査陽性となった。1 0 月 2 4 日の悪心、嘔吐、腹痛にて受診、AST 1 3 6 4、ALT 1 3 0 6、肝不全を認める。1 0 月 2 5 日に多臓器不全により死亡。感染経路が不明であるが、輸血による HBV の感染が否定できないとの担当医の見解である。

### 3 状況

#### （1）輸血された血液製剤について

①当該患者には 3 人の供血者から採血された赤血球濃厚液を輸血。

②当該製剤と同一供血者から製造された 3 本の原料血漿は全て確保済み。

#### （2）3 人の供血者について

3 人の供血者のうち、2 名が再採血・献血に来場（2 名の HBV 関連検査は全て陰性）。（平成 2 0 年 4 月 2 4 日現在、残る 1 名の来訪なし。）

#### （3）供血者個別 NAT の試験結果

輸血時の供血者 3 人の供血時の保管検体について、個別 NAT を実施したところ、全て陰性であった。

### 4 今後の対応

（1）供血者 1 人の再献血・検査にかかるフォローを行う。

（2）血液の安全対策の推進

「輸血医療の安全確保のための総合対策」を着実に実施する。

## 輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われた事例 （1月23日報告）について

### 1 経緯

平成20年1月23日、日本赤十字社から輸血（赤血球濃厚液、血小板濃厚液）によるHBV感染の疑い事例で患者が死亡した症例の報告があった。

### 2 事例

60歳代の男性。原疾患は骨髄異形成症候群。平成19年7月12日から平成19年12月20日にかけて、輸血（赤血球濃厚液合計42単位（2単位21本）、血小板濃厚液合計160単位（10単位16本））を受ける。

輸血前の血液検査（平成19年7月11日）ではHBs抗原検査陰性、HBs抗体検査陰性、HBc抗体検査陰性であったが、輸血後の平成20年1月8日に、HBs抗原検査陽性、HBV-DNA検査陽性となった。原疾患で入院中に輸血を受け、平成19年12月8日に退院。その後、平成20年1月8日に倦怠感、発熱により再度入院、AST3368、ALT2843。1月10日にはAST7674、ALT5030まで上昇、翌日急性B型肝炎にて死亡。輸血と死亡との関連性ありとの担当医の見解である。

### 3 状況

#### （1）輸血された血液製剤について

①当該患者には37人の供血者から採血された赤血球濃厚液及び血小板濃厚液を輸血。

②当該製剤と同一供血者から製造された26本の原料血漿、11本の新鮮凍結血漿は全て確保済み。

#### （2）37人の供血者について

37人の供血者のうち、9名が献血に再来（8名のHBV関連検査は全て陰性、1人はHBs抗体のみ陽性で、当該献血時も同様であった）。（平成20年5月15日現在、残る28名の来訪なし。）

#### （3）供血者個別NATの試験結果

輸血時の供血者37人の供血時の保管検体について、個別NATを実施したところ、全て陰性であった。

### 4 今後の対応

（1）供血者28人の再献血・検査にかかるフォローを行う。

（2）血液の安全対策の推進

「輸血医療の安全確保のための総合対策」を着実に実施する。

## 輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われた事例 （2月8日報告）について

### 1 経緯

平成20年2月8日、日本赤十字社から輸血（赤血球濃厚液、血小板濃厚液）によるHBV感染の疑い事例の報告があり、その後3月17日に、患者が死亡したとの報告があった。

### 2 事例

80歳代の男性。原疾患は急性骨髄性白血病。平成19年6月28日から平成20年2月3日にかけて、輸血（赤血球濃厚液合計78単位（2単位39本）、血小板濃厚液合計670単位（10単位67本））を受ける。

輸血前の血液検査（平成19年6月15日）ではHBs抗原検査陰性、HBc抗体陰性であったが、輸血後の平成20年2月4日に、HBs抗原検査陽性、HBe抗原検査陽性、HBs抗体検査陰性、HBc抗体検査陽性、HBV-DNA検査陽性となった。輸血後の平成20年2月6日にAST221、ALT106となり、3月12日、急性B型肝炎にて死亡。輸血と死亡との関連性ありとの担当医の見解である。

### 3 状況

#### （1）輸血された血液製剤について

①当該患者には106人の供血者から採血された赤血球濃厚液及び血小板濃厚液を輸血。

②当該製剤と同一供血者から製造された95本の原料血漿のうち、93本確保済み（2本使用済み）、11本の新鮮凍結血漿は全て確保済み。

#### （2）106人の供血者について

106人の供血者のうち、33名が献血に再来（HBV関連検査は全て陰性）。（平成20年5月15日現在、残る73名の来訪なし。）

#### （3）供血者個別NATの試験結果

輸血時の供血者106人の供血時の保管検体について、個別NATを実施したところ、全て陰性であった。

### 4 今後の対応

（1）供血者73人の再献血・検査にかかるフォローを行う。

（2）血液の安全対策の推進

「輸血医療の安全確保のための総合対策」を着実に実施する。



## 輸血用血液製剤でC型肝炎が疑われた事例 (2月15報告)について

### 1 経緯等

平成18年2月15日、日本赤十字社から輸血(赤血球濃厚液)によるHCV感染の疑いの症例の報告があった。その後、当該症例の死亡が確認され、日本赤十字社から3月8日に追加報告があったものである。

### 2 事例

70歳代の男性。原疾患は血液腫瘍。平成17年8月13日から平成18年1月30日までの間に、輸血(濃厚血小板液10単位47本、赤血球濃厚液2単位21本、新鮮凍結血漿5単位7本、同2単位4本、同1単位2本)を実施。患者は、2月19日に急性循環不全により死亡。患者の輸血前(8月12日)のHCV抗体検査は陰性であったが、本年1月30日にHCVコア抗原の陽性が確認され、2月14日のAST/ALTは67/192であった。

### 3 状況

#### (1) 輸血された輸血用製剤について

- ・ 当該患者には、81人の供血者から採血された赤血球製剤、血小板製剤及び新鮮凍結血漿を輸血。
- ・ 当該製剤と同一供血者から製造された70本の原料血漿のうち67本は確保・廃棄済み(3本は使用済み)。新鮮凍結血漿は、14本製造で11本確保済み(3本は医療機関供給済み)。赤血球製剤6本は医療機関供給済み。

#### (2) 検体検査の状況

- ・ 保管検体81本のHCV個別NATはすべて陰性。
- ・ 供血者81人中78人が献血に再来又は再採血し、HCV関連検査は陰性であった(平成20年4月24日現在、残る3人のその後の来訪なし)。

#### (3) 患者検体の調査

- ・ 輸血後の検体でHCV-RNA陽性が確認された。

#### (4) 担当医の見解

- ・ C型肝炎が死期を早めたと思われるが、輸血がC型肝炎の原因であるとの証明はされていないとのこと。

#### (5) 併用薬等

- ・ 当該患者は、輸血と同時期に乾燥アンチトロンビン、乾燥スルホ化グロブリン、人血清アルブミンを併用していた。

#### 4 今後の対応

- (1) 今後、遡及調査ガイドラインの徹底を進める。
- (2) 再来していない供血者3人のフォローアップを引き続き行う。

## 輸血用血液製剤で細菌感染が疑われた事例 (3月10日報告)について

### 1 経緯

平成20年3月10日、日本赤十字社から輸血（赤血球濃厚液）による細菌感染の疑い事例で患者が死亡した症例の報告があった。

### 2 事例

90歳代の女性。原疾患は骨髄異形成症候群。平成20年3月5日に、輸血（赤血球濃厚液2単位）を受ける。輸血前体温37.9℃、輸血後体温39.2℃、悪寒あり。3月6日、敗血症性ショックにて死亡。院内にて実施の患者血液培養より *Klebsiella pneumoniae* を同定した。

### 3 状況

#### (1) 輸血された血液製剤について

- ・当該患者には、1人の供血者から採血された赤血球濃厚液を輸血。
- ・当該製剤と同一供血者から製造された1本の原料血漿は確保済み。
- ・当該製剤1本は、採血10日目の照射赤血球濃厚液－LR。

#### (2) 検体検査の状況

- ・日本赤十字社において、当該製剤の使用済みバッグによる細菌培養試験を実施。試験結果は陰性。

#### (3) 患者検体の調査

- ・非溶血性副作用関連検査実施。抗血漿タンパク質抗体検査は陰性、血漿タンパク質欠損検査は欠損なし。

#### (4) 担当医の見解

- ①医療機関からの第1報にて、「副作用の程度は重篤であり、副作用・感染症と輸血血液との因果関係は不明だが、発熱は可能性がある。発熱は39.2℃までで、輸血直後に急に出現したため因果関係ありと考える。輸血と死亡との関連性は不明である。（剖検なし）」との意見。
- ②日本赤十字社の調査結果を受けて、「副作用・感染症と輸血血液との因果関係は不明である」、「輸血と死亡との関連性なし」とのコメントあり。

### 4 今後の対応

今後、遡及調査ガイドラインの徹底や細菌を除去・不活化する方策の検討を進め、輸血用血液製剤と細菌感染症の因果関係を明らかにする。

## 平成20年度感染症報告事例のまとめ（前回報告分以降）について

- 1 平成20年1月1日報告分から20年5月2日までに報告（新規及び追加）があった感染症報告（疑い事例を含む。供血剤からの情報により開始した遡及調査によるものを除く。）は、輸血用血液製剤44件である。
 

輸血用血液製剤の内訳は、	
(1) B型肝炎報告事例：	14
(2) C型肝炎報告事例：	15
(3) HIV感染症報告事例：	0
(4) その他の感染症報告事例：	15
- 2 B型肝炎報告事例
  - (1) 輸血前後に感染検査でHBs抗原（又はHBV-DNA）等が陽転した事例は11例（うち、輸血後NATで陰性又は輸血前後で陽性は3例）。
  - (2) 血液製剤を提供した献血者の保管検体の個別NAT陽性の事例は0例。
  - (3) 輸血後に死亡（原疾患又は他の原因による死亡を除く）したとの報告を受けた事例は2例（劇症化例含む。）である。
- 3 C型肝炎報告事例
  - (1) 輸血前後に抗体検査（又はHCV-RNA）等が陽転した事例は12例（うち、輸血後NATで陰性又は輸血前後で陽性は2例）。
  - (2) 使用した血液製剤を提供した献血者の保管検体の個別NAT陽性事例は0例。
  - (3) 輸血後に死亡（原疾患又は他の原因による死亡を除く）したとの報告を受けた事例は0例。
- 4 HIV報告事例
  - (1) 輸血前後に抗体検査等が陽転した事例は0例。
  - (2) 使用した血液製剤を提供した献血者の保管検体の個別NAT陽性事例は0例。
  - (3) 輸血後に死亡（原疾患又は他の原因による死亡を除く）したとの報告を受けた事例は0例。
- 5 その他の感染症報告事例
  - (1) 細菌等感染症報告事例において、血液製剤を提供した献血者の保管検体の無菌試験陽性事例は0例である。輸血後に死亡（原疾患又は他の原因による死亡を除く）したとの報告を受けた事例は1例。

※今回新しく個票として取り上げた症例には、黄色を付した。

日赤番号	識別番号	FAX受付日	報告受領日	一般名	患者性別	年齢	原疾患	感染症名	投与年月	投与前検査(年月)	投与後検査(年月)	日赤投与前検査	日赤投与後検査	受血者個別NAT	献血者個別NAT	併用血液製剤等	備考	使用単位数	献血者再献血※	同一献血者製剤確保※	同一献血者製剤使用※	感染症等転帰	転帰	献血者調査及献血者調査後の献血者(抗原、抗体、NAT)(投与時点)	献血者調査及献血者調査後の献血者(抗原、抗体、NAT)(投与時点)	
				輸血によるHBV感染報告例(疑い例を含む。)																						
供血者陽性事例																										
陽転事例																										
3-08001	A-07000178	2008/1/8	2008/1/22	新鮮凍結人血漿-LR (追加) 新鮮凍結人血漿-LR 人血小脳凍厚液 (放射線照射)	女	50	消化器疾患	B型肝炎	07/09 (追加) 07/09 07/09	HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(+) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(+) HBsAg(-) HBsAg(-) (08/01)	HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(+) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(+) HBsAg(-) HBsAg(-) (08/01)	HBV-DNA(-) (07/09)	HBV-DNA(+) (08/01)	陰性(輸血前) 陰性(輸血後)	供養抗体1 本について HBV-DNA(-) (追加) 供養抗体9 本について HBV-DNA(-)	併用血液製剤等 (追加) 担当医同時期に使用された輸血液9本についても検査と報告している。	1単位 (追加) 9単位 30単位	献血者再献血※ 同一献血者製剤確保※ 同一献血者製剤使用※	1本の赤血球濃厚液-LRを製(追加) 3本の原料血漿 6本の赤血球濃厚液-LRを製意、原料血漿はすべて確保済み。	赤血球濃厚液-LRは医療機関に供給済みで、輸血された患者は疾患にて死亡。(追加) 赤血球濃厚液-LRはすべて医療機関へ供給済み。	重篤	未回復	献血者陽転情報 当該 07/2/5 HBV関連検査陰性 供養抗体(個別NAT)HBV-DNA(-)(追加調査対象) 次回 07/8/7 HBc抗体検査陽性 (検体血液) 供養抗体(個別NAT)HBV-DNA(-)			
3-08005	A-07000188	2008/1/17	2008/1/30	人赤血球濃厚液 (放射線照射)-LR 新鮮凍結人血漿 人血小脳凍厚液 (放射線照射)	男	60	血液腫瘍	B型肝炎	07/01-07 07/06 07/08-10	HBsAg(+) HBsAg(-) HBsAg(-) (08/01)	HBsAg(+) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(+) (08/01)	検査不能(機 器トラブル) 検体量不足	HBV-DNA(+) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) (08/01)	陽性(輸血後) 陰性(輸血後)	供養抗体23 本全部 HBV-DNA(-)		30単位 10単位 30単位	11/23 (HBV関連 検査陰性)	17本の原料血漿 6本の製薬 凍結血漿-LR 5本の赤血球MAPを製意、原料血漿は6本確保済み。	原料血漿は11本使用済み。新鮮凍結血漿-LR、赤血球MAPは全て医療機関へ供給済み。新鮮凍結血漿-LRのうち2本は未使用であり回収。	重篤	未回復				
3-08008	A-07000202	2008/1/23	2008/2/5	人赤血球濃厚液 (放射線照射)-LR 人血小脳凍厚液 (放射線照射)	男	60	骨髄異形 症候群	B型肝炎	07/07-12 07/02-3 05/08- 07/02	HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) (07/07)	HBV-DNA(+) HBsAg(+) (08/01)	HBV-DNA(-) (07/07)	HBV-DNA(-) (07/08.09.10) HBV-DNA(+) (07/11.12) (08/01)	陽性(輸血前) 陰性(輸血後)	供養抗体37 本全部 HBV-DNA(-)	患者は08/01/11急性B型肝炎にて死亡。担当医の昇昇、死亡と本例の関連性あり	42単位 160単位	9/378人はHBV関連検査-入、1人はHBs抗原のみ陽性で、当該献血時と同様であった。) )	28本の原料血漿、11本の新鮮凍結血漿-LRを製意、原料血漿、新鮮凍結血漿-LRはすべて確保済み。		重篤	不明				
3-08010	A-07000223	2008/1/31	2008/2/14	人赤血球濃厚液 (放射線照射)-LR 人血小脳凍厚液 (放射線照射)	女	70	腫瘍	B型肝炎	05/08-12 07/02-3 05/08- 07/02	HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) (08/01)	HBsAg(+) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) HBsAg(-) (08/01)		HBV-DNA(-) (08/01)	陰性(輸血前) 陰性(輸血後)	供養抗体12 本全部 HBV-DNA(-)	8単位 6単位 50単位	8/12 HBV関連検査(陰性)	11本の原料血漿、1本の新鮮凍結血漿-LRを製意、原料血漿、新鮮凍結血漿-LRはすべて確保済み。	原料血漿はすべて使用済み。新鮮凍結血漿、新鮮凍結血漿-LRは医療機関へ供給済み。	非重篤	未回復					

日赤番号	識別番号	FAX受付日	報告受領日	一般名	性別	年齢	原疾患	感染症名	投与年月	投与前検査(年月)	投与後検査(年月)	日赤投与前検査	日赤投与後検査	受血者個別NAT	献血者個別NAT	併用血液製剤等	備考	使用単位数	献血者再献血※	同一献血者製剤確保※	同一献血者製剤使用※	感染症等転帰	転帰	献血者検測及献血者の献血履歴(抗原、抗体、NAT)(投与時点)	献血者検測及献血者の献血履歴(抗原、抗体、NAT)(投与時点)
3-08013	A-07000230	2008/2/6	2008/2/21	人赤血球濃厚液(放射線照射)	女	50	貧血	B型肝炎	08/11	HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) (08/11)	HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(-) (08/11)	HBV-DNA(-) HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) (08/11)	HBV-DNA(+) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(+) (08/01)	陰性(輸血前) 陰性(輸血後)	保腎抗体2本全部 HBV-DNA(-)			2単位	1/2(HEV)関連検査陰性	2本の原料血漿を製造。	原料血漿は全て使用済み。	重篤	未回復		
3-08014	A-07000231	2008/2/8	2008/2/21 2008/3/24	人赤血球濃厚液(放射線照射) 人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	男	80	血液腫瘍	B型肝炎	07/06-08/02 07/07-08/02	HBsAg(-) HBsAb(-) (07/08)	HBV-DNA(+) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(+) (08/02)	HBV-DNA(-) HBsAg(-) HBsAb(-) (07/08)	HBV-DNA(+) HBsAg(+) HBsAb(-) (08/02)	陰性(輸血前) 陰性(輸血後)	保腎抗体10本全部 HBV-DNA(-)	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 人血清アルブミン	担当医の息が「死亡」と本剤との関連性あり」	670単位 78単位	33/08(HEV)関連検査陰性	95本の原料血漿、11本の新鮮凍結血漿-LRを製造。原料血漿は33本凍結血漿-LRは全て確保済み。	原料血漿は2本使用済み。	重篤	死亡 (08/03/12) 急性B型肝炎にて死亡。前後なし。		
3-08031	A-08000025	2008/3/28	2008/4/9	人赤血球濃厚液(放射線照射) 人赤血球濃厚液(放射線照射)	男	70	リンパ腫	B型肝炎	08/12 08/12	HBsAg(-) HBsAb(-) (08/10)	HBV-DNA(-) HBsAg(-) HBsAb(+) HBcAb(-) (07/01) HBsAg(-) (07/05) HBV-DNA(+) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(+) (08/01) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(+) (08/03)	HBV-DNA(-) HBsAg(-) HBsAb(+) HBcAb(-) (07/01) HBsAg(-) (07/05) HBV-DNA(+) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(+) (08/01) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(+) (08/03)	-	保腎抗体2本全部 HBV-DNA(-)		2単位 10単位	1/2(HEV)関連検査陰性	2本の原料血漿を製造。	原料血漿は全て使用済み。	非重篤	未回復				
3-08032	A-08000026	2008/3/31	2008/4/9	新鮮凍結人血漿	女	50	血液腫瘍	B型肝炎	05/05	HBsAg(-) (05/05)	HBsAg(-) HBsAb(+) (05/07) HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) (08/03)	HBV-DNA(+) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(+) (08/03)	陰性(輸血後)	保腎抗体1本について HBV-DNA(-)		2単位	(献血者)関連検査陰性 のため該当せず)	1本の原料血漿、1本の赤血球MAPを製造。	原料血漿は使用済み。赤血球MAPは医療機関へ供給済み(受血者は輸血前後ともにHBs抗原陰性であり感染の疑いなし)とコメントあり	非重篤	未回復				
輸血後NATで陰性又は輸血前後で陽性																									

日赤番号	識別番号	FAX受付日	報告受領日	一般名	患者性別	年齢	原疾患	感染症名	投与年月	投与前検査(年月)	投与後検査(年月)	日赤投与前検査	日赤投与後検査	受血者個別NAT	献血者個別NAT	併用血液製剤等	備考	使用単位数	献血者再献血※	同一献血者製剤確保※	同一献血者製剤使用※	感染症等転帰	転帰	献血者検査及の献血者検査検査体(抗原、抗体、NAT)(投与時点)	献血者検査及の献血者検査検査体(抗原、抗体、NAT)(投与時点)		
3-08002	A-07000182	2008/1/11	2008/1/25	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	男	80	消化器疾患	B型肝炎	07/09	HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) (07/09)	HBV-DNA(+) (07/12)	HBV-DNA(-) HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) (07/09)	HBV-DNA(-) HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) (08/01)	保腎錠6 本全部 HBV-DNA(-)	保腎錠6 本全部 HBV-DNA(-)	併用血液製剤等		12単位	1/6 (HBV) 関連検査 (陰性)	4本の原料血漿、2本の新鮮凍結血漿-LRを製造。原料血漿-LRはすべて確保済み。	-	不明	非重篤	不明			
3-08003	A-07000181	2008/1/11	2008/1/25	人赤血球濃厚液-LR	男	70	腫瘍	B型肝炎	07/09	HBsAg(-) (07/07)	HBsAg(+) (08/01)	HBcAb(+) HBV-DNA(-) HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(+) (07/09)	HBcAb(+) HBV-DNA(-) HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(+) (08/01)	保腎錠5 本全部 HBV-DNA(-)	保腎錠5 本全部 HBV-DNA(-)	人血清アルブミン		10単位	0/5	4本の原料血漿、1本の新鮮凍結血漿-LRを製造。原料血漿はすべて確保済み。新鮮凍結血漿-LRは確保済み。	-	不明	非重篤	不明			
3-08021	A-07000249	2008/2/25	2008/3/11	人赤血球濃厚液-LR 人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	男	60	多発性骨腫瘍	B型肝炎	07/07- 08/02 07/09	HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) (07/07)	HBV-DNA(+) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(-) IgM-HBcAb(-) (08/02)	HBV-DNA(+) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(-) (07/07)	保腎錠11 本全部 HBV-DNA(-)	保腎錠11 本全部 HBV-DNA(-)			20単位 2単位	1/11 (HBV) 関連検査 (陰性)	10本の原料血漿、4本の新鮮凍結血漿-LRを製造。原料血漿は8本確保済み。新鮮凍結血漿-LRは確保済み。	原料血漿は2本使用済み。	未回復	未回復					
陽転未確認事例																											
3-08036	A-08000031	2008/4/7	2008/4/16	新鮮凍結人血漿 新鮮凍結人血漿-LR	女	20	血液腫瘍	B型肝炎	07/03-06 07/08-12	HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) (07/05)	HBV-DNA(-) HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) (08/02)	HBV-DNA(-) HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) (07/05)	保腎錠31 本について HBV-NAT 実施予定	保腎錠31 本について HBV-NAT 実施予定	乾燥濃縮人アンチロニン-3		36単位 24単位	19/31	17本の原料血漿、1本の新鮮凍結血漿、8本の赤血球MAP、13本の赤血球濃厚液-LRを製造。原料血漿は使用の有無を調査中。	新鮮凍結血漿、赤血球濃厚液-LRはすべて確保済み。	未回復	非重篤	未回復				
3-08037	A-08000079	2008/4/21	2008/5/2	人赤血球濃厚液(放射線照射) 人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	男	70	血液腫瘍、腎不全、肺腫瘍	B型肝炎	07/01 07/01-07	HBsAg(-) (07/01)	HBV-DNA(+) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(-) (08/04)	HBV-DNA(+) HBsAg(+) HBsAb(-) HBcAb(-) (08/04)	保腎錠15 本について HBV-NAT 実施予定	保腎錠15 本について HBV-NAT 実施予定			2単位 28単位	11/15	調査中	調査中	非重篤	軽快					

日赤番号	識別番号	FAX受付日	報告受領日	一般名	患者性別	年齢	原疾患	感染症名	投与年月	投与前検査(年月)	投与後検査(年月)	日赤投与前検査	日赤投与後検査	受血者個別NAT	献血者個別NAT	併用血液製剤等	備考	使用単位数	献血者再献血※	同一献血者製剤確保※	同一献血者製剤使用※	感染症等転帰	転帰	献血者調査及の献血者調査検査(抗体、NAT)(投与時点)	献血者調査及の献血者調査検査(抗体、NAT)(投与時点)
3-08039	A-08000081	2008/4/22	2008/5/2	人赤小球濃厚液(放射線照射) 人赤血球濃厚液(放射線照射) 人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	男	80	血液腫瘍	B型肝炎	08/12-09/03 07/01-09/03	HBsAg(-) HBsAb(-) HBcAb(-) HBcAb(-) (08/04)	-	調査中	HBV関連検査実施予定	保管検体36本についてHBV-NAT実施予定				245単位 4単位 28単位	調査中	調査中	調査中	非重篤	未回復		
<b>輸血によるHCV感染報告例(疑い例を含む。)</b>																									
<b>供血者陽性事例</b>																									
<b>陽転事例</b>																									
3-07153	A-07000170	#####	2008/1/9	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	女	80	消化器疾患	C型肝炎	07/05	HCV-Ab(+) HCV-RNA(-) (07/12)	HCV-Ab(-) HCV-RNA(-) (07/05)	HCV-RNA(-) HCV-Ab(-) HCV-RNA(+) HCV-Ab(+) (07/12)	保管検体3本全部HCV-RNA(-)	加熱人血漿たん白人血清アルブミン		6単位	0/3		3本の原料血漿を製造。	原料血漿は全て使用済み。	非重篤	未回復			
3-07154	A-07000171	2008/1/4	2008/1/9	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR 人赤血球濃厚液(放射線照射) 人赤血球濃厚液(放射線照射) HLA(放射線照射)	女	40	血液腫瘍	C型肝炎	07/08-12 07/08-09 07/09-12	HCVコア抗原(-) HCV-Ab(-) HCV-RNA(-) (07/08)	HCVコア抗原(+) HCV-Ab(+) HCV-RNA(-) (07/12)	HCV-RNA(+) HCV-Ab(+) HCV-RNA(-) (07/12)	保管検体41本全部HCV-RNA(-)		輸血用血液(41本)175単位 185単位 の献血者は40人である。	24単位 175単位 185単位	15/40 (HCV関連検査陰性)	35本の原料血漿、6本の新鮮凍結血漿-LRを製造。原料血漿は全て確保済み。新鮮凍結血漿-LRは全て確保済み。	-	非重篤	未回復				
3-08006	A-07000187	2008/1/18	2008/1/30	人赤血球濃厚液(放射線照射)	女	70	消化器疾患	C型肝炎	06/04	HCV-Ab(-) HCV-RNA(-) (06/03)	HCV-Ab(+) HCV-RNA(+) HCV-Ab(+) HCV-RNA(+) (08/01)	HCV-RNA(+) HCV-Ab(-) HCV-RNA(+) HCV-Ab(+) (08/01)	保管検体3本全部HCV-RNA(-)		6単位	2/3(HCV関連検査陰性)	6本の原料血漿を製造。	原料血漿は全て使用済み。	重篤	未回復					
3-08011	A-07000227	2008/2/1	2008/2/15	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	男	30	腫瘍、脳疾患	C型肝炎	07/01-05	HCVコア抗原(-) HCV-Ab(-) HCV-RNA(-) (08/01)	HCVコア抗原(+) HCV-Ab(-) HCV-RNA(-) (07/01)	HCV-RNA(+) HCV-Ab(-) HCV-RNA(+) HCV-Ab(+) (08/01)	保管検体7本全部HCV-RNA(-)	乾燥スル化人血漿 乾燥フラスコ 乾燥フラスコ 乾燥フラスコ	14単位	3/7(HCV関連検査陰性)	5本の原料血漿、2本の新鮮凍結血漿-LRを製造。	原料血漿は全て使用済み。新鮮凍結血漿-LRは全て医療機関へ供給済み。	非重篤	未回復					
3-08020	A-07000247	2008/2/25	2008/3/6	人赤血球濃厚液-LR	女	80	心疾患	C型肝炎	07/03	HCV-Ab(-) HCV-RNA(-) (04/12) HCV-Ab(-) HCV-RNA(-) (05/01) HCV-Ab(+) HCV-RNA(-) (08/02)	HCV-Ab(+) HCV-RNA(+) HCV-Ab(-) HCV-RNA(-) (08/02)	HCV-RNA(+) HCV-Ab(+) HCV-RNA(+) HCV-Ab(+) (08/02)	保管検体1本HCV-RNA(-)		2単位	0/1	1本の新鮮凍結血漿-LRを製造。	新鮮凍結血漿-LRは医療機関へ供給済み。	重篤	不明					
3-08022	A-07000250	2008/2/26	2008/3/11	人赤血球濃厚液(放射線照射) 人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	女	80	リウマチ	C型肝炎	07/02 07/02	HCV-Ab(-) HCV-RNA(-) (07/02) HCV-Ab(+) HCV-RNA(-) (08/01) HCV-RNA(+) HCV-Ab(+) (08/02)	HCV-RNA(-) HCV-Ab(-) HCV-RNA(+) HCV-Ab(-) (08/02)	HCV-RNA(+) HCV-Ab(+) HCV-RNA(+) HCV-Ab(+) (08/02)	保管検体6本全部HCV-RNA(-)		20単位 4単位	2/6(HCV関連検査陰性)	5本の原料血漿、1本の新鮮凍結血漿-LRを製造。	原料血漿は全て使用済み。新鮮凍結血漿-LRは医療機関へ供給済み。	重篤	未回復					



日赤番号	識別番号	FAX受付日	報告受付日	一般名	患者性別	年齢	原疾患	感染症名	投与年月	投与前検査(年月)	投与後検査(年月)	日赤投与前検査	日赤投与後検査	受血者個別NAT	献血者個別NAT	献血者血液製剤等	備考	使用単位数	献血者再献血※	同一献血者製剤混入※	同一献血者製剤使用※	感染症等転帰	転帰	献血者調査及の献血者調査後の献血者(抗原、抗体、NAT)(投与時点)	献血者調査及の献血者調査後の献血者(抗原、抗体、NAT)(投与時点)			
3-08023	A-07000253	2008/3/5	2008/3/18	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	女	70	心疾患	C型肝炎	07/11	HCV-Ab(-) (08/10)	HCV-Ag(+) (07/11) HCV-RNA(-) (08/01) HCV-RNA(+) (08/02) HCV-Ab(+) (08/02)	HCV-RNA(-) (07/11)	HCV-RNA(+) (08/03)	陰性(輸血前) 陽性(輸血後)	保管検体2 本全部 HCV-RNA(-)		併用血液製剤等		4単位	0/2	2本の新鮮凍結血漿-LRを製剤として使用済み。新鮮凍結血漿-LRは全て確保済み。	-	重篤	未回復				
3-08027	A-07000279	2008/3/11	2008/3/25	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR 人血小坂濃厚液(放射線照射)	女	30	リンパ腫	C型肝炎	07/08-09/01 07/08-09/01	HCV-Ab(-) (07/08) HCV-RNA(+) (08/02) HCV-Ag(+) (08/02)	HCV-RNA(-) (07/08)	HCV-RNA(+) (08/01)	陰性(輸血前) 陽性(輸血後)	保管検体23 本全部 HCV-RNA(-)				22単位 125単位	10/23 (HCV陽性検査陰性)	18本の原料血漿、5本の新鮮凍結血漿-LRを製剤として使用済み。新鮮凍結血漿-LRは全て確保済み。	-	重篤	未回復					
3-08029	A-07000290	2008/3/17	2008/3/28	人血小坂濃厚液(放射線照射) 人赤血球濃厚液(放射線照射) 人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	女	20	血液腫瘍	C型肝炎	06/06-07/12 06/06-07/12 06/10-07/09-07/11	HCV-Ag(-) (06/07) HCV-Ab(-) (07/12) HCV-Ag(-) (08/01) HCV-RNA(+) (08/02) HCV-Ab(+) (08/02)		HCV-RNA(+) (08/03)	陽性(輸血後)	保管検体47 本全部 HCV-RNA(-)				320単位 22単位 8単位	39/47 (HCV陽性検査陰性)	45本の原料血漿、6本の新鮮凍結血漿、2本の新鮮凍結血漿-LRを製剤として使用済み。新鮮凍結血漿-LRは全て確保済み。	原料血漿は30本使用済み。新鮮凍結血漿はすべて供給済み。	後遺症有 (慢性肝炎)						
3-08030	A-07000296	2008/3/19	2008/3/31	人赤血球濃厚液(放射線照射)	女	70	骨折、肺炎	C型肝炎	00/11	HCV-Ab(-) (00/11)	HCV-Ab(+) (02/05) HCV-Ab(+) (07/11)			-	保管検体5 本全部 HCV-RNA(-)		加熱人血製剤たん白		10単位	1/5 (HCV陽性検査陰性)	5本の原料血漿、2本の新鮮凍結血漿を製剤として使用済み。	原料血漿はすべて使用済み。新鮮凍結血漿は全て医療機関へ供給済み。	軽快					
輸血後NATで陰性又は輸血前後で陽性																												
3-08009	A-07000222	2008/1/31	2008/2/14	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	男	50	消化器腫瘍、泌尿器疾患	C型肝炎	07/08-11	HCV-Ab(-) (07/07) HCV-RNA(+) (07/08) HCV-Ag(+) (08/01)	HCV-RNA(+) (08/01) HCV-Ab(+) (07/08) HCV-RNA(-) (08/01)	HCV-RNA(+) (07/08) HCV-Ab(+) (08/01)	陰性(輸血前) 陽性(輸血後)	保管検体12 本全部 HCV-RNA(-)				22単位	2/12(HCV陽性検査陰性)	9本の原料血漿、3本の新鮮凍結血漿-LRを製剤として使用済み。新鮮凍結血漿-LRは全て確保済み。	-	重篤	不明					
3-08025	A-07000277	2008/3/7	2008/3/21	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR 新鮮凍結人血漿-LR 人血小坂濃厚液(放射線照射)	女	70	心疾患、血腫、ショック	C型肝炎	07/10-07/12 07/10-07/12 07/10-07/12	HCV-Ab(-) (07/10) HCV-Ag(+) (08/01) HCV-RNA(-) (07/12) HCV-Ab(-) (08/01)	HCV-RNA(-) (07/10) HCV-Ab(-) (07/10) HCV-RNA(-) (08/01)	HCV-RNA(-) (07/10) HCV-Ab(-) (07/11,12) HCV-RNA(-) (08/01)	陰性(輸血前) 陽性(輸血後)	保管検体80 本全部 HCV-RNA(-)				62単位 64単位 100単位	25/80 (HCV陽性検査陰性)	44本の原料血漿、3本の新鮮凍結血漿-LR、23本の赤血球濃厚液-LRを製剤として使用済み。新鮮凍結血漿-LRはすべて医療機関へ供給済み。	赤血球濃厚液-LRはすべて医療機関へ供給済み。	重篤	軽快					
陽転未確認事例																												
3-08035	A-08000030	2008/4/3	2008/4/16	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	女	70	肺炎	C型肝炎	07/07-09	HCV-Ab(-) (07/03) HCV-Ag(+) (07/12) HCV-RNA(+) (08/01)	HCV-RNA(-) (07/07) HCV-Ag(+) (07/12) HCV-RNA(+) (08/01)	HCV-RNA(-) (07/07) HCV-Ag(+) (07/12) HCV-RNA(+) (08/01)	調査中	保管検体7 本全部 HCV-NAT 実施予定				14単位	4/7(HCV陽性)	4/7(HCV陽性)	調査中	調査中	重篤	未回復				

日赤番号	識別番号	FAX受付日	報告受領日	一般名	患者性別	年齢	原疾患	感染症名	投与年月	投与前検査(年月)	投与後検査(年月)	日赤投与前検査	日赤投与後検査	受血者個別NAT	献血者個別NAT	併用血液製剤等	備考	使用単位数	献血者再献血※	同一献血者製剤確保※	同一献血者製剤使用※	感染症等転帰	転帰	献血者検査の献血者氏名(抗原、抗体、NAT)(投与時点)	献血者検査の献血者氏名(抗原、抗体、NAT)(投与時点)		
3-08038	A-08000080	2008/4/22	2008/5/2	新鮮凍結人血漿-LR 人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	男	0	先天性心疾患	C型肝炎	07/08-09 07/08	HCV-Abs(-) HCVコア抗原(-) HCVコア抗体(+) (08/03) (08/04)	HCV-Abs(+) HCVコア抗体(-) HCV-Abs(+) HCVコア抗体(+) (08/03) (08/04)	-	調査予定	HCV関連検査実施予定	保管抗体8本についてHCV-NAT実施予定	人血清アブゾミン、ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン		10単位 4単位	0/8	2本の原料血漿、6本の赤血球濃厚液-LRを製造。原料血漿は毎日の有無を調査中。	赤血球濃厚液-LRは全て医療機関へ供給済み。	非重篤	不明				
3-08041		2008/4/25		新鮮凍結人血漿-LR 人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	女	60	消化器腫瘍	C型肝炎	07/10-11 07/10-11	HCV-Abs(-) HCVコア抗原(-) HCV-Abs(+) HCVコア抗体(+) (07/10) (08/04)	HCV-Abs(-) HCVコア抗原(-) HCV-Abs(+) HCVコア抗体(+) (07/11) (08/02)	調査中	調査中	HCV関連検査実施予定	保管抗体18本についてHCV-NAT実施予定	人血清アブゾミン、ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン		24単位 12単位	6/18(HCV関連検査陰性)	5本の原料血漿、1本の新鮮凍結血漿-LR、12本の赤血球濃厚液-LRを製造。原料血漿は毎日の有無を調査中。新鮮凍結血漿-LRは確保済み。	赤血球濃厚液-LRは全て医療機関へ供給済み。	非重篤	不明				
輸血によるその他ウイルス感染報告例(疑い例を含む。)																											
3-08012	A-07000229	2008/2/5	2008/2/19	人血小脳濃厚液(放射線照射) 人赤血球濃厚液-LR 新鮮凍結人血漿	女	0	超低体重出生児	サイトメガロウイルス感染	07/10 07/10-12 07/10	IgM-CMV-Abs(+) IgG-CMV-Abs(+) (07/12)	IgM-CMV-Abs(+) IgG-CMV-Abs(+) (07/12)	-	IgM-CMV-Abs(+) IgG-CMV-Abs(+) (08/01)	-	保管抗体10本全部にIgM-CMV-Abs(-) IgG-CMV-Abs(+)	日本人のCMV抗体保有率は90%とされており、潜伏感染の状態で体内にウイルスを保有している。	30単位 6単位 2単位	-	7本の原料血漿、2本の新鮮凍結血漿-LR、1本の新鮮凍結血漿を製造。原料血漿は全て医療機関へ供給済み。新鮮凍結血漿-LRは確保済み。	新鮮凍結血漿、赤血球MAPIはすべて医療機関へ供給済み。	重篤	未回復					
輸血による細菌等感染報告例(疑い例を含む。)																											
3-08004	A-07000185	2008/1/16	2008/1/30	人血小脳濃厚液	男	70	血液腫瘍	細菌感染	08/01	BT39°C BPI40/80 PRI110/min RR23/min 血液培養(嫌気性ポトルよリ)グラム陽性球菌 Staphylococcus epidermidis 検出	BT39°C BPI40/80 PRI110/min RR23/min 血液培養(嫌気性ポトルよリ)グラム陽性球菌 Staphylococcus epidermidis 検出	-	-	当該製剤のセグメントチューブによる細菌培養試験を実施。試験結果：陰性	培養4日目の濃厚血小版(1本)	10単位	-	1本の原料血漿を製造。原料血漿は確保済み。	-	重篤	軽快						
3-08007	A-07000200	2008/1/22	2008/2/5	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	男	70	腫瘍	細菌感染	08/01	BT39.2°C 院内にて実施 の培養(血液培養)は陽性 本菌はグラム陰性球菌 Staphylococcus epidermidisと同定された。	BT39.2°C 院内にて実施 の培養(血液培養)は陽性 本菌はグラム陰性球菌 Staphylococcus epidermidisと同定された。	-	-	非溶血性副作用を用いた濃厚血小版の製造。原料血漿は確保済み。試験結果：陰性。質次検査：欠損なし。	培養9、10日目の濃厚血小版(2本)	4単位	-	2本の原料血漿を製造。原料血漿は全て確保済み。	-	重篤	回復						
3-08015	A-07000238	2008/2/14	2008/2/28	人血小脳濃厚液	女	60	リンパ腫	細菌感染	08/02	BT 36.5°C -39°C 院内にて患者血液培養を実施。陰性。	BT 36.5°C -39°C 院内にて患者血液培養を実施。陰性。	-	-	非溶血性副作用を用いた濃厚血小版の製造。原料血漿は確保済み。試験結果：陰性。質次検査：欠損なし。	培養3日目の濃厚血小版(1本)	10単位	-	1本の原料血漿を製造。原料血漿は確保済み。	-	非重篤	軽快						

日赤番号	識別番号	FAX受付日	報告受領日	一般名	患者性別	年齢	原疾患	感染症名	投与年月	投与前検査(年月)	投与後検査(年月)	日赤投与前検査	日赤投与後検査	受血者個別NAT	献血者個別NAT	併用血液製剤等	備考	使用単位数	献血者再献血※	同一献血者製剤確保※	同一献血者製剤使用※	感染症等転帰	転帰	献血者調査及献血者の献血履歴(抗原抗体、NAT)(投与時点)	献血者調査及献血者の献血履歴(抗原抗体、NAT)(投与時点)	
3-08016	A-07000242	2008/2/19	2008/3/4	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	女	80	貧血、糖尿病(型)、高尿酸血症、高血圧	細菌感染	08/02	BT 36.2℃ -39.3℃ 患者静脈血液培養は陰性。 骨髄培養による細菌菌種、カリンダ菌種は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。	-	-	-	非溶血性副作用 用間連検査実施。抗血漿タンパク抗体検査は陰性。 血漿タンパク質検査は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。	投与中止の当該製剤(1本)で細菌培養試験を実施。陰性。	併用血液製剤等	被疑薬：採血15日目の照射赤血球濃厚液-LR(1本) 1本の原料血漿を製造。原料血漿は確保済み。	1単位	-	1本の原料血漿を製造。原料血漿は確保済み。	-	重篤	軽快			
3-08017	A-07000243	2008/2/20	2008/3/4	人血小坂濃厚液(放射線照射)	女	60	貧血	細菌感染	08/02	BT 36.6℃ -37.9℃ 院内にて患者血液培養、Acinetobacter calcoaceticus 検出。	-	-	-	非溶血性副作用 用間連検査実施。抗血漿タンパク抗体検査は陰性。 血漿タンパク質検査は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。	投与中止の当該製剤(1本)で細菌培養試験を実施。陰性。	併用血液製剤等	被疑薬：採血3日目の濃厚血小坂(1本)の調査をうけて、担当医より副作用、感染症と輸血との因果関係が考えられるとの見解が得られた。	10単位	-	1本の原料血漿を製造。原料血漿は確保済み。	-	非重篤	軽快			
3-08018	A-07000244	2008/2/20	2008/3/4	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	男	60	血液腫瘍	細菌感染	08/02	BT 37℃ -38.2℃ 院内にて患者血液培養、Staphylococcus epidermidis 同定。	-	-	-	非溶血性副作用 用間連検査実施。抗血漿タンパク抗体検査は陰性。 血漿タンパク質検査は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。	投与中止の当該製剤(1本)で細菌培養試験を実施。陰性。	併用血液製剤等	被疑薬：採血11日目の照射赤血球濃厚液-LR(1本)の調査をうけて、担当医より副作用、感染症と輸血との因果関係が考えられるとのコメント。	2単位	-	1本の原料血漿を製造。原料血漿は確保済み。	-	非重篤	回復(その後、原疾患にて死亡)			
3-08019	A-07000246	2008/2/22	2008/3/6	人血小坂濃厚液(放射線照射)	男	10	リンパ腫	細菌感染	08/02	BT 40.2℃ 院内にて患者血液培養、真菌性。	-	-	-	-	使用済み ハンクによる細菌培養試験を実施。陰性。	併用血液製剤等	被疑薬：採血3日目の濃厚血小坂(1本)	10単位	-	1本の原料血漿を製造。原料血漿は確保済み。	-	非重篤	未回復			
3-08024	A-07000254	2008/3/6	2008/3/18	人血小坂濃厚液(放射線照射)	男	50	骨髄異形成症候群	細菌感染	08/03	BT 37.5℃ -38.5℃ 院内にて実施の患者エンドトキシン検査は陰性。院内にて患者血液培養、真菌性。	-	-	-	非溶血性副作用 用間連検査実施。抗血漿タンパク抗体検査は陰性。 血漿タンパク質検査は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。	投与済み ハンクによる細菌培養試験を実施。陰性。	併用血液製剤等	被疑薬：採血4日目の濃厚血小坂(1本)	10単位	-	1本の原料血漿を製造。原料血漿は確保済み。	-	重篤	未回復			
3-08026	A-07000278	2008/3/10	2008/3/21	人赤血球濃厚液(放射線照射)-LR	女	90	骨髄異形成症候群	細菌感染	08/03	BT 37.9℃ -39.2℃ 院内にて患者血液培養、Klebsiella pneumoniae 同定。	-	-	-	非溶血性副作用 用間連検査実施。抗血漿タンパク抗体検査は陰性。 血漿タンパク質検査は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。	投与済み ハンクによる細菌培養試験を実施。陰性。	併用血液製剤等	被疑薬：採血10日目の照射赤血球濃厚液(1本)の結果を受けて、担当医より副作用、感染症と輸血との因果関係は不明である。とのコメントが得られました。	2単位	-	1本の原料血漿を製造。原料血漿は確保済み。	-	重篤	死亡			
3-08028	A-07000289	2008/3/17	2008/3/28	人赤血球濃厚液-LR	女	60	動脈硬化症	細菌感染	08/03	BT 37.8℃ -39.4℃ 院内にて実施の患者血液培養による真菌菌種は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。	調査中	調査中	調査中	非溶血性副作用 用間連検査実施。抗血漿タンパク抗体検査は陰性。 血漿タンパク質検査は陰性。 骨髄培養、カリンダ菌種は陰性。	投与中止の当該製剤(1本)で細菌培養試験を実施。陰性。	併用血液製剤等	被疑薬：採血12日目の赤血球濃厚液-LR 2008年3月10日に「発熱、呼吸器」として情報入手し、担当医の重篤度判断が非重篤であったため、報告対象外としていたが、患者血液培養より細菌が検出されたことの情報を入力し、細菌感染も疑われるとの担当医の見解が得られたため、感染症症例として報告。	2単位	-	1本の原料血漿を製造。原料血漿は確保済み。	調査中	非重篤	軽快			

日赤番号	識別番号	FAX受付日	報告受領日	一般名	患者性別	年齢	原疾患	感染症名	投与年月	投与前検査(年月)	投与後検査(年月)	日赤投与前検査	日赤投与後検査	受血者個別NAT	献血者個別NAT	併用血液製剤等	備考	使用単位数	献血者再献血※	同一献血者製剤重複※	同一献血者製剤使用※	感染症等転帰	転帰	献血者調査及献血者の場合の献血者調査検査項目(抗体、NAT)(投与時点)	献血者調査及献血者の場合の献血者調査検査項目(抗体、NAT)(投与時点)
3-08033	A-08000028	2008/4/2	2008/4/15	洗浄人赤血球浮遊液-LR 人血小坂濃厚液	男	40	骨髄異形 成症候群	細菌感染	08/03 08/03	BP 104/82 KT 37.1℃ (投与直前)	BP 70/台 KT 39℃ ※患者血液培養にてクラ ム陰性球菌 検出。その 後、Xanthomonas malphophilisと 同定。	調査中	-	非溶血性副作 用関連検査実 施予定	同一採血番 号の血漿(2 本)で無菌 試験を実施 予定		複製薬:採血3日目 の濃厚血小坂(1本) 洗浄赤血球-LR(1 本)は採血6日目の 赤血球濃厚液-LRを 原料として製造し翌 日使用	2単位 10単位	-	1本の原料血漿-LRの新製凍結血漿-LRを製造。原料血漿は製剤の有無を調査中。新鮮凍結血漿-LRは確認済み。	調査中	重篤	軽快		
3-08034	A-08000029	2008/4/2	2008/4/15	人赤血球濃厚液-LR	男	50	肺炎	細菌感染	08/03	-	BP 40.1℃ ※患者血液培養にてクラ ム陰性球菌 検出。Staphylococcus epidermidis と同定。	調査中	調査中	非溶血性副作 用関連検査実 施予定	同一採血番 号の血漿 (1本)で無 菌試験を實 施 予定		複製薬:採血19日 目の赤血球濃厚液-LR(1本)	2単位	-	1本の新鮮凍結血漿-LRを製造。新鮮凍結血漿-LRは確認済み。	-	非重篤	回復		
3-08040		2008/4/24		人血小坂濃厚液	女	50	血液腫瘍	細菌感染	08/04	輸血開始時 BP64/54 HR109 院内にて患者 血培養実施 中。	-	調査中	非溶血性副作 用関連検査実 施予定	使用済み (バッグ)に上 各細菌培養 試験を実施 する予定		複製薬:採血4日 目の濃厚血小坂(1本)	10単位	-	調査中	調査中	不明	重篤			
3-08042		2008/4/28		人赤血球濃厚液 (放射線照射)-LR	男	80	骨髄異形 成症候群	細菌感染	08/04	輸血後4時間 で発熱37℃ →38℃ 激しい胃腸症 状(下痢) 院内にて患者 血液培養実 施中。	-	-	-	当院製剤の セグメント チューブ(2 本)で無菌 試験を実施 予定。		複製薬:採血9、13日 目の照射赤血球濃 厚液-LR(2本)	4単位	-	2本の新鮮凍結血漿-LRを製造。新鮮凍結血漿-LRはすべて確認済み。	-	調査中	重篤	調査中		

試行的 HEV20 プール NAT 実施状況について  
(輸血後 HEV 感染の予防対策)

1. 試行的 HEV20 プール NAT 実施状況

北海道赤十字血液センター管内  
調査期間:平成 17 年 1 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日

	献血者数	HEV-RNA 陽性	陽性率
H17. 1～H18. 2 <sup>*1</sup>	341, 174	45	1/7, 582
H18. 3～H20. 3 <sup>*2</sup>	557, 329	67	1/8, 318
合計	898, 503	112	1/8, 022

\*1 北海道センターにて NAT 実施(ALT 高値、検査不合格検体も含む)

\*2 血漿分画センターにて NAT 実施(ALT 高値、検査不合格検体は除く)

2. HEV-RNA 陽性献血者の内訳  
別添

## 2. HEV-RNA陽性者の内訳

No.	採血日	年齢	性別	ALT (IU/L)	HEV抗体		HEV RNA	問診 該当 ※1	喫食歴調査		経過 対象 供給製剤	受血者情報
					IgM	IgG			肉の種類	食べ方		
1	2005/01/04	32	M	57	-	-	+	無	不明レバー	生	無	
2	2005/02/07	38	F	11	-	-	+	無	ブタレバー	生	無	
3	2005/02/13	41	M	103	-	-	+	無	回答なし		無	
4	2005/03/25	65	F	17	-	-	+	無	回答なし		無	
5	2005/03/27	26	M	38	-	-	+	有	不明レバー(問診時)	生	有	赤血球製剤破損のため院内廃棄
6	2005/04/10	54	F	20	-	-	+	無	ウシ精肉	半生	無	
7	2005/04/15	59	F	16	-	-	+	無	ブタホルモン、シカ精肉	十分加熱	無	
8	2005/04/15	35	F	16	-	-	+	無	シカ精肉、ウシ精肉 ウシレバー、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	無	
9	2005/04/20	25	M	24	+	+	+	無	ウシレバー、ウシ精肉 ウシホルモン、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	有	感染なし
10	2005/04/28	22	M	44	-	-	+	無	回答なし		無	
11	2005/06/07	42	M	24	+	+	+	無	ウシ精肉 ウシホルモン、ブタ精肉、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	有	原疾患により死亡
12	2005/06/22	51	M	52	-	-	+	無	回答なし		無	
13	2005/07/03	58	M	219	+	+	+	無	不明レバー、ブタ精肉	十分加熱	無	
14	2005/07/05	22	M	23	+	-	+	無	回答なし		無	
15	2005/07/05	38	M	15	-	-	+	無	ブタホルモン、ウシ精肉、ブタ精肉	半生	無	
16	2005/07/13	24	M	19	-	-	+	無	ウシレバー	生	有	原疾患により死亡
17	2005/09/02	33	M	49	-	-	+	無	ウシ精肉 ヒツジ精肉 ブタホルモン、ブタ精肉	生 半生 十分加熱	無	
18	2005/09/01	29	F	100	+	+	+	無	ウシホルモン、ヒツジ精肉 ウシレバー、ウシ精肉、ブタ精肉	半生 十分加熱	無	
19	2005/09/20	42	M	31	-	-	+	無	ブタホルモン、不明レバー、ヒツジ精肉	十分加熱	有	HEV感染(H17.11.1 運営委員会報告済み)
20	2005/09/27	20	F	10	-	-	+	無	ウシ精肉、ブタホルモン、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
21	2005/10/21	41	M	12	-	-	+	無	回答なし		無	
22	2005/10/25	44	F	38	+	+	+	無	ウシ精肉、ブタ精肉	十分加熱	無	
23	2005/11/07	30	F	21	-	-	+	無	ブタホルモン、ウシ精肉、ヒツジ精肉 ブタホルモン、ウシ精肉、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	無	
24	2005/11/07	31	F	12	+	+	+	有	ブタレバー、ブタホルモン、ウシ精肉	十分加熱	無	
25	2005/11/20	28	M	47	+	+	+	有	ウシレバー、ウマ精肉 ブタホルモン、ウシ精肉、ブタ精肉	生 十分加熱	無	
26	2005/11/29	35	F	333	+	+	+	有	回答なし		無	
27	2005/12/13	42	M	30	-	-	+	有	ウシ精肉、ヒツジ精肉 不明レバー、ブタ精肉	半生 十分加熱	有	原疾患により死亡
28	2005/12/13	30	M	11	-	-	+	有	不明レバー	十分加熱	有	HEV感染(H18.01.26 運営委員会報告済み)
29	2005/12/22	62	F	14	-	-	+	無	回答なし		無	
30	2005/12/27	42	F	14	-	-	+	無	回答なし		無	

No.	採血日	年齢	性別	ALT (IU/L)	HEV抗体		HEV RNA	問診 該当 ※1	喫食歴調査		遊及対象 供給製剤	受血者情報
					IgM	IgG			肉の種類	食べ方		
31	2006/01/02	22	F	12	-	-	+	有	ウシレバー、ウシ精肉	十分加熱	無	
32	2006/01/06	68	M	23	-	-	+	無	ウシレバー、ブタホルモン、ヒツジ精肉	半生	無	
33	2006/01/13	36	M	42	-	-	+	無	ウマ精肉、不明レバー ウシ精肉、ヒツジ精肉、 ウシレバー、ブタ精肉、ブタホルモン	生 半生 十分加熱	無	
34	2006/01/18	53	M	238	+	+	+	有	ウシレバー、ウシホルモン	十分加熱	無	
35	2006/01/13	31	M	43	-	-	+	有	不明レバー ブタ精肉、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	無	
36	2006/01/17	48	M	25	-	-	+	無	回答なし		無	
37	2006/01/25	52	M	25	-	-	+	無	不明レバー、ヒツジ精肉	十分加熱	有	輸血後89日現在、HEVマーカーの陽転は見られず追跡調査終了
38	2006/01/30	39	F	22	-	-	+	無	回答なし		無	
39	2006/01/30	25	M	32	-	-	+	有	ウシ精肉、ウシホルモン、ブタ精肉	十分加熱	無	
40	2006/02/02	39	F	35	-	+	+	有	ウシレバー ウシレバー ヒツジ精肉	生 半生 十分加熱	無	
41	2006/02/07	57	M	13	-	-	+	無	不明	不明	無	
42	2006/02/07	40	F	172	+	+	+	無	ウシ精肉	十分加熱	無	
43	2006/02/17	39	M	28	-	-	+	無	ブタホルモン、ブタレバー、ブタガツ、ヒツジ精肉 イノシシ精肉、ブタ精肉	半生 十分加熱	無	
44	2006/02/20	58	M	22	-	-	+	無	ヒツジ精肉	十分加熱	無	
45	2006/02/21	45	M	30	-	-	+	無	ウシ精肉 ブタ精肉、ブタレバー、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	無	
46	2006/03/01	46	F	15	-	-	+	無	回答なし		無	
47	2006/03/01	50	F	29	-	-	+	無	回答なし		無	
48	2006/03/02	54	M	47	+	+	+	無	ウシ・ブタ(精肉、レバー、ホルモン)、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
49	2006/03/27	40	F	12	-	-	+	無	回答なし		無	
50	2006/04/01	31	F	16	-	-	+	/	ヒツジ精肉	半生	無	
51	2006/04/04	30	F	14	-	-	+	/	ブタ精肉、不明レバー	十分加熱	無	
52	2006/04/12	38	M	45	+	+	+	/	ブタレバー、ウシ精肉、ブタ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
53	2006/04/18	21	M	26	-	-	+	/	ウシ精肉、ウシホルモン ウシ精肉、ウシホルモン	半生 十分加熱	無	
54	2006/04/22	28	M	14	+	+	+	/	回答なし		無	
55	2006/04/26	46	M	19	-	-	+	/	ブタレバー	半生	無	
56	2006/05/18	62	M	27	-	-	+	/	ヒツジレバー	十分加熱	無	
57	2006/07/07	17	M	33	-	-	+	/	回答なし		無	
58	2006/07/11	34	F	10	-	-	+	/	回答なし		無	
59	2006/07/12	21	F	27	-	-	+	/	回答なし		無	
60	2006/07/22	49	M	46	+	+	+	/	ウシ精肉、ブタ精肉、ブタホルモン、ブタレバー	十分加熱	無	

No.	採血日	年齢	性別	ALT (IU/L)	HEV抗体		HEV RNA	問診 該当 ※1	喫食歴調査		遊及対象 供給製剤	受血者情報
					IgM	IgG			肉の種類	食べ方		
61	2006/08/01	62	M	18	-	-	+	/	ブタホルモン、ウシ精肉、ブタ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
62	2006/09/06	44	F	14	-	-	+	/	喫食歴なし		無	
63	2006/09/29	68	M	15	-	-	+	/	ブタ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
64	2006/10/21	29	M	22	-	-	+	/	不明		無	
65	2006/11/19	48	M	58	-	-	+	/	ウシ精肉、ブタ精肉	十分加熱	無	
66	2006/11/23	54	M	18	-	-	+	/	回答なし		無	
67	2006/12/01	43	M	55	-	+	+	/	ブタ精肉	十分加熱	無	
68	2006/12/04	60	M	46	+	+	+	/	ウシ精肉	十分加熱	無	
69	2006/12/04	47	M	40	+	+	+	/	ウシ精肉、ウシホルモン	十分加熱	無	
70	2007/03/01	33	M	41	-	-	+	/	ウシレバー	生	無	
71	2007/03/15	42	M	32	-	+	+	/	ブタレバー、ブタホルモン	半生	無	
72	2007/03/27	55	M	30	-	-	+	/	不明レバー	十分加熱	無	
73	2007/04/07	22	F	9	-	-	+	/	ユッケ ウシホルモン、ヒツジホルモン	生 十分加熱	無	
74	2007/05/16	47	F	15	-	-	+	/	ヒツジ精肉、ブタホルモン	十分加熱	無	
75	2007/05/18	40	F	27	+	+	+	/	ブタ生ハム(自家製)	半生	無	
76	2007/05/30	33	M	26	-	+	+	/	ヒツジ精肉、ブタホルモン	十分加熱	無	
77	2007/06/22	38	M	20	-	-	+	/	ウシ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
78	2007/06/25	45	M	37	+	+	+	/	ブタ精肉 ヒツジ精肉	十分加熱 半生	無	
79	2007/06/27	37	M	18	-	-	+	/	ブタ精肉	十分加熱	無	
80	2007/07/24	57	M	24	-	-	+	/	喫食歴なし		無	
81	2007/07/29	37	M	48	-	-	+	/	不明レバー、ブタホルモン 不明レバー、ブタホルモン	十分加熱 半生	無	
82	2007/07/31	48	M	30	-	-	+	/	ブタ精肉、ブタホルモン、ブタレバー	十分加熱	無	
83	2007/08/01	48	M	33	-	-	+	/	ブタ精肉 ウシ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱 半生	無	
84	2007/08/04	53	M	28	-	-	+	/	ヒツジ精肉 ヒツジ精肉	十分加熱 半生	無	
85	2007/08/26	50	M	60	-	-	+	/	ヒツジ精肉 ウシ精肉	十分加熱 生	無	
86	2007/09/05	41	M	29	-	-	+	/	喫食歴なし		無	
87	2007/09/18	41	M	23	-	-	+	/	ウシ精肉、ブタ精肉、ウシホルモン、ブタホルモン	半生	無	
88	2007/09/21	57	M	19	-	-	+	/	ブタホルモン	十分加熱	無	
89	2007/10/03	59	M	39	-	-	+	/	ブタレバー、ブタ精肉	十分加熱	無	
90	2007/10/03	19	M	40	-	-	+	/	喫食歴なし		無	



No.	採血日	年齢	性別	ALT (IU/L)	HEV抗体		HEV RNA	問診 該当 ※1	喫食歴調査		遊及対象 供給製剤	受血者情報
					IgM	IgG			肉の種類	食べ方		
91	2007/10/09	35	M	19	-	-	+	/	ブタ精肉	十分加熱	無	
92	2007/10/18	30	M	31	-	-	+	/	ウシ精肉、ブタ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
93	2007/11/16	24	M	5	-	-	+	/	不明		無	
94	2007/11/16	54	M	22	-	+	+	/	ブタホルモン、ブタレバー	十分加熱	無	
95	2007/11/16	45	M	47	-	-	+	/	ブタ精肉 ブタレバー	十分加熱 半生	無	
96	2007/11/19	58	M	13	-	-	+	/	レバー、ホルモン	不明	無	
97	2007/11/19	24	M	46	-	-	+	/	不明		無	
98	2007/11/24	36	M	25	-	-	+	/	不明		無	
99	2007/11/29	42	M	21	-	+	+	/	不明		無	
100	2007/11/30	31	M	42	+	+	+	/	レバー	不明	無	
101	2008/01/08	35	M	36	-	-	+	/	ウシ精肉、ブタ精肉	十分加熱	無	
102	2008/01/17	48	F	13	+	+	+	/	ブタホルモン、シカ精肉 ウシ精肉	十分加熱 半生	無	
103	2008/01/29	57	M	22	-	-	+	/	ブタレバー、ブタホルモン	十分加熱	無	
104	2008/02/04	31	M	47	+	+	+	/	不明		無	
105	2008/02/06	57	M	20	-	-	+	/	ブタホルモン	十分加熱	無	
106	2008/02/13	42	M	35	-	-	+	/	不明レバー	十分加熱	無	
107	2008/02/13	60	M	37	+	+	+	/	不明		無	
108	2008/03/11	30	M	21	-	-	+	/	不明		無	
109	2008/03/25	34	F	26	-	-	+	/	喫食歴なし		無	
110	2008/03/26	32	M	41	+	+	+	/	ブタ精肉、ウシ精肉	十分加熱	無	
111	2008/03/29	54	M	26	-	-	+	/	ブタ精肉	十分加熱	無	
112	2008/03/30	19	F	9	-	-	+	/	不明レバー	十分加熱	無	

※1. 問診喫食歴調査内容  
05年1月1日～05年10月31日：「過去3ヶ月以内にブタ、シカ、イノシシあるいは動物種不明の生肉、生レバーの喫食歴」  
05年11月1日～06年03月31日：「過去3ヶ月以内に生肉（半生も含む）、レバー、ホルモン（動物種、焼き方を問わず）の喫食歴」、なお本調査は06年03月31日をもって終了

事務連絡  
平成20年4月21日

日本赤十字社血液事業本部 御中

薬事・食品衛生審議会血液事業部会事務局  
厚生労働省医薬食品局血液対策課

### 血液製剤に関する報告事項について

血液事業の推進に御努力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、標記につきましては、平成20年1月18日付け血安第21号にて貴社から報告を頂いたところですが、平成20年5月21日（水）に平成20年度第1回血液事業部会運営委員会が開催されますので、下記の事項について資料を作成いただき、平成20年4月24日（木）までに当事務局あて御提出いただきますようお願いいたします。記の12については、平成20年1月23日開催平成19年度第5回血液事業部会運営委員会提出資料を更新のうえ、再度御提出ください。

なお、資料の作成に当たっては、供血者、患者及び医療機関の名称並びにこれらの所在地又はこれらの事項が特定できる情報を記載しないよう、個人情報及び法人情報の保護に特段の御配慮をお願いします。

### 記

1. 平成15年9月5日付けで報告された輸血用血液製剤でHIVの感染が疑われる事例について、残る2人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。
2. 平成16年3月22日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る5人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。
3. 平成16年11月26日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る8人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。
4. 平成17年1月12日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る4人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。

査結果。来訪がなければ、その旨。

5. 平成17年2月4日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る1人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。
6. 平成17年6月23日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る5人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。
7. 平成18年4月7日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る9人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。
8. 平成18年6月5日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る2人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。
9. 平成19年2月20日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る1人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。
10. 平成18年2月15日報告、3月8日付けで追加報告された輸血用血液製剤でHCV（C型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る3人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。
11. 試行的HEV20プールNATについて、その後の調査実施状況。

厚生労働省医薬食品局血液対策課長 様

日本赤十字社

血液事業本部長

血液製剤に関する報告事項について（回答）

平成20年4月21日付事務連絡によりご依頼のありました標記の件については、下記により回答いたします。

記

1. 平成15年9月5日付けで報告された輸血用血液製剤でH I Vの感染が疑われる事例について、残る2人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。  
⇒ 残る2人のその後の来訪なし。（8名中6名が来所、検査は全て陰性）
2. 平成16年3月22日付けで報告された輸血用血液製剤でH B V（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る5人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。  
⇒ 残る5人のその後の来訪なし。（37名中32名が来所、検査は全て陰性）
3. 平成16年11月26日付けで報告された輸血用血液製剤でH B V（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る8人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。  
⇒ 残る8人のその後の来訪なし。（48名中40名が来所、検査は全て陰性）
4. 平成17年1月12日付けで報告された輸血用血液製剤でH B V（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る4人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。  
⇒ 残る4人のその後の来訪なし。（16名中12名が来所、検査は全て陰性）
5. 平成17年2月4日付けで報告された輸血用血液製剤でH B V（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る1人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。  
⇒ 残る1人のその後の来訪なし。（追跡調査対象の4名中3名が来所、HBV-DNAは全て陰性。1名はHBc抗体がEIA法のみ陽性HI法陰性、その他の者は全て陰性）

6. 平成17年6月23日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る5人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。  
⇒ 残る5人のその後の来訪なし。（20名中15名が来所、検査は全て陰性）
7. 平成18年4月7日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る9人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。  
⇒ 残る9人のその後の来訪なし。（53名中44名が来所、HBV-DNAは全て陰性。  
2名はHBc抗体及びHBs抗体陽性、1名はHBs抗体のみ陽性、その他の者は全て陰性）
8. 平成18年6月5日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る2人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。  
⇒ 残る2人のその後の来訪なし。（29名中27名が来所、HBV-DNAは全て陰性。  
2名はHBc抗体及びHBs抗体陽性、1名はHBs抗体のみ陽性、その他の者は全て陰性）
9. 平成19年2月20日付けで報告された輸血用血液製剤でHBV（B型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る1人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。  
⇒ 残る1人のその後の来訪なし。（3名中2名が来所、検査は全て陰性）
10. 平成18年2月15日報告、3月8日付けで追加報告された輸血用血液製剤でHCV（C型肝炎ウイルス）感染が疑われる事例について、残る3人の供血者のその後の検査結果。来訪がなければ、その旨。  
⇒ 残る3人のその後の来訪なし。（81名中78名が来所、検査は全て陰性）
11. 試行的HEV20プールNATについて、その後の調査実施状況。  
⇒ 別紙のとおり

## 試行的 HEV20 プール NAT 実施状況について

### (輸血後 HEV 感染の予防対策)

#### 1. 試行的 HEV20 プール NAT 実施状況

北海道赤十字血液センター管内

調査期間:平成 17 年 1 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日

	献血者数	HEV-RNA 陽性	陽性率
H17. 1～H18. 2 <sup>*1</sup>	341, 174	45	1/7, 582
H18. 3～H20. 3 <sup>*2</sup>	557, 329	67	1/8, 318
合計	898, 503	112	1/8, 022

\*1 北海道センターにて NAT 実施(ALT 高値、検査不合格検体も含む)

\*2 血漿分画センターにて NAT 実施(ALT 高値、検査不合格検体は除く)

#### 2. HEV-RNA 陽性献血者の内訳

別添

## 2. HEV-RNA陽性者の内訳

No.	採血日	年齢	性別	ALT (IU/L)	HEV抗体		HEV RNA	問診 該当 ※1	喫食歴調査		経過 対象 供給製剤	受血者情報
					IgM	IgG			肉の種類	食べ方		
1	2005/01/04	32	M	57	-	-	+	無	不明レバー	生	無	
2	2005/02/07	38	F	11	-	-	+	無	ブタレバー	生	無	
3	2005/02/13	41	M	103	-	-	+	無	回答なし		無	
4	2005/03/25	65	F	17	-	-	+	無	回答なし		無	
5	2005/03/27	26	M	38	-	-	+	有	不明レバー(問診時)	生	有	赤血球製剤破損のため院内廃棄
6	2005/04/10	54	F	20	-	-	+	無	ウシ精肉	半生	無	
7	2005/04/15	59	F	16	-	-	+	無	ブタホルモン、シカ精肉	十分加熱	無	
8	2005/04/15	35	F	16	-	-	+	無	シカ精肉、ウシ精肉 ウシレバー、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	無	
9	2005/04/20	25	M	24	+	+	+	無	ウシレバー、ウシ精肉 ウシホルモン、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	有	感染なし
10	2005/04/28	22	M	44	-	-	+	無	回答なし		無	
11	2005/06/07	42	M	24	+	+	+	無	ウシ精肉 ウシホルモン、ブタ精肉、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	有	原疾患により死亡
12	2005/06/22	51	M	52	-	-	+	無	回答なし		無	
13	2005/07/03	58	M	219	+	+	+	無	不明レバー、ブタ精肉	十分加熱	無	
14	2005/07/05	22	M	23	+	-	+	無	回答なし		無	
15	2005/07/05	38	M	15	-	-	+	無	ブタホルモン、ウシ精肉、ブタ精肉	半生	無	
16	2005/07/13	24	M	19	-	-	+	無	ウシレバー	生	有	原疾患により死亡
17	2005/09/02	33	M	49	-	-	+	無	ウシ精肉 ヒツジ精肉 ブタホルモン、ブタ精肉	生 半生 十分加熱	無	
18	2005/09/01	29	F	100	+	+	+	無	ウシホルモン、ヒツジ精肉 ウシレバー、ウシ精肉、ブタ精肉	半生 十分加熱	無	
19	2005/09/20	42	M	31	-	-	+	無	ブタホルモン、不明レバー、ヒツジ精肉	十分加熱	有	HEV感染(H17.11.1 運営委員会報告済み)
20	2005/09/27	20	F	10	-	-	+	無	ウシ精肉、ブタホルモン、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
21	2005/10/21	41	M	12	-	-	+	無	回答なし		無	
22	2005/10/25	44	F	38	+	+	+	無	ウシ精肉、ブタ精肉	十分加熱	無	
23	2005/11/07	30	F	21	-	-	+	無	ブタホルモン、ウシ精肉、ヒツジ精肉 ブタホルモン、ウシ精肉、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	無	
24	2005/11/07	31	F	12	+	+	+	有	ブタレバー、ブタホルモン、ウシ精肉	十分加熱	無	
25	2005/11/20	28	M	47	+	+	+	有	ウシレバー、ウマ精肉 ブタホルモン、ウシ精肉、ブタ精肉	生 十分加熱	無	
26	2005/11/29	35	F	333	+	+	+	有	回答なし		無	
27	2005/12/13	42	M	30	-	-	+	有	ウシ精肉、ヒツジ精肉 不明レバー、ブタ精肉	半生 十分加熱	有	原疾患により死亡
28	2005/12/13	30	M	11	-	-	+	有	不明レバー	十分加熱	有	HEV感染(H18.01.26 運営委員会報告済み)
29	2005/12/22	62	F	14	-	-	+	無	回答なし		無	
30	2005/12/27	42	F	14	-	-	+	無	回答なし		無	

No.	採血日	年齢	性別	ALT (IU/L)	HEV抗体		HEV RNA	問診 該当 ※1	喫食歴調査		遊及対象 供給製剤	受血者情報
					IgM	IgG			肉の種類	食べ方		
31	2006/01/02	22	F	12	-	-	+	有	ウシレバー、ウシ精肉	十分加熱	無	
32	2006/01/06	68	M	23	-	-	+	無	ウシレバー、ブタホルモン、ヒツジ精肉	半生	無	
33	2006/01/13	36	M	42	-	-	+	無	ウマ精肉、不明レバー ウシ精肉、ヒツジ精肉、 ウシレバー、ブタ精肉、ブタホルモン	生 半生 十分加熱	無	
34	2006/01/18	53	M	238	+	+	+	有	ウシレバー、ウシホルモン	十分加熱	無	
35	2006/01/13	31	M	43	-	-	+	有	不明レバー ブタ精肉、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	無	
36	2006/01/17	48	M	25	-	-	+	無	回答なし		無	
37	2006/01/25	52	M	25	-	-	+	無	不明レバー、ヒツジ精肉	十分加熱	有	輸血後89日現在、HEVマーカーの陽転は見られず追跡調査終了
38	2006/01/30	39	F	22	-	-	+	無	回答なし		無	
39	2006/01/30	25	M	32	-	-	+	有	ウシ精肉、ウシホルモン、ブタ精肉	十分加熱	無	
40	2006/02/02	39	F	35	-	+	+	有	ウシレバー ウシレバー ヒツジ精肉	生 半生 十分加熱	無	
41	2006/02/07	57	M	13	-	-	+	無	不明	不明	無	
42	2006/02/07	40	F	172	+	+	+	無	ウシ精肉	十分加熱	無	
43	2006/02/17	39	M	28	-	-	+	無	ブタホルモン、ブタレバー、ブタガツ、ヒツジ精肉 イノシシ精肉、ブタ精肉	半生 十分加熱	無	
44	2006/02/20	58	M	22	-	-	+	無	ヒツジ精肉	十分加熱	無	
45	2006/02/21	45	M	30	-	-	+	無	ウシ精肉 ブタ精肉、ブタレバー、ヒツジ精肉	半生 十分加熱	無	
46	2006/03/01	46	F	15	-	-	+	無	回答なし		無	
47	2006/03/01	50	F	29	-	-	+	無	回答なし		無	
48	2006/03/02	54	M	47	+	+	+	無	ウシ・ブタ(精肉、レバー、ホルモン)、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
49	2006/03/27	40	F	12	-	-	+	無	回答なし		無	
50	2006/04/01	31	F	16	-	-	+		ヒツジ精肉	半生	無	
51	2006/04/04	30	F	14	-	-	+		ブタ精肉、不明レバー	十分加熱	無	
52	2006/04/12	38	M	45	+	+	+		ブタレバー、ウシ精肉、ブタ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
53	2006/04/18	21	M	26	-	-	+		ウシ精肉、ウシホルモン ウシ精肉、ウシホルモン	半生 十分加熱	無	
54	2006/04/22	28	M	14	+	+	+		回答なし		無	
55	2006/04/26	46	M	19	-	-	+		ブタレバー	半生	無	
56	2006/05/18	62	M	27	-	-	+		ヒツジレバー	十分加熱	無	
57	2006/07/07	17	M	33	-	-	+		回答なし		無	
58	2006/07/11	34	F	10	-	-	+		回答なし		無	
59	2006/07/12	21	F	27	-	-	+		回答なし		無	
60	2006/07/22	49	M	46	+	-	+		ウシ精肉、ブタ精肉、ブタホルモン、ブタレバー	十分加熱	無	



No.	採血日	年齢	性別	ALT (IU/L)	HEV抗体		HEV RNA	問診 該当 ※1	喫食歴調査		遊及対象 供給製剤	受血者情報
					IgM	IgG			肉の種類	食べ方		
61	2006/08/01	62	M	18	-	-	+	/	ブタホルモン、ウシ精肉、ブタ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
62	2006/09/06	44	F	14	-	-	+	/	喫食歴なし		無	
63	2006/09/29	68	M	15	-	-	+	/	ブタ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
64	2006/10/21	29	M	22	-	-	+	/	不明		無	
65	2006/11/19	48	M	58	-	-	+	/	ウシ精肉、ブタ精肉	十分加熱	無	
66	2006/11/23	54	M	18	-	-	+	/	回答なし		無	
67	2006/12/01	43	M	55	-	+	+	/	ブタ精肉	十分加熱	無	
68	2006/12/04	60	M	46	+	+	+	/	ウシ精肉	十分加熱	無	
69	2006/12/04	47	M	40	+	+	+	/	ウシ精肉、ウシホルモン	十分加熱	無	
70	2007/03/01	33	M	41	-	-	+	/	ウシレバー	生	無	
71	2007/03/15	42	M	32	-	+	+	/	ブタレバー、ブタホルモン	半生	無	
72	2007/03/27	55	M	30	-	-	+	/	不明レバー	十分加熱	無	
73	2007/04/07	22	F	9	-	-	+	/	ユッケ ウシホルモン、ヒツジホルモン	生 十分加熱	無	
74	2007/05/16	47	F	15	-	-	+	/	ヒツジ精肉、ブタホルモン	十分加熱	無	
75	2007/05/18	40	F	27	+	+	+	/	ブタ生ハム(自家製)	半生	無	
76	2007/05/30	33	M	26	-	+	+	/	ヒツジ精肉、ブタホルモン	十分加熱	無	
77	2007/06/22	38	M	20	-	-	+	/	ウシ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
78	2007/06/25	45	M	37	+	+	+	/	ブタ精肉 ヒツジ精肉	十分加熱 半生	無	
79	2007/06/27	37	M	18	-	-	+	/	ブタ精肉	十分加熱	無	
80	2007/07/24	57	M	24	-	-	+	/	喫食歴なし		無	
81	2007/07/29	37	M	48	-	-	+	/	不明レバー、ブタホルモン 不明レバー、ブタホルモン	十分加熱 半生	無	
82	2007/07/31	48	M	30	-	-	+	/	ブタ精肉、ブタホルモン、ブタレバー	十分加熱	無	
83	2007/08/01	48	M	33	-	-	+	/	ブタ精肉 ウシ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱 半生	無	
84	2007/08/04	53	M	28	-	-	+	/	ヒツジ精肉 ヒツジ精肉	十分加熱 半生	無	
85	2007/08/26	50	M	60	-	-	+	/	ヒツジ精肉 ウシ精肉	十分加熱 生	無	
86	2007/09/05	41	M	29	-	-	+	/	喫食歴なし		無	
87	2007/09/18	41	M	23	-	-	+	/	ウシ精肉、ブタ精肉、ウシホルモン、ブタホルモン	半生	無	
88	2007/09/21	57	M	19	-	-	+	/	ブタホルモン	十分加熱	無	
89	2007/10/03	59	M	39	-	-	+	/	ブタレバー、ブタ精肉	十分加熱	無	
90	2007/10/03	19	M	40	-	-	+	/	喫食歴なし		無	

No.	採血日	年齢	性別	ALT (IU/L)	HEV抗体		HEV RNA	問診 該当 ※1	喫食歴調査		遊及対象 供給製剤	受血者情報
					IgM	IgG			肉の種類	食べ方		
91	2007/10/09	35	M	19	-	-	+	/	ブタ精肉	十分加熱	無	
92	2007/10/18	30	M	31	-	-	+	/	ウシ精肉、ブタ精肉、ヒツジ精肉	十分加熱	無	
93	2007/11/16	24	M	5	-	-	+	/	不明		無	
94	2007/11/16	54	M	22	-	+	+	/	ブタホルモン、ブタレバー	十分加熱	無	
95	2007/11/16	45	M	47	-	-	+	/	ブタ精肉 ブタレバー	十分加熱 半生	無	
96	2007/11/19	58	M	13	-	-	+	/	レバー、ホルモン	不明	無	
97	2007/11/19	24	M	46	-	-	+	/	不明		無	
98	2007/11/24	36	M	25	-	-	+	/	不明		無	
99	2007/11/29	42	M	21	-	+	+	/	不明		無	
100	2007/11/30	31	M	42	+	+	+	/	レバー	不明	無	
101	2008/01/08	35	M	36	-	-	+	/	ウシ精肉、ブタ精肉	十分加熱	無	
102	2008/01/17	48	F	13	+	+	+	/	ブタホルモン、シカ精肉 ウシ精肉	十分加熱 半生	無	
103	2008/01/29	57	M	22	-	-	+	/	ブタレバー、ブタホルモン	十分加熱	無	
104	2008/02/04	31	M	47	+	+	+	/	不明		無	
105	2008/02/06	57	M	20	-	-	+	/	ブタホルモン	十分加熱	無	
106	2008/02/13	42	M	35	-	-	+	/	不明レバー	十分加熱	無	
107	2008/02/13	60	M	37	+	+	+	/	不明		無	
108	2008/03/11	30	M	21	-	-	+	/	不明		無	
109	2008/03/25	34	F	26	-	-	+	/	喫食歴なし		無	
110	2008/03/26	32	M	41	+	+	+	/	ブタ精肉、ウシ精肉	十分加熱	無	
111	2008/03/29	54	M	26	-	-	+	/	ブタ精肉	十分加熱	無	
112	2008/03/30	19	F	9	-	-	+	/	不明レバー	十分加熱	無	

※1. 問診喫食歴調査内容  
05年1月1日～05年10月31日：「過去3ヶ月以内にブタ、シカ、イノシシあるいは動物種不明の生肉、生レバーの喫食歴」  
05年11月1日～06年03月31日：「過去3ヶ月以内に生肉（半生も含む）、レバー、ホルモン（動物種、焼き方を問わず）の喫食歴」、なお本調査は06年03月31日をもって終了

# 安全対策業務の流れ

