

	一般的名称	報告の概要
344	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン	本剤の単独接種または本剤を含む複数ワクチンの同時接種を受けた新生児98例を対象とした接種後3日間の心肺機能及びC-反応性蛋白値測定において、心肺疾患事象およびC-反応性蛋白値異常が認められた。
345	レボホリナートカルシウム	進行性胃癌患者141例を対象とした高用量フルオロウラシルレジメン、高用量フルオロウラシル/葉酸併用レジメン、高用量フルオロウラシル/葉酸/シスプラチン併用レジメンと比較するランダム化Phase II 試験において、高用量フルオロウラシル/葉酸/シスプラチン併用レジメンにおいて、1例が胃内容物の誤嚥による両側性肺炎により死亡した。
346	レボホリナートカルシウム	予後不良進行結腸直腸癌患者2135例を対象としたランダム化臨床試験(MRC FOCUS試験)において、24例が死亡した。
347	レボホリナートカルシウム	転移性結腸直腸癌患者54例を対象としたフルオロウラシル/ロイコボリン療法とirinotecan併用療法を検討するPhase II 試験において、1例が消化器毒性とGrade4の好中球減少症を伴う肺水腫により死亡した。
348	塩酸メトホルミン	長期治療を受けている2型糖尿病患者1493例を対象としたレトロスペクティブ研究において、メトホルミン非服用者と比較してメトホルミン服用者では腎機能低下のリスクが高いことが示唆された。
349	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	ベバシズマブ投与後に肺高血圧症を発現した症例が全世界で8例報告された。
350	イトラコナゾール	肺移植後患者17例を対象とした単施設プロスペクティブコントロール研究において、吸入フルチカゾンとイトラコナゾール併用試験を行ったところ、イトラコナゾール非併用群と比較してイトラコナゾール併用群で有意にフルチカゾンの血中濃度が増加した。
351	塩酸ベラパミル	12人の健康な被験者においてベラパミルとテジサミルを併用すると、QT延長やPR間隔延長が起こることが示唆された。
352	シンバスタチン	in vitro及び臨床試験において、ラノラジンとHMG-CoA還元酵素阻害剤を併用した場合、HMG-CoA還元酵素阻害剤のIC50が減少し、臨床試験においてはシンバスタチンのAUC増加が起こることが示唆された。
353	プロポフォール	心房細動の患者で、長時間のプロポフォールの投与下で非外科的高周波カテーテルアブレーションをうけた場合、代謝性アシドーシスの発症リスクが高まることが示唆された。
354	メトレキサート	急性リンパ性白血病患者を対象としたメトレキサート髄腔内投与において、重篤な神経毒性が発現した。
355	メトレキサート	病理学的にステージIIと診断された男性乳癌患者31例を対象としたプロスペクティブ研究において、治療により1例が死亡し、7例に二次がんが認められた。
356	エストラジオール	閉経後ホルモン補充療法(HRT)を行っている患者において、経口避妊薬の過去の前使用者は非使用者よりも乳癌発症のリスクが高まることが示唆された。
357	オメプラゾール	プロトンポンプ阻害剤の使用により、市中肺炎発症リスクが上昇し、中でも使用開始直後はリスク上昇率が高いことが示唆された。
358	硫酸マグネシウム・ブドウ糖	妊娠高血圧ラットに硫酸マグネシウムを妊娠10日-20日に連続投与したところ、胎仔の心臓形成異常が見られた。