

## D P Cにおける高額な新規の医薬品等への対応について

- 1 新規に薬価収載された医薬品等については、D P Cにおける診療報酬点数に反映されないことから、以下の基準に該当する医薬品等を使用した患者については、包括評価の対象外とし、出来高算定することとしている。

前年度に使用実績のない医薬品等については、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費（併用する医薬品も含む）の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の平均+1SDを超えること。

- 2 効能追加の薬事承認がなされた医薬品のうち、献血グロベニン-I-ニチャク（乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射用）については、新規に追加された効能である「天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分な場合）」に対して使用した場合は、この基準に該当するため、当該効能に対して本剤を使用した患者については、出来高算定することとする。

### <参考>

献血グロベニン-I-ニチャク（乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射用）

- ・ 追加となった効能・効果：  
天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分な場合）
- ・ 用法・用量：1日に400mg/kgを5日間連日点滴静注
- ・ 薬価：

500mg10mL1瓶（溶解液付）	6,091円
2.5g50mL1瓶（溶解液付）	27,312円
5g100mL1瓶（溶解液付）	53,907円
- ・ 標準的な費用：  
 $400\text{mg/kg} \times 50\text{kg} = 20,000\text{mg} (20\text{g}) = 5\text{g製剤 } 4\text{バイアル}$   
 $5\text{g製剤 } 4\text{バイアル} \times 53,907\text{円}/1\text{バイアル} \times 5\text{日間}$   
= 約108万円
- ・ 当該医薬品を使用するD P Cでの診断群分類：  
MDC108 皮膚・皮下組織の疾患  
(分類080110xxxx0xx)
- ・ 当該医薬品を使用していない症例の薬剤費（平均+1SD）：  
35,067点