

(2) 患者特性調査から算出可能なQI項目と算出方法〔再掲〕

項目名	分子	分母 (記載の無い場合は入院14日以内の患者を除く全患者)
痛み	中程度の痛みが毎日あるか、耐え難い痛みがある	
褥瘡ハイリスク	I度以上の褥瘡がある患者数	寝返りか移乗の広範な障害、昏睡状態、栄養障害のいずれかに該当する患者に限る
褥瘡ローリスク	I度以上の褥瘡がある患者数	褥瘡ハイリスクに該当する患者を除外
身体抑制	毎日身体抑制している	
留置カテーテル	留置カテーテルを挿入している	
尿路感染症	尿路感染症である	
ADLの低下①	過去90日間におけるADL自立度の悪化	在院日数90日以上 of 患者のうち、昏睡・末期・緩和ケアに該当する患者を除外
ADLの低下②	入院時と比較してのADL自立度の悪化	在院日数15日以上90日未満 of 患者のうち、昏睡・末期・緩和ケアに該当する患者を除外

【患者特性調査からのQI算出結果】

QI項目	病院数	分母の患者数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	平均+2標準偏差
痛み	50	2,226	6.0%	6.8%	0.0%	26.9%	19.5%
褥瘡ハイリスク	48	1,681	16.0%	11.3%	0.0%	62.5%	38.6%
褥瘡ローリスク	48	658	6.7%	11.1%	0.0%	50.0%	28.9%
尿路感染	50	2,226	7.4%	15.1%	0.0%	93.9%	37.6%
ADLの低下①	50	1,769	8.5%	10.8%	0.0%	60.0%	30.0%
ADLの低下②	46	392	8.1%	12.4%	0.0%	50.0%	33.0%