


妊娠回避

- ・1日1回、就寝前にコップ1杯程度の水又はぬるま湯で服用してください。
- ・服用し忘れても、絶対に2回分を1度に服用しないでください。
- ・服用し忘れてお薬は、カプセルシート内に残した状態で、次回診察時にご持参ください。



このカプセルシート内のお薬をカプセルシートから出して保管しないでください。
このカプセルシート内のお薬服用期間中に、カプセルシートを切り離さないでください。

服用状況：サレド[®]カプセル100

服用の日付と曜日を全てご記入ください。

服用したお薬のカプセル数をご記入ください。

体調の変化や何か気になること、また服用しなかった場合にはその理由等をご記入ください。

日付・曜日	服用数量	コメント
/ ()	個	
/ ()	個	
/ ()	個	
/ ()	個	
/ ()	個	
/ ()	個	
/ ()	個	

次回診察時に、このカプセルシートを提示してください。
医療機関から服用状況欄を受け取り保存してください。

服用における注意事項

『催奇形性』についてのご注意

- ・このお薬は**催奇形性**があり、妊娠中に服用すると胎児に重大な障害を引き起こす可能性があります。
妊娠している女性又は妊娠している可能性のある女性は、絶対に服用しないでください。
- ・このお薬を服用中の男性患者さんは、妊婦との性交渉をしないでください。
- ・確実な妊娠回避の方法は性交渉をしないことですが、性交渉する場合、妊娠回避の必要な女性患者さん及び男性パートナーの方は**避妊を徹底**してください。
また、男性患者さんが性交渉を行う場合は**必ずコンドーム**を使用してください。
- ・妊娠回避の必要な女性患者さんは、必ず処方前に**妊娠検査**を受けてください。
- ・このお薬の服用中および服用中止8週間後までは授乳、精子、精液の提供をしないでください。
- ・献血しないでください。

『眠気』についてのご注意

- ・このお薬は眠気が問題となる場所での服用を避け、適切な医師の助言なしに眠気の原因となる他のお薬と一緒に服用しないでください。
- ・アルコールによって眠気が増強する可能性があるため、このお薬と一緒にアルコールを飲まないでください。
- ・このお薬の服用中は車の運転や複雑な機械類を動かす等の行為をしないでください。

『お薬の取り扱い』についてのご注意

- ・このお薬は、子供の手の届かない専用の場所に保管し、他のお薬や飲食物とは別の場所で保管してください。
- ・このお薬を他の人と共有したり、他の人へ譲り渡したりしないでください。
- ・不要になったお薬は**捨てず**に調剤された医療機関の薬剤師まで**返却**してください。