



⑤ 原因疾患別にみたリハビリテーションの実施状況


・原因疾患別にみた入棟日の翌週 1 週間の理学療法の実施単位数 (図表 4-24)




・原因疾患別にみた入棟日の翌週 1 週間の作業療法の実施単位数 (図表 4-25)




・原因疾患別にみた入棟日の翌週 1 週間の言語療法の実施単位数 (図表 4-26)




・原因疾患別にみた退棟日の前週1週間の理学療法の実施単位数(図表4-27)



・原因疾患別にみた退棟日の前週1週間の作業療法の実施単位数(図表4-28)




・原因疾患別にみた退棟日の前週1週間の言語療法の実施単位数(図表4-29)




■ 退棟時の状況

① 在棟日数

・ 在棟日数（図表 4-30）




・ 原因疾患別にみた在棟日数（図表 4-31）




【大腿骨等の骨折、多発骨折】


【入院料 1 (加算有り)】
平均 56.9 日



【入院料 1 (加算無し)】
平均 56.5 日




【入院料 2】
平均 52.9 日




【廃用症候群】


【入院料 1 (加算有り)】
平均 57.4 日



【入院料 1 (加算無し)】
平均 54.7 日



【入院料 2】
平均 53.9 日



② 日常生活機能評価の改善状況


・日常生活機能評価の改善状況（図表 4-32）

【入院料 1（加算有り）】

⇒ 退棟時における日常生活機能評価：入棟時と比べて平均 2.7 点改善

入棟時と比べて 1 点以上改善した患者の割合 73.0%

入棟時に 10 点以上だった患者のうち、退棟時に 3 点以上改善した患者の割合 60.8%



【入院料 1（加算無し）】

退棟時における日常生活機能評価：入棟時と比べて平均 2.6 点改善

入棟時と比べて 1 点以上改善した患者の割合 73.4%

入棟時に 10 点以上だった患者のうち、退棟時に 3 点以上改善した患者の割合 59.3%

