

図表 71 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況（TDS 点数別）

	総数	4週間 禁煙	1週間 禁煙	失敗	無回答
全体	1,231 100.0%	966 78.5%	69 5.6%	185 15.0%	11 0.9%
5点	105 100.0%	90 85.7%	5 4.8%	8 7.6%	2 1.9%
6点	168 100.0%	135 80.4%	8 4.8%	25 14.9%	0 0.0%
7点	201 100.0%	162 80.6%	7 3.5%	29 14.4%	3 1.5%
8点	295 100.0%	230 78.0%	18 6.1%	44 14.9%	3 1.0%
9点	274 100.0%	200 73.0%	22 8.0%	51 18.6%	1 0.4%
10点	153 100.0%	120 78.4%	9 5.9%	22 14.4%	2 1.3%

図表 72 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況（合併症の状況別）

		総数	4週間 禁煙	1週間 禁煙	失敗	無回答
全体		1,231 100.0%	966 78.5%	69 5.6%	185 15.0%	11 0.9%
合併症有無	あり	706 100.0%	546 77.3%	45 6.4%	113 16.0%	2 0.3%
	なし	508 100.0%	408 80.3%	23 4.5%	70 13.8%	7 1.4%
合併症の内容	高血圧	298 100.0%	232 77.9%	20 6.7%	45 15.1%	1 0.3%
	脂質異常	172 100.0%	135 78.5%	9 5.2%	28 16.3%	0 0.0%
	糖尿病	142 100.0%	112 78.9%	8 5.6%	21 14.8%	1 0.7%
	脳卒中	25 100.0%	23 92.0%	0 0.0%	2 8.0%	0 0.0%
	心臓病	112 100.0%	87 77.7%	4 3.6%	21 18.8%	0 0.0%
	悪性新生物	26 100.0%	18 69.2%	3 11.5%	5 19.2%	0 0.0%
	呼吸器疾患	134 100.0%	100 74.6%	10 7.5%	22 16.4%	2 1.5%
	消化器疾患	98 100.0%	80 81.6%	5 5.1%	13 13.3%	0 0.0%
	精神疾患	70 100.0%	45 64.3%	8 11.4%	17 24.3%	0 0.0%
	その他	144 100.0%	115 79.9%	4 2.8%	25 17.4%	0 0.0%

図表 73 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況
(保険適用中の禁煙補助剤の使用状況別)

	総数	4週間 禁煙	1週間 禁煙	失敗	無回答
全体	1,231 100.0%	966 78.5%	69 5.6%	185 15.0%	11 0.9%
ニコチンパッチのみ	364 100.0%	280 76.9%	19 5.2%	63 17.3%	2 0.5%
バレニクリンのみ	718 100.0%	568 79.1%	42 5.8%	102 14.2%	6 0.8%
ニコチンパッチ・バレニクリン	18 100.0%	14 77.8%	1 5.6%	3 16.7%	0 0.0%
ニコチンパッチとニコチンガムの併用	10 100.0%	5 50.0%	1 10.0%	4 40.0%	0 0.0%
その他	73 100.0%	57 78.1%	5 6.8%	8 11.0%	3 4.1%
いずれも使用せず	32 100.0%	29 90.6%	1 3.1%	2 6.3%	0 0.0%

(注)「ニコチンパッチ・バレニクリン」とは、一方から他方へ切り替えて使用した場合。

図表 74 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況
(治療を受けた施設種別別)

	総数	4週間 禁煙	1週間 禁煙	失敗	無回答
全体	1,231 100.0%	966 78.5%	69 5.6%	185 15.0%	11 0.9%
病院	364 100.0%	290 79.7%	19 5.2%	51 14.0%	4 1.1%
診療所	867 100.0%	676 78.0%	50 5.8%	134 15.5%	7 0.8%

図表 75 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況
(治療を受けた施設の禁煙治療体制別)

	総数	4週間 禁煙	1週間 禁煙	失敗	無回答
全体	1,231 100.0%	966 78.5%	69 5.6%	185 15.0%	11 0.9%
専門外来設置等、 特別体制で実施	289 100.0%	237 82.0%	14 4.8%	36 12.5%	2 0.7%
通常の診療体制の 中で治療を実施	788 100.0%	609 77.3%	50 6.3%	121 15.4%	8 1.0%
特別体制と通常診 療の両方	150 100.0%	117 78.0%	4 2.7%	28 18.7%	1 0.7%
その他	4 100.0%	3 75.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%

図表 76 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況
(治療を受けた施設における禁煙指導の実施者別)

	総数	4週間 禁煙	1週間 禁煙	失敗	無回答
全体	1,231 100.0%	966 78.5%	69 5.6%	185 15.0%	11 0.9%
医師のみで行って いる	313 100.0%	255 81.5%	18 5.8%	38 12.1%	2 0.6%
医師に加えて他の 医療職種も指導	918 100.0%	711 77.5%	51 5.6%	147 16.0%	9 1.0%

図表 77 5回の指導を終了した患者の指導終了時の状況
(治療を受けた施設における禁煙治療内容別)

	総数	4週間 禁煙	1週間 禁煙	失敗	無回答
全体	1,231 100.0%	966 78.5%	69 5.6%	185 15.0%	11 0.9%
標準手順書に従った 禁煙治療を実施	1,015 100.0%	781 76.9%	61 6.0%	164 16.2%	9 0.9%
標準手順書に加え て独自治療を実施	199 100.0%	171 85.9%	8 4.0%	18 9.0%	2 1.0%
その他	2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

3) 5回の指導を途中で中止した患者の中止時の状況

図表 78 ニコチン依存症指導中止時の状況

