

Fig. 1 Body weight changes of male rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test




Fig. 2 Body weight changes of female rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test




Fig. 3 Food consumption of male rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test




Fig. 4 Food consumption of female rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Table 1 Hematological examination in male rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose (mg/kg/day)	0	2.5	10	40	160
No. of animals	12	12	12	12	12
RBC ($\times 10^4/\text{mm}^3$)	838 \pm 31	849 \pm 31	832 \pm 29	851 \pm 45	844 \pm 32
Hb (g/dl)	16.3 \pm 0.5	16.1 \pm 0.3	16.2 \pm 0.4	16.1 \pm 0.4	16.5 \pm 0.3
Ht (%)	47 \pm 2	47 \pm 1	46 \pm 2	47 \pm 2	48 \pm 1
MCV (μ^3)	55.6 \pm 1.5	54.9 \pm 1.2	55.8 \pm 0.9	55.0 \pm 1.6	57.1 \pm 1.3*
MCH (pg)	19.4 \pm 0.6	19.0 \pm 0.6	19.5 \pm 0.4	19.0 \pm 0.7	19.5 \pm 0.5
MCHC (%)	34.9 \pm 0.4	34.7 \pm 0.7	34.9 \pm 0.6	34.5 \pm 0.5	34.2 \pm 0.4**
Reticulocyte (%)	21 \pm 5	22 \pm 4	22 \pm 4	20 \pm 4	25 \pm 4
Platelet ($\times 10^4/\text{mm}^3$)	118.2 \pm 11.8	113.5 \pm 10.7	117.8 \pm 10.7	117.0 \pm 11.1	108.2 \pm 8.4
PT (sec.)	12.4 \pm 0.9	12.5 \pm 1.2	12.4 \pm 0.6	12.5 \pm 0.7	14.3 \pm 1.7**
APTT (sec.)	19.2 \pm 1.2	18.7 \pm 1.0	18.8 \pm 0.9	19.5 \pm 2.0	20.4 \pm 1.6
Fibrinogen (mg/dl)	241 \pm 27	262 \pm 27	247 \pm 19	250 \pm 16	245 \pm 21
WBC ($\times 10^2/\text{mm}^3$)	100 \pm 17	109 \pm 29	111 \pm 31	106 \pm 35	112 \pm 24
Differential leucocyte counts (%)					
Lymphocytes	88.0 \pm 4.3	85.2 \pm 5.8	87.5 \pm 4.5	88.5 \pm 4.4	86.8 \pm 8.3
Stab	0.0 \pm 0.1	0.0 \pm 0.1	0.0 \pm 0.0	0.0 \pm 0.0	0.0 \pm 0.0
Segmented	10.8 \pm 4.1	14.0 \pm 5.4	11.6 \pm 4.4	10.8 \pm 3.8	12.4 \pm 7.8
Eosinophils	0.6 \pm 0.5	0.3 \pm 0.5	0.3 \pm 0.3	0.3 \pm 0.3	0.5 \pm 0.7
Basophils	0.0 \pm 0.0	0.0 \pm 0.0	0.0 \pm 0.0	0.0 \pm 0.0	0.0 \pm 0.0
Monocytes	0.7 \pm 0.4	0.5 \pm 0.7	0.5 \pm 0.4	0.5 \pm 0.8	0.3 \pm 0.4
Others	0.0 \pm 0.0	0.0 \pm 0.0	0.0 \pm 0.0	0.0 \pm 0.0	0.0 \pm 0.0

Values are expressed as Mean \pm S.D.

Significantly different from the control group; *:P<0.05. **:P<0.01

Table 2 Blood chemical examination in male rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose (mg/kg/day)	0	2.5	10	40	160
No. of animals	12	12	12	12	12
GOT (IU/l)	60 \pm 7	56 \pm 7	53 \pm 9	59 \pm 9	59 \pm 10
GPT (IU/l)	42 \pm 8	38 \pm 3	39 \pm 5	42 \pm 4	44 \pm 4
LDH (IU/l)	41 \pm 23	42 \pm 25	38 \pm 12	34 \pm 13	38 \pm 13
ALP (IU/l)	209 \pm 48	219 \pm 36	202 \pm 57	214 \pm 51	230 \pm 40
Total chol. (mg/dl)	56 \pm 8	54 \pm 7	58 \pm 11	51 \pm 9	49 \pm 9
TG (mg/dl)	97 \pm 37	91 \pm 40	87 \pm 31	89 \pm 34	96 \pm 43
PL (mg/dl)	105 \pm 13	104 \pm 12	105 \pm 13	99 \pm 14	100 \pm 14
Total bilirubin (mg/dl)	0.13 \pm 0.02	0.13 \pm 0.03	0.13 \pm 0.03	0.14 \pm 0.03	0.14 \pm 0.03
Glucose (mg/dl)	114 \pm 8	119 \pm 9	114 \pm 9	115 \pm 12	105 \pm 11
BUN (mg/dl)	15 \pm 2	15 \pm 2	14 \pm 2	14 \pm 2	14 \pm 3
Creatinine (mg/dl)	0.65 \pm 0.06	0.66 \pm 0.03	0.65 \pm 0.06	0.64 \pm 0.03	0.68 \pm 0.07
Na (mEq/l)	141 \pm 1	142 \pm 1	141 \pm 1	141 \pm 1	141 \pm 1
K (mEq/l)	4.5 \pm 0.1	4.5 \pm 0.2	4.6 \pm 0.2	4.6 \pm 0.3	4.5 \pm 0.2
Cl (mEq/l)	113 \pm 1	114 \pm 1	113 \pm 1	113 \pm 1	112 \pm 1*
Ca (mg/dl)	9.3 \pm 0.2	9.2 \pm 0.2	9.1 \pm 0.3	9.2 \pm 0.3	9.3 \pm 0.2
P (mg/dl)	7.1 \pm 0.6	7.2 \pm 0.7	7.0 \pm 0.6	7.4 \pm 0.8	7.3 \pm 0.6
TP (g/dl)	6.4 \pm 0.2	6.3 \pm 0.3	6.4 \pm 0.2	6.3 \pm 0.3	6.1 \pm 0.3
A/G ratio	0.93 \pm 0.06	0.94 \pm 0.05	0.96 \pm 0.10	0.99 \pm 0.07	1.08 \pm 0.11**
Albumin (%)	48.0 \pm 1.6	48.3 \pm 1.4	48.9 \pm 2.6	49.7 \pm 1.8	51.9 \pm 2.5**
Globulin (%)					
α_1	22.9 \pm 1.5	22.6 \pm 2.3	22.4 \pm 1.9	21.9 \pm 3.1	22.1 \pm 2.7
α_2	4.8 \pm 1.0	5.1 \pm 1.8	4.7 \pm 1.8	4.6 \pm 1.6	4.4 \pm 1.4
β	18.0 \pm 1.5	17.9 \pm 1.2	17.8 \pm 1.4	18.0 \pm 1.7	16.8 \pm 0.9
γ	6.0 \pm 1.2	6.1 \pm 0.9	6.3 \pm 1.0	5.7 \pm 0.5	4.8 \pm 1.4*

Values are expressed as Mean \pm S.D.

Significantly different from the control group; *:P<0.05. **:P<0.01.

Table 3 Absolute and relative organ weights in male rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose (mg/kg/day)	0	2.5	10	40	160
No. of animals	12	12	12	12	12
Body weight (g)	502 ± 33	505 ± 35	503 ± 26	498 ± 23	511 ± 11
Absolute organ weight					
Thymus (mg)	333 ± 115	353 ± 103	334 ± 77	369 ± 99	352 ± 52
Heart (g)	1.49 ± 0.16	1.44 ± 0.11	1.43 ± 0.09	1.43 ± 0.12	1.46 ± 0.09
Liver (g)	14.12 ± 1.49	14.13 ± 1.48	14.12 ± 1.64	13.38 ± 1.03	13.77 ± 0.72
Spleen (mg)	769 ± 58	792 ± 94	799 ± 72	793 ± 124	762 ± 82
Kidney					
Right (g)	1.56 ± 0.14	1.57 ± 0.14	1.56 ± 0.09	1.61 ± 0.16	1.58 ± 0.13
Left (g)	1.55 ± 0.13	1.54 ± 0.15	1.54 ± 0.10	1.63 ± 0.17	1.61 ± 0.11
Testis					
Right (g)	1.73 ± 0.14	1.71 ± 0.12	1.73 ± 0.12	1.72 ± 0.12	1.67 ± 0.13
Left (g)	1.70 ± 0.14	1.70 ± 0.11	1.73 ± 0.13	1.80 ± 0.37	1.67 ± 0.11
Epididymis					
Right (mg)	658 ± 60	654 ± 57	659 ± 49	682 ± 59	645 ± 50
Left (mg)	661 ± 63	649 ± 55	672 ± 52	659 ± 62	627 ± 56
Relative organ weight					
Thymus (mg%)	67 ± 23	70 ± 21	66 ± 15	74 ± 21	69 ± 12
Heart (g%)	0.30 ± 0.02	0.28 ± 0.02	0.29 ± 0.02	0.29 ± 0.02	0.29 ± 0.02
Liver (g%)	2.81 ± 0.18	2.79 ± 0.14	2.80 ± 0.22	2.69 ± 0.16	2.70 ± 0.15
Spleen (mg%)	154 ± 12	157 ± 18	159 ± 19	159 ± 24	149 ± 19
Kidney					
Right (g%)	0.31 ± 0.03	0.31 ± 0.02	0.31 ± 0.01	0.32 ± 0.02	0.31 ± 0.03
Left (g%)	0.31 ± 0.02	0.31 ± 0.03	0.31 ± 0.01	0.33 ± 0.03	0.31 ± 0.03
Testis					
Right (g%)	0.35 ± 0.04	0.34 ± 0.03	0.34 ± 0.03	0.35 ± 0.03	0.33 ± 0.03
Left (g%)	0.34 ± 0.04	0.34 ± 0.03	0.35 ± 0.03	0.36 ± 0.07	0.33 ± 0.02
Epididymis					
Right (mg%)	132 ± 14	130 ± 18	131 ± 11	137 ± 12	126 ± 12
Left (mg%)	132 ± 14	129 ± 15	134 ± 10	133 ± 13	123 ± 12

Values are expressed as Mean ± S.D.

Table 4 Absolute and relative organ weights in female rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose (mg/kg/day)	0	2.5	10	40	160
No. of animals	12	12	12	10	9
Body weight (g)	340 ± 15	334 ± 13	343 ± 20	340 ± 17	346 ± 9
Absolute organ weight					
Thymus (mg)	241 ± 67	192 ± 60	282 ± 79	240 ± 49	188 ± 49
Heart (g)	1.07 ± 0.15	1.00 ± 0.10	1.03 ± 0.08	0.98 ± 0.05	1.00 ± 0.10
Liver (g)	13.28 ± 0.99	13.21 ± 0.75	12.97 ± 1.26	13.58 ± 1.15	15.36 ± 1.02**
Spleen (mg)	710 ± 75	677 ± 107	659 ± 83	648 ± 70	752 ± 77
Kidney					
Right (g)	1.03 ± 0.07	1.09 ± 0.12	1.03 ± 0.08	1.00 ± 0.06	1.01 ± 0.05
Left (g)	1.04 ± 0.07	1.07 ± 0.10	1.03 ± 0.08	1.00 ± 0.06	1.09 ± 0.27
Ovary					
Right (mg)	63 ± 9	62 ± 9	57 ± 11	54 ± 7	47 ± 7**
Left (mg)	55 ± 6	55 ± 5	54 ± 6	50 ± 5	47 ± 7
Relative organ weight					
Thymus (mg%)	71 ± 20	58 ± 17	82 ± 23	71 ± 13	54 ± 15
Heart (g%)	0.31 ± 0.05	0.30 ± 0.03	0.30 ± 0.04	0.29 ± 0.02	0.29 ± 0.03
Liver (g%)	3.91 ± 0.31	3.96 ± 0.22	3.79 ± 0.33	4.00 ± 0.31	4.43 ± 0.30**
Spleen (mg%)	209 ± 18	203 ± 31	193 ± 26	191 ± 19	217 ± 20
Kidney					
Right (g%)	0.31 ± 0.03	0.33 ± 0.03	0.30 ± 0.03	0.30 ± 0.02	0.29 ± 0.02
Left (g%)	0.31 ± 0.02	0.32 ± 0.03	0.30 ± 0.04	0.30 ± 0.02	0.32 ± 0.08
Ovary					
Right (mg%)	19 ± 3	19 ± 3	17 ± 3	16 ± 2	14 ± 2**
Left (mg%)	16 ± 2	16 ± 2	16 ± 2	15 ± 1	14 ± 2

Values are expressed as Mean ± S.D.

Significantly different from the control group; **:P<0.01

Table 5 Histopathological findings of male rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Organs	Dose (mg/kg/day)	0				2.5				10				40				160			
		No. of animals				No. of animals				No. of animals				No. of animals				No. of animals			
-findings	Grade	0	1	2	TE	0	1	2	TE	0	1	2	TE	0	1	2	TE	0	1	2	TE
Cerebrum		12			12				0				0				0	12			12
Cerebellum		12			12				0				0				0	12			12
Heart																					
-myocarditis/focal		10	2		12				0				0				0	8	4		12
Liver																					
-lipid droplet/cytoplasmic			8	4	12		7	5	12		8	4	12		1	11	12		6		6
Adrenal		12			12				0				0				0	12			12
Spleen		12			12				0				0				0	12			12
Kidney																					
-basophilic change/tubular epithelium/focal		11		1	12				0				0				0	12			12
Testis																					
-atrophy/tubular/focal/bilateral		11	1		12				0				0				0	12			12
Epididymis		12			12				0				0				0	12			12

0:No remarkable changes 1:Slight 2:Mild TE:Total Examine

Table 6 Histopathological findings of dams treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Organs	Dose (mg/kg/day)	0			2.5		10		40			40			160			160						
		Alive			Alive		Alive		Alive			Dead or Sacrificed			Alive			Dead or Sacrificed						
-findings	Grade	0	1	TE	0	TE	0	TE	0	1	TE	0	2	3	TE	0	1	TE	0	1	2	3	P	TE
Cerebrum		12	12		0		0		0			0			9	9	3						3	
Cerebellum		12	12		0		0		0			0			9	9	3						3	
Heart																								
-degeneration/myocardial		12	12		0		0		0			0			9	9	2				1		3	
Liver																								
-necrosis/centrilobular		12	12		12	12	12	12	10	10		1	1	2	9	9	3						3	
-deposit/glycogen		12	12		12	12	12	12	8	2	10	2		2	2	7	9	1			2			3
Adrenal																								
-hypertrophy/zona foveolata		12	12		0		0		0			1	1		9	9	3						3	
Spleen																								
-hematopoiesis/extramedullary/increased		8	4	12		0		0			0			0	6	3	9	3						3
Kidney																								
-necrosis/tubular epithelium		12	12		0		0		0					0	9	9	2			1			3	
Ovary		12	12		0		0		0					0	9	9	3						3	
Other gross lesion																								
-Thymus:atrophy			0		0		0		0			1	1		0	1							1	
:hemorrhage			0		0		0		0	1		1	1		0			1					1	
-Lung:congestion			0		0		0		0					0	0			1					1	
-Subcutaneous nodule:adenocarcinoma/ mammary gland			0		0		0		0					0	0							1	1	

0:No remarkable changes 1:Slight 2:Mild 3:Moderate P:Present^{a)} TE:Total Examine

a): "Present" is used when grading of severity was not done, such as case in the neoplastic lesion

Table 7 Summary of reproductive performance in rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose (mg/kg/day)	0	2.5	10	40	160
Estrus cycle (days, Mean \pm S.D.)	4.4 \pm 0.6	4.4 \pm 0.4	4.2 \pm 0.3	4.7 \pm 0.6	4.2 \pm 0.3
No. of pairs mated	12	12	12	12	12
No. of pairs copulated	12	12	12	12	12
No. of pregnant females	12	12	12	12	12
Copulation index (%) ^{a)}	100	100	100	100	100
Fertility index (%) ^{b)}	100	100	100	100	100

a): (No. of pairs with successful copulation/No. of pairs mated) \times 100b): (No. of pregnant animals/No. of pairs with successful copulation) \times 100

2) 分娩および哺育状態 (Table 8)

40 mg/kg 群の 1 例が妊娠 22 日の分娩途中で死亡した以外に分娩の異常は対照群および被験物質投与群のいずれにも観察されなかった。しかし、160 mg/kg 群では分娩途中の死亡例は認められないことから、40 mg/kg 群における死亡が分娩異常に起因したものであるとは考えられない。また、40 mg/kg 群の 1 例では妊娠 25 日においても分娩が観察されなかったため、剖検したところ着床痕が観察された。妊娠期間、黄体数、着床痕数、着床率、出産率および分娩率には対照群と被験物質投与群との間に有意な差は認められなかった。

哺育状況では、160 mg/kg 群において乳頭の未発達例が 2 例に観察され、全ての新生児が哺育 2 日あるいは 3 日に死亡した。その他には哺育状況の異常は認められなかった。性比、出生率および新生児生存率には対照群と被験物質投与群との間に有意な差は認められなかった。なお、哺育期間中の児の死亡は、160 mg/kg 群において多い傾向がみられたため、同群の哺育 4 日の平均生存児数が少なく、新生児生存率も低い傾向にあった。

3) 新生児の形態、体重および剖検所見 (Table 9)

生存児および死産児数の外表検査では、短軀および痕跡尾が対照群の死産児に 1 例、痕跡尾が 160 mg/kg 群の生存児に 1 例観察されたのみであった。哺育 0 日および 4 日の体重は、160 mg/kg 群において対照群に比べてわずかに低値を示す傾向にあったが、有意な差は認められなかった。40 mg/kg 以下の投与群における体重は対照群とほぼ同等の値であった。哺育 4 日の剖検では、いずれの例においても異常は認められなかった。

考察

1. 反復投与毒性

雄では、死亡例はなく、一般状態、体重、摂餌量、血液学検査値、血液生化学検査値、剖検所見および器官重量には被験物質投与の影響は認められなかった。なお、血液学検査において 160 mg/kg 群にプロトンピン時間の延長が認められたが、血液凝固系に関連する他の項目に変化が認められない単一項目における変化であった。また、本被験物質はラットおよびマウスにおいて低カルシウム血症を起こすことが報告²⁾されているが、本試験

では血液凝固因子の 1 つであるカルシウムの低下は認められなかった。これらのことから、この変化が被験物質投与による影響とは考えられない。病理組織学検査において被験物質投与に起因すると考えられる変化は肝臓で認められた。すなわち、対照群において観察される小葉周辺性脂肪化の程度およびその出現頻度が 40 mg/kg 以上の被験物質投与群で減少した。しかし、その機序は明らかではなかった。

雌では、40 mg/kg 群の 1 母体が妊娠 22 日の分娩途中で、160 mg/kg 群の 1 母体が妊娠 22 日に死亡した。死亡例の病理組織学検査において、死亡に直接関連すると考えられる共通した所見は両者には認められなかった。その他、一般状態、体重、摂餌量および剖検所見に被験物質投与の影響は認められなかった。器官重量では 160 mg/kg 群において肝臓の高値、卵巣の低値が認められたが、40 mg/kg 以下の被験物質投与群には対照群との間に有意な差は認められなかった。病理組織学検査において被験物質投与に起因すると考えられる変化は雄と同様に肝臓で認められたが、その変化は雄と異なっていた。すなわち、肝細胞内にグリコーゲン量の軽微な増加が 40 mg/kg 群の少数例、160 mg/kg 群の多数例に観察された。なお、40 および 160 mg/kg 群の肝臓においてヘマトキシリン・エオジン染色標本で肝細胞の細胞質が腫大淡明化し明るくぬけていたため、その性状を PAS 反応および唾液消化後 PAS 反応で検索したところ、細胞内に分布するグリコーゲンを反映するものと考えられた。

以上のことから、2-ヒドロキシベンズアルデヒドの反復投与により、160 mg/kg 群において雌の肝臓重量が高値を、卵巣重量が低値を示し、病理組織学検査では雌雄に相違はあるものの 40 mg/kg 以上の投与群において肝臓に変化が認められた。したがって、本試験条件下における 2-ヒドロキシベンズアルデヒドの一般毒性学的な無影響量は、雌雄ともに 10 mg/kg/day であると判断される。

2. 生殖発生毒性

雌の性周期、雌雄の交尾および受胎および雌の妊娠期間ならびに分娩に及ぼす被験物質投与の影響は認められなかった。哺育状況では、160 mg/kg 群において乳頭の未発達に起因すると考えられる全新生児の死亡例が 2 例認められた。しかし、乳頭の未発達と被験物質投与の影

Table 8 Delivery and litter data in female rats treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose (mg/kg/day)	0	2.5	10	40	160
No. of pregnant females	12	12	12	12	12
No. of females with live pups	12	12	12	10	11
Gestation index (%) ^{a)}	100	100	100	83.8	91.7
Gestation length (days, Mean±S.D.)	22.3 ± 0.5	22.3 ± 0.5	22.5 ± 0.7	22.5 ± 0.5	22.8 ± 0.4
No. of corpora lutea (Mean±S.D.)	248(20.7 ± 4.7)	257(21.4 ± 3.5)	226(18.8 ± 3.6)	198(19.8 ± 2.4)	214(19.5 ± 2.3)
No. of implantations (Mean±S.D.)	207(17.3 ± 3.1)	223(18.6 ± 2.6)	184(15.3 ± 4.8)	172(17.2 ± 1.7)	185(16.8 ± 2.0)
Implantation index (%) ^{b)}	83.5	86.8	81.4	86.9	86.4
No. of stillborn (Mean±S.D.)	2(0.2 ± 0.4)	4(0.3 ± 0.7)	0(0.0 ± 0.0)	2(0.2 ± 0.6)	7(0.6 ± 0.9)
No. of live born (Mean±S.D.)	183(15.3 ± 4.0)	208(17.3 ± 2.2)	165(13.8 ± 4.3)	152(15.2 ± 2.5)	152(13.8 ± 3.1)
Live birth index (%) ^{c)}	98.9	98.1	100	98.7	95.6
Delivery index (%) ^{d)}	89.4	95.1	89.7	89.5	85.9
No. of male pups (Mean±S.D.)	97(8.1 ± 3.2)	105(8.8 ± 2.4)	83(6.9 ± 3.1)	78(7.8 ± 2.7)	82(7.5 ± 2.2)
No. of female pups (Mean±S.D.)	86(7.2 ± 3.1)	103(8.6 ± 2.0)	82(6.8 ± 2.2)	74(7.4 ± 2.5)	70(6.4 ± 2.0)
Sex ratio ^{e)}	1.13	1.02	1.01	1.05	1.17
No. of pups					
Day 0 of lactation (Mean±S.D.)	183(15.3 ± 4.0)	208(17.3 ± 2.2)	165(13.8 ± 4.3)	152(15.2 ± 2.5)	151(13.7 ± 3.3)
Day 4 of lactation (Mean±S.D.)	179(14.9 ± 3.8)	203(16.9 ± 1.7)	163(13.6 ± 4.3)	151(15.1 ± 2.5)	125(11.4 ± 6.1)
Viability index (%) ^{f)}	97.8	97.6	98.8	99.3	82.8

a) : (No. of females with live pup/No. of pregnant females)×100

b) : (No. of implantations/No. of corpora lutea)×100

c) : (No. of live pups on day 0/No. of pups born)×100

d) : (No. of pups born/No. of implantations)×100

e) : (No. of males/No. of females)

f) : (No. of live pups on day 4/No. of live pups on day 0)×100

Table 9 Body weight of pups from dams treated orally with 2-hydroxybenzaldehyde in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose (mg/kg/day)	0	2.5	10	40	160
Day 0 of lactation					
Male	6.7 ± 0.6	6.4 ± 0.4	7.0 ± 0.6	6.9 ± 0.5	6.0 ± 0.5
Female	6.2 ± 0.5	6.0 ± 0.4	6.8 ± 0.6	6.5 ± 0.7	5.7 ± 0.5
Day 4 of lactation					
Male	10.5 ± 1.8	10.0 ± 1.1	11.2 ± 1.3	10.9 ± 1.2	9.7 ± 1.4
Female	10.0 ± 1.5	9.3 ± 1.0	11.2 ± 1.8	10.5 ± 1.5	9.0 ± 1.7

Values are expressed as Mean ± S.D.

響との関係については明らかではなかった。40 mg/kg以下の被験物質投与群には哺育の異常は認められなかった。新生児出産雌数、出産率、黄体数、着床痕数および着床率には被験物質投与の影響は認められなかった。

新生児に関して、生存児数、死産児数、性比、分娩率および出生率には被験物質投与の影響は認められなかった。また、新生児および死産児に被験物質投与に起因する外表面異常は認められなかった。哺育期間中の児の死亡は、対照群との間に有意な差は認められないものの160 mg/kg群において多い傾向がみられ、新生児生存率が低い傾向にあった。また、哺育0日および4日の体重は160 mg/kg群においてわずかに低値を示す傾向にあった。サリチル酸あるいはアスピリンの150 mg/kgを妊娠8日～14日までの7日間にわたって経口投与した試験

では新生児の発育遅延、離乳率の低下が報告⁶⁾されている。したがって、本被験物質160 mg/kgの投与により新生児の生存および発育に及ぼす影響が示唆された。しかし、40 mg/kg以下の投与群においては新生児の生存および発育に及ぼす被験物質投与の影響は認められなかった。新生児の哺育4日の剖検では、いずれの例においても異常は認められなかった。

以上のことから、生殖発生毒性的には性周期、交尾および受胎、妊娠期間および分娩に及ぼす被験物質投与の影響はいずれの投与群においても認められなかった。しかし、160 mg/kg群では全新生児が死亡した母動物が2例認められ、また、新生児の生存・発育に及ぼす影響が示唆された。したがって、本試験条件下における生殖発生毒性的な無影響量は、雄に関しては160 mg/kg/day、

雌に関しては40 mg/kg/day, 新生児に関しては40 mg/kg/dayであると判断される.

文献

- 1) D. L. J. Opdyke, *Fd Cosmet. Toxicol.*, **17**, 903 (1979)
- 2) H. Saito, A. Yokoyama, S. Takeno, T. Sakai, K. Ueno, H. Masumura and H. Kitagawa, *Res. Comm. Chem. Path. Pharmacol.*, **38**, 209 (1982)
- 3) C. A. Kimmel, J. G. Wilson and H. J. Shumacher, *Teratology*, **4**, 15 (1971)
- 4) R. P. Koshakji and A. R. Schulert, *Biochem. Pharmacol.*, **22**, 407 (1973)
- 5) K. S. Khera, *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, **37**, 149 (1975)
- 6) S. Tanaka, K. Kawashima, S. Nakaura, S. Nagao, T. Kuwamura, A. Takanaka and Y. Omori, *Cong. Anom.*, **13**, 73 (1973)

連絡先

試験責任者: 梅村建夫
試験担当者: 杉沢健一, 石倉寿一, 石井孝広,
田村一利, 茂呂光夫, 勝亦俱慶
(株)ボゾリサーチセンター 函南研究所
〒419-01 静岡県田方郡函南町桑原三本松1308
Tel 0559-78-7851 Fax 0559-78-7898

Correspondence

Authors: Tatsuo Umemura (Study Director)
Kenichi Sugisawa, Toshikazu Ishikura,
Takahiro Ishii, Kazutoshi Tamura,
Mitsuo Moro, Tomoyoshi Katsumata
Bozo Research Center Inc. Kannami Laboratory
1308 Kuwahara-Sanbonmatsu, Kannami-cho,
Tagata-gun, Shizuoka-ken, 419-01, Japan
Tel +81-559-78-7851 Fax +81-559-78-7898

テトラヒドロフルフリルアルコールの細菌を用いる復帰変異試験

Reverse Mutation Test of Tetrahydrofurfuryl alcohol in Bacteria

要約

テトラヒドロフルフリルアルコールについて *Salmonella typhimurium* TA100, TA1535, TA98, TA1537 および *Escherichia coli* WP2 *uvrA*/pKM101 を用いる復帰変異試験を実施した。

予備試験の結果をもとに本試験では、S9 mix 非共存下および共存下の各菌株について 5000 ~ 313 $\mu\text{g}/\text{plate}$ (公比2) の5用量を設定した。

2回の本試験の結果、S9 mixの有無によらず、いずれの菌株においても陰性(溶媒)対照値の2倍以上を示す復帰変異コロニー数の増加は認められなかった。

以上の結果から、テトラヒドロフルフリルアルコールは本試験系において変異原性を有さない(陰性)と判定した。

方法

1. テスト菌株

カリフォルニア大学B.N.Ames教授より1983年5月27日に入手した *Salmonella typhimurium* TA98, TA100, TA1535, TA1537¹⁾ および日本バイオアッセイ研究センターより1997年9月18日に入手した *Escherichia coli* WP2 *uvrA*/pKM101²⁾ の5菌株を用いた。テスト菌株は菌懸濁液にジメチルスルホキシド(DMSO:関東化学株)を加え、0.2 mLずつ小分けしてドライアイス・アセトン中で急速凍結した後、超低温槽で-80°C以下に凍結保存したものを使用した。これら菌株はアミノ酸要求性、紫外線感受性、膜変異、薬剤耐性などの遺伝的特徴を事前に調べ、特性を備えていることを確認した。

2. テスト菌株の前培養

L字型試験管に2.5%ニュートリエントブロス(Oxoid Nutrient Broth No.2, Unipath)溶液を10 mL分注し、これに凍結保存した菌懸濁液を解凍して20 μL を接種した。37°Cで8時間振盪培養した後、濁度計を用いて菌濃度を測定し、生菌数が $1 \times 10^9/\text{mL}$ 以上であることを確認した。

3. 被験物質

テトラヒドロフルフリルアルコール(ロット番号:2002-4; 高压化学工業(大阪)提供)は、純度99.5%(不純物として5-メチルテトラヒドロフルフリルアルコール:0.34%含有)の無色液体である。被験物質は使用

時まで室温で保存した。

被験物質原体は安定であり、反応しない。

4. 被験物質溶液の調製

注射用水(DW:大塚製薬工場)を用いて最高用量の溶液を調製した後、同溶媒で所定用量に段階希釈し、速やかに試験に使用した。

5. 陽性対照物質

陽性対照物質として下記のものを用いた。陽性対照物質溶液は、あらかじめ所定の濃度に調製し、-80°C以下に凍結保存したものを使用した。

AF-2:2-(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル)アクリルアミド(和光純薬工業)

NaN₃: アジ化ナトリウム(和光純薬工業)

ENNG: N-エチル-N'-ニトロ-N-ニトロソグアニジン(Sigma Chemical)

9-AA: 9-アミノアクリジン塩酸塩(Sigma Chemical)

2-AA: 2-アミノアントラセン(和光純薬工業)

NaN₃はDWに、その他はDMSOに溶解したものを使用した。

6. 培地およびS9 mixの組成

1) トップアガー

アミノ酸水溶液として、精製水を用いて0.5 mmol/L D-ピオチン、0.5 mmol/L L-ヒスチジン混合水溶液(サルモネラ用)または0.5 mmol/L L-トリプトファン水溶液(大腸菌用)を調製し、これをろ過滅菌後、冷蔵庫に保管した。精製水100 mLに対して、粉末寒天(Bacto-Agar, Difco)0.6 g、塩化ナトリウム0.5 gの割合で加え、オートクレーブで滅菌し完全に溶解させた後、上記のアミノ酸水溶液を1/10量加えて混和し、約45°Cに保温した。

2) 最少グルコース寒天平板培地

クリメディアAM-N培地(オリエンタル酵母工業)を購入し、使用した。なお、培地1 Lあたりの組成は下記のとおりである。

硫酸マグネシウム・七水塩	0.2 g
クエン酸・一水塩	2 g
リン酸二カリウム・無水塩	10 g
リン酸一アンモニウム	1.92 g
水酸化ナトリウム	0.66 g
グルコース	20 g

寒天(OXOID Agar No.1) 15 g
 径90 mmのシャーレ1枚あたり30 mLを流して固めてある。

3) S9 mix

S9 mix 1 mLあたり以下の組成で調製し、使用時まで水中に保存した。

S9*	0.1 mL
塩化マグネシウム	8 μmol
塩化カリウム	33 μmol
D-グルコース6-リン酸	5 μmol
β-NADPH	4 μmol
β-NADH	4 μmol
ナトリウム-リン酸緩衝液(pH 7.4)	100 μmol
滅菌精製水	残量

*:購入したS9(キッコーマン)を使用した。このS9は、7週齢の雄のSD系ラットにフェノバルビタールと5,6-ベンゾフラボン併用投与して作製した肝ホモジネートの9000×g遠心上清分画である。

7. 試験方法

試験はブレインキューベーション法で実施した。

滅菌した試験管に被験物質溶液を0.1 mL、0.1 mol/L ナトリウム-リン酸緩衝液(pH 7.4)を0.5 mLおよび菌懸濁液を0.1 mL加え、37°Cで20分間振盪培養した。S9 mixを共存させる場合には、0.1 mol/Lナトリウム-リン酸緩衝液の代わりにS9 mixを0.5 mL添加した。ブレインキューベーション後、トップアガー2 mLを上記の混合液に加え混和し、最少グルコース寒天平板培地上に重層した。重層したトップアガーが凝固した後、37°Cで48時間培養した。

実体顕微鏡を用いて菌叢の生育状態を観察し、被験物質による抗菌性の有無を調べた後、目視により被験物質の沈殿の有無を確認した。プレート上の復帰変異コロニー数を自動コロニーカウンターで計測した。予備試験は各用量につき1枚のプレートを使用した。本試験は各用量につき3枚のプレートを使用し、再現性を確認するため2回実施した。また、被験物質溶液の代わりに陰性対照物質(溶媒)および各菌株毎の陽性対照物質を用いて、被験物質群と同様の操作を行う対照群を設けた。

8. 試験結果の判定基準

いずれかの試験菌株で、S9 mixの有無によらず、被験物質用量の増加にともなって復帰変異コロニー数(平均値)が陰性(溶媒)対照値の2倍以上に増加し、さらにその増加に再現性が認められる場合に、当該被験物質は変異原性を有する(陽性)と判定した。なお、試験結果の判定には統計学的手法は用いなかった。

結果及び考察

1. 予備試験

予備試験を *Salmonella typhimurium* TA100, TA1535, TA98, TA1537 および *Escherichia coli* WP2 *uvrA*/pKM101を用いて、5000, 1250, 313, 78.1, 19.5, 4.88, 1.22 μg/plateの7用量で実施した結果、S9 mixの有無によらず、いずれの菌株においても復帰変異コロニー数の増加は認められなかった。また、S9 mixの有無にかかわらず、いずれの菌株においても抗菌性および沈殿物は認められなかった。従って本試験では、S9 mix非共存下および共存下の各菌株について5000, 2500, 1250, 625, 313 μg/plateの5用量を設定した。

2. 本試験

試験の結果をTable 1, 2に示した。本試験を2回実施した結果、S9 mixの有無によらず、いずれの菌株においても陰性(溶媒)対照値の2倍以上を示す復帰変異コロニー数の増加は認められなかった。S9 mixの有無にかかわらず、いずれの菌株においても抗菌性および沈殿物は認められなかった。

なお、S9 mix非共存下および共存下において陽性対照が各菌株に誘発した復帰変異コロニー数は、各菌株の陰性対照の復帰変異コロニー数と比較して、明らかに2倍を超えて増加し、陽性の結果を示した。

以上の結果から、テトラヒドロフルフリルアルコールは本試験系において変異原性を有さない(陰性)と判定した。

なお、類似化合物であるテトラヒドロフラン³⁾、フルフラール³⁾は、いずれも細菌を用いる復帰変異試験で陰性の結果が報告されている。

文献

- 1) Maron DM, Ames BN: Revised methods for the *Salmonella* mutagenicity test. *Mutation Res*, 113: 173-215(1983).
- 2) Green MHL, Muriel WJ: Mutagen testing using *Trp*^r reversion in *Escherichia coli*. *Mutation Res*, 38: 3-32(1976).
- 3) 労働安全衛生法有害性調査制度に基づく既存化学物質変異原性試験データ集, 日本化学物質安全・情報センター, 東京(1996)p.178, pp.233-234.

連絡先

試験責任者：榎本佳明
試験担当者：榎本佳明，清水優子，大西千絵美
㈱三菱化学安全科学研究所鹿島研究所
〒314-0255 茨城県鹿島郡波崎町砂山14
Tel 0479-46-2871 Fax 0479-46-2874

Correspondence

Authors: Yoshiaki Enomoto (Study director)
Yoshiaki Enomoto, Yuko Shimizu,
Chiemi Oonishi
Mitsubishi Chemical Safety Institute Ltd.,
Kashima Laboratory
14 Sunayama, Hasaki-machi, Kashima-gun,
Ibaraki, 314-0255 Japan
Tel +81-479-46-2871 Fax +81-479-46-2874

Table 1 Mutagenicity of tetrahydrofurfuryl alcohol in bacteria (I)

With (+) or without (-) S9 mix	Test substance dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	Number of revertants (number of colonies/plate, mean \pm S.D.)				
		Base-pair change type			Frameshift type	
		TA100	TA1535	WP2uvrA/pKM101	TA98	TA1537
S9 mix (-)	0	103 123 (113) 113 (\pm 10)	14 11 (12) 11 (\pm 2)	82 75 (81) 87 (\pm 6)	22 20 (21) 22 (\pm 1)	17 16 (17) 17 (\pm 1)
	313	97 103 (107) 122 (\pm 13)	11 8 (10) 10 (\pm 2)	93 73 (86) 92 (\pm 11)	17 23 (20) 21 (\pm 3)	16 21 (17) 15 (\pm 3)
	625	112 122 (114) 108 (\pm 7)	10 8 (10) 12 (\pm 2)	76 76 (83) 98 (\pm 13)	21 20 (20) 19 (\pm 1)	15 18 (16) 14 (\pm 2)
	1250	110 134 (113) 96 (\pm 19)	14 11 (12) 10 (\pm 2)	63 77 (78) 95 (\pm 16)	31 18 (25) 25 (\pm 7)	18 20 (18) 15 (\pm 3)
	2500	116 109 (112) 111 (\pm 4)	11 9 (10) 9 (\pm 1)	93 81 (89) 92 (\pm 7)	20 17 (20) 24 (\pm 4)	17 11 (15) 17 (\pm 3)
	5000	118 119 (113) 102 (\pm 10)	10 16 (12) 11 (\pm 3)	87 70 (83) 91 (\pm 11)	17 21 (18) 17 (\pm 2)	17 23 (18) 15 (\pm 4)
S9 mix (+)	0	128 127 (119) 102 (\pm 15)	13 8 (12) 15 (\pm 4)	99 106 (101) 99 (\pm 4)	33 24 (27) 23 (\pm 6)	25 24 (24) 22 (\pm 2)
	313	114 120 (118) 119 (\pm 3)	9 11 (10) 11 (\pm 1)	87 111 (97) 92 (\pm 13)	40 23 (31) 29 (\pm 9)	26 27 (25) 21 (\pm 3)
	625	137 98 (120) 125 (\pm 20)	13 10 (12) 12 (\pm 2)	92 102 (90) 77 (\pm 13)	33 30 (29) 23 (\pm 5)	27 23 (24) 22 (\pm 3)
	1250	108 126 (113) 106 (\pm 11)	12 11 (13) 17 (\pm 3)	104 111 (109) 112 (\pm 4)	30 31 (33) 37 (\pm 4)	22 27 (24) 24 (\pm 3)
	2500	113 120 (119) 123 (\pm 5)	10 16 (14) 15 (\pm 3)	109 95 (105) 112 (\pm 9)	29 29 (30) 33 (\pm 2)	26 24 (23) 18 (\pm 4)
	5000	101 120 (111) 113 (\pm 10)	10 18 (14) 13 (\pm 4)	86 113 (105) 116 (\pm 17)	23 33 (26) 23 (\pm 6)	25 30 (28) 29 (\pm 3)
Positive control S9 mix (-)	Name	AF-2 ^{a)}	NaN ₃ ^{b)}	ENNG ^{c)}	AF-2	9-AA ^{d)}
	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	0.01	0.5	2	0.1	80
	Number of colonies/plate	564 555 (551) 533 (\pm 16)	520 476 (488) 468 (\pm 28)	4412 4259 (4221) 3992 (\pm 213)	632 644 (634) 625 (\pm 10)	292 237 (292) 346 (\pm 55)
Positive control S9 mix (+)	Name	2-AA ^{e)}	2-AA	2-AA	2-AA	2-AA
	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	1	2	2	0.5	2
	Number of colonies/plate	1381 1446 (1423) 1443 (\pm 37)	169 149 (163) 171 (\pm 12)	935 955 (938) 925 (\pm 15)	436 437 (441) 451 (\pm 8)	171 167 (171) 175 (\pm 4)

a) AF-2: 2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl) acrylamide
 b) NaN₃: sodium azide
 c) ENNG: N-ethyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine
 d) 9-AA: aminoacridine hydrochloride
 e) 2-AA: 2-aminoanthracene

Table 2 Mutagenicity of tetrahydrofurfuryl alcohol in bacteria (II)

With(+) or without(-) S9 mix	Test substance dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	Number of revertants (number of colonies/plate, mean \pm S.D.)				
		Base-pair change type			Frameshift type	
		TA100	TA1535	WP2uvrA/pKM101	TA98	TA1537
S9 mix (-)	0	121 118 (114) 102 (\pm 10)	16 15 (15) 14 (\pm 1)	82 85 (85) 88 (\pm 3)	19 22 (21) 22 (\pm 2)	18 14 (14) 11 (\pm 4)
	313	127 111 (115) 108 (\pm 10)	14 11 (12) 12 (\pm 2)	96 94 (92) 86 (\pm 5)	24 24 (25) 26 (\pm 1)	17 16 (16) 15 (\pm 1)
	625	95 106 (103) 107 (\pm 7)	9 10 (10) 10 (\pm 1)	95 86 (90) 89 (\pm 5)	16 24 (22) 25 (\pm 5)	16 16 (16) 15 (\pm 1)
	1250	110 112 (113) 117 (\pm 4)	10 11 (11) 12 (\pm 1)	76 90 (85) 88 (\pm 8)	17 25 (21) 21 (\pm 4)	14 18 (16) 17 (\pm 2)
	2500	101 105 (104) 105 (\pm 2)	13 9 (12) 15 (\pm 3)	86 90 (89) 91 (\pm 3)	16 17 (18) 20 (\pm 2)	15 13 (15) 17 (\pm 2)
	5000	121 98 (116) 130 (\pm 17)	8 11 (11) 14 (\pm 3)	93 87 (87) 81 (\pm 6)	26 18 (22) 23 (\pm 4)	12 10 (11) 12 (\pm 1)
S9 mix (+)	0	110 127 (115) 108 (\pm 10)	11 11 (13) 16 (\pm 3)	93 95 (92) 87 (\pm 4)	32 29 (32) 35 (\pm 3)	23 23 (20) 15 (\pm 5)
	313	123 114 (121) 116 (\pm 6)	12 13 (13) 13 (\pm 1)	88 111 (97) 91 (\pm 13)	24 31 (27) 27 (\pm 4)	20 17 (20) 22 (\pm 3)
	625	124 119 (118) 110 (\pm 7)	14 16 (15) 14 (\pm 1)	90 87 (93) 103 (\pm 9)	39 21 (28) 24 (\pm 10)	18 22 (23) 29 (\pm 6)
	1250	121 115 (116) 112 (\pm 5)	10 13 (11) 10 (\pm 2)	87 95 (95) 102 (\pm 8)	25 28 (29) 33 (\pm 4)	22 25 (23) 22 (\pm 2)
	2500	108 99 (108) 116 (\pm 9)	14 10 (12) 13 (\pm 2)	90 96 (98) 108 (\pm 9)	24 27 (27) 30 (\pm 3)	22 16 (19) 20 (\pm 3)
	5000	108 114 (108) 102 (\pm 6)	9 13 (11) 10 (\pm 2)	101 87 (99) 108 (\pm 11)	25 25 (26) 28 (\pm 2)	22 19 (20) 19 (\pm 2)
Positive control S9 mix (-)	Name	AF-2 ^{a)}	NaN ₃ ^{b)}	ENNG ^{c)}	AF-2	9-AA ^{d)}
	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	0.01	0.5	2	0.1	80
	Number of colonies/plate	563 520 (522) 482 (\pm 41)	369 387 (399) 440 (\pm 37)	4358 4439 (4357) 4275 (\pm 82)	632 618 (613) 590 (\pm 21)	242 209 (220) 209 (\pm 19)
Positive control S9 mix (+)	Name	2-AA ^{e)}	2-AA	2-AA	2-AA	2-AA
	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	1	2	2	0.5	2
	Number of colonies/plate	1398 1398 (1366) 1301 (\pm 56)	150 147 (145) 138 (\pm 6)	1347 1373 (1264) 1072 (\pm 167)	432 428 (428) 423 (\pm 5)	200 182 (192) 194 (\pm 9)

a) AF-2: 2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide

b) NaN₃: sodium azide

c) ENNG: N-ethyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine

d) 9-AA: aminoacridine hydrochloride

e) 2-AA: 2-aminoanthracene

テトラヒドロフルフリルアルコールの チャイニーズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験

In Vitro Chromosomal Aberration Test of Tetrahydrofurfuryl alcohol in Cultured Chinese Hamster Cells

要約

テトラヒドロフルフリルアルコールの培養細胞に及ぼす細胞遺伝学的影響を、チャイニーズ・ハムスター培養細胞(CHL/IU)を用いて染色体異常試験を実施した。

細胞増殖抑制試験の結果をもとに、短時間処理法のS9 mix存在下および非存在下ならびに連続処理法の24時間処理で、1030 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (約10 mmol/L)を最高濃度として公比2で3濃度を設定した。

短時間処理法のS9 mix存在下および非存在下ならびに24時間連続処理のいずれの処理群においても、染色体の構造異常や倍数性細胞の出現頻度は5%未満であった。

以上の結果より、本試験条件下ではテトラヒドロフルフリルアルコールは、染色体異常を誘発しない(陰性)と結論した。

方法

1. 使用した細胞

大日本製薬から入手(2001年7月, 入手時:継代14代, 凍結時:17代)したチャイニーズ・ハムスター肺由来のCHL/IU細胞を, 解凍後継代4週間以内で試験に用いた。

2. 培養液の調製

培養には, 非働化した仔牛血清(Invitrogen, ロット番号:296130)を10 vol%添加したイーグルMEM(日本水薬)培養液を用いた。

3. 培養条件

2×10^4 個のCHL/IU細胞を, 培養液5 mLを入れたディッシュ(径6 cm, Becton Dickinson)に播き, 37 °CのCO₂インキュベーター(5%CO₂)内で培養した。

短時間処理法では, 細胞播種3日目にS9 mix存在下および非存在下で6時間処理し, 処理終了後新鮮な培養液でさらに18時間培養した。また連続処理法では, 細胞播種3日目に被験物質を加え, 24時間処理した。

4. 被験物質

テトラヒドロフルフリルアルコール(ロット番号:2002-4, 高圧化学工業(大阪)提供)は, 純度99.5%(不純物として5-メチルテトラヒドロフルフリルアルコール:0.34%含有)の無色液体である。被験物質は使用時まで室温で保存した。

被験物質原体は安定であり, 反応しない。

5. 被験物質溶液の調製

被験物質調製液は, 用時調製した。溶媒は生理食塩水(大塚製薬工場, ロット番号:K2A79)を用いた。原体を溶媒に溶解して原液を調製し, ついで原液を溶媒で順次希釈して所定の濃度の被験物質調製液を作製した。被験物質調製液は, すべての試験において培養液の10 vol%になるように加えた。

6. 細胞増殖抑制試験

染色体異常試験に用いる被験物質の処理濃度を決定するため, 被験物質の細胞増殖に及ぼす影響を調べた。被験物質のCHL/IU細胞に対する増殖抑制作用は, 単層培養細胞密度計(オリンパス光学工業)を用いて測定し, 陰性対照群に対する割合をもって指標とした。

その結果, テトラヒドロフルフリルアルコールによる50%以上の細胞増殖抑制は, 短時間処理法および連続処理法のいずれにおいても認められなかった(Fig.1)。

7. 実験群の設定

細胞増殖抑制試験の結果をもとに, 短時間処理法のS9 mix存在下および非存在下ならびに連続処理法の24時間処理で, 1030 $\mu\text{g}/\text{mL}$ を最高濃度として公比2で3濃度を設定した。

陽性対照として, 短時間処理法のS9 mix存在下では, ベンゾ[*a*]ピレン(東京化成工業, ロット番号:GG01)の濃度を20 $\mu\text{g}/\text{mL}$, S9 mix非存在下では, マイトマイシンC(協和発酵工業, ロット番号:342AJH)の濃度を0.1 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 連続処理法では, マイトマイシンCの濃度を0.05 $\mu\text{g}/\text{mL}$ に設定した。

各濃度4枚のディッシュに処理し, 2枚を染色体標本作製, 2枚を細胞増殖率測定に使用した。

8. 染色体標本作製法

培養終了の2時間前に, コルセミドを最終濃度が約0.1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ になるように染色体標本作成用ディッシュの培養液に加えた。染色体標本の作製は常法に従って行った。スライド標本は各ディッシュにつき2枚作製した。作製した標本を, 3 vol%ギムザ溶液で20分間染色した。

9. 染色体分析

作製したスライド標本のうち, 1枚のディッシュから得られたスライドを処理条件が分からないようにコード




Fig. 1 Growth inhibition of CHL/IU cells treated with tetrahydrofurfuryl alcohol

化した状態で分析した。染色体の分析は、日本環境変異原学会・哺乳動物試験分科会(MMS)¹⁾による分類法に基づいて行い、染色体型あるいは染色体型の切断、交換などの構造異常およびギャップの有無と倍数性細胞(polyploid)の有無について観察した。ギャップは構造異常には含めなかった。また、構造異常および倍数性細胞については1群200個の分裂中期細胞を分析した。

10. 記録と測定

溶媒および陽性対照群と被験物質処理群についての分析結果は、観察した細胞数、構造異常の種類と数、倍数性細胞の数について集計し、各群の値を記録用紙に記入した。被験物質の染色体異常誘発性についての判定は、石館ら²⁾の判定基準に従い、染色体異常を有する細胞の頻度が5%未満を陰性、5%以上10%未満を疑陽性、10%以上を陽性とした。

11. 細胞増殖の測定

染色体標本作製と同一のサンプルにおける細胞増殖を測定した。細胞増殖測定用のディッシュを用いて、細胞増殖抑制試験と同様に測定した。

結果および考察

短時間処理法による染色体分析の結果をTable 1に示した。テトラヒドロフルフリルアルコールを加えてS9 mix存在下および非存在下で6時間処理した結果、いずれの処理群においても、染色体の構造異常および倍数性細胞の誘発作用は認められなかった。

連続処理法による染色体分析の結果をTable 2に示した。テトラヒドロフルフリルアルコールを加えて24時間連続処理したいずれの処理群においても、染色体の構造異常および倍数性細胞の誘発作用は認められなかった。

以上の結果から、テトラヒドロフルフリルアルコール

は本試験条件下において、染色体異常を誘発しないと結論した。

なお、類似化合物であるDibenzofuranは、染色体異常試験で陰性の結果が報告されている。また、Maleic anhydrideは、染色体異常試験の連続処理法48時間処理で陽性の結果が報告されている²⁾。

文献

- 1) 日本環境変異原学会・哺乳動物試験分科会(編):「化学物質による染色体異常アトラス」朝倉書店、東京(1988)pp.16-37.
- 2) 祖父尼俊雄(監修):「染色体異常試験データ集」1998年版、エル・アイ・シー、東京(1999).

連絡先

試験責任者: 中川宗洋

試験担当者: 成見香瑞範, 石毛裕子, 齋藤 準,
齋藤宏美, 長友弘子, 須之内みどり

(株)三菱化学安全科学研究所鹿島研究所

〒314-0255 茨城県鹿島郡波崎町砂山14

Tel 0479-46-2871 Fax 0479-46-2874

Correspondence

Authors: Munehiro Nakagawa (Study director)

Kazunori Narumi, Yuko Ishige,

Hitoshi Saitou, Hiromi Saitou,

Hiroko Nagatomo, Midori Sunouchi

Mitsubishi Chemical Safety Institute Ltd.,

Kashima Laboratory

14 Sunayama, Hasaki-machi, Kashima-gun,

Ibaraki, 314-0255 Japan

Tel +81-479-46-2871 Fax +81-479-46-2874

Table 1 Chromosomal analysis of Chinese hamster cells (CHL/IU) treated with tetrahydrofurfuryl alcohol with and without S9 mix

Group	Concentration (µg/mL)	S9 mix	Time of exposure (hr)	Cell growth index (%)	Number of cells analyzed	Number of structural aberrations						Number of cells with aberrations (%)	Number of gaps	polyploid ^{b)} (%)	Judgement ^{c)}	
						ctb	cte	csb	cse	frg	total				SA	NA
Vehicle ^{a)}	0	-	6-18	100	200	1	0	0	0	0	1	1(0.5)	0	0.0	-	-
Test Substance	257.5	-	6-18	105	200	2	0	0	1	1	4	4(2.0)	0	0.0	-	-
	515	-	6-18	104	200	1	0	0	0	0	1	1(0.5)	0	0.0	-	-
	1030	-	6-18	106	200	1	1	1	0	0	3	2(1.0)	0	0.0	-	-
	MMC	0.1	-	6-18	N.D.	200	34	51	0	0	0	85	82(41.0)	0	0.0	+
Vehicle	0	+	6-18	100	200	0	0	1	0	0	1	1(0.5)	1	0.0	-	-
Test Substance	257.5	+	6-18	108	200	0	1	1	0	0	2	2(1.0)	0	0.0	-	-
	515	+	6-18	107	200	0	1	0	0	0	1	1(0.5)	0	0.0	-	-
	1030	+	6-18	112	200	0	0	0	0	0	0	0(0.0)	0	0.0	-	-
	BP	20	+	6-18	N.D.	200	24	157	2	0	0	183	163(81.5)	1	0.0	+

Abbreviations; ctb:chromatid break, cte:chromatid exchange, csb:chromosome break, cse:chromosome exchange (dicentric and ring), frg:fragment

SA:structural aberration, NA:numerical aberration, MMC:mitomycin C (positive control), BP:benzo [a] pyrene (positive control)
N.D.:Not determined

a) Isotonic sodium chloride solution was used as vehicle.

b) Two hundred cells were analyzed in each group.

c) Judgement was done on the basis of criteria of Ishidate *et al.* (1987)

Table 2 Chromosomal analysis of Chinese hamster cells (CHL/IU) treated with tetrahydrofurfuryl alcohol without S9 mix

Group	Concentration (µg/mL)	Time of exposure (hr)	Cell growth index (%)	Number of cells analyzed	Number of structural aberrations						Number of cells with aberrations (%)	Number of gaps	polyploid ^{b)} (%)	Judgement ^{c)}	
					ctb	cte	csb	cse	frg	total				SA	NA
Vehicle ^{a)}	0	24	100	200	1	0	1	0	0	2	2(1.0)	1	0.0	-	-
Test Substance	257.5	24	103	200	0	1	1	1	0	3	3(1.5)	0	0.0	-	-
	515	24	102	200	0	0	0	0	0	0	0(0.0)	0	0.0	-	-
	1030	24	101	200	0	2	0	0	0	2	2(1.0)	0	0.0	-	-
	MMC	0.05	24	N.D.	200	21	33	1	9	0	64	53(26.5)	0	0.0	+

Abbreviations; ctb:chromatid break, cte:chromatid exchange, csb:chromosome break, cse:chromosome exchange (dicentric and ring), frg:fragment

SA:structural aberration, NA:numerical aberration, MMC:mitomycin C (positive control)

N.D.:Not determined

a) Isotonic sodium chloride solution was used as vehicle.

b) Two hundred cells were analyzed in each group.

c) Judgement was done on the basis of criteria of Ishidate *et al.* (1987).

Twenty-eight-day Repeat Dose Oral Toxicity Test of Tetrahydrofurfuryl alcohol in Rats

要約

テトラヒドロフルフリルアルコールは、溶剤、可塑剤、防かび剤、リジンの中間体、樹脂改質剤、塗料、ジヒドロピラン原料、合成医薬品中間体原料等に用いられている化学物質である¹⁾。本物質の毒性については、ラット経口投与におけるLD₅₀値は1.6-3.2 g/kgで、皮膚や粘膜に対して刺激性を有すること²⁾が知られている。また、ラットへの90日間混餌投与による亜慢性毒性試験では、精巣に対する毒性影響が認められているほか、血色素量、平均赤血球容積、平均赤血球血色素量、平均赤血球血色素濃度、血小板数、血糖値、総タンパク、グロブリンおよびカルシウムの低値が認められている³⁾。また、本物質の基本骨格であるテトラヒドロフランの毒性として、マウスへの単回経口投与により麻酔作用が認められ⁴⁾、マウス或いはラットへの反復吸入暴露試験においては、副腎の肥大、肝臓の肝細胞肥大および肝細胞逸脱酵素活性の上昇、白血球数減少、運動失調等⁵⁻⁹⁾が認められている。さらに、発癌性試験においては、マウスで肝細胞腺腫/癌の発生率の有意な増加、ラットで腎細胞腺腫/癌の発生率の増加傾向¹⁰⁾が認められている。

今回、テトラヒドロフルフリルアルコールについて、SD系[Crj:CD(SD)IGS]ラットを用い、0(溶媒)、10、40、150および600 mg/kg用量で、28日間反復経口投与毒性試験を実施した。動物数は1群雌雄各5匹とし、投与期間終了後屠殺の5群、ならびに対照および600 mg/kgの14日間回復群を設定した。

その結果、600 mg/kg群で、雌雄に自発運動亢進、続いて自発運動低下および腹臥姿勢、さらに雄には後肢握力の低下、摂餌量の減少および体重増加の抑制、雌には投与1週のみ摂餌量の減少が認められた。150 mg/kg群では、雌に自発運動亢進が認められた。尿検査では、600 mg/kg群で雄にpHの低下が認められた。血液学検査では、600 mg/kg群で雌雄に平均赤血球血色素量、平均赤血球血色素濃度、白血球数および血小板数の減少並びにプロトロンビン時間の延長、さらに雄には網状赤血球数、雌には血色素量の減少が認められた。血液生化学検査では、600 mg/kg群で雌雄にALP、総タンパク、アルブミン、総ビリルビンおよびカルシウム、さらに雄にはLDH、トリグリセライドおよびナトリウムのいずれも減少並びに尿素窒素の増加が認められた。150 mg/kg群では、雄に総タンパクの減少が認められた。器官重量では、600 mg/kg群で雌雄に胸腺、雌に下垂体の絶対および相対重量に共通した減少、雄で脳絶対重量の減少、

雌で腎臓相対重量の増加が認められた。150 mg/kg群では、雌に下垂体相対重量の減少が認められた。病理組織学検査では、600 mg/kg群で雌雄に胸腺の萎縮、雄に脾臓の髓外造血低下による赤脾髄萎縮および被膜炎並びに精巣の精上皮細胞壊死、150 mg/kg群で雄に脾臓の被膜炎並びに精巣の精上皮細胞壊死が認められ、精巣の精子形成サイクル検査では、600 mg/kg群でセルトリ細胞に対する精子細胞の比率の減少が認められた。

回復群においては、これらの投与期間中或いは投与期間終了時の観察および検査で認められた変化のうち、精巣の変化は増強する傾向にあり、精子細胞に加えてパキテン期精母細胞の比率も減少したが、その他の変化は回復或いは回復傾向を示した。

以上の結果から、テトラヒドロフルフリルアルコールのラットへの28日間反復投与による主な毒性は、胸腺、脾臓、腎臓および精巣に対する影響並びに血液学および血液生化学的影響であった。無影響量は、雌雄とも40 mg/kg/dayであると考えられた。

方法

1. 被験物質

テトラヒドロフルフリルアルコールは水、アセトンに易溶な無色の液体である。試験には、高圧化学工業(大阪)から提供されたロット番号2002-4(純度99.5%)を入手し、冷暗(4℃)条件下で保管し、使用した。被験物質の投与液は、局方精製水(共栄製薬)を溶媒として、所定の投与用量になるような濃度の溶液として調製し、使用時まで冷所(4℃)遮光下で密栓保管し、調製後7日以内に使用した。なお、保管条件下および投与形態での被験物質は安定であることを確認した。

2. 供試動物および飼育条件

動物は、SD系[Crj:CD(SD)IGS]ラットを、日本チャールス・リバー(神奈川)より搬入し、雄は7日、雌は8日間検疫を兼ねて試験環境に馴化させた後、5週齢で試験に供した。1群の動物数は雌雄各5匹とし、投与期間終了後屠殺の5群のほか、対照群および最高用量群については別に雌雄各5匹の14日間回復群を設けた。群分けは、投与開始前日の体重に基づく層化無作為抽出法により行なった。投与開始時の体重は雄で157~181 g、雌で141~161 gであった。ラットは、温度22.4~22.8℃、湿度47~62%に制御した飼育室で、金網ケージに個別に収容し、固型飼料[ラボMRストック、日本農産工

業]および水を自由に摂取させて飼育した。

3. 投与量および投与方法

投与量設定試験として、1群雌雄各4匹のラットに、被験物質を0, 50, 100, 200, 500および1000 mg/kg用量で14日間反復経口投与した結果、100 mg/kg群では、自発運動の亢進が認められたが、雌1匹のみの変化であった。200 mg/kg群では、自発運動の亢進が雌に認められたほか、雌雄に血小板数、雄に尿pH、平均赤血球血色素濃度、アルブミンおよび総タンパク、雌に平均赤血球血色素量、胸腺および下垂体の絶対および相対重量のいずれも低値が認められた。500 mg/kg群では、雌雄に自発運動亢進および低下、摂餌量、尿pH、血小板数、平均赤血球血色素量、平均赤血球血色素濃度、白血球数、血清アルブミン、総タンパク、LDH、総ビリルビンおよびカルシウムの低値並びに γ -GTPの高値、盲腸の拡張、雄に立毛例、体重増加の抑制傾向、血清ALPの低値並びに尿素窒素およびクレアチニンの高値、雌にプロトンピン時間の高値、ナトリウム、胸腺および下垂体の絶対および相対重量のいずれも低値が認められた。1000 mg/kg群では、500 mg/kg群で認められた変化に加えて、雄にプロトンピン時間および血清ChEの高値並びにナトリウム、胸腺の絶対および相対重量のいずれも低値、雌に立毛例、血色素量の低値並びに活性化部分トロンボプラスチン時間およびトリグリセライドの高値が認められた。以上の結果から、本試験における投与量は、600 mg/kg/dayを最高用量とし、以下150, 40および10 mg/kg/dayの4用量を設定した。投与方法は、投与液量を体重1 kg当たり5 mLとし、テフロン製胃ゾンデを装着した注射筒を用いて、1日1回(午前中)、28日間にわたって経口投与した。対照群には、局方精製水を同様に投与した。

4. 観察および検査

1) 一般状態観察

28日間の投与期間およびそれに続く14日間の回復期間を通じて、動物の生死、外観、行動等を毎日観察した。

2) 詳細な臨床観察

週1回(投与7, 14, 21および28日並びに回復群ではさらに回復7および14日)、午後の概ね一定時刻に、動物をケージから取り出す時およびケージ外のアルミ製オープンフィールド(370 W×560 D×40 Hmm)で観察(ケージからの出し易さ、ケージから出す時の扱い易さ、体躯緊張、皮膚、毛並み、立毛、眼分泌液、眼瞼閉鎖状態、眼球突出、流涙、口鼻分泌液、流涎、下腹部被毛の尿による汚れ、肛門周囲の便による汚れ、異常発声、呼吸、姿勢、痙攣、振戦、探索行動、警戒性、自発運動、歩行、異常行動、常同、意識不全、四肢筋緊張、排尿、排便)し、認められた変化を評点で記録した。各個体の行動の特性を把握するため、投与開始前日にも観察した。観察は、ブラインドで行った。

3) 感覚反射機能検査

投与28日および回復14日においては、詳細な臨床観察に加えて、聴覚反応(ピンセットで軽くケージを叩く音に対する耳介のPreyer反射)、視覚反応(顔面に棒を近づけた場合の接近反射)、触覚反応(腰部に触れた場合の反応)、耳介反射(耳介に触れた場合の耳介の反射)、痛覚反応(尾根部をピンセットで摘んだ場合の逃避、発声などの反応)、瞳孔反射(暗所から急に明るい場所に移した時の瞳孔の反射)、同側屈筋反射(後肢の足趾をピンセットで摘んだ場合の屈筋の反応)、眼瞼反射(眼瞼に接触した場合の眼瞼の反応)および正向反射(面上で動物を背臥位にした場合の正常姿勢にもどる反射)を調べ、認められた変化を評点で記録した。

4) 着地開脚幅、握力および自発運動量測定

投与4週(投与23日)および回復2週(回復13日)において、午後の概ね一定時刻に、着地開脚幅(足趾に墨を塗り、30 cmの高さから落とした時の足跡の幅を測定)、前肢および後肢の握力(ラット・マウス用握力測定装置、MK-380R/FR、室町機械)並びに自発運動量(自発運動量測定装置、SUPERMEX、室町機械、測定装置内の区画間の60分間における移動回数を測定)を測定した。

5) 体重および摂餌量測定

体重は、週2回、3あるいは4日ごと、および屠殺日に測定した。摂餌量は、毎週1回、1日(24時間)の飼料消費量を測定した。

6) 尿検査

投与26日および回復12日に、動物の腰部を刺激して新鮮尿を採取し、外観の観察並びにpH、潜血、タンパク、糖、ケトン体、ビリルビンおよびウロビリノーゲンの検査(以上、試験紙法:マイルス・三共、マルティステイクス[®])を行った。

7) 血液学検査

採血は、投与期間および回復期間終了翌日にエーテル麻酔下で開腹して腹大動脈より行なった。動物は採血前日の午後5時から除餌し、水のみを給与した。採取した血液は3分割し、その一部は、EDTA-2 Kで凝固防止処理し、多項目自動血球計数装置〔東亜医用電子、E-4000〕により、赤血球数(電気抵抗検出方式)、血色素量(ラウリル硫酸ナトリウム-ヘモグロビン法)、ヘマトクリット値(パルス検出方式)、平均赤血球容積(MCV)、平均赤血球血色素量(MCH)、平均赤血球血色素濃度(MCHC、以上計算値)、白血球数および血小板数(以上、電気抵抗検出方式)を、また塗抹標本を作製して網状赤血球数(Brilliant cresyl blueで染色して鏡検)および白血球百分率(May-Giemsaで染色して鏡検)を測定した。また一部は、3.8%クエン酸ナトリウム液で凝固阻止処理して血漿を分離し、血液凝固自動測定装置(アメルング社、KC-10 A)により、プロトンピン時間(PT, Quick一段法)および活性化部分トロンボプラスチン時間

(APTT, エラジン酸活性化法)を測定した。

8) 血液生化学検査

採取した血液の一部から血清を分離し、生化学自動分析装置〔日本電子, JCA-BM8〕により、総タンパク(Biuret法), アルブミン(BCG法), A/G比(計算値), グルコース, トリグリセライド, 総コレステロール(以上, 酵素法), 総ビリルビン(ジアゾ法), 尿素窒素(Urease-UV法), クレアチニン(Jaffé法), GOT, GPT, γ -GTP, ALP(以上, JSCC法), LDH(SFBC法), コリンエステラーゼ(BTC-DTNB法), カルシウム(OCPC法)および無機リン(酵素法)を, また電解質自動分析装置〔東亜電波工業, NAKL-132〕により, ナトリウム, カリウムおよび塩素を測定した。

9) 病理学検査

投与期間あるいは回復期間終了翌日の採血に続いて放血屠殺し, 剖検を行った。また, 脳, 心臓, 胸腺, 肝臓, 腎臓, 脾臓, 副腎, 精巣, 精巣上体, 卵巣および子宮を秤量(絶対重量)し, また対体重比(相対重量)を算出した。病理組織学検査は, 採取した器官を10%中性リン酸緩衝ホルマリン液(精巣および精巣上体のみブアン液で固定)で固定後, 対照群および600 mg/kg群については, 脳, 下垂体, 甲状腺(上皮小体を含む), 胸腺, 心臓, 肺, 気管, 肝臓, 腎臓, 脾臓, 副腎, 胃, 腸, 膀胱, 脊髄, リンパ節, 坐骨神経, 骨髄, さらに雄では精巣, 精巣上体, 前立腺, 雌では卵巣, 子宮を検査した。また, 600 mg/kg群で, 雌雄の胸腺並びに雄の精巣および脾臓に病理組織学的変化が認められたので, 雌雄の胸腺, 雄の精巣および脾臓については, 10, 40および150 mg/kg群並びに回復群も検査した。検査は, 常法によりパラフィン切片を作製し, ヘマトキシリン・エオジン染色を施して鏡検した。精巣についてはPAS染色標本も作製し, 精子形成サイクル(ステージII-III, V, VIIおよびXII)の検査^{11,12)}も行なった。さらに, 沈着物を同定するため, 対照群の雄の2匹の腎臓にもPAS染色を行なった。

5. 統計解析

パラメトリックデータについては, Bartlettの分散検定を行い, 分散が一樣な場合は一元配置の分散分析を行った。分散が一樣でない場合およびノンパラメトリックデータはKruskal-Wallisの順位検定を行った。それらの結果, 有意差を認めた場合, DunnettまたはSheffé(群間で標本数が異なる場合)の方法により対照群に対する各群の比較検定を行った。カテゴリカルデータにはFisherの直接確率法を用いた。ただし, 回復群のパラメトリックデータはF検定を行い, その結果分散が一樣な場合はStudentのt検定を, 一樣でない場合はAspinn-Welchのt検定を行った。ノンパラメトリックデータには, Mann-WhitneyのU検定を用いた。有意水準は, いずれの場合も5%とした。

結果

1. 死亡および一般状態

投与期間において, 概ね投与後5~40分間に軽度な自発運動亢進が150 mg/kg群の雌の5匹中5匹並びに600 mg/kg群の各10匹中雄の4匹および雌の9匹に認められ, これらの発現率はいずれも対照群と比べて有意差が認められた。また, 自発運動亢進が消失した後, 続いて軽度ないし中等度な自発運動低下および自発運動低下中の一時的な腹伏姿勢が600 mg/kg群の雌雄全例に認められた。自発運動低下は, 投与開始後数日間は投与後概ね6時間まで認められたが, 4~6日以降においては, 投与後2~3時間以内に回復した。

回復期間においては, 一般状態の変化は認められなかった。

死亡は, 投与および回復期間を通じて認められなかった。

2. 詳細な臨床観察

投与期間中および回復期間中の観察において, 各観察項目に有意な変化は認められなかった。

3. 感覚反射機能検査

投与期間中および回復期間中の検査において, 各検査項目に有意な変化は認められなかった。

4. 着地開脚幅, 握力および自発運動量(Table 1)

投与期間中の測定において, 600 mg/kg群で雄の後肢握力に有意な減少が認められた。着地開脚幅および自発運動量には, 有意な変化は認められなかった。

回復期間中の測定においては, 着地開脚幅, 握力および自発運動量ともに, 有意な変化は認められなかった。

5. 体重(Fig. 1)

投与期間において, 600 mg/kg群の雄の体重は対照群を下回り, 投与3日以降の体重および投与期間中の体重増加量に有意差が認められ, 対照群の体重との差は投与の経過とともに拡大する傾向にあった。150 mg/kg群の雄の体重も対照群を下回って推移する傾向にあったが, 各測定時点の体重および投与期間中の体重増加量に有意差は認められなかった。また, 雌においては, 体重に対する影響は認められなかった。

回復期間において, 600 mg/kg群の雄の体重に有意差は残るものの, 対照群と概ね平行して推移した。

6. 摂餌量(Fig. 2)

投与期間において, 600 mg/kg群の雄の摂餌量は, 投与期間を通じて有意な低値を示した。同群の雌では, 投与1週にのみ, 有意な低値が認められた。150 mg/kg群では, 雄の摂餌量が投与期間を通じて低値傾向にあったが, 有意差は認められなかった。

回復期間において, 600 mg/kg群の雌雄の摂餌量は, 対照群と比べて有意差は認められなかった。




Fig. 1 Body weight changes of rats treated orally with tetrahydrofurfuryl alcohol in the 28-day repeated dose toxicity test




Fig. 2 Food consumption of rats treated orally with tetrahydrofurfuryl alcohol in the 28-day repeated dose toxicity test