



# 第一回石巻市雄勝地区 健診結果集計

## 【血圧測定】


受診者数		最大値	最小値	平均	STD	判定基準					判定不能	
						異常なし	軽度異常	要経過観察	要治療	要精密検査		
563	収縮期	200	90	135.4	18.3	90~139	~89 140~149	150~159	160~			
	拡張期	118	42	78.4	11.1	90未満	90~94	95~99	100~			
	人数					346	90	64	63			
	構成比					61.5%	16.0%	11.4%	11.2%			

	至適血圧	正常血圧	正常高値血圧	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	
収縮期血圧	<120	<130	130-139	140-159	160-179	≥180	計
拡張期血圧	かつ	かつ	または 85-89	または 90-99	または 100-109	または ≥110	
人数	100	111	135	154	55	8	563
構成比	17.8%	19.7%	23.9%	27.3%	9.8%	1.5%	100.0%







## 【尿検査】

	受診者数	最大値	最小値	平均	STD	判定基準					判定不能
						異常なし	軽度異常	要経過観察	要治療	要精密検査	
尿蛋白	549	(+) / (-)	(-)			判定基準	-	±	+	++~	
						人数	527	17	5		
尿潜血	549	(+++)	(-)			判定基準	-	±	+	++~	
						人数	530	17	2		
尿糖	549	(+) / (-)	(-)			判定基準	-	±	+	++~	
						人数	532	12	5		
						構成比	96.0%	3.1%	0.9%	0.0%	
						構成比	96.5%	3.1%	0.0%	0.4%	
						構成比	96.9%	2.2%	0.9%	0.0%	





【貧血検査】

	受診者数	最大値	最小値	平均	STD		異常なし	軽度異常	要経過観察	要治療	要精密検査	判定不能
赤血球数	562	589	285	446.3	44.3	男性	400~539	540~579	360~399	~359 580~		
						女性	360~489	490~519	330~359	~329 520~		
						人数	515	19	20	8		
						構成比	91.6%	3.4%	3.6%	1.4%		
ヘモグロビン	562	17.3	8.7	13.5	1.5	男性	13.0~16.6	16.7~17.5	12.1~12.9	~12.0 17.6~		
						女性	11.4~14.6	14.7~15.4	10.8~11.3	~10.7 15.5~		
						人数	483	19	30	30		
						構成比	85.9%	3.4%	5.3%	5.3%		
ヘマトクリット	562	52.7	28.3	41.3	4.1	男性	38.0~48.9	49.0~51.9	35.0~37.9	~34.9 52.0~		
						女性	34.0~43.9	44.0~45.9	31.0~33.9	~30.9 46.0~		
						人数	484	35	27	16		
						構成比	86.1%	6.2%	4.8%	2.8%		





【血糖検査】

	受診者数	最大値	最小値	平均	STD		異常なし	軽度異常	要経過観察	要治療	要精密検査	判定不能
HbA1c	562	8.9	4.3	5.3	0.58	判定基準	5.5未満		5.5~6.0	6.1~		
						人数	412	105	45			
						構成比	73.3%	18.7%	8.0%			








## 【総コレステロール】

	受診者数	最大値	最小値	平均	STD	要精密検査	異常なし	軽度異常	要経過観察	要治療	判定不能	
						判定基準	~139	140~199	200~219	220~239	240~	
						人数	14	265	114	87	82	
総コレステロール	562	380	123	202.5	34.5	構成比	2.5%	47.2%	20.3%	15.5%	14.6%	



【肝臓系検査】

	受診者数	最大値	最小値	平均	STD	判定基準	異常なし	軽度異常	要経過観察	要治療	要精密検査	判定不能
GOT	562	147	11	24.8	11.8	判定基準	~35		36~49		50~	
						人数	512		30		20	
						構成比	91.1%		5.3%		3.6%	
GPT	562	233	5	21.4	15.6	判定基準	~35		36~49		50~	
						人数	511		24		27	
						構成比	90.9%		4.3%		4.8%	
γ-GTP	562	347	7	31.4	31.0	判定基準	~55	56~79	80~99		100~	
						人数	496	35	12		19	
						構成比	88.3%	6.2%	2.1%		3.4%	
アルブミン	562	5.1	3.1	4.3	0.26	判定基準	4.0~		3.6~3.9		~3.5	
						人数	531		30		1	
						構成比	94.5%		5.3%		0.2%	





アルブミン(カテゴリ別)

	~3.4	3.5~3.7	3.8~3.9	4.0~4.9	5.0以上	計
人数	1	12	18	527	4	562
構成比	0.2%	2.1%	3.2%	93.8%	0.7%	



【クレアチニン】

	受診者数	最大値	最小値	平均	STD		異常なし	軽度異常	要経過観察	要治療	要精密検査	判定不能
						男性	~1.1		1.2~1.3		1.4~	
						女性	~0.8		0.9~1.0		1.1~	
クレアチニン	562	3.51	0.38	0.68	0.22	人数	537		19		6	
						構成比	95.6%		3.4%		1.1%	





【尿素窒素】

	受診者数	最大値	最小値	平均	STD		異常なし	軽度異常	要経過観察	要治療	要精密検査	判定不能
						判定基準	~22.0	22.1~24.9			25.0~	
尿素窒素	562	47.2	3.9	16.5	4.85	人数	496	36			30	
						構成比	88.3%	6.4%			5.3%	



【身体測定】


	受診者数	最大値	最小値	平均	STD		低体重	普通体重	肥満1度	肥満2度	肥満3度	肥満4度
身長	563	188.3	116.5	157.2	9.8	人数						
						構成比						
体重	563	97.4	30.2	59.1	10.8	人数						
						構成比						
BMI	563	38.6	14.2	23.8	3.5	判定基準	18.5未満	18.5以上 25.0未満	25.0以上 30.0未満	30.0以上 35.0未満	35.0以上 40.0未満	40.0以上
						人数	24	345	166	24	4	
						構成比	4.3%	61.3%	29.5%	4.3%	0.7%	
						構成比						
腹囲	563	121.5	61.5	86.2	9.32	人数						
						構成比						



【診察所見】

	受診者数	最大値	最小値	平均	STD		異常なし	軽度異常	要経過観察	要治療	要精密検査	判定不能
診察所見	563					人数	524				39	
						構成比	93.1%				6.9%	

要精密検査内訳	人数	比率
心雑音	22	3.9%
貧血疑い	12	2.1%
不整脈	6	1.1%



【握力測定】

男性

年齢区分	低い	やや低い	平均	やや高い	高い	未測定	合計
～29		2	2	2			6
30～39		1	4	4			9
40～49		2	12	7	3		24
50～59	2	6	14	12	6		40
60～64	4	3	10	9	8		34
65～69		4	7	14	7		32
70～75	1	3	4	20	8		36
75～79		5	2	22	3		32
80～84		1	4	12	2		19
85～	1	1	1	6			9
合計	8	28	60	108	37	0	241

女性

年齢区分	低い	やや低い	平均	やや高い	高い	未測定	合計
～29		2	4				6
30～39	1	5	8	2			16
40～49	1	9	18	1			29
50～59	1	13	25	11		1	51
60～64	1	3	4	27	5		40
65～69		4	9	33	9		55
70～75	1	6	8	26	9		50
75～79	1	4	6	22	9		42
80～84	1	5	2	14	3		25
85～	1	1	2	3	2		9
合計	8	52	86	139	37	1	323

基準値 男性



年齢区分	低い	やや低い	平均	やや高い	高い
～29	≦36	≦43	≦51	≦58	>58
30～39	≦35	≦42	≦50	≦57	>57
40～49	≦33	≦40	≦48	≦55	>55
50～59	≦30	≦37	≦45	≦52	>52
60～64	≦28	≦34	≦37	≦45	>45
65～69	≦24	≦31	≦34	≦43	>43
70～75	≦22	≦29	≦32	≦40	>40
75～79	≦20	≦26	≦29	≦37	>37
80～84	≦18	≦23	≦27	≦35	>35
85～	≦18	≦23	≦25	≦32	>32

基準値 女性

年齢区分	低い	やや低い	平均	やや高い	高い
～29	≦20	≦26	≦33	≦39	>39
30～39	≦19	≦25	≦32	≦38	>38
40～49	≦18	≦24	≦31	≦37	>37
50～59	≦16	≦22	≦29	≦35	>35
60～64	≦16	≦21	≦23	≦30	>30
65～69	≦15	≦19	≦21	≦27	>27
70～75	≦14	≦18	≦20	≦26	>26
75～79	≦12	≦16	≦18	≦24	>24
80～84	≦12	≦16	≦17	≦23	>23
85～	≦10	≦13	≦16	≦20	>20

判断基準

緑	平均、やや高い、高い
赤	低い、やや低い



## 【歯科健診】

	受診者数	良好			未記入
		人数	良好でない	構成比	
口腔衛生状態	557	323	230	4	
		58.0%	41.3%	0.7%	

	受診者数	う蝕なし		未記入
		人数	う蝕あり	
う蝕(虫歯)の有無	557	386	187	4
		69.3%	33.6%	0.7%

	受診者数	出血なし		未記入
		人数	出血あり	
歯ぐきの出血の有無	557	375	176	6
		67.3%	31.6%	1.1%

	受診者数	動揺なし				未記入
		1度(軽度)	2度(中等度)	高度(3度)		
歯の動揺の程度	557	370	103	49	28	7
		66.4%	18.5%	8.8%	5.0%	1.3%

	受診者数	喪失歯なし			未記入
		要補綴	補綴治療が完了		
失った歯の状況	557	93	211	249	4
		16.7%	37.9%	44.7%	0.7%

	受診者数	あり		未記入
		人数	なし	
歯の健康指導の希望	557	260	293	4
		46.7%	52.6%	0.7%

	受診者数	あり		未記入
		人数	なし	
受診希望	557	302	251	4
		54.2%	45.1%	0.7%

	受診者数	要治療			未記入
		要経過観察	治療不要		
受診勧奨の必要性	557	291	125	137	4
		52.2%	22.4%	24.6%	0.7%

