

ケトチフェンフマル酸塩点眼薬の添付文書

アレルギー専用

ザジテン[®]AL点眼薬

Zaditen[®]

第1類医薬品

特徴

花粉・ハウスダストなどによる 目のかゆみ・充血に

トリプル・コントロール

ザジテンAL点眼薬は、3つのはたらきをもつ抗アレルギー薬「ケチフェンブマル酸塩」を配合。アレルギーの「発症」から「悪化」までのメカニズムに作用し、軽い症状を感じたときから、アレルギーをコントロールすることができます。

アレルギー症状を引き起こす誘発物質が体内に放出されないように元から抑えます。

抑える

抗アレルギー作用

鎮める

抗ヒスタミン作用

アレルギー

ヒスタミン受容体をブロックし、既にか起こってしまったアレルギー症状を鎮めます。

結膜の炎症を改善し、症状が繰り返し起こりにくい状態を保ちます。

ひどくしない

抗炎症作用



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 1才未満の小児
- 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。)



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
 - はげしい目の痛み
 - アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人とくに次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師にご相談ください。
 - 片方の目だけに症状がある場合
 - 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
 - 視力にも影響がある場合
 - 目やにの多い場合
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ**	かゆみ
目**	目の充血、刺激感*、痛み*、はれ*、かゆみ*
その他	眠気

*目のまわりを含みます。

**人によっては、使用開始初期(1~2日目)にまぶた、目の周囲、頬などにひどいかゆみ、はれ、痛みなどの症状があらわれることがあります。

- 目のかすみ改善されない場合
- 1週間位使用しても症状がよくなる場合
- 次の場合は、医師又は薬剤師に相談してください。
 - 症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合

効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量

1回1～2滴、1日4回(朝・昼・夕方及び就寝前)点眼してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
- (4) 容器の先が、まぶたやまつ毛に触れると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがあるので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) コンタクトレンズの装着液として、また、コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 本剤は点眼用にのみ使用してください。

<p>1. 使用する前に手をきれいに洗ってください。</p> 	<p>2. 下まぶたを軽く押し下げ、真上から1～2滴を点眼してください。容器の先がまぶたやまつ毛に直接触れないように、また、使用後も容器の先端やキャップは清潔に取り扱ってください。</p> 
<p>3. 滴下した後、目を閉じて、液を目にいきわたらせてください。使用後はキャップをしっかりと閉めてください。</p> 	<p>4. 目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。</p> 

成分

100mL中

ケトチフェンマル酸塩 69mg(ケトチフェンとして50mg)

添加物:ベンザルコニウム塩化物、グリセリン、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光を避け、なるべく涼しい所にキャップをきちんと閉めて、保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
4. 汚染を避けるため、他の人と共用しないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

お問い合わせ先

製品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

ノバルティス ファーマ株式会社 〒106-8618 東京都港区西麻布4-17-30
お客様相談室 電話 03(5766)2615
受付時間 9:00～17:00
(土日祝・その他当社休業日を除く)

製品に関する情報はこちら <http://www.zaditen-al.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> 電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

 NOVARTIS

製造販売元
ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区西麻布4-17-30

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

花粉・ハウスダストなどによる目のかゆみ・充血に

アイリスアレスト

第1類医薬品

ケトチフェンフマル酸塩配合 〈アレルギー用点眼薬〉

- ◆アイリスアレストは抗アレルギー成分「ケトチフェンフマル酸塩」を配合したすぐれた効きめのアレルギー専用目薬です。抗アレルギー作用、抗ヒスタミン作用、抗炎症作用、3つの作用を持つ「ケトチフェンフマル酸塩」が目のかゆみ、充血、なみだ目、異物感などのつらいアレルギー症状を改善します。
- ◆かゆみ・充血などの起こってしまった症状の改善はもちろん、「抗アレルギー作用」が花粉やハウスダストなどのアレルゲンが体内に入ってきて、かゆみや充血などのアレルギー症状を引き起こす原因物質（ヒスタミンなど）の発生を抑制するすぐれた効果があります。



使用上の注意

必ず読むこと!



⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- ① 次の人は使用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 1才未満の小児。
- ② 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります)



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
(5) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
とくに次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師にご相談ください
・片方の目だけに症状がある場合
・目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
・視力にも影響がある場合
・目やにの多い場合
(6) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚**	かゆみ
目**	目の充血、刺激感*、痛み*、はれ*、かゆみ*
その他	眠気

* 目のまわりを含みます。

** 人によっては、使用開始初期(1~2日目)にまぶた、目の周囲、頬などにひどいかゆみ、はれ、痛みなどの症状があらわれることがあります。

- (2) 目のかすみが改善されない場合。
- (3) 1週間位使用しても症状がよくなる場合。

- ③ 次の場合は、医師又は薬剤師に相談してください
症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合。

効 能

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量

1回1～2滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)点眼してください。

[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
- (4)容器の先が、まぶたやまつ毛に触れると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがあるので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5)コンタクトレンズの装着液として、また、コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6)本剤は点眼用にのみ使用してください。

成 分

100mL中

ケトチフェンフマル酸塩 69mg
(ケトチフェンとして 50mg)

添加物：ベンザルコニウム塩化物、グリセリン、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光をさけ、なるべく涼しい所にキャップをきちんと閉めて、保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれる等、何かお気付の点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

バルティスファーマ株式会社
東京都港区西麻布4丁目17番30号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)