

第2類から第3類へリスクの低い区分に変更となる 製剤の一覧とその副作用の発生状況

※重篤な副作用については症例表を添付している。(非重篤な副作用については症例表を添付していない。)

注1) 非重篤な副作用の症例数は、平成21年6月1日から平成22年5月31日までの期間に受けた副作用について企業から報告があったものを記載してある。

注2) 重篤な副作用の症例数は平成16年度から平成21年度までの期間に、PMDAに報告があったものを記載してある。

配合成分一日処方量の区分の標記は研究班での検討結果に基づき以下のように記載する。

- ・検討の結果、区分が現状のままのもの：黒字(第2類)(第3類)
- ・量的条件なしで第2類から第3類へ変更予定のもの：青字(第3類)
- ・量的条件ありで第2類から第3類へ変更予定のもの：赤字(条第3類)
- ・製品として配合量が少量のため第2類から第3類へ変更予定のもの：緑色(少条3類)

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用 [※]	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
健胃薬	オウバク(条第3類)3g 、ガジュツ(第3類)0.5g、ゲンノショウコ(第3類)1.5g	—	0	急性肝炎	1
健胃薬	オウバク(条第3類)3000mg 、ゲンチアナ(第3類)300mg、ゲンノショウコ(第3類)1380mg、トウヤク(第3類)30mg	—	0	—	0
健胃薬	エンメインソウ(第3類)0.36g 、 オウバク(条第3類)3.00g 、ニガキ(第3類)0.45g	—	0	—	0
健胃薬	エンメインソウ(第3類)0.36g 、 オウバク(条第3類)3.00g 、ニガキ(第3類)0.45g	—	0	—	0
健胃薬	エンメインソウ(第3類)0.57g 、 オウバク(条第3類)3g 、ゲンチアナ(第3類)0.5g、ゲンノショウコ(第3類)1g、トウヤク(第3類)0.03g	—	0	—	0
健胃薬	エンメインソウ(第3類)1.25g 、 オウバク(条第3類)3g 、ケイヒ(第3類)0.1g、ゲンチアナ(第3類)0.1g、トウヤク(第3類)0.05g、ニンジン(第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g 、ケツメイシ(第3類)0.67g、ゲンノショウコ(第3類)1g、トウヤク(第3類)0.03g、 ソウジュツ(条第3類)0.4g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g 、 リュウタン(条第3類)0.4g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g 、ゲンノショウコ(第3類)7.5075g、トウヤク(第3類)0.2997g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.5g 、ガジュツ(第3類)0.6g、ゲンノショウコ(第3類)0.6g、トウヤク(第3類)0.016g、 ビヤクジュツ(条第3類)0.6g 、 リュウタン(条第3類)0.15g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g 、ケツメイシ(第3類)0.67g、ゲンノショウコ(第3類)1g、トウヤク(第3類)0.03g、 ソウジュツ(条第3類)0.4g	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用 [※]	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、ケツメイシ(第3類)0.67g、ゲンノシヨウコ(第3類)1g、トウヤク(第3類)0.03g、ソウジュツ(条第3類)0.4g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.2g、カンゾウ(第3類)0.5g、ケイヒ(第3類)0.4g、ゲンチアナ(第3類)0.45g、トウヤク(第3類)0.05g、ニンジン(第3類)0.4g、	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)1g、オウバク(条第3類)2.52g、ケイヒ(第3類)0.3g、ゲンチアナ(第3類)0.2g、トウヤク(第3類)0.05g、	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1800mg、カンゾウ(第3類)500mg、ゲンチアナ(第3類)400mg、ゲンノシヨウコ(第3類)1000mg、トウヤク(第3類)50mg、	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)1.000mg、オウバク(条第3類)2.000mg、ケイヒ(第3類)400mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)1.000mg、オウバク(条第3類)2.000mg、ケイヒ(第3類)400mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、トウヤク(第3類)50mg、センブリ(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)0.9g、カンゾウ(第3類)0.6g、ケイヒ(第3類)0.9g、コウジン(第3類)0.1g、トウヤク(第3類)0.9g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.12g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.002g	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)1.000mg、オウバク(条第3類)2.000mg、ケイヒ(第3類)400mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)1.000mg、オウバク(条第3類)2.000mg、ケイヒ(第3類)400mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g	—	0	—	0
健胃薬	リュウタン(条第3類)0.45g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1200mg、ケイヒ(第3類)300mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、ゲンノシヨウコ(第3類)600mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g	—	0	—	0
健胃薬	アロエ(第3類)0.06g、オウゴン(条第3類)0.6g、オウバク(条第3類)1.2g、ガジュツ(第3類)1.2g、カンゾウ(第3類)0.6g、ケイヒ(第3類)0.3g、シヨウキョウ(第3類)0.3g、チヨウジ(第3類)0.09g、ビヤクジュツ(条第3類)0.6g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.1g、キジツ(第3類)0.8g、ゲンチアナ(第3類)0.4g、ゲンノシヨウコ(第3類)0.66g、コシヨウ(第3類)0.15g、サンシヨウ(第3類)0.15g、シヨウキョウ(第3類)0.3g、トウヤク(第3類)0.02g、ビヤクジュツ(条第3類)0.6g	—	0	—	0
健胃薬	カンゾウ(第3類)0.075g、シヨウキョウ(第3類)0.03g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.075g、ニンジン(第3類)0.1g、ビヤクジュツ(条第3類)0.06g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)0.75g、ガジュツ(第3類)0.6g、エンメイソウ(第3類)0.3g、トウヤク(第3類)0.05g、ケイヒ(第3類)0.3g、ボレイ(第3類)1.8g、動物胆(ユウタン等)(第3類)1.333g、カンゾウ(第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)0.75g、ガジュツ(第3類)0.6g、エンメイソウ(第3類)0.3g、トウヤク(第3類)0.05g、ケイヒ(第3類)0.3g、ボレイ(第3類)1.8g、動物胆(ユウタン等)(第3類)1.333g、カンゾウ(第3類)0.3g	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用 [※]	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
健胃薬	ウイキョウ(第3類)100mg、 オウバク(条第3類)900mg 、ケイヒ(第3類)800mg、ゲンチアナ(第3類)500mg、シヨウキョウ(第3類)100mg、トウヤク(第3類)30mg、チヨウジ(第3類)30mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1500mg 、ガジュツ(第3類)600mg、トウヤク(第3類)50mg、ケイヒ(第3類)600mg、ニンジン(第3類)300mg、カンゾウ(第3類)300mg、胆汁(第3類)100mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.5g 、カンゾウ(第3類)0.3g、ケイヒ(第3類)0.55g、ゲンチアナ(第3類)0.4g、ニンジン(第3類)0.45g、	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)800mg 、 オウバク(条第3類)1000mg 、カンゾウ(第3類)300mg、ケイヒ(第3類)300mg、ゲンチアナ(第3類)400mg、ゲンノシヨウコ(第3類)500mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	ウコン(第3類)270mg、 エンメイソウ(第3類)870mg 、 オウバク(条第3類)900mg 、ケイヒ(第3類)250mg、ゲンチアナ(第3類)465mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)3g 、 ソウジュツ(条第3類)1g 、ボレイ(第3類)1g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.8g 、センブリ(第3類)0.05g、ニガキ(第3類)0.45g、ボレイ(第3類)1.3g	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)0.56g 、 オウバク(条第3類)0.67g 、 オウレン(条第3類)0.15g 、ガジュツ(第3類)0.45g、トウヤク(第3類)0.05g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)0.6g 、 オウレン(条第3類)0.1g 、ゲンノシヨウコ(第3類)2.3g、シヨウキョウ(第3類)0.1g、ダイオウ(第3類)0.1g、トウヤク(第3類)0.05g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g 、 オウレン(条第3類)120mg 、ケイヒ(第3類)900mg、トウヤク(第3類)30mg、カンゾウ(第3類)300mg	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)560mg 、 オウバク(条第3類)670mg 、 オウレン(条第3類)150mg 、ガジュツ(第3類)450mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)900mg 、 オウバク(条第3類)900mg 、 オウレン(条第3類)180mg 、カンゾウ(第3類)400mg、ケイヒ(第3類)900mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.2g 、 オウレン(条第3類)0.3g 、ケイヒ(第3類)0.48g、ゲンチアナ(第3類)0.3g、シヨウキョウ(第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	オウレン(条第3類)0.3g 、カンゾウ(第3類)0.96g、ケイヒ(第3類)0.1g、ゲンチアナ(第3類)0.6g、コウジン(第3類)0.5g、 ソウジュツ(条第3類)0.6g 、チヨウジ(第3類)0.09g、ホップ(第3類)0.7g	—	0	—	0
健胃薬	オウレン(条第3類)0.3g 、カンゾウ(第3類)0.96g、ケイヒ(第3類)0.1g、ゲンチアナ(第3類)0.6g、コウジン(第3類)0.5g、 ソウジュツ(条第3類)0.6g 、チヨウジ(第3類)0.09g、ホップ(第3類)0.7g	—	0	—	0
健胃薬	オウレン(条第3類)0.3g 、カンゾウ(第3類)0.96g、ケイヒ(第3類)0.1g、ゲンチアナ(第3類)0.6g、コウジン(第3類)0.5g、 ソウジュツ(条第3類)0.6g 、チヨウジ(第3類)0.09g、ホップ(第3類)0.7g	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)0.9g 、 オウバク(条第3類)1.2g 、 オウレン(条第3類)0.45g 、炭(第3類)0.399g	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用 [※]	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
健胃薬	オウバク(条第3類)1000mg、オウレン(条第3類)300mg、 カンゾウ(第3類)250mg、ケイヒ(第3類)500mg、ゲンチアナ(第3類)400mg、ゲンノショウコ(第3類)600mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	ウイキョウ(第3類)200mg、オウレン(第2類)500mg、ケイヒ(第3類)300mg、ゲンチアナ(第3類)200mg、ショウキョウ(第3類)600mg、 ソウジュツ(条第3類)1200mg、 ニンジン(第3類)600mg、ホップ(第3類)600mg	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)540mg、オウレン(条第3類)630mg、 ケイヒ(第3類)1170mg、ショウキョウ(第3類)300mg、チヨウジ(第3類)270mg、ニンジン(第3類)600mg	—	0	—	0
健胃薬	アカメガシワ(第3類)2.5g、ウイキョウ(第3類)1.0g、キジツ(第3類)1.0g、ケイヒ(第3類)3.5g、シュクシヤ(第3類)1.0g、ショウキョウ(第3類)0.8g、 ソウジュツ(条第3類)0.5g、 チクセツニンジン(第3類)0.2g、チヨウジ(第3類)0.1g、チンピ(第3類)1.0g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.8g、 ケイヒ(第3類)0.6g、ゲンノショウコ(第3類)5.74g、トウヤク(第3類)0.9g	—	0	—	0
健胃薬	ウイキョウ(第3類)0.05g、 オウバク(条第3類)0.60g、 ケイヒ(第3類)0.10g、ショウキョウ(第3類)0.05g、トウヤク(第3類)0.05g、チヨウジ(第3類)0.05g、ボレイ(第3類)1.80g、 モッコウ(第3類)0.10g、 動物胆(ユウタン等)(第3類)0.10g	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)1,000mg、オウバク(条第3類)2,000mg、 ケイヒ(第3類)400mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.2g、 カンゾウ(第3類)0.6g、シャクヤク(第3類)0.6g、ニンジン(第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、 ケイヒ(第3類)0.5g、ゲンチアナ(第3類)0.25g、ゲンノショウコ(第3類)1.61g、トウヤク(第3類)0.05g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)0.375g、 ガジュツ(第3類)0.3g、 エンメイソウ(第3類)0.15g、 トウヤク(第3類)0.025g、ケイヒ(第3類)0.15g、ボレイ(第3類)0.9g、動物胆(ユウタン等)(第3類)1.333g、カンゾウ(第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)2.475g、 トウヤク(第3類)0.03g、 ソウジュツ(条第3類)0.5g、 ゲンノショウコ(第3類)1.02g、ケツメイシ(第3類)0.7g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、 ゲンノショウコ(第3類)1.5g、トウヤク(第3類)0.05g、ニンジン(第3類)0.5g、 リュウタン(条第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	アカメガシワ(第3類)3000mg、 オウバク(条第3類)1800mg、 ガジュツ(第3類)2700mg	—	0	—	0
健胃薬	ウイキョウ(第3類)450mg、カンゾウ(第3類)300mg、ケイヒ(第3類)795mg、ゲンチアナ(第3類)150mg、ショウキョウ(第3類)150mg、 ソウジュツ(条第3類)450mg、 ボレイ(第3類)1350mg	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用 [※]	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
健胃薬	オウバク(条第3類)1800mg、ケイヒ(第3類)150mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、ゲンノショウコ(第3類)1800mg、センブリ(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	アカメガシワ(第3類)2.5g、アロエ(第3類)0.15g、オウバク(条第3類)0.5g、オウレン(条第3類)0.019965g、ゲンチアナ(第3類)0.3g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.1g	—	0	—	0
健胃薬	アロエ(第3類)140mg、オウバク(条第3類)450mg、オウレン(条第3類)125mg、ゲンチアナ(第3類)250mg、ゲンノショウコ(第3類)5005mg、トウヤク(第3類)45mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)105mg	—	0	—	0
健胃薬	アカメガシワ(第3類)2500mg、アロエ(第3類)150mg、オウバク(条第3類)500mg、オウレン(条第3類)19.965mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)100mg	—	0	—	0
健胃薬	ウイキョウ(第3類)88mg、オウバク(条第3類)190mg、オウレン(条第3類)38mg、カンゾウ(第3類)345mg、ケイヒ(第3類)250mg、サンザシ(第3類)1400mg、ショウキョウ(第3類)86mg、チヨウジ油(第3類)3mg、ホップ(第3類)270mg、ボレイ(第3類)1400mg	—	0	—	0
健胃薬	ウイキョウ(第3類)88mg、オウバク(条第3類)190mg、オウレン(条第3類)38mg、カンゾウ(第3類)345mg、ケイヒ(第3類)250mg、サンザシ(第3類)1400mg、ショウキョウ(第3類)86mg、チヨウジ油(第3類)3mg、ホップ(第3類)270mg、ボレイ(第3類)1400mg	—	0	—	0
健胃薬	ウヅッコツ(第3類)550mg、エンメイソウ(第3類)200mg、オウバク(条第3類)200mg、オウレン(条第3類)60mg、ガジュツ(第3類)360mg、カンゾウ(第3類)600mg、キジツ(第3類)240mg、ケイヒ(第3類)240mg、シユクシヤ(第3類)100mg、ソウジュツ(条第3類)100mg、胆汁(第3類)665mg、チンピ(第3類)900mg、ニクズク(第3類)50mg、ニンジン(第3類)30mg、ボレイ(第3類)2,200mg、リョウキョウ(第3類)120mg	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)540mg、オウレン(条第3類)630mg、ケイヒ(第3類)1170mg、ショウキョウ(第3類)300mg、チヨウジ(第3類)270mg、ニンジン(第3類)600mg	—	0	—	0
その他の循環	カゴソウ(第3類)10g	—	0	—	0
その他の循環	カゴソウ(第3類)10g	—	0	—	0
その他の循環	カゴソウ(第3類)10g	—	0	—	0
その他の循環	カゴソウ(第3類)10g	—	0	—	0
その他の循環	サンキライ(第3類)20g	—	0	—	0
その他の循環	サンキライ(第3類)20g	—	0	—	0
その他の循環	サンキライ(第3類)20g	—	0	—	0
その他の循環	サンキライ(第3類)20g	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第2類)0.2g	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)2mg 、サフラン(第3類)3mg、 ジンコウ(条第3類)100mg 、シンジュ(第3類)12mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)10mg、ニンジン(第3類)250mg、リュウノウ(第3類)30mg、レイヨウカク(第3類)10mg	—	0	—	0
止瀉薬	オウバク(条第3類)2g 、ゲンノショウコ(第3類)0.4g、トウヤク(第3類)0.5g	—	0	—	0
止瀉薬	オウバク(条第3類)1.2g 、カンゾウ(第3類)0.2g、ケイヒ(第3類)0.45g、ゲンノショウコ(第3類)1.2g、トウヤク(第3類)0.05g	—	0	—	0
止瀉薬	オウゴン(条第3類)0.3g 、 オウバク(条第3類)0.9g 、ケイヒ(第3類)0.5g、ゲンノショウコ(第3類)0.6g、トウヤク(第3類)0.18g、 ヨウバイヒ(第3類)0.4g	—	0	—	0
止瀉薬	エンメインソウ(第3類)0.84g 、 オウバク(条第3類)0.9g 、ゲンノショウコ(第3類)0.84g、 ゴバイシ(第3類)0.54g 、 ヨウバイヒ(第3類)0.33g	—	0	—	0
止瀉薬	オウバク(条第3類)1.5g 、ゲンノショウコ(第3類)1.0g、トウヤク(第3類)0.3g、 ヨウバイヒ(第3類)0.4g 、	—	0	—	0
止瀉薬	オウバク(条第3類)1.2g 、ゲンノショウコ(第3類)3g、炭(第3類)1.2g	—	0	—	0
止瀉薬	オウバク(条第3類)1.125g 、 オウレン(条第3類)0.15g 、ゲンノショウコ(第3類)1.35g、 ゴバイシ(第3類)0.75g 、トウヤク(第3類)0.05g	—	0	—	0
止瀉薬	アセンヤク(第3類)500mg、 オウバク(条第3類)700mg 、 オウレン(条第3類)150mg 、ゲンチアナ(第3類)500mg、ゲンノショウコ(第3類)600mg、 ゴバイシ(第3類)500mg 、トウヤク(第3類)500mg	—	0	—	0
止瀉薬	エンメインソウ(第3類)600mg 、 オウゴン(条第3類)210mg 、 オウバク(条第3類)600mg 、 オウレン(条第3類)150mg 、ケイヒ(第3類)300mg、シャクヤク(第3類)300mg、トウヤク(第3類)750mg	—	0	—	0
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)1.404mg、 モツヤク(第3類)0.738mg 、 ラタニア(第3類)1.389mg	—	0	—	0
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)2.500mg、 モツヤク(第3類)1.240mg 、 ラタニア(第3類)2.500mg	口内炎	1	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用 [※]	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)2.808mg、 モツヤク(第3類)1.476mg 、 ラタニア(第3類)2.778mg	口腔粘膜剥離	1	—	0
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)2.808mg、 モツヤク(第3類)1.476mg 、 ラタニア(第3類)2.778mg	—	0	—	0
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)2.808mg、 モツヤク(第3類)1.476mg 、 ラタニア(第3類)2.778mg	・皮膚炎 ・味覚異常	2	—	0
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)2.808mg、 モツヤク(第3類)1.476mg 、 ラタニア(第3類)2.778mg	・口内炎(2件) ・脈拍異常 ・皮膚炎	4	—	0
小児鎮静薬 (小児五疳薬等)	オウレン(条第3類)30mg 、カンゾウ(第3類)30mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)6mg、 ゴオウ(第3類)5mg 、チヨウジ(第3類)4.5mg、ニンジン(第3類)55mg、レイヨウカク(第3類)15mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)0.01g 、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.03g、ニンジン(第3類)3.15g、ロクジョウ(第3類)0.05g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)0.050g 、ロクジョウ(第3類)0.300g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ニンジン(第3類)0.6g、 ゴオウ(第3類)0.1g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)0.2g 、ニンジン(第3類)0.3g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)100mg 、ニンジン(第3類)1500mg	そう痒症	1	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)100mg 、ニンジン(第3類)600mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)100mg 、動物胆(ユウタン等)(第3類)30mg、ニンジン(第3類)467mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	コウジン(第3類)2400mg、 ゴオウ(第3類)100mg	発疹	1	—	0
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.008g、カンゾウ(第3類)0.041g、ケイヒ(第3類)0.069g、サンヤク(第3類)0.065g、 ジオウ(少条第3類)0.014g 、シャクヤク(第3類)0.014g、 センキュウ(条第3類)0.01g 、 ソウジュツ(条第3類)0.003g 、トウキ(第3類)0.014g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.055g、ニンジン(第3類)0.006g、ニンニク(第3類)0.107g、ハンピ(第3類)2.756g、 ビャクジュツ(条第3類)0.014g 、 ブクリヨウ(条第3類)0.017g	・下痢 ・食欲不振、胃不快感	2	—	0
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.2g、オウセイ(第3類)0.2g、カンゾウ(第3類)0.1g、キキョウ(第3類)0.1g、ケイヒ(第3類)0.3g、サフラン(第3類)0.1g、サンヤク(第3類)0.5g、 ジオウ(少条第3類)0.4g 、シャクヤク(第3類)0.2g、ショウキョウ(第3類)0.2g、 センキュウ(条第3類)0.1g 、チヨウジ(第3類)0.5g、トウキ(第3類)0.1g、ニンジン(第3類)0.2g、 ブクリヨウ(条第3類)0.4g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.2g、オウセイ(第3類)0.2g、カンゾウ(第3類)0.1g、キキョウ(第3類)0.1g、ケイヒ(第3類)0.3g、サンヤク(第3類)0.5g、 ジオウ(少条第3類)0.4g 、シャクヤク(第3類)0.2g、ショウキョウ(第3類)0.2g、 センキュウ(条第3類)0.1g 、チヨウジ(第3類)0.5g、トウキ(第3類)0.1g、ニンジン(第3類)0.2g、 ブクリヨウ(条第3類)0.4g	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.2g、加工大蒜(第3類)0.1g、カンゾウ(第3類)0.5g、ケイヒ(第3類)1g、サンヤク(第3類)0.5g、 ジオウ(少条第3類)0.5g 、シヤクヤク(第3類)0.5g、 センキュウ(条第3類)0.5g 、トウキ(第3類)0.5g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.075g、ニンジン(第3類)3g、ハンピ(第3類)0.18g、 ビヤクジュツ(条第3類)0.5g 、 ブクリヨウ(条第3類)0.15g	胃不快感	1	—	0
生薬主薬製剤	ウナギ(第3類)0.353g、カンゾウ(第3類)0.176g、キキョウ(第3類)0.353g、ケイヒ(第3類)0.353g、サンヤク(第3類)0.495g、 ジオウ(少条第3類)0.353g 、シヤクヤク(第3類)0.176g、ショウキョウ(第3類)0.176g、 センキュウ(条第3類)0.106g 、トウキ(第3類)0.106g、ドベッコウ(第3類)0.353g、ニンジン(第3類)0.123g、 ブクリヨウ(条第3類)0.353g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)0.01g 、 ジオウ(少条第3類)0.3g 、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.016g、ニンジン(第3類)0.3g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.4g、 オウバク(条第3類)0.2g 、ニンニク(第3類)6g、カンゾウ(第3類)0.15g、ケイヒ(第3類)0.3g、 ゴオウ(第3類)0.01g 、 サイコ(少条第3類)0.2g 、 ジオウ(少条第3類)0.3g 、シヤクヤク(第3類)0.3g、ショウキョウ(第3類)0.15g、トウキ(第3類)0.3g、ニンジン(第3類)3.015g、 ビヤクジュツ(条第3類)0.3g 、 ブクリヨウ(条第3類)0.3g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	カンゾウ(第3類)100mg、ケイヒ(第3類)250mg、コウジン(第3類)3000mg、 ゴオウ(第3類)10mg 、シヤクヤク(第3類)300mg、 センキュウ(条第3類)180mg 、トウキ(第3類)180mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)50mg、 ポウフウ(少条第3類)180mg 、ロクジョウ(第3類)5mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	カッコウ(条第3類)162mg 、ケイヒ(第3類)105mg、 ゴオウ(第3類)12mg 、ショウキョウ(第3類)105mg、 センキュウ(条第3類)158mg 、チンピ(第3類)172mg、トウキ(第3類)264mg、ニンジン(第3類)53mg、 ビヤクシ(条第3類)11mg 、 ビヤクジュツ(条第3類)158mg 、 ポウフウ(少条第3類)250mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	オンジ(第3類)285mg、コウジン(第3類)3300mg、サフラン(第3類)90mg、 ジンコウ(条第3類)10mg 、レイヨウカク(第3類)100mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.25g、カンゾウ(第3類)0.045g、シコン(第3類)7.5g、ジウヤク(第3類)1.5g、 センキュウ(条第3類)0.225g 、トウキ(第3類)0.342g、ニンジン(第3類)3.0g、ヨクイニン(第3類)1.8g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	カンゾウ(第3類)100mg、 ゴオウ(第3類)100mg 、ニンジン(第3類)500mg	・不眠症 ・頭痛、耳鳴、ほてり ・不眠症、悪寒	3	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	モッカ(第3類)6.0g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	オウゴン(条第3類)0.61g 、カンゾウ(第3類)0.61g、 サイコ(少条第3類)0.61g 、ショウキョウ(第3類)0.131g、 ソウジュツ(条第3類)0.61g 、タイソウ(第3類)0.754g、ニンジン(第3類)0.61g、 ハンゲ(少条第3類)0.551g 、 ブクリヨウ(条第3類)1.223g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	インテンコウ(条第3類)3g 、ケイヒ(第3類)0.5g、ケツメイシ(第3類)10g、 サイコ(少条第3類)0.5g 、 サンシシ(第3類)1.5g 、 タクシャ(条第3類)1g 、 チヨレイ(条第3類)0.6g 、 ビヤクジュツ(条第3類)0.6g 、 ブクリヨウ(条第3類)0.6g	・発赤 ・疼痛	2	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	ゴミシ(第3類)0.190g、サンシュユ(第3類)0.370g、サンヤク(第3類)0.370g、 ジオウ(少条第3類)0.750g、タクシヤ(条第3類)0.280g 、バクモンドウ(第3類)0.280g、 ブクリヨウ(条第3類)0.280g 、 ポタンピ(少条第3類)0.280g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	ジオウ(少条第3類)0.25g 、シャクヤク(第3類)0.45g、 センキュウ(条第3類)1.5g 、トウキ(第3類)1.5g、 ビヤクジュツ(条第3類)2g 、 ブクリヨウ(条第3類)2g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	カツコン(条第3類)0.3g 、カンゾウ(第3類)0.41g、キキョウ(第3類)0.7g、キジツ(第3類)0.26g、シヨウキョウ(第3類)0.055g、 ゼンコ(条第3類)0.5g 、シソヨウ(第3類)0.3g、タイソウ(第3類)0.005g、チクセツニンジン(第3類)0.005g、チンピ(第3類)0.2g、 ハンゲ(少条第3類)0.5g 、 ブクリヨウ(条第3類)0.9g 、 モッコウ(第3類)0.005g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	オウヒ(第3類)0.54g、カンゾウ(第3類)0.54g、キキョウ(第3類)0.54g、 ケイガイ(条第3類)0.54g 、 サイコ(少条第3類)0.54g 、シヨウキョウ(第3類)0.54g、 センキュウ(条第3類)0.54g 、デンブン(第3類)0.6g、 ドクカツ(条第3類)0.54g 、ハマボウフウ(第3類)0.54g、 ブクリヨウ(条第3類)0.54g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	オウギ(第3類)0.54g、カンゾウ(第3類)0.42g、ケイヒ(第3類)0.48g、 ジオウ(少条第3類)0.6g 、シャクヤク(第3類)0.48g、 センキュウ(条第3類)0.48g 、トウキ(第3類)0.6g、ニンジン(第3類)0.6g、ハチミツ(第3類)0.6g、 ビヤクジュツ(条第3類)0.6g 、 ブクリヨウ(条第3類)0.6g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	シャクヤク(第3類)1.5g、シヨウキョウ(第3類)0.6g、 ソウジュツ(条第3類)2g 、 ブクリヨウ(条第3類)2.9g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	ケイヒ(第3類)0.823g、 ソウジュツ(条第3類)1.076g 、 タクシヤ(条第3類)2.25g 、 チヨレイ(条第3類)0.823g 、 ブクリヨウ(条第3類)0.823g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	シャクヤク(第3類)1.452g、シヨウキョウ(第3類)0.726g、 ソウジュツ(条第3類)1.451g 、 ブクリヨウ(条第3類)1.452g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	シヨウキョウ(第3類)0.325g、 ソウジュツ(条第3類)1.207g 、チンピ(第3類)1.392g、ニンジン(第3類)0.928g、 ブクリヨウ(条第3類)1.99g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	カンキョウ(第3類)0.346g、カンゾウ(第3類)0.691g、ケイヒ(第3類)1.401g、チンピ(第3類)0.207g、ニンジン(第3類)0.691g、 ビヤクジュツ(条第3類)0.691g 、 ブクリヨウ(条第3類)0.691g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	オウバク(条第3類)0.24g 、 ヨウバイヒ(第3類)0.0578g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	カンゾウ(第3類)0.9375g、 サンソウニン(第3類)24.000g 、 センキュウ(条第3類)1.875g 、チモ(第3類)1.875g、 ブクリヨウ(条第3類)1.875g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	シャクヤク(第3類)0.9g、 センキュウ(条第3類)0.78g 、 タクシヤ(条第3類)1.2g 、デンブン(第3類)0.54g、トウキ(第3類)0.78g、 ビヤクジュツ(条第3類)0.9g 、 ブクリヨウ(条第3類)0.9g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	シャクヤク(第3類)2.476g、 センキュウ(条第3類)1.468g 、 ソウジュツ(条第3類)0.388g 、 タクシヤ(条第3類)0.776g 、トウキ(第3類)1.08g、 ブクリヨウ(条第3類)0.388g	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	オウギ(第3類)0.062g、カンゾウ(第3類)0.371g、ケイヒ(第3類)0.804g、シャクヤク(第3類)1.684g、ショウキョウ(第3類)0.309g、 ソウジュツ(条第3類)0.619g 、タイソウ(第3類)2.475g、トウキ(第3類)0.062g、 ブクリョウ(条第3類)0.619g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)5g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)5g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)5g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)10g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)10g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)10g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)10g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	アセンヤク(第3類)8.4mg、カンゾウ(第3類)102mg、キキョウ(第3類)84mg、 キョウニン(少条第3類)15mg 、セネガ(第3類)4.2mg、ニンジン(第3類)84mg	湿疹	1	中毒性湿疹	1
鎮咳去痰薬	アセンヤク(第3類)8.4mg、カンゾウ(第3類)102mg、キキョウ(第3類)84mg、 キョウニン(少条第3類)15mg 、セネガ(第3類)4.2mg、ニンジン(第3類)84mg	発赤	1	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)50mg、キキョウ(第3類)70mg、 キョウニン(少条第3類)5mg 、セネガ(第3類)3mg	・蕁麻疹 ・発疹	2	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)50mg、キキョウ(第3類)70mg、 キョウニン(少条第3類)5mg 、セネガ(第3類)3mg	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)428.7mg、キキョウ(第3類)82.2mg、 キョウニン(少条第3類)6mg 、セネガ(第3類)4.2mg、ニンジン(第3類)84mg	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)428.7mg、キキョウ(第3類)82.2mg、 キョウニン(少条第3類)6mg 、セネガ(第3類)4.2mg、ニンジン(第3類)84mg	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)428.7mg、キキョウ(第3類)82.2mg、 キョウニン(少条第3類)6mg 、セネガ(第3類)4.2mg、ニンジン(第3類)84mg	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)0.33g、キキョウ(第3類)2.5g、 シャゼンソウ(第3類)1.33g 、 モツカ(第3類)0.833g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	オウゴン(条第3類)96mg 、 オウレン(条第3類)30mg 、カンゾウ(第3類)34.8mg、ケイヒ(第3類)180mg、シャクヤク(第3類)300mg、 センキュウ(条第3類)420mg 、 ソウジュツ(条第3類)96mg 、チクセツニンジン(第3類)18mg、チヨウジ(第3類)96mg、トウキ(第3類)420mg、 ブクリョウ(条第3類)49.2mg	—	0	—	0
婦人薬	カンゾウ(第3類)0.9g、 ジオウ(少条第3類)0.5g 、シャクヤク(第3類)0.9g、 センキュウ(条第3類)0.9g 、トウキ(第3類)1.8g、ニンジン(第3類)0.3g	—	0	中毒性皮膚壊死症	1
婦人薬	カンゾウ(第3類)0.9g、 ジオウ(少条第3類)0.5g 、シャクヤク(第3類)0.9g、 センキュウ(条第3類)0.9g 、トウキ(第3類)1.8g、ニンジン(第3類)0.3g	・そう痒症、食欲不振、悪心 ・胃不快感	2	—	0
婦人薬	カノコソウ(第3類)50mg、カンゾウ(第3類)30mg、ケイヒ(第3類)20mg、サフラン(第3類)5mg、シャクヤク(第3類)50mg、ジュウヤク(第3類)60mg、トウキ(第3類)60mg、ニンジン(第3類)50mg、 ブクリョウ(条第3類)24mg 、 ポウフウ(少条第3類)60mg 、 ポタンピ(少条第3類)50mg	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
婦人薬	ケイヒ(第3類)100mg、コウカ(第3類)100mg、シャクヤク(第3類)400mg、 センキュウ(条第3類)300mg、ソウジュツ(条第3類)200mg 、トウキ(第3類)300mg、ニンジン(第3類)300mg、 ブクリョウ(条第3類)200mg 、 ポタンピ(少条第3類)200mg	—	0	—	0
婦人薬	ケイヒ(第3類)400mg、コウカ(第3類)300mg、シャクヤク(第3類)1300mg、ショウキョウ(第3類)300mg、 センキュウ(条第3類)1000mg、タクシャ(条第3類)500mg 、トウキ(第3類)400mg、 ビヤクジュツ(条第3類)500mg 、 ブクリョウ(条第3類)500mg 、 ポタンピ(少条第3類)300mg 、ボレイ(第3類)500mg	—	0	—	0
婦人薬	カノコソウ(第3類)0.24g、カンゾウ(第3類)0.24g、ケイヒ(第3類)0.24g、サフラン(第3類)0.006g、シャクヤク(第3類)0.24g、ショウキョウ(第3類)0.12g、 センキュウ(条第3類)0.36g 、トウキ(第3類)0.24g、ニンジン(第3類)0.06g、 ビヤクジュツ(条第3類)0.24g 、 ブクリョウ(条第3類)0.24g 、 モクツウ(少条第3類)0.24g	—	0	—	0
婦人薬	ウコン(第3類)0.16g、 カッコウ(条第3類)0.66g 、カンゾウ(第3類)0.80g、コショウ(第3類)0.14g、サフラン(第3類)0.08g、シタン(第3類)1.88g、シクシャ(第3類)0.24g、ニンジン(第3類)0.16g、 モッコウ(第3類)0.08g	—	0	—	0
婦人薬	オウギ(第3類)0.563g、カンゾウ(第3類)0.938g、ケイヒ(第3類)0.563g、シャクヤク(第3類)0.75g、ショウキョウ(第3類)0.188g、 センキュウ(条第3類)0.788g 、タイソウ(第3類)0.563g、 タクシャ(条第3類)0.75g 、トウキ(第3類)0.75g、 ビヤクジュツ(条第3類)1.088g 、 ブクリョウ(条第3類)1.313g	—	0	—	0
婦人薬	オウギ(第3類)0.061g、カンゾウ(第3類)0.368g、ケイヒ(第3類)0.797g、シャクヤク(第3類)1.225g、ショウキョウ(第3類)0.306g、 センキュウ(条第3類)0.882g 、 ソウジュツ(条第3類)0.613g 、タイソウ(第3類)2.451g、 タクシャ(条第3類)1.765g 、トウキ(第3類)0.943g、 ブクリョウ(条第3類)0.613g	—	0	—	0
婦人薬	カンゾウ(条第3類)0.21g 、ケイヒ(第3類)0.21g、サフラン(第3類)0.03g、シャクヤク(第3類)0.39g、 センキュウ(条第3類)0.39g 、トウキ(第3類)0.39g、ニンジン(第3類)0.09g、 ブクリョウ(条第3類)0.39g 、 モッコウ(第3類)0.21g	—	0	—	0
婦人薬	オウゴン(条第3類)1g 、シャクヤク(第3類)1g、 センキュウ(条第3類)1g 、 ソウジュツ(条第3類)0.5g 、トウキ(第3類)1g、 ブクリョウ(条第3類)0.5g	・下痢 ・胃不快感	2	—	0
婦人薬	ケイヒ(第3類)500mg、シャクヤク(第3類)1700mg、ショウキョウ(第3類)500mg、 センキュウ(条第3類)1100mg 、 タクシャ(条第3類)600mg 、トウキ(第3類)400mg、 ビヤクジュツ(条第3類)600mg 、 ブクリョウ(条第3類)600mg	悪心、嘔吐	3	—	0
婦人薬	ケイヒ(第3類)375mg、シャクヤク(第3類)1275mg、ショウキョウ(第3類)375mg、 センキュウ(条第3類)825mg 、 タクシャ(条第3類)450mg 、トウキ(第3類)300mg、 ビヤクジュツ(条第3類)450mg 、 ブクリョウ(条第3類)450mg	—	0	—	0
その他薬効群	ゴオウ(第3類)100mg 、ニンジン(第3類)700mg	—	0	—	0
その他薬効群	ケイヒ(第3類)200mg、コウジン(第3類)1660mg、 ゴオウ(第3類)15mg 、ローヤルゼリー(第3類)100mg、ロクジョウ(第3類)50mg	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用 [※]	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
その他薬効群	アロエ(第3類)225mg、カノコソウ(第3類)720mg、カンゾウ(第3類)225mg、ケツメイシ(第3類)1080mg、 ジオウ(少条第3類)630mg 、ダイオウ(第3類)1350mg、 リュウタン(条第3類)135mg	—	0	—	0
その他薬効群	オウバク(条第3類)1.2g 、カンゾウ(第3類)0.5g、ケイヒ(第3類)0.4g、ゲンチアナ(第3類)0.45g、トウヤク(第3類)0.05g、ニンジン(第3類)0.4g、	—	0	—	0
その他薬効群	オウバク(条第3類)0.3g 、カンゾウ(第3類)0.5g、ケイヒ(第3類)1g、ゲンチアナ(第3類)0.125g、チンピ(第3類)0.5g、ニンジン(第3類)1.1g	—	0	—	0
その他薬効群	オウバク(条第3類)1800mg 、カンゾウ(第3類)500mg、ゲンチアナ(第3類)400mg、ゲンノショウコ(第3類)1000mg、トウヤク(第3類)50mg、	—	0	—	0
その他薬効群	オウバク(条第3類)0.9g 、ケイヒ(第3類)0.9g、カンゾウ(第3類)0.45g、トウヤク(第3類)0.9g	—	0	—	0
その他薬効群	オウバク(条第3類)0.75g 、ガジュツ(第3類)0.6g、 エンメイソウ(第3類)0.3g 、トウヤク(第3類)0.05g、ケイヒ(第3類)0.3g、ボレイ(第3類)1.8g、動物胆(ユウタン等)(第3類)1.333g、カンゾウ(第3類)0.3g	—	0	—	0
その他薬効群	アセンヤク(第3類)500mg、 オウバク(条第3類)600mg 、カンゾウ(第3類)300mg、ケイヒ(第3類)600mg、ゲンチアナ(第3類)100mg、ゲンノショウコ(第3類)750mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
その他薬効群	アセンヤク(第3類)500mg、 オウバク(条第3類)600mg 、カンゾウ(第3類)300mg、ケイヒ(第3類)600mg、ゲンチアナ(第3類)100mg、ゲンノショウコ(第3類)750mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
その他薬効群	アカメガシワ(第3類)3000mg、 オウバク(条第3類)1800mg 、ガジュツ(第3類)2700mg	—	0	—	0
その他薬効群	ゴオウ(第3類)0.02g 、 ジンヨウ(条第3類)0.09g 、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.09g、ニンジン(第3類)0.2g、リュウノウ(第3類)0.06g	—	0	—	0
その他薬効群	ゴオウ(第3類)0.02g 、 ジンヨウ(条第3類)0.09g 、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.09g、ニンジン(第3類)0.2g、リュウノウ(第3類)0.06g	—	0	—	0
その他薬効群	オウギ(第3類)1g、 オウレン(条第3類)0.3g 、カンゾウ(第3類)0.3g、ゴミシ(第3類)0.3g、サンザシ(第3類)0.3g、サンヤク(第3類)0.3g、 シンキク(第3類)0.3g 、トウキ(第3類)1g、ニンジン(第3類)0.3g、 モッコウ(第3類)0.3g 、リュウコツ(第3類)0.3g、レンニク(第3類)0.3g	—	0	—	0