

予防接種の記録 (2)

定期予防接種 (児童)

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
ジフテリア・破傷風 Diphtheria・Tetanus	第2期			右左
日本脳炎 Japanese Encephalitis	第2期			右左

任意予防接種

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
Hib (インフルエンザ菌b型) Haemophilus influenza Type B	1回			右左
	2回			右左
	3回			右左
	追加			右左
小児肺炎球菌 (7価結合型) Streptococcus pneumoniae	1回			右左
	2回			右左
	3回			右左
	追加			右左
水痘 (水ぼうそう) Chickenpox(Varicella)				右左
おたふくかぜ Mumps				右左

予防接種の記録 (3)

任意予防接種

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
ヒトパピローマ ウイルス (HPV) Human Papilloma Virus	1回			右左
	2回			右左
	3回			右左

インフルエンザ Influenza			
接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
			右左

※その他の任意予防接種はP.48の「その他の予防接種」欄にご記入ください。

母子健康手帳 P63 新生児聴覚検査

◎新生児聴覚検査について

赤ちゃんは1歳前でも、色々な音を聞いたり、声を出したりして、話し始めるための準備をしています。ことばの発達の上で、とても大切な時期です。

生まれつき、聴覚に障害を持つ赤ちゃんは1000人に1～2人といわれています。医療機関には、赤ちゃんが眠っている間に、音を聞かせてその反応を記録する方法で聴覚検査を行っているところがあります。赤ちゃんに負担なく数分から10分間程度で安全に行うことができ、痛みや検査による害はありません。

なお、新生児聴覚検査は健康保険が適用されないので、自費診療となります。耳の聞こえについて気になるときは、医師や保健所にご相談ください。

《原稿位置の配置》

新生児聴覚検査

SIDS の予防のために