

| 農作物 | 試験圃場数 | 試験条件 | | 回数 | 経過日数 | 最大残留値 (ppm) 注1) |
|---|-------|-------------------|---|----|------|------------------------------------|
| | | 剤型 | 使用量・使用方法 | | | |
| ○ブルーベリー (果実) | 13 | メタラキシル 25.2%乳剤 | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | 2 | 0 | 圃場A: 1.63* (#) 圃場A: 1.54* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 18 | 圃場A: 0.24* (#) 圃場A: 0.13* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 34 | 圃場A: <0.05* (#) 圃場A: 0.07* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 0 | 圃場B: 1.53* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 18 | 圃場B: 0.46* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 34 | 圃場B: 0.25* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 0 | 圃場C: 0.06* (#) 圃場C: <0.05* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 16 | 圃場C: <0.05* (#) 圃場C: <0.05* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 31 | 圃場C: 0.05* (#) 圃場C: 0.05* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 0 | 圃場D: 0.07* (#) 圃場D: 0.07* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 14 | 圃場D: <0.05* (#) 圃場D: <0.05* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 29 | 圃場D: <0.05* (#) 圃場D: <0.05* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 0 | 圃場E: 0.10* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 14 | 圃場E: 0.17* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 29 | 圃場E: 0.24* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 0 | 圃場F: <0.05* (#) 圃場F: <0.05* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 14 | 圃場F: 0.06* (#) 圃場F: 1.62* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 28 | 圃場F: 0.09* (#) 圃場F: 0.09* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 0 | 圃場G: 0.15* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 14 | 圃場G: 0.15* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 28 | 圃場G: 0.16* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 0 | 圃場H: <0.05* (#) |
| | | | 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | | 14 | 圃場H: <0.05* (#) |
| | | | 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | | 28 | 圃場H: <0.05* (#) |
| 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | 0 | 圃場I: <0.05* (#) | | | | |
| 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | 14 | 圃場I: <0.05* (#) | | | | |
| 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | 28 | 圃場I: <0.05* (#) | | | | |
| 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | 0 | 圃場J: <0.05* (#) | | | | |
| 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | 14 | 圃場J: <0.05* (#) | | | | |
| 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | 28 | 圃場J: 0.08* (#) | | | | |
| 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | 0 | 圃場K: <0.05* (#) | | | | |
| 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | 14 | 圃場K: <0.05* (#) | | | | |
| 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | 28 | 圃場K: 0.07* (#) | | | | |
| 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | 0 | 圃場L: 1.1* (#) | | | | |
| 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | 14 | 圃場L: 0.05* (#) | | | | |
| 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | 30 | 圃場L: <0.05* (#) | | | | |
| 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | 0 | 圃場M: 0.61* (#) | | | | |
| 7.24 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計14.48 lbs.ai/A | 14 | 圃場M: <0.05* (#) | | | | |
| 3.62 lbs.ai/A 带状土壌散布1回 土壌灌注1回 合計7.24 lbs.ai/A | 28 | 圃場M: 0.05* (#) | | | | |

| 農作物 | 試験 圃場数 | 試験条件 | | | 最大残留値(ppm) 注1) | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|----|-----------------------------------|
| | | 剤型 | 使用量・使用方法 | 回数 | 経過日数 | | | |
| ○アーモンド (子実) | 6 | メダラキシル 25.2%乳剤 | 8.0 lbs.ai/A 全面散布 | 1 | 0 | 圃場A: 0.17* (#) 圃場A: 0.16* (#) | | |
| | | | | | 14 | 圃場A: 0.25* (#) 圃場A: 0.25* (#) | | |
| | | | | | 29 | 圃場A: 0.20* (#) 圃場A: 0.19* (#) | | |
| | | | | | 0 | 圃場B: 0.23* (#) 圃場B: 0.23* (#) | | |
| | | | | | 14 | 圃場B: 0.33* (#) 圃場B: 0.36* (#) | | |
| | | | | | 29 | 圃場B: 0.32* (#) 圃場B: 0.31* (#) | | |
| | | | 0 | | 圃場C: <0.05* (#) 圃場C: <0.05* (#) | | | |
| | | | 14 | | 圃場C: <0.05* (#) 圃場C: <0.05* (#) | | | |
| | | | 28 | | 圃場C: <0.05* (#) 圃場C: <0.05* (#) | | | |
| | | | 0 | | 圃場D: <0.05* (#) 圃場D: <0.05* (#) | | | |
| | | | 14 | | 圃場D: <0.05* (#) 圃場D: <0.05* (#) | | | |
| | | | 28 | | 圃場D: <0.05* (#) 圃場D: <0.05* (#) | | | |
| | | 0 | 圃場E: 0.15* (#) 圃場E: 0.19* (#) | | | | | |
| | | 14 | 圃場E: 0.19* (#) 圃場E: 0.22* (#) | | | | | |
| | | 29 | 圃場E: 0.17* (#) 圃場E: 0.17* (#) | | | | | |
| | | 0 | 圃場F: 0.88* (#) 圃場F: 0.59* (#) | | | | | |
| | | 14 | 圃場F: 0.80* (#) 圃場F: 0.66* (#) | | | | | |
| | | 29 | 圃場F: 0.71* (#) 圃場F: 0.57* (#) | | | | | |
| | | ○クルミ (子実) | 6 | メダラキシル 25.2%乳剤 | 8.0 lbs.ai/A 全面散布 | 1 | 0 | 圃場A: 0.08* (#) 圃場A: 0.07* (#) |
| | | | | | | | 15 | 圃場A: 0.09* (#) 圃場A: 0.06* (#) |
| | | | | | | | 30 | 圃場A: 0.08* (#) 圃場A: 0.08* (#) |
| | | | | | | | 0 | 圃場B: 0.08* (#) 圃場B: 0.08* (#) |
| | | | | | | | 15 | 圃場B: 0.08* (#) 圃場B: 0.13* (#) |
| | | | | | | | 30 | 圃場B: 0.07* (#) 圃場B: <0.05* (#) |
| 0 | 圃場C: <0.05* (#) 圃場C: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 14 | 圃場C: <0.05* (#) 圃場C: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 30 | 圃場C: <0.05* (#) 圃場C: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 0 | 圃場D: <0.05* (#) 圃場D: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 14 | 圃場D: 0.05* (#) 圃場D: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 30 | 圃場D: <0.05* (#) 圃場D: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 0 | 圃場E: <0.05* (#) 圃場E: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 16 | 圃場E: <0.05* (#) 圃場E: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 30 | 圃場E: <0.05* (#) 圃場E: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 0 | 圃場F: <0.05* (#) 圃場F: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 16 | 圃場F: <0.05* (#) 圃場F: <0.05* (#) | | | | | | | |
| 30 | 圃場F: <0.05* (#) 圃場F: <0.05* (#) | | | | | | | |

| 農作物 | 試験 圃場数 | 試験条件 | | | 経過日数 | 最大残留値 (ppm) ^{註1)} | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|------------------|----------------------------|------------------|
| | | 剤型 | 使用量・使用方法 | 回数 | | | |
| 結球レタス | 14 | リタソ10.0%水和剤 | リタソ乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 5回 | 7日、14日 | 圃場A: 0.08 ** (H) | |
| | | | 圃場B: 1.5 ** (H) | | | | |
| | | | 圃場C: 0.50 ** (H) | | | | |
| | | | 圃場D: 0.19 ** (H) | | | | |
| | | | 圃場E: 4.7 ** (H) | | | | |
| | | | 圃場F: 1.4 ** (H) | | | | |
| | | リタソ25.1%乳剤 もしくは リタソ15%粒剤 | リタソ乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 5回 | 5日 | 圃場G: 0.44 ** (H) | |
| | | | 圃場H: 3.3 ** (H) | | | | |
| | | | 圃場I: 2.3 ** (H) | | | | |
| | | | 圃場J: 0.49 ** (H) | | | | |
| | | | 圃場K: <0.06 ** (H) | | | | |
| | | | 圃場L: 0.33 ** (H) | | | | |
| | リタソ10.0%水和剤 | リタソ水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 5回 | 7日 | 圃場M: 0.63 ** (H) | | |
| | | 圃場N: 0.10 ** (H) | | | | | |
| | | リタソ4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | | | 5回 | 5日 | 圃場O: 0.89 ** (H) |
| | | | | | | | 圃場P: 3.7 ** (H) |
| | | | | | | | 圃場Q: 4.9 ** (H) |
| | | | | | | | 圃場R: 0.12 ** (H) |
| | 圃場S: 0.47 ** (H) | | | | | | |
| | 圃場T: 0.21 ** (H) | | | | | | |
| | 6 | リタソ25.1%乳剤 もしくは リタソ10.0%水和剤 | リタソ乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理1回 | 5回 | 7日、14日 | 圃場A: 0.08 ** (H) | |
| | | | 圃場B: 0.19 ** (H) | | | | |
| | | | 圃場C: 4.26 ** (H) | | | | |
| | | リタソ10.0%水和剤 | リタソ水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 5回 | 7日 | 圃場D: 1.43 ** (H) | |
| 圃場E: 1.46 ** (H) | | | | | | | |
| 圃場F: 0.50 ** (H) | | | | | | | |
| 8 | リタソ15%粒剤 もしくは リタソ10.0%水和剤 | リタソ乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理1回 | 5回 | 4日 | 圃場A: 0.44 ** (H) | | |
| | | 圃場B: 3.3 ** (H) | | | | | |
| | | 圃場C: 2.3 ** (H) | | | | | |
| | | 圃場D: 0.49 ** (H) | | | | | |
| | | 圃場E: <0.05 ** (H) | | | | | |
| | | 圃場F: 0.33 ** (H) | | | | | |
| | リタソ10.0%水和剤 | リタソ水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 5回 | 5日 | 圃場G: 0.63 ** (H) | | |
| | | 圃場H: 0.10 ** (H) | | | | | |
| | | リタソ4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理1回 | | | 5回 | 5日 | 圃場I: 0.89 ** (H) |
| | | | | | | | 圃場J: 3.7 ** (H) |
| | | | | | | | 圃場K: 4.9 ** (H) |
| | | | | | | | 圃場L: 0.12 ** (H) |
| 圃場M: 0.47 ** (H) | | | | | | | |
| 圃場N: 0.21 ** (H) | | | | | | | |

| 農作物 | 試験 圃場数 | 試験条件 | | | 経過日数 | 最大残留値 (ppm) ^{注1)} |
|--------------|-----------|--|--------------------------------------|----|-------------------|----------------------------|
| | | 剤型 | 使用量・使用方法 | 回数 | | |
| 非結球レタス | 10 | ワザン25.1%乳剤 もしくは ワザン5%粒剤 ワザン10.0%水和 剤 | ワザン乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 5回 | 5日 | 圃場A: 3.8 ** (H) |
| | | | ワザン水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | | | 圃場B: 0.71 ** (H) |
| | | | ワザン乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | | | 圃場C: 1.4 ** (H) |
| | | | ワザン水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | | | 圃場D: 1.6 ** (H) |
| | | ワザン乳剤 4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 圃場E: 0.80 ** (H) | | | |
| | | ワザン水和剤 0.4 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 圃場F: 1.4 ** (H) | | | |
| | | ワザン乳剤 4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 圃場G: 1.6 ** (H) | | | |
| | | ワザン水和剤 0.4 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 圃場H: 0.80 ** (H) | | | |
| | | ワザン乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 圃場B: 1.1 ** (H) | | | |
| | | ワザン水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 圃場C: 1.2 ** (H) | | | |
| | | ワザン乳剤 4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 圃場D: 0.82 ** (H) | | | |
| | | ワザン水和剤 0.4 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 圃場E: 1.7 ** (H) | | | |
| セロリ | 8 | ワザン25.1%乳剤 もしくは ワザン5%粒剤 ワザン10.0%水和 剤 | ワザン乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 5回 | 5日 | 圃場A: 1.6 ** (H) |
| | | | ワザン水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | | | 圃場B: 0.42 ** (H) |
| | | | ワザン乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | | | 圃場C: 0.57 ** (H) |
| | | | ワザン水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | | | 圃場D: 0.88 ** (H) |
| | | ワザン乳剤 4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 圃場E: 1.8 ** (H) | | | |
| | | ワザン水和剤 0.4 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 圃場F: 0.83 ** (H) | | | |
| | | ワザン乳剤 4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 圃場G: 2.1 ** (H) | | | |
| | | ワザン水和剤 0.4 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 圃場H: 0.67 ** (H) | | | |
| | | ワザン乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 圃場A: 0.42 ** (H) | | | |
| | | ワザン水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 圃場B: 2.1 ** (H) | | | |
| | | ワザン乳剤 4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理(混和)1回 | 圃場C: 1.1 (S, S) ** (H) | | | |
| | | ワザン水和剤 0.4 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | 圃場D: 2.3 ** (H) | | | |
| にんじん (根部) | 4 | ワザン25.1%乳剤 ワザン10.0%水和 剤 | ワザン乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理1回 | 5回 | 7日 | 圃場A: <0.05 ** (H) |
| | | | ワザン水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | | | 圃場B: 0.22 ** (H) |
| | | | ワザン乳剤 4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理1回 | | 圃場C: 0.06 ** (H) | |
| | | | ワザン水和剤 0.4 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | | 圃場D: <0.05 ** (H) | |
| にんじん (葉部) | 4 | ワザン25.1%乳剤 ワザン10.0%水和 剤 | ワザン乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理1回 | 5回 | 7日 | 圃場A: 0.9 ** (H) |
| | | | ワザン水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | | | 圃場B: 0.28 ** (H) |
| | | | ワザン乳剤 4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理1回 | | 圃場C: 2.9 ** (H) | |
| | | | ワザン水和剤 0.4 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | | 圃場D: 6.7 ** (H) | |
| | | | ワザン乳剤 2.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理1回 | 5回 | 7日 | 圃場A: 3.6 ** (H) |
| | | | ワザン水和剤 0.2 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | | | 圃場B: 1.7 ** (H) |
| | | | ワザン乳剤 4.0 lbs. ai/A 播付時土壌処理1回 | | 圃場C: 4.4 ** (H) | |
| | | | ワザン水和剤 0.4 lbs. ai/A 茎葉散布4回 | | 圃場D: 7.1 ** (H) | |