

【商品選択画面】

- 商品一覧画面等から希望の商品を選択すると商品の詳細画面へ展開。
- 用法・用量や商品の価格、商品説明として成分に関する表示が記載されている。
- この画面では数量を選択して、「カートに入れる」で次画面へ展開。

商品名

アンプロキシノール塩酸塩配合！！

商品名

商品コード:

JANコード:

商品名

は、熱・せき・たん・のどの痛み・鼻水・鼻づまりなどのつらいかぜの症状に対しよく効くよう処方設計されたかぜ薬です。スイッチOTC成分として医療用で使用されているアンプロキシノール塩酸塩(去痰成分)の他、イブプロフェン(解熱鎮痛成分)及び、ヨウ化イブプロキサド(鼻水抑制成分)を配合しています。

【効能・効果】

かぜの諸症状(発熱、悪寒、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

成人(15才以上)・・・3錠

15才未満・・・服用しないこと

【用法・用量に関連する注意】

・用法・用量を厳守してください。

定価=2,289円(税込) 販売価格=1,550円(税込)

14ポイント獲得

送料・手数料について

数量 1

カートに入れる

お気に入りリストに追加する

URLをケータイに送信する

商品説明

【成分】9錠(成人1日量)中イブプロフェン・・・アンプロキシノール塩酸塩・・・ヨウ化イブプロキサド・・・

【注文確認画面】

- 数量確認や配送先、支払い方法についての確認に加え、20歳以上かどうかの確認を求めるチェックボックスあり。
- このチェックを入れなければ次画面に展開できず、「チェックを入れてください」とのメッセージが表示される。

商品名	価格(税込)	数量	獲得ポイント	小計
商品名	1,300円	2 <input type="button" value="変更"/>	-	3,100円 <input type="button" value="削除"/>
商品の合計金額(税込)				3,100円
ログインすれば今回のお買い物で獲得できるポイント 28ポイント		※種類異なるポイントの併用、ポイント交換はできません。		

お届け情報 ※必須

ゆうパック
 店頭受取り

配達希望日時

日付指定: お届け日指定なし
 希望時間帯: 時間指定なし

お支払い方法 ※必須 *ご利用できるお支払い方法

商品代引
 銀行振込(前払い)

お買い物オプション

年齢確認 ※必須

未成年者への販売を防ぐため、年齢確認を行っております。チェックをお願いします。

私は20歳以上です。

【配送先指定画面】

- 配送先等に関する確認。氏名や住所などの必須事項が入力されないと次画面に進めない。
- 次画面で注文内容を確認して注文完了。

店舗名

お届け先

【お届け先住所を確認のうえ、入力してください】

氏名 ※必須	姓	名
郵便番号 ※必須	(例:128-4567)	郵便番号から住所検索
都道府県 ※必須	都道府県を選択	
市区町村 ※必須		(例:港区)
番地 ※必須		(例:六本木5-1)
ビル、マンション名		
電話番号 ※必須	(例:03-1234-5678)	

ご請求先

お届け先住所と同じ

※お支払い方法に「商品代引」を選択した場合、ご請求先はお届け先の住所と同じになります。

メールのあて先

ご注文確認メールからのお知らせメールを受け取るメールアドレスを入力してください。

メールアドレス ※必須

携帯電話のメールアドレスの場合、 を受信拒否しないようご注意ください。

ご注文内容

商品名	価格(税込)	数量	数量ポイント	小計
商品名	1,550円	2	-	3,100円
商品の合計金額(税込)				3,100円
送料				※
手数料				※
合計金額(税込)				3,100円

※送料・手数料はご注文内容確認画面で確認できます。詳細はこちらで確認してください。

ご注文内容確認へ

ショッピングカートに戻る

【商品選択画面】

- 商品一覧画面等から希望の商品を選択すると以下の商品の詳細画面へ展開。
- この画面では数量を選択して、「商品を購入する」で次画面へ展開。

商品名

商品名

商品写真

商品を選択する

ブランド: 商品名

数量:

当社販売価格: ¥2,289(税込)

商品番号:

通常1~2日以内出荷予定

在庫数: 11

この商品を一度にお買い上げいただくことができる個数は1個です。

商品を購入する

※商品の安心保証
現在、この商品の
定期購入はありません

サイト

English Site

商品価格に関する更新

内容量: 45錠 JANコード:

※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります

一緒に購入されている商品

商品広告	商品広告	商品広告	商品広告	商品広告
------	------	------	------	------

一緒にチェックされている商品

商品広告	商品広告	商品広告	商品広告	商品広告
------	------	------	------	------

商品名

- ▶ 肩や腕/膝や足関節/腰痛
- ▶ 肩や腕/膝や足関節/腰痛/全身痛
- ▶ 肩や腕/全身痛

関連商品

商品説明

商品名 は、イブプロフェンにアンブロキシール塩酸塩を同時配合したかぜ薬です。アンブロキシール塩酸塩がせきの原因となるたんどの排出を促進し、シビドロコデインリン酸塩と共にせきをしずめます。イブプロフェンが熱を下げ、のどの痛みを緩和。ヨウ化イソプロパミドが鼻水を抑えます。熱・せきをはじめとした「つらいかぜの症状」によく効きます。医薬品。

使用上の注意

●してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15才未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(消炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠中精薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は母乳をさけてください

5. 服用前後は飲酒しないでください

6. 5日間を超えて服用しないでください

●相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、腎臓病、甲状腺機能障害、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病

(7) 次の病気にかかったことのある人。

目・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃腸出血、胸やけ、腹痛、腹部膨満感、口内炎、下痢、血便
精神神経系	めまい、頭痛
循環器	動悸
呼吸器	息切れ
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ、耳なり、むくみ、しびれ感、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中の痛み、過度の体温低下、からだがだるい、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察をうけてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症候群	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等の症状があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。)
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無菌性球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかかわき、寝気

4. 5-6回服用しても症状がよくならない場合(特に熱が3日以上続いたり、また熱が反復したりするとき)は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。

年齢	1回量
成人(15才以上)	3錠
15才未満	服用しないこと

用法・用量に関する注意

用法・用量を厳守してください。

成分・分量

9錠(成人1日量)中

イブプロフェン

アムプロキシソール塩酸塩

保管および取扱い上の注意

- (1)高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。また開封後は品質保持のため、使用期限内であっても、6カ月以内を目安になるべく早めに服用してください。

お問い合わせ先

製薬企業の照会先

文責: 販売元 薬剤師 薬剤師名

【注意喚起】

○ 注意事項等が掲載されており、該当するものがあればチェックボックスにチェックを入れる。チェックが入った場合、チェック項目に応じたメッセージが赤字でその下に表示され、それと同時に画面の最下段にある「購入するために必要な注意事項を読む」ボタンをクリックできなくなる。

商品名

ご購入の前に

商品名

(商品ID:)は医薬品です。下記の当てはまる項目をチェックしてください。

- このお薬,またはこのお薬の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある
◆このお薬を服用することはできません。お薬の成分が体質に合いません。
- このお薬,または他のかぜ薬,解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある
- 日常にお酒を飲んでいる
- 15才未満である
◆このお薬を服用することはできません。
- 出産予定日12週以内の妊婦である
◆このお薬を服用することはできません。
- 授乳中である
- このお薬を5日間以上服用している
◆このお薬は5日間を超えて服用することはできません。
- このお薬の使用期間中に乗物又は機械類の運転操作をしなければならない
- 他のかぜ薬,解熱鎮痛薬,鎮静薬,鎮咳去痰薬,抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬,乗物酔い薬,アレルギー用薬,中枢鎮静薬),目薬鎮痛鎮感薬を服用している
◆このお薬を服用することはできません。お薬と成分が重複したり,同一の効能を持つ成分が含まれています。副作用が強くあらわれることが考えられます。
- 医師または歯科医師の治療を受けている
- 妊娠中だ,または妊娠しているかもしれない
- 65才以上である
- 高熱,排尿困難の症状がある
- 医師に甲状腺機能障害,糖尿病,心臓病,高血圧,肝臓病,腎臓病,緑内障,全身性エリテマトーデス,混合性結合組織病の診断を受けている
- 胃・十二指腸炎,潰瘍性大腸炎,クローン氏病にかかったことがある
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある
◆服用前に医師,薬剤師または登録販売者にご相談ください。体質に合わない成分が含まれているかもしれません。

購入するために必要な注意事項を読む(必須)

【使用上の注意】

- 「購入するために必要な注意事項を読む」 ボタンをクリックすると以下の注意事項が記載されている画面へ展開。
- 購入者は内容を確認し、問題がなければ最下段の「上記内容を確認・了承の上、商品を購入する」 ボタンをクリックすることで購入可能。

商品名	ご使用時の注意事項
商品名	(商品ID:)をご購入いただく前に、下記の注意事項をお読みください。
<ol style="list-style-type: none"> このお薬を服用(使用)することで、まれにショック(アナフィラキシー)の副作用がおこることがあり、緊急に対処する必要があります。以下の症状があらわれたら、ただちに医師の診療を受けてください。 ショック(アナフィラキシー)＜副作用の症状＞服用(使用)直ぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる このお薬は、まれに尿量と似た症状をあらわす重要な副作用を起こすことがあります。このお薬を服用(使用)することで、次の症状があらわれたら緊急に対処する必要があります。ただちに医師の診療を受けてください。 皮膚粘膜炎(ステープンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死剥離症(ライエル症候群)＜副作用の症状＞高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する このお薬は、まれに尿量と似た症状をあらわす重要な副作用を起こすことがあります。このお薬を服用(使用)することで、次の症状があらわれたら緊急に対処する必要があります。ただちに医師の診療を受けてください。 無顆粒球症＜副作用の症状＞発熱の高熱、さむげ、のどの痛み等があらわれる このお薬は、まれに尿量と似た症状をあらわす重要な副作用を起こすことがあります。このお薬を服用(使用)することで、次の症状があらわれたら緊急に対処する必要があります。ただちに医師の診療を受けてください。 無菌性髄膜炎＜副作用の症状＞首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる このお薬を服用(使用)することで、まれに重要な副作用がおこることがあり、対処が必要です。以下の症状があらわれたら、ただちに医師の診療を受けてください。 肝機能障害＜副作用の症状＞発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる このお薬を服用(使用)することで、まれに重要な副作用がおこることがあり、対処が必要です。以下の症状があらわれたら、ただちに医師の診療を受けてください。 腎障害＜副作用の症状＞発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる このお薬を服用(使用)することで、まれに重要な副作用がおこることがあり、対処が必要です。以下の症状があらわれたら、ただちに医師の診療を受けてください。 間質性肺炎＜副作用の症状＞胸膈を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、発熱、発赤等がみられ、これらが急にあらわれたり、増悪したりする このお薬を服用(使用)することで、まれに重要な副作用がおこることがあり、対処が必要です。以下の症状があらわれたら、ただちに医師の診療を受けてください。 せんそう＜副作用の症状＞息をするときぜーぜー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる このお薬を服用(使用)することで、まれに重要な副作用がおこることがあり、対処が必要です。以下の症状があらわれたら、ただちに医師の診療を受けてください。 再生不良性貧血＜副作用の症状＞青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、疲労や顔色が青白くみえる、夜頻尿、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる このお薬を服用することによって、副作用の症状があらわれる可能性があります。副作用の症状は、このお薬の添付文書(説明書)で確認できます。必ずお薬の服用前にご確認ください。 添付文書に記載のある副作用症状、その他気になる症状があらわれた時には速やかに医師、薬剤師または基幹販売者へご相談ください。 5-6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このお薬の添付文書(説明書)もしくはこのお薬(製品)を持って医師、薬剤師または基幹販売者にご相談ください。 <p>◆ここには、知っていただきたい主な事項だけが書いてあります。 ご使用の際は「用法・用量」を守り、必ず添付文書に書かれております「使用上の注意」をよくお読みになってください。</p> <p>掲載されている製品に関する情報は、随時、最新情報に更新するように努力しておりますが、実際の添付文書の記載とは異なっている場合もございますので、必ず製品に入っている添付文書をよくお読みいただいた上で、ご使用になってください。</p> <p style="text-align: center;">上記内容を確認・了承の上、商品を購入する</p>	

◆ご質問やご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。(お問い合わせいただく際は、お薬の『商品名』を必ずご記入ください)


- この商品について、薬剤師に問い合わせフォームから相談する
- この商品について、薬剤師に電話で相談する
受付時間：平日10:00～17:00
フリーダイヤル: [XXXXXXXXXXXX](#)
(携帯電話からは [XXXXXXXXXXXX](#))
- この商品について、薬剤師にTV電話 [XXXXXXXXXX](#) で相談する
受付時間：平日10:00～17:00
電話番号: [XXXXXXXXXX](#)
 - TV電話機能がついている、[XXXXXXXXXX](#) 端末のみご利用できます。
 - 通話料は、お客様のご負担となります。ご了承ください。
- このほか、購入手続きに関するお問い合わせ: [XXXXXXXXXX](#)

[商品ページに戻る](#) > [購入前確認ページに戻る](#)

【参考】薬局・店舗における薬剤師・登録販売者の関与について





薬剤師・登録販売者は、医薬品の選定から販売後の対応にいたるまで、インターネット販売のあらゆる場面で関与し、管理を行っている。



8


【参考】店舗ページでの情報掲載①



医薬品販売にかかる許可証の記載事項				許可情報や薬剤師等の情報、顔写真等、実在を示す情報を掲載
許可の種類	店舗販売業	許可番号	第XXXXXXXX号	
発行年月日	平成XX年XX月XX日	有効期間	平成XX年XX月XX日から平成XX年XX月XX日	
氏名	〇〇株式会社	店舗の名称	ドラッグストア〇〇	
店舗の所在地	東京都〇〇区〇〇 X-XX-XX			
医薬品販売(相談応需含む)に従事する薬剤師・登録販売者の情報				厚労省データベースへのリンク
店舗の管理者		薬剤師 田中 花子 薬剤師登録番号:XXXXXX 登録先:東京都	厚生労働省薬剤師検索システムはこちら	
その他の有資格者		登録販売者 鈴木 太郎 販売従事登録番号:XXXXXX 登録先:東京都		
相談応需を受ける連絡先等の情報				薬剤師等が電話やメール、FAX等で相談応需
電話番号	XX-XXXX-XXXX	メールアドレス	XXXXX@XXXXX.co.jp	
相談応需可能時間	平日10時~17時	緊急連絡先	XXX-XXXX-XXXX	

9

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項	
第一類医薬品とは	実店舗に掲載している 情報と同様の情報を掲載 医薬品関連情報 へのリンクも可能
第二类医薬品とは	
第三類医薬品とは	
第一類医薬品、第二类医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説	
第一類医薬品、第二类医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説	
指定第二类医薬品に関する陳列等に関する解説	
一般用医薬品の陳列に関する解説	
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説	



注意 医薬品をご購入の方へ

「商品名: ■■■■■■ 12錠【第○類医薬品】」

本商品は医薬品となります。購入時は、使用上の注意をよく読み、内容を正確に理解し、必要に応じて医師にご相談ください。また、当日では、医薬品の購入には、18歳以上の会員の方のみとさせていただきます。ご了承ください。

本医薬品をご購入いただく前に、下記の注意事項もご確認ください。

■ 使用してはいけない方
以下の項目に該当する方はこの医薬品を使用することができません(購入できません)

- ・ 15才未満である
- ・ 出産予定日12週以内の妊婦である
- ・ 他の薬剤(薬)を併用している
- ・ 医師から注意喚起がある(貧血、血小板が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等の状態)にある
- ・ 肝臓病、腎臓病、心臓病、糖尿病、高血圧、アレルギー疾患、感染症、免疫抑制剤を服用している

■ 事前に相談が必要な方
以下の項目に該当する方は購入前に薬剤師へご相談ください。

- ・ 購入者は書面による情報提供が必要である。
- ・ 医師または歯科医師の治療を受けている
- ・ 妊娠中または妊娠しているかもしれない

■ ご購入に際し、下記注意事項を必ずお読みください。

- ・ このお薬を服用することによって副作用の症状があらわれる可能性があります。気づくべき副作用の症状はこのお薬の添付文書(説明書)もしくは本サイトの薬剤師から確認できます。お薬の服用前にご確認ください。
- ・ このお薬はまれに医師と似た症状をあらわす重篤な副作用を認めています。このお薬の使用(服用)することによる副作用があらわれらば速に対応する必要があります。ただし、医師の診断を受けてください。
- ・ このお薬はまれに重篤な副作用(肝臓病、腎臓病、心臓病、免疫抑制剤(ステロイド)併用時の副作用、アレルギー反応)をあらわす可能性があります。重篤な副作用の発現・発症等が確認された場合には、速に医師に相談してください。

◆ ここには、知っていただきたい主な事項だけが書いてあります。ご使用の際には「用法・用量」を必ず添付文書にかかれております「使用上の注意」をよくお読みになってください。

掲載されている製剤に関する情報は、随時、最新情報に更新するよう努力しておりますが、実際の添付文書の記載とは異なる場合もございますので、必ず製品に入っている添付文書をお読みください。ご使用になってください。

「使用してはいけない方」「事前に相談が必要な方」の項目に該当しません。必要事項を確認し理解したうえで注文します。

内容に同意し買い物かごへ入ります

上記事項に該当する方は、以下までご連絡ください。
お電話・メール・直接来店などでご連絡させていただきます。

TEL: 00-XXXX-XXXX | メール: xxx@xxxx.co.jp

年齢制限

使用してはいけない方、事前に相談が必要な方に該当しないか、詳細に確認。該当する場合は購入できない、または専門家への事前の相談を呼びかける

書面を用いたの情報提供を必要とする購入者には、プリントアウト等を用いて説明

その他の注意事項等も改めて掲載


各項目を確認してから注文

相談応需の連絡先を記載し、相談しやすく


問い合わせ内容や購買履歴等の情報をもとに、
専門家が販売可否を判断

必要に応じて購入者に連絡を取るなどして、適切な使用を促す

販売後も送付先等購入者の連絡先がわかるため、
販売した医薬品について後日何らかの情報
(例: 販売当時製薬会社が把握していなかった副作用情報等)が
発生した場合には、連絡を取るなどして情報伝達




インターネットでの医薬品購入手順 (※1クリックですぐに手元に届くわけではない)




このような手順の中で、どのようなルールを設けるか、日本オンラインドラッグ協会のガイドラインを参考にしながら、具体的な検討が必要

参考:その他の販売方法における医薬品購入手順①



<電話販売>



<健康保険組合のあっせん>

