

7 特定疾患（難病）関係

(1) 特定疾患医療受給者証所持者数

平成25年度末現在の特定疾患医療受給者証所持者数は855,061人で、男は367,889人(43.0%)、女は487,172人(57.0%)となっている。また、人口10万対でみると671.7となっており、疾患別では「(12)潰瘍性大腸炎」が121.9と最も多く、次いで「(20)パーキンソン病関連疾患」が99.1となっている。(表8)

表8 特定疾患医療受給者証の所持者数

(単位：人)

平成25年度末現在

| | 特定疾患医療受給者証所持者数 | | | |
|---|--------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | (人口10万対) | 男 | 女 |
| 総数 (構成割合：%) | 855 061 (100.0) | 671.7 | 367 889 (43.0) | 487 172 (57.0) |
| (01) ベーチェット病 | 19 147 | 15.0 | 8 220 | 10 927 |
| (02) 多発性硬化症 | 18 082 | 14.2 | 5 054 | 13 028 |
| (03) 重症筋無力症 | 20 691 | 16.3 | 7 661 | 13 030 |
| (04) 全身性エリテマトーデス | 61 528 | 48.3 | 6 738 | 54 790 |
| (05) スモン | 1 473 | 1.2 | 359 | 1 114 |
| (06) 再生不良性貧血 | 10 428 | 8.2 | 4 238 | 6 190 |
| (07) サルコイドーシス | 24 487 | 19.2 | 7 085 | 17 402 |
| (08) 筋萎縮性側索硬化症 | 9 240 | 7.3 | 5 190 | 4 050 |
| (09) 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 49 631 | 39.0 | 8 719 | 40 912 |
| (10) 特発性血小板減少性紫斑病 | 24 956 | 19.6 | 7 713 | 17 243 |
| (11) 結節性動脈周囲炎 | 10 674 | 8.4 | 4 300 | 6 374 |
| (12) 潰瘍性大腸炎 | 155 116 | 121.9 | 84 530 | 70 586 |
| (13) 大動脈炎症候群 | 6 101 | 4.8 | 669 | 5 432 |
| (14) ビュルガー病 | 6 979 | 5.5 | 6 066 | 913 |
| (15) 天疱瘡 | 5 596 | 4.4 | 2 290 | 3 306 |
| (16) 脊髄小脳変性症 | 26 250 | 20.6 | 12 584 | 13 666 |
| (17) クローン病 | 38 271 | 30.1 | 27 031 | 11 240 |
| (18) 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 | 253 | 0.2 | 126 | 127 |
| (19) 悪性関節リウマチ | 6 433 | 5.1 | 1 883 | 4 550 |
| (20) パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病) | 126 211 | 99.1 | 51 841 | 74 370 |
| (21) アミロイドーシス | 2 016 | 1.6 | 1 054 | 962 |
| (22) 後縦靭帯骨化症 | 35 070 | 27.5 | 23 584 | 11 486 |
| (23) ハンチントン病 | 897 | 0.7 | 377 | 520 |
| (24) モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) | 16 086 | 12.6 | 5 202 | 10 884 |
| (25) ウェゲナー肉芽腫症 | 2 176 | 1.7 | 1 028 | 1 148 |
| (26) 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 | 26 556 | 20.9 | 19 976 | 6 580 |
| (27) 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) | 11 956 | 9.4 | 5 952 | 6 004 |
| (28) 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | 353 | 0.3 | 152 | 201 |
| (29) 膿疱性乾癬 | 1 938 | 1.5 | 956 | 982 |
| (30) 広範脊柱管狭窄症 | 5 632 | 4.4 | 3 749 | 1 883 |
| (31) 原発性胆汁性肝硬変 | 21 013 | 16.5 | 2 800 | 18 213 |
| (32) 重症急性膵炎 | 1 730 | 1.4 | 1 138 | 592 |
| (33) 特発性大腿骨頭壊死症 | 16 035 | 12.6 | 8 950 | 7 085 |
| (34) 混合性結合組織病 | 10 539 | 8.3 | 789 | 9 750 |
| (35) 原発性免疫不全症候群 | 1 458 | 1.1 | 865 | 593 |
| (36) 特発性間質性肺炎 | 7 697 | 6.0 | 5 186 | 2 511 |
| (37) 網膜色素変性症 | 27 937 | 21.9 | 11 842 | 16 095 |
| (38) プリオン病 | 487 | 0.4 | 173 | 314 |
| (39) 肺動脈性肺高血圧症 | 2 587 | 2.0 | 803 | 1 784 |
| (40) 神経線維腫症 | 3 794 | 3.0 | 1 653 | 2 141 |
| (41) 亜急性硬化性全脳炎 | 88 | 0.1 | 54 | 34 |
| (42) バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 | 264 | 0.2 | 129 | 135 |
| (43) 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 2 140 | 1.7 | 539 | 1 601 |
| (44) ラインゾーム病(ファブリー[Fabry]病含む。) | 967 | 0.8 | 544 | 423 |
| (45) 副腎白質ジストロフィー | 195 | 0.2 | 186 | 9 |
| (46) 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 155 | 0.1 | 75 | 80 |
| (47) 脊髄性筋萎縮症 | 797 | 0.6 | 482 | 315 |
| (48) 球脊髄性筋萎縮症 | 1 094 | 0.9 | 1 089 | 5 |
| (49) 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 4 018 | 3.2 | 2 420 | 1 598 |
| (50) 肥大型心筋症 | 3 616 | 2.8 | 2 148 | 1 468 |
| (51) 拘束型心筋症 | 31 | 0.0 | 21 | 10 |
| (52) ミトコンドリア病 | 1 246 | 1.0 | 547 | 699 |
| (53) リンパ脈管筋腫症(LAM) | 586 | 0.5 | 3 | 583 |
| (54) 重症多形滲出性紅斑(急性期) | 68 | 0.1 | 22 | 46 |
| (55) 黄色靭帯骨化症 | 3 088 | 2.4 | 2 019 | 1 069 |
| (56) 間脳下垂体機能障害 (PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) | 19 204 | 15.1 | 9 085 | 10 119 |

(2) 特定疾患登録者証所持者数

平成 25 年度末現在の特定疾患登録者証所持者数は 68,807 人で、男は 27,977 人 (40.7%)、女は 40,830 人 (59.3%) となっている。また、人口 10 万対で見ると 54.1 となっており、疾患別では「(07)特発性血小板減少性紫斑病」が 10.9 と最も多く、次いで「(09)潰瘍性大腸炎」が 8.6 となっている。(表 9)

表 9 特定疾患登録者証の所持者数

(単位：人)

平成 25 年度末現在

| | 特定疾患登録者証所持者数 | | | |
|---|-------------------|----------|------------------|------------------|
| | | (人口10万対) | 男 | 女 |
| 総数 (構成割合：%) | 68 807 (100.0) | 54.1 | 27 977 (40.7) | 40 830 (59.3) |
| (01) ベーチェット病 | 2 073 | 1.6 | 698 | 1 375 |
| (02) 重症筋無力症 | 1 454 | 1.1 | 461 | 993 |
| (03) 全身性エリテマトーデス | 3 647 | 2.9 | 433 | 3 214 |
| (04) 再生不良性貧血 | 3 581 | 2.8 | 1 499 | 2 082 |
| (05) サルコイドーシス | 10 500 | 8.2 | 3 560 | 6 940 |
| (06) 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 1 832 | 1.4 | 428 | 1 404 |
| (07) 特発性血小板減少性紫斑病 | 13 830 | 10.9 | 4 195 | 9 635 |
| (08) 結節性動脈周囲炎 | 313 | 0.2 | 126 | 187 |
| (09) 潰瘍性大腸炎 | 10 944 | 8.6 | 5 178 | 5 766 |
| (10) 大動脈炎症候群 | 556 | 0.4 | 65 | 491 |
| (11) ビュルガー病 | 577 | 0.5 | 491 | 86 |
| (12) 天疱瘡 | 478 | 0.4 | 165 | 313 |
| (13) クローン病 | 1 528 | 1.2 | 855 | 673 |
| (14) 悪性関節リウマチ | 72 | 0.1 | 26 | 46 |
| (15) 後縦靭帯骨化症 | 6 863 | 5.4 | 4 702 | 2 161 |
| (16) モヤモヤ病(ウリス動脈輪閉塞症) | 2 609 | 2.0 | 880 | 1 729 |
| (17) ウェゲナー肉芽腫症 | 97 | 0.1 | 43 | 54 |
| (18) 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | 10 | 0.0 | 5 | 5 |
| (19) 膿疱性乾癬 | 48 | 0.0 | 14 | 34 |
| (20) 広範脊柱管狭窄症 | 545 | 0.4 | 389 | 156 |
| (21) 特発性大腿骨頭壊死症 | 5 750 | 4.5 | 3 171 | 2 579 |
| (22) 混合性結合組織病 | 480 | 0.4 | 63 | 417 |
| (23) 特発性間質性肺炎 | 543 | 0.4 | 316 | 227 |
| (24) バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 | 49 | 0.0 | 24 | 25 |
| (25) 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 28 | 0.0 | 12 | 16 |
| (26) 肥大型心筋症 | 11 | 0.0 | 5 | 6 |
| (27) 拘束型心筋症 | - | - | - | - |
| (28) ミトコンドリア病 | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
| (29) 黄色靭帯骨化症 | 161 | 0.1 | 100 | 61 |
| (30) 間脳下垂体機能障害 (PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH 分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、 クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) | 226 | 0.2 | 72 | 154 |