

表2 三大死因の年齢調整死亡率(人口10万対)の年次推移

性別	昭和35年	40年	45年	50年	55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年
全死因											
男	1476.1	1369.9	1234.6	1036.5	923.5	812.9	747.9	719.6	634.2	593.2	544.3
女	1042.3	931.5	823.3	685.1	579.8	482.9	423.0	384.7	323.9	298.6	274.9
悪性新生物											
男	188.2	195.6	199.2	198.9	210.9	214.8	215.6	226.1	214.0	197.7	182.4
女	132.0	130.3	126.9	121.1	118.8	113.1	107.7	108.3	103.5	97.3	92.2
心疾患											
男	153.3	156.0	161.7	150.0	158.0	146.9	139.1	99.7	85.8	83.7	74.2
女	111.9	111.1	114.5	106.3	103.9	94.6	88.5	58.4	48.5	45.3	39.7
脳血管疾患											
男	341.1	361.0	333.8	265.0	202.0	134.0	97.9	99.3	74.2	61.9	49.5
女	242.7	243.8	222.6	183.0	140.9	95.3	68.6	64.0	45.7	36.1	26.9

表3 三大死因の粗死亡率(人口10万対)の年次推移

性別	昭和35年	40年	45年	50年	55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年
全死因											
男	822.9	785.0	766.6	690.4	682.9	690.6	736.5	822.9	855.3	949.4	1029.2
女	692.2	643.1	619.0	574.0	561.8	562.7	602.8	664.0	679.5	772.3	869.2
悪性新生物											
男	110.9	122.1	132.6	140.6	163.5	187.4	216.4	262.0	291.3	319.1	343.4
女	90.2	95.2	100.7	105.2	115.5	125.9	139.3	163.1	181.4	200.3	219.2
心疾患											
男	75.8	80.5	90.9	92.1	112.1	121.5	135.7	114.4	117.3	136.3	144.2
女	70.8	73.6	82.7	86.4	100.5	113.2	134.0	109.6	116.3	138.0	155.2
脳血管疾患											
男	172.1	192.2	191.5	164.3	142.7	110.6	95.6	114.2	102.7	103.3	97.7
女	149.6	160.0	160.7	149.4	136.4	113.9	103.0	121.4	108.2	107.1	97.6