

3

使用上の注意の改訂について (その258)

平成26年7月8日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせします。

精神神経用剤

1 パロキセチン塩酸塩水和物

[販売名] パキシル錠5mg, 同錠10mg, 同錠20mg, 同CR錠12.5mg, 同CR錠25mg (グラクソ・スミスクライン) 他

[副作用
(重大な副作用)] アナフィラキシー：アナフィラキシー（発疹、血管浮腫、呼吸困難等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

主としてカビに作用するもの

2 アムホテリシンB [非リポソーム製剤（注射剤）]

[販売名] ファンギゾン注射用50mg (ブリストル・マイヤーズ)

[副作用
(重大な副作用)] 中枢神経障害：本剤の髄腔内注入で、髄膜炎、脳症、脊髄障害、対麻痺等があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。

一般用医薬品

3

- ①イブプロフェン・塩酸プロソイドエフェドリン・クロルフェニラミンマレイン酸塩・ジヒドロコデインリン酸塩・無水カフェイン
②イブプロフェン・塩酸プロソイドエフェドリン・L-カルボシスチイン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩・ジヒドロコデインリン酸塩・無水カフェイン

[販 売 名] ①ベンザブロックL, 同L錠 (武田薬品工業)

②ベンザブロックLプラス, 同Lプラス錠 (武田薬品工業)

[相談すること] 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群), 中毒性表皮壊死融解症, 急性汎発性発疹性膿疱症: 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ (小膿疱) が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

一般用医薬品

4

茵陳蒿湯

[販 売 名] 「クラシエ」漢方茵陳蒿湯エキス顆粒 (クラシエ製薬) 他

[相談すること] 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
腸間膜静脈硬化症: 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。
