

肝臓の取扱い（たたき台）（素案）

第〇 肝臓の障害

1 現行の認定基準

具体的な認定基準は定められておらず、胸部臓器の障害と同様の基準により障害の労働能力に及ぼす支障の程度を総合的に判定することとしている。

2 肝臓の機能と業務上の傷病による影響

(1) 肝臓の構造と機能

ア 肝臓の構造

肝臓は、右上腹部に存在する。

肝臓は、右葉と左葉に分けられ、右葉は左葉に比較して大きい。肝下面の中央にある肝門部と呼ばれる領域には、総胆管、固有肝動脈及び門脈がある。

イ 肝臓の機能

肝臓は多様な機能を営むものであるが、大きく次の4つの機能に要約される。

- ① 胆汁の生産と分泌
- ② 炭水化物、脂肪、蛋白、ビタミンの代謝合成分泌、貯蔵
- ③ 胃腸管から血液中に侵入した細菌や異物の補足
- ④ 生体異物（薬物など）の代謝

(2) 業務上の傷病による影響

肝臓の機能に影響を与える傷病には、様々なものがあるが、業務上の事由による傷病により機能が継続的に低下したもののみが障害補償の対象になることを考えると、

- ① 医療従事者の針刺し事故等によるウイルス性慢性肝炎、これに由来する肝硬変及び肝がん
 - ② 外傷による肝臓損傷
 - ③ 化学物質による肝障害
- について検討することで足りると考える。

3 検討の視点

- (1) 慢性肝炎については、治ゆ後においてアフターケアを利用することが一定の要件のもとに認められている。しかしながら、慢性肝炎の原因となったウイルスを排除できない場合にはウイルスに持続的に感染している状態となり、徐々に肝機能の低下等をもたらすことから、どのような状態となった場合に慢性肝炎を治ゆとすることが適当であるのかについて検討する。

- (2) 慢性肝炎の多くを占める C 型慢性肝炎の場合、ほとんど自覚症状はないが、この場合についても治ゆ後において障害補償の対象とする必要があるのか検討する必要がある。また、B 型慢性肝炎については一定の症状が生じることがあるが、急性症状が再燃した場合には再発として取り扱うことから、同様の観点から検討する必要がある。
- (3) 治ゆ後急性症状が再燃した場合等再び療養が必要となる場合があるが、どのような状態に至った場合、再発として療養を認めるのが適当か検討すべきである。
- (4) 従来、慢性肝炎が悪化し、肝硬変になった場合には一律に療養が必要なものとして取り扱われているが、肝硬変についても代償期には自覚症状もほぼ認められないことから、肝硬変についても療養の必要性を判断する基準を検討すべきである。
- (5) 肝臓を外傷により損傷し、肝臓を部分的に切除することがあるが、肝臓については大きな予備能があるとともに、再生力もあることを考慮したうえで、肝臓を外傷により損傷した場合の障害等級の設定について検討すべきである。
- (6) 肝臓は、生体異物等の代謝を行う器官であり、化学物質等による肝機能障害をきたすことがあるが、このような肝機能障害について障害補償の対象とする必要があるか検討する必要がある。

4 検討の内容

(1) 慢性肝炎及び肝硬変の病因・症状等

ア 慢性肝炎

(ア) 病因

慢性肝炎とは、6か月以上肝に炎症が持続していると思われる病態であり、臨床的には6か月以上の肝機能検査の異常とウイルス感染が持続している病態である。広義には、自己免疫性肝炎なども含まれる。

しかしながら、障害補償は業務上の疾病に限って行うことを念頭に置くと、上記のとおり慢性ウイルス性肝炎を検討すればよいと考えられる。

慢性ウイルス性肝炎となりうるウイルスとしては、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルス及びD 型肝炎ウイルスがあるが、我が国においてはD 型肝炎ウイルスによる急性肝炎自体がきわめてまれである。また、B 型慢性肝炎は生下時に母親からB 型肝炎ウイルスに感染する例がほとんどであり、成人では急性肝炎を発症しても慢性肝炎に移行することは極めてまれである。一方、C 型肝炎ウイルスは母子感染はまれであり、医療行為等を通じて感染し、急性肝炎を発症した場合の60~70%は慢性化するとされているので、業務上の慢性肝炎としては主としてC 型肝炎ウイルスによるものを考えればよいこととなる。

(イ) 治療効果と治ゆ等

a 治療効果等

C型慢性肝炎は自然治ゆは極めてまれであるとされているが、インターフェロン治療等により約3割はウイルスが陰性化し、完治するとされている。また、C型慢性肝炎は、ほとんど症状がないことから、臨床症状の有無は治療にとって重要ではなく、肝機能検査値（AST、ALTなど）が異常を示す場合には治療を行うべきであるとされている。

一方、B型慢性肝炎の場合には、AST、ALTが持続的に正常化し、臨床的には自然治ゆが期待できるものの、現在のところ治療によってウイルスを排除することはできないとされている。

また、B型慢性肝炎では急性増悪することがあり、増悪時に黄疸、全身倦怠感、食欲低下などの症状を伴うことがある。このような場合、急性肝炎が劇症肝炎へと進行することがあり、適切な治療を行うべきであるとされている。

b 治ゆ

(a) C型慢性肝炎

C型慢性肝炎については、インターフェロン等の著効例があること及び難治例があることを踏まえ、次の場合に治ゆとすべきである。

① 「AST、ALTの値が正常化し、ウイルスが排除されたことが確認された（インターフェロン投与終了後6か月以上陰性化が持続しているものに限る。）場合又は「ウイルス排除は確認されていないものの、AST、ALTの値が持続的に正常である」場合

② 「インターフェロン等による治療にもかかわらず治療効果が認められない」場合

ただし、次に該当する場合には「インターフェロン等による治療にもかかわらず治療効果が認められない」ときであっても、治ゆとすることは適当ではない。

① 線維化の進行が著しい場合

② AST、ALTの値が持続的に200IU/Lを超える場合

①に該当する場合には、慢性肝炎の悪化の進行が著しく、症状が安定しているとは考えられないためであり、②に該当する場合には、安静加療を要するとされているからである。

(b) B型慢性肝炎

B型慢性肝炎については、自然治ゆ例があること及び難治例があることを踏まえ、「HBe抗原が陰性化するとともに、HBe抗体が陽性化し（セロコンバージョン）、1年以上にわたりAST,ALTが正常範囲にある」場合又はC型の難治例と同様に

「治療効果が認められない場合」に症状固定したとするべきである。

(ウ) 肝機能障害の治ゆ後の症状等

C型慢性肝炎の場合、ウイルスが排除され、持続陰性化した場合には、病態が進行することではなく、肝機能も正常化するのが通常である。ただし、ウイルスが排除・陰性化されても肝組織の線維化が進んでいることはあり、その場合には肝機能の障害が残ることがある。

しかしながら、ウイルスが排除・陰性化され、肝機能検査値が正常化した場合には、線維化も徐々に改善される。

一方、治療効果がなく治ゆとした場合は、ウイルスに持続的に感染されている状態であるから、徐々に病態は進行するが、慢性ウイルス性肝炎のほとんどの例では、患者の自覚症状はないとされている。患者の自覚症状のない無症候性の肝炎の場合、一般健康人と同様に通常の労働に従事して差し支えなく、労務に支障は生じないのが通常である。

【要検討】

まれに全身倦怠感等の非特異的な症状を呈することがあるとされているが、その場合においては、11級又は13級の障害として評価することが適當か。

あるいは、非特異的な症状であり、かつ、臨床症状の有無は治療にとり、重要ではないとされていること、肝機能障害が一定以上に達した場合には療養の対象とするので、その症状は一般的に軽いと考えられることから、障害として評価することは適當ではないとすべきか。

なお、C型慢性肝炎の場合、組織学的所見の進展速度は速くないものの、B型慢性肝炎のように自然に寛解する例はみられないとされており、治療を行わない場合には慢性肝炎から肝硬変を経て肝癌に至るとされている。この点に関し、輸血後C型慢性肝炎の場合では、発症から肝硬変まで約20年、肝細胞癌までは約30年を要するという報告がある。ただし、感染時年齢によって進行速度は異なり、高齢での感染は若年時に感染した場合よりも進行が速いと言われている。

B型慢性肝炎の場合も同様に慢性活動性肝炎、肝硬変、肝細胞癌へと病態は進行するが、C型慢性肝炎と異なり、急性症状が再燃し、各種の身体所見を呈することがあり、その場合には急激に病態が進行すると言われている。

(エ) 再発

ウイルスを陰性化できない状態のまま治ゆしたものについては、急性症状が再燃した場合又は肝硬変へと進展し、肝硬変合併症が出現した場合等症状が増悪した場合に再発として取り扱うことが適当である。

また、AST, ALT の値が持続的に 200IU/L を超える場合についても安静加療を要するから、再発として取り扱うことが適当である。

なお、いったん完治（ウイルスが排除され、肝機能が正常化したもの）したものの、肝機能検査の結果が悪化し、異常値を示した場合や肝がんを生じた場合には再発として取り扱うことが適当である。

イ 肝硬変

(ア) 症状

肝硬変初期には腹水、肝性脳症、食道静脈瘤などの生命に関わる重大な合併症はみられず、自覚症状に乏しい（代償期）。肝炎の終息がない場合、これらの重大な合併症が出現（非代償期）し、浮腫、吐血、意識障害などを呈するようになる。

また、他覚的所見としては次のようなものがある。

- ① 肝脾腫
- ② 肝性脳症
- ③ 腹水、胸水、浮腫
- ④ 食道・胃の静脈瘤

皮膚症状等

(イ) 治療・予後

ウイルスが排除されない場合、肝硬変そのものの病態を治ゆさせることは不可能であり、治療は一般状態の改善と合併症の治療に限られるとされている。

一方、食道・胃の静脈瘤破裂による死亡は治療法の進歩に伴い著減しているものの、肝癌合併比率は極めて高く、また、ウイルスなど原因が除かれない限り進行性であることから、原則として肝硬変の状態に至った場合には治ゆとすることは適当ではないと考えられる。

ただし、合併症の症状がでていない代償期の肝硬変の場合であって、治療によりウイルスが陰性化し、肝機能検査の結果が正常になったときにあっては、治ゆとすべきである。

(3) 肝損傷の分類と後遺症状

日本外傷学会においては、次のような分類を規定している。

【日本外傷学会 肝損傷分類】

- I型 皮膜下損傷 Subcapsular injury
 - a. 皮膜下血腫 Subcapsular hematoma
 - b. 中心性破裂 Central rupture
- II型 表在性損傷 Superficial injury
- III型 深在性損傷 Deep injury
 - a. 単純型 Simple type
 - b. 複雑型 Complex type

Appendix : 肝損傷に合併した傍肝血管、肝門部胆管の表現

胆後面下大静脈損傷 (IVC)、肝静脈損傷 (HV)、肝動脈損傷 (HA)、門脈損傷 (P)、胆管損傷 (B)

このうち、I型は、肝皮膜の連続性が保たれているものであり、腹腔内出血を伴わないもの、II型は深さ3cm以内の損傷であり、深部の太い血管、胆管の損傷はなく、死腔を残さず縫合が可能なもの、III型のうち、単純型は組織挫滅が少なく、組織の壊死を伴わないものであるので、後遺症状を検討する必要があるのは、III型のうち、複雑型ということとなる。

このような重症な肝損傷の場合、出血を止めるとともに、肝部分切除や縫合等の治療が行われるが、肝臓には大きな予備能があるとともに、再生力があることから、一時的に肝臓の機能が低下したとしても、その後通常機能は正常に復すると考えられる。

(4) 化学物質による肝障害

四塩化炭素等の化学物質により肝障害が生じている場合には、通常化学物質への曝露から離れると、症状は軽快し、肝機能は正常化する。

まれに持続的に四塩化炭素に曝露し、肝硬変となることがあるが、その場合には慢性肝炎に係る肝硬変の項目で記したとおりの症状が生じる。この場合、留意しておく必要があるのは、肝硬変は肝障害因子が持続的に存在しない限り進行しないということであり、この点を踏まえて療養の要否を検討する必要がある。

なお、塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫は、業務上の疾病と認められているが、そのような症状が生じた場合には、予後は不良であり、継続的に療養を要するから、治ゆとすることは適当ではない。

(5) 障害等級

ア 慢性肝炎

前記のとおり慢性肝炎に罹患し持続的にウイルスに感染している場合であっても、C型慢性肝炎の場合、通常自覚症状は生じないことから、労働に支障を及ぼすとは考えられないので、障害には該当しない。

また、B型慢性肝炎の場合もほとんどの症例は肝庇護薬等の使用により 100 IU/L 前後であり、通常の業務に服し、職種制限も認められないので、障害には該当しない。

なお、急性症状が再燃した場合又は AST, ALT が 200 IU/L を越える高値を示した場合には、治療が必要となることから、その場合には再発として積極的な治療行為を行うべきである。

イ 肝硬変

肝硬変が非代償期にいたった場合には、治療が不可欠であることから、治ゆとし、障害認定することは適当ではない。

ただし、肝硬変が代償期にとどまるものであって、治療によりウイルスが陰性化・消失した場合には、治ゆとすることが適当であるが、通常自覚症状は生じないことから、労働に支障を及ぼすとは考えられないので、障害には該当しない。

なお、腹水、肝性脳症、食道静脈瘤等の合併症を併発している場合には、積極的な治療が必要であるので、治ゆとすることは適当ではなく、いったん治ゆとした場合には、再発として取り扱うことが適当である。

ウ 肝損傷

上記のとおり、肝の部分切除等により一時的に肝臓の機能が低下したとしても、その後機能は正常に復するのが通常と考えられることから、基本的には障害には該当しない。

エ 肝細胞がん

慢性肝炎、肝硬変が長期にわたった場合、肝細胞癌が出現する。基礎病変として多くは肝硬変を伴っており、肝硬変及び肝細胞がんに対する治療が不可欠であることから、治ゆとすることは適当ではない。

オ 化学物質による肝障害

上記のとおり、四塩化炭素等の化学物質による肝障害は曝露から離れると速やかに軽快し、肝機能が正常化するのが通常であるので、基本的には障害には該当しない。

まれに肝硬変が生じることもあるが、その場合には慢性肝炎の取扱いに準じ

て取り扱うべきであり、同様にまれに肝血管肉腫が生じた場合には、療養を継続すべきである。

参考：『スネル臨床解剖学』山内 昭夫訳 メディカル・サイエンス・インターナショナル 2002年

『内科学書』責任編集 島田 騒 中山書店 1999年

『新臨床内科学』 監修 高久 史磨 医学書院 2002年

『標準救急医学』 監修 日本救急医学会 医学書院 平成13年

ウイルス肝炎感染対策ガイドライン

慢性肝炎診療のためのガイドライン

肝炎対策に関する有識者会議報告書

C型肝炎について（一般的なQ & A）