

	潜在的・無症候性梅毒反応陽性者	標準		
	白癬症	標準		
	破傷風	標準		
	バビシア症	標準		
	パラインフルエンザウイルス感染症、乳幼児の呼吸器性	接触	罹病期間中	
	パルボウイルスB19	標準		
	ハンタウイルス呼吸器症候群	標準		
	ハンセン病	標準		
ひ	ヒトブラズマ症	標準		
	羊驚口瘡	標準		
	ヒト由来ウイルス脳炎(東、西ベネゼエラ馬脳炎:セントルイス、カリフォルニア脳炎)	標準		
	ヒト由来ウイルス熱(デング熱、黄熱、コロラドダニ熱)	標準		
	百日咳	飛沫	有効な治療開始後 5日まで	
ふ	風疹			
	ブドウ球菌(黄色ブドウ球菌)			
	皮膚、創傷・熱傷の			
	大	接触	罹病期間中	
	小	標準		
	腸炎	標準		
	熱傷皮膚症候群	接触	罹病期間中	
	トキシックショック症候群	標準		
	ブルセラ症(波状熱、マルタ熱、地中海熱)	標準		
	分芽菌症 北アメリカ、皮膚・肺	標準		
	糞中症	標準		
へ	閉鎖腔感染症			
	排膿、少量	標準		
	排膿なし	標準		
	ペスト			
	腺ペスト	標準		
	肺ペスト	飛沫	有効な治療開始後72時間まで	