

大切な腎臓を守るために、T市の特徴を見てみよう

腎臓の病気分類	GFR 基準 (mg/分)	年齢	性別	糸球体ろ過量 (GFR) (mg/分)	血清クレアチニン 1.3mg/分以上	+危険因子の重なり				
						血圧	尿酸	脂質異常	糖代謝異常	BMI
						収縮期:140mmHg以上 拡張期:90mmHg以上 または高血圧で治療中	7mg/d以上 または 高尿酸血症・痛風で 治療中	LDL:140mg/d以上 または 高脂血症で治療中	空腹時血糖: 110mg/d以上 随時血糖: 140mg/d以上 HbA1c 5.5%以上 または糖尿病で治療中	25以上
(人工透析)	15.0未満	65	女	6.6	5.98	○	○		○	
		65	男	13.8	4.1	○	○			
腎機能不全期	15	87	女	19.6	2.22	○				○
		89	男	20.2	1.94					
		72	女	23.0	2	○			○	
		91	男	23.4	2.45		○			
		81	女	25.5	1.79	○				
		67	男	28.7	2.16	○				○
腎機能障害期	29.9	77	男	29.0	2.09		○		○	
		30	女	31.4	1.78			○		
		81	女	33.8	1.4	○				
		77	女	34.2	1.4	○				
		71	女	35.1	1.39	○			○	
		70	男	35.2	1.8	○		○		
		76	男	35.7	1.75	○		○		
		80	男	35.8	1.73	○		○		
		84	女	36.0	1.32	○				
		82	男	36.9	1.68				○	
		51	男	37.3	1.81					○
		51	女	38.4	1.36					
		56	男	38.8	1.72			○		
		76	男	38.8	1.63	○		○		
		69	男	39.3	1.64	○			○	
		85	男	39.6	1.57	○		○		
		71	男	40.8	1.58	○			○	○
		79	男	40.8	1.55				○	
		72	男	40.9	1.57			○		
		83	男	41.0	1.53	○		○		
		75	男	41.5	1.54	○		○		
		65	男	42.4	1.55				○	
		69	男	42.5	1.53	○				
		71	男	42.6	1.52					○
		80	男	42.6	1.49					
		90	男	42.9	1.45	○				
		58	男	43.1	1.56	○		○		
		79	男	43.3	1.47	○				
		79	男	43.3	1.47			○		○
		73	男	43.4	1.49				○	
		76	男	43.7	1.47				○	○
		79	男	43.7	1.46	○		○		
		81	男	43.8	1.44					
		82	男	44.8	1.42					
		61	男	45.0	1.49	○			○	
		68	男	45.0	1.46	○			○	
		74	男	45.0	1.44	○		○		
		65	男	45.1	1.47	○		○		
		78	男	45.2	1.42	○				○
		77	男	45.3	1.42			○		
		66	男	45.7	1.45	○			○	
		64	男	46.0	1.45			○		
		80	男	46.1	1.39			○		
		67	男	46.3	1.43			○		
		67	男	46.3	1.43	○		○		○
		73	男	46.6	1.4			○		○
		85	男	46.7	1.36				○	
		74	男	46.8	1.39	○		○		
		77	男	46.9	1.38	○		○		
		62	男	47.0	1.43	○		○		
73	男	47.0	1.39	○		○		○		
71	男	47.2	1.39	○		○		○		
78	男	47.5	1.36				○			
81	男	47.6	1.35	○			○			
83	男	47.7	1.34	○			○			
85	男	47.9	1.33				○			
77	男	48.5	1.34	○				○		
91	女	48.5	1.3	○		○				
70	男	48.6	1.36	○			○			
73	男	48.6	1.35			○				
74	男	48.9	1.34	○			○			
77	男	49.3	1.32	○						
81	男	49.3	1.31				○			
62	男	49.4	1.37			○				
80	男	49.4	1.31					○		
79	男	49.5	1.31	○		○				
64	男	49.9	1.35	○			○			
79	男	49.9	1.3	○				○		
66	男	50.0	1.34	○			○			
72	男	50.0	1.32	○			○			
75	男	50.0	1.31	○		○		○		
49	男	50.1	1.41							
68	男	50.1	1.33	○			○			
69	男	50.4	1.32				○			
69	男	50.4	1.32			○				
71	男	50.6	1.31	○			○			
62	男	50.7	1.34	○		○				
70	男	50.7	1.31				○			
70	男	50.7	1.31							
計				87	重なり数(人)	51	34	7	40	13
					割合	58.6%	39.1%	8.0%	46.0%	14.9%

高血圧+高尿酸の重なり 19名 (21.8%)